

חוג: תהא R קבוצה ותהיינה $+, *$ פעולות בינאריות אזי $(R, +, *)$ המקיים

• $(R, +)$ חבורה אבלית.

• אסוציאטיביות כפל: לכל $a, b, c \in R$ מתקיים $(a * b) * c = a * (b * c)$.

• חוג הפילוג משמאל: לכל $a, b, c \in R$ מתקיים $a * (b + c) = (a * b) + (a * c)$.

• חוק הפילוג מימין: לכל $a, b, c \in R$ מתקיים $(b + c) * a = (b * a) + (c * a)$.

סימון: יהי $(R, +, *)$ חוג ויהי e איבר היחידה של $(R, +)$ אזי $0_R = e$.

חוג אבל/קומוטטיבי/חילופי: חוג $(R, +, *)$ המקיים $a * b = b * a$ לכל $a, b \in R$.

חוג בעל יחידה: חוג $(R, +, *)$ עבורו $(R, *)$ בעל איבר יחידה m וכן $m \neq 0_R$.

סימון: יהי $(R, +, *)$ חוג ויהי m איבר היחידה של $(R, *)$ אזי $1_R = m$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}$ אזי \mathbb{Z}_n חוג אבל בעל יחידה וכן \mathbb{Z} חוג אבל בעל יחידה.

טענה: יהי R חוג אבל בעל יחידה ויהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $R[x_1 \dots x_n]$ חוג אבל בעל יחידה.

תחום שלמות: חוג אבל R עבורו לכל $a, b \in R$ המקיימים $ab = 0$ מתקיים $(a = 0) \vee (b = 0)$.

טענה: יהי R תחום שלמות ויהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $R[x_1 \dots x_n]$ תחום שלמות.

הגדרה: יהי R חוג אבל בעל יחידה אזי $R^\times = \{a \in R \mid \exists h \in R. ah = ha = 1\}$.

למה: יהי R חוג אבל בעל יחידה אזי $(R^\times, *)$ חבורה.

טענה: יהי R חוג אבל בעל יחידה אזי $(R[x])^\times = R^\times$.

שדה: חוג אבל בעל יחידה \mathbb{F} המקיים $\mathbb{F}^\times = \mathbb{F} \setminus \{0\}$.

הגדרה: יהי R תחום שלמות באשר $R \neq \{0\}$ אזי $\sim_{\text{Frac}} = \{((a, b), (c, d)) \in (R \times (R \setminus \{0\}))^2 \mid ad = bc\}$.

סימון: יהי R תחום שלמות באשר $R \neq \{0\}$ אזי $\text{Frac}(R) = R / \sim_{\text{Frac}}$.

הגדרה: יהי R תחום שלמות באשר $R \neq \{0\}$ ויהיו $(a, b), (c, d) \in R \times (R \setminus \{0\})$ אזי $[(a, b)]_{\text{Frac}} + [(c, d)]_{\text{Frac}} = [(ad + cb, bd)]_{\text{Frac}}$.

וכן $[(a, b)]_{\text{Frac}} \cdot [(c, d)]_{\text{Frac}} = [(ac, bd)]_{\text{Frac}}$.

טענה שדה השברים: יהי R תחום שלמות באשר $R \neq \{0\}$ אזי $\text{Frac}(R)$ שדה.

טענה: יהי \mathbb{K} שדה אזי $\mathbb{K}[x]$ תחום שלמות.

פונקציות רציונליות: יהי \mathbb{K} שדה אזי $\mathbb{K}(x) = \text{Frac}(\mathbb{K}[x])$.

מסקנה: יהי $\mathbb{K}(x)$ שדה אזי $\mathbb{K}(x)$ שדה.

הומומורפיזם בין חוגים: יהיו R, S חוגים אזי $\nu : R \rightarrow S$ המקיימת

• משמרת כפל: לכל $a, b \in R$ מתקיים $\nu(ab) = \nu(a)\nu(b)$.

• משמרת חיבור: לכל $a, b \in R$ מתקיים $\nu(a + b) = \nu(a) + \nu(b)$.

גרעין: יהיו R, S חוגים ויהי $\nu : R \rightarrow S$ הומומורפיזם אזי $\ker(\nu) = \nu^{-1}[\{0\}]$.

למה: יהיו R, S חוגים ויהי $\nu : R \rightarrow S$ הומומורפיזם אזי $\ker(\nu), \text{Im}(\nu)$ חוגים.

מונומורפיזם: יהיו R, S חוגים אזי הומומורפיזם $\nu : R \rightarrow S$ באשר ν חח"ע.

למה: יהיו R, S חוגים ויהי $\nu : R \rightarrow S$ הומומורפיזם אזי $(\nu \text{ מונומורפיזם}) \iff (\ker(\nu) = 0)$.

אפימורפיזם: יהיו R, S חוגים אזי הומומורפיזם $\nu : R \rightarrow S$ באשר ν על.

למה: יהיו R, S חוגים ויהי $\nu : R \rightarrow S$ הומומורפיזם אזי $(\nu \text{ אפימורפיזם}) \iff (\text{Im}(\nu) = S)$.

איזומורפיזם: יהיו R, S חוגים אזי הומומורפיזם $\nu : R \rightarrow S$ באשר ν חח"ע ועל.

סימון: יהיו R, S חוגים איזומורפיים אזי $R \simeq S$.

למה: יהיו R, S חוגים ויהי $\nu : R \rightarrow S$ הומומורפיזם אזי $(\nu \text{ איזומורפיזם}) \iff (\nu \text{ מונומורפיזם וכן } \nu \text{ אפימורפיזם})$.

אידאל: יהי R חוג אבל אזי $I \subseteq R$ המקיימת $I \cdot R \subseteq I$ וכן $I + I \subseteq I$.

טענה: יהי R חוג אבל ויהי $I \subseteq R$ אידאל אזי $(I, +) \leq (R, +)$.

טענה: יהיו R, S חוגים ויהי $\nu : R \rightarrow S$ הומומורפיזם אזי $\ker(\nu)$ אידאל.

משפט: יהי R חוג אבל בעל יחידה אזי $(R \text{ שדה}) \iff (I \subseteq R \text{ לכל אידאל } I \text{ מתקיים } I \in \{\{0\}, R\})$.

מסקנה: יהיו \mathbb{F}, \mathbb{K} שדות ויהי $\nu : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{K}$ הומומורפיזם אזי $(\nu \text{ מונומורפיזם}) \vee (\nu = 0)$.

הגדרה: יהי R חוג אבל ויהי $I \subseteq R$ אידאל אזי $R/I = \{a + I \mid a \in R\}$.

טענה: יהי R חוג אבל ויהי $I \subseteq R$ אידאל ויהיו $a, b, c, d \in R$ באשר $a + I = c + I$ וכן $b + I = d + I$ אזי $(ab) + I = (cd) + I$.

הגדרה: יהי R חוג אבל ויהי $I \subseteq R$ אידאל ויהיו $a, b \in R$ אזי $(a + I)(b + I) = (ab) + I$.

משפט חוג מנה: יהי R חוג אבלי ויהי $I \subseteq R$ אידאל אזי R/I חוג אבל.

טענה: יהי R חוג אבלי יהי $I \subseteq R$ אידאל ונגדיר $p : R \rightarrow R/I$ כך $p(a) = a + I$ אזי p הינו אפימורפיזם חוגים וכן $\ker(p) = I$.

למה: יהיו R, S חוגים ויהי $\nu : R \rightarrow S$ הומומורפיזם חוגים אזי $R/\ker(\nu)$ חוג.

משפט: יהיו R, S חוגים ויהי $\nu : R \rightarrow S$ הומומורפיזם חוגים אזי $R/\ker(\nu) \simeq \text{Im}(\nu)$.

אידאל ראשי: יהי R חוג אבלי אזי אידאל $I \subseteq R$ עבורו קיים $a \in R$ המקיים $I = aR$.

אידאל ראשוני: יהי R חוג אבלי אזי אידאל $I \subseteq R$ עבורו לכל $a, b \in R$ המקיימים $ab \in I$ מתקיים $(a \in I) \vee (b \in I)$.

אידאל מקסימלי: יהי R חוג אבלי אזי אידאל $I \subseteq R$ עבורו לכל אידאל $J \subseteq R$ לא מתקיים $I \subseteq J$.

משפט: יהי R חוג אבלי בעל יחידה ויהי $I \subseteq R$ אידאל אזי

• $(I \text{ אידאל ראשוני}) \iff (R/I \text{ תחום שלמות}).$

• $(I \text{ אידאל מקסימלי}) \iff (R/I \text{ שדה}).$

משפט: יהי \mathbb{K} שדה אזי

• לכל אידאל $I \subseteq \mathbb{K}[x]$ מתקיים כי I אידאל ראשי.

• יהי $f \in \mathbb{K}[x]$ אזי $f \cdot \mathbb{K}[x] \iff (f \text{ ראשוני}) \iff (f \text{ אי־פריק ב-}\mathbb{K}[x]).$

משפט: יהי R חוג אבלי בעל יחידה ויהי $I \subseteq R$ אידאל אזי קיים אידאל מקסימלי $M \subseteq R$ עבורו $I \subseteq M$. דורש AC

משפט: יהי $f \in \mathbb{Z}[x] \setminus \{0\}$ והיו $g, h \in \mathbb{Q}[x]$ באשר $f = gh$ אזי קיימים $r, s \in \mathbb{Q}$ המקיימים $sh, rg \in \mathbb{Z}[x]$ וכן $f = (rg)(sh)$.

מסקנה גאוס: יהי $f \in \mathbb{Z}[x]$ מתוקן ויהי $d \in \mathbb{Q}[x]$ אי־פריק מתוקן באשר $d|f$ אזי $d \in \mathbb{Z}[x]$.

שורש של פולינום: יהי \mathbb{K} שדה ויהי $f \in \mathbb{K}[x] \setminus \{0\}$ אזי $\alpha \in \mathbb{K}$ המקיים $f(\alpha) = 0$.

משפט בז'ור: יהי \mathbb{K} שדה יהי $f \in \mathbb{K}[x]$ ויהי $\alpha \in \mathbb{K}$ אזי $(f \text{ שורש של } \alpha) \iff ((x - \alpha) | f)$.

מסקנה: יהי \mathbb{K} שדה ויהי $f \in \mathbb{K}[x] \setminus \{0\}$ אזי $|\{\alpha \in \mathbb{K} \mid f(\alpha) = 0\}| \leq \deg(f)$.

שורש פשוט: יהי \mathbb{K} שדה ויהי $f \in \mathbb{K}[x] \setminus \{0\}$ אזי $\alpha \in \mathbb{K}$ באשר α שורש של f וכן $(x - \alpha)^2 \nmid f$.

שורש מרובה: יהי \mathbb{K} שדה ויהי $f \in \mathbb{K}[x] \setminus \{0\}$ אזי $\alpha \in \mathbb{K}$ באשר α שורש של f וכן $(x - \alpha)^2 | f$.

נגזרת של פולינום: יהי \mathbb{K} שדה יהי $n \in \mathbb{N}$ והיו $a_0 \dots a_n \in \mathbb{K}$ אזי $(\sum_{i=0}^n a_i x^i)' = \sum_{i=1}^n a_i x^{i-1}$.

משפט: יהי \mathbb{K} שדה ויהי $f \in \mathbb{K}[x] \setminus \{0\}$ אזי (כל השורשים של f הם פשוטים) $\iff (\gcd(f, f') = 1)$.

סימון: יהי $p \in \mathbb{P}$ אזי $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p$.

שדה הרחבה: יהי \mathbb{K} שדה אזי שדה \mathbb{L} המקיים $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$.

סימון: יהיו \mathbb{K}, \mathbb{L} שדות באשר \mathbb{L} הרחבה של \mathbb{K} אזי \mathbb{L}/\mathbb{K} .

הערה: יהיו \mathbb{K}, \mathbb{L} שדות באשר \mathbb{L}/\mathbb{K} אזי נתייחס לביטוי \mathbb{L}/\mathbb{K} כאובייקט.

הומומורפיזם הרחבות: יהיו $\mathbb{K}, \mathbb{F}, \mathbb{L}$ שדות באשר \mathbb{K}/\mathbb{F} הרחבה וכן \mathbb{L}/\mathbb{F} הרחבה אזי שיכון $\nu : \mathbb{K}/\mathbb{F} \rightarrow \mathbb{L}/\mathbb{F}$ המקיים $\nu|_{\mathbb{F}} = \text{Id}_{\mathbb{F}}$.

שדה פשוט: שדה \mathbb{F} עבורו לא קיים שדה \mathbb{K} המקיים $\mathbb{K} \subset \mathbb{F}$.

טענה: יהי \mathbb{F} שדה אזי $\{\mathbb{K} \subseteq \mathbb{F} \mid \mathbb{K} \text{ שדה}\} \cap \{\mathbb{K} \subseteq \mathbb{F} \mid \mathbb{K} \text{ שדה פשוט}\} = \{\mathbb{F}\}$.

מסקנה: יהי \mathbb{F} שדה אזי קיים ויחיד שדה פשוט $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{F}$.

משפט: יהי \mathbb{F} שדה פשוט אזי $(\mathbb{F} \simeq \mathbb{Q}) \vee (\exists p \in \mathbb{P}. \mathbb{F} \simeq \mathbb{F}_p)$.

מציון של שדה: יהי \mathbb{F} שדה ויהי $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{F}$ שדה פשוט אזי

• אם $\mathbb{K} \simeq \mathbb{Q}$ אז $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$.

• אם קיים $p \in \mathbb{P}$ עבורו $\mathbb{K} \simeq \mathbb{F}_p$ אז $\text{char}(\mathbb{F}) = p$.

טענה: יהי \mathbb{F} שדה המקיים $\text{char}(\mathbb{F}) > 0$ אזי לכל $a \in \mathbb{F}$ מתקיים $\text{char}(\mathbb{F}) \cdot a = 0$.

מורפיזם פרובניוס: יהי $p \in \mathbb{P}$ ויהי \mathbb{K} שדה המקיים $\text{char}(\mathbb{K}) = p$ אזי נגדיר $\text{Fr}_p : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ כך $\text{Fr}_p(a) = a^p$.

משפט: יהי $p \in \mathbb{P}$ ויהי \mathbb{K} שדה המקיים $\text{char}(\mathbb{K}) = p$ אזי Fr_p מונומורפיזם.

טענה: יהי \mathbb{F} שדה באשר $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$ ויהיו $a, b, c \in \mathbb{F}$ באשר $a \neq 0$ אזי $\text{sols}(ax^2 + bx + c) = \left\{ \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right\}$.