

פונקציה קדומה:

- תהא $f \in \mathbb{R}^{(a,b)}$ אזי $F \in \mathbb{R}^{(a,b)}$ גזירה המקיימת $F' = f$.
- תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ אזי $F \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ גזירה המקיימת $F'(x) = f(x)$ לכל $x \in (a,b)$ ומקיימת $F'_+(a) = f(a)$ וכן $F'_-(b) = f(b)$.

אינטגרל לא מסוים: תהא $f \in \mathbb{R}^I$ אזי $\int f = \{F \in \mathbb{R}^I \mid F' = f\}$.

טענה: תהא $f \in \mathbb{R}^{(a,b)}$ תהא $F \in \mathbb{R}^{(a,b)}$ קדומה ותהא $G \in \mathbb{R}^{(a,b)}$ אזי $(G' = f) \iff (\exists c \in \mathbb{R}. G = F + c)$.

הערה: תהא $f \in \mathbb{R}^I$ ותהא $F \in \int f$ אזי מקובל לסמן $\int f = F + c$ עבור $c \in \mathbb{R}$.

טענה: תהיינה $f, g \in \mathbb{R}^I$ בעלות פונקציות קדומות אזי

$$\bullet \int (f + g) = \left(\int f\right) + \left(\int g\right)$$

$$\bullet \int (\alpha f) = \alpha \left(\int f\right) \text{ יהי } \alpha \in \mathbb{R} \text{ אזי}$$

טענה אינטגרציה בחלקים: תהיינה $u, v \in \mathbb{R}^I$ גזירות אזי $\int uv' = u \cdot v - \int u'v$.

טענה החלפת משתנים: תהא $f \in \mathbb{R}^I$ ותהא $F \in \int f$ אזי $F \circ g = \int ((f \circ g) \cdot g')$ ותהא $F \in \int f$ אזי $F \circ g = \int ((f \circ g) \cdot g')$.

חלוקה: יהי $[a, b]$ אזי $\Pi = \{x_0, \dots, x_n\}$ המקיימות $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$.

סימון: תהא $\{x_0, \dots, x_n\}$ חלוקה אזי $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

מדד העדינות: תהא $\Pi = \{x_0, \dots, x_n\}$ חלוקה אזי $\lambda(\Pi) = \max_{i=1}^n |\Delta x_i|$.

עידון: תהא Π_1 חלוקה אזי חלוקה Π_2 המקיימת $\Pi_1 \subseteq \Pi_2$.

טענה: תהא Π_1 חלוקה וכן Π_2 עידון אזי $\lambda(\Pi_2) \leq \lambda(\Pi_1)$.

נקודות מתאימות: תהא $\{x_0, \dots, x_n\}$ חלוקה אזי $\{t_1 \dots t_n\}$ המקיימות $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$ $\forall i \in \{1 \dots n\}$.

סכום רימן: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ תהא Π חלוקה ויהיו $\{t_i\}$ נקודות מתאימות אזי $S(f, \Pi, \{t_i\}) = \sum f(t_i) \Delta x_i$.

אינטגרליות רימן: $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ עבורה קיים $L \in \mathbb{R}$ לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ לכל Π חלוקה המקיימת $\lambda(\Pi) < \delta$ לכל נקודות

מתאימות $\{t_i\}$ מתקיים $|S(f, \Pi, \{t_i\}) - L| < \varepsilon$.

אינטגרל רימן מסוים: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ אינטגרליות רימן אזי $L = \int_a^b f$.

סימון: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ אינטגרליות רימן אזי $\int_a^b f = \int_{[a,b]} f = \int_{[a,b]} f(t) dt = \int_a^b f(t) dt$.

הערה: יהיו $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ אזי $\int_a^b f(\varphi) d\varphi$ אינטגרל על פי המשתנה φ .

הערה: כל עוד ברור מהו תחום האינטגרל וכן מהי הפונקציה כל הסימונים תקפים.

סימון: $R([a, b]) = \{f \in \mathbb{R}^{[a,b]} \mid f \text{ אינטגרליות רימן}\}$.

הערה: ניתן להגדיר אינטגרליות רימן בסימון $S(f, \Pi, \{t_i\}) = \lim_{\lambda(\Pi) \rightarrow 0} S(f, \Pi, \{t_i\})$ $\int_a^b f(t) dt = \lim_{\lambda(\Pi) \rightarrow 0} S(f, \Pi, \{t_i\})$.

טענה: יהי $c \in \mathbb{R}$ תהא Π חלוקה ויהיו $\{t_i\}$ נקודות מתאימות אזי $\int_a^b c \cdot dt = c(b - a)$.

טענה: $D(x) \notin R(\mathbb{R})$.

משפט: תהא $f \in R([a, b])$ אזי f חסומה.

סכום דרבו עליון: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ חסומה ותהא Π חלוקה אזי $\bar{\Sigma}(f, \Pi) = \sum_{i=1}^n \sup_{[x_i, x_{i-1}]}(f) \cdot \Delta x_i$.

סכום דרבו תחתון: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ חסומה ותהא Π חלוקה אזי $\underline{\Sigma}(f, \Pi) = \sum_{i=1}^n \inf_{[x_i, x_{i-1}]}(f) \cdot \Delta x_i$.

למה: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ חסומה ותהא Π חלוקה

$$\bullet \bar{\Sigma}(f, \Pi) = \sup_{\text{נקודות מתאימות } \{t_i\}} S(f, \Pi, \{t_i\})$$

$$\bullet \underline{\Sigma}(f, \Pi) = \inf_{\text{נקודות מתאימות } \{t_i\}} S(f, \Pi, \{t_i\})$$

למה: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ חסומה ותהיינה $\Pi_1 \subseteq \Pi_2$ חלוקות

$$\bullet \bar{\Sigma}(f, \Pi_1) \geq \bar{\Sigma}(f, \Pi_2)$$

$$\bullet \underline{\Sigma}(f, \Pi_1) \leq \underline{\Sigma}(f, \Pi_2)$$

מסקנה: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ חסומה ותהיינה Π_1, Π_2 חלוקות אזי $\underline{\Sigma}(f, \Pi_1) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi_2)$.

האינטגרל העליון: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ חסומה אזי $\bar{I}(f) = \inf_{\Pi \text{ חלוקה}} \bar{\Sigma}(f, \Pi)$.

האינטגרל התחתון: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ חסומה אזי $\underline{I}(f) = \sup_{\Pi \text{ חלוקה}} \underline{\Sigma}(f, \Pi)$.

מסקנה: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ חסומה ותהא Π חלוקה אזי $\underline{\Sigma}(f, \Pi) \leq \underline{I}(f) \leq \bar{I}(f) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi)$.

קריטריון דרבו: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ חסומה אזי $(f \in R([a, b])) \iff (\forall \varepsilon > 0 \text{ קיימת } \delta > 0 \text{ לכל } \Pi \text{ חלוקה המקיימת } \lambda(\Pi) < \delta$

מתקיים $|\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi)| < \varepsilon$).

מסקנה: תהא $f \in R([a, b])$ חסומה אזי $\int_a^b f = \underline{I}(f) = \bar{I}(f)$

תנודה: תהא $f \in R^J$ חסומה אזי $\omega(f, J) = \sup_{x, y \in J} (f(x) - f(y))$

משפט: תהא $f \in R^J$ חסומה ויהי $x_0 \in J$ אזי f רציפה על x_0 $\iff (\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(f, [x_0 - \delta, x_0 + \delta]) = 0)$

משפט: תהא $f \in R^J$ חסומה אזי f רציפה במ"ש $\iff (\forall I \subseteq J. \forall \varepsilon > 0. \exists \delta > 0. \text{len}(I) \cdot \omega(f, I) < \varepsilon)$

תנודה כוללת ביחס לחלוקה: תהא $f \in R^{[a, b]}$ חסומה ותהא Π חלוקה אזי $\omega(f, \Pi) = \sum_{i=1}^n \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i$

מסקנה: תהא $f \in R^{[a, b]}$ חסומה ותהא Π חלוקה אזי $\omega(f, \Pi) = \bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi)$

למה: תהא $f \in R^{[a, b]}$ חסומה ותהיינה $\Pi_1 \cup \{p\} = \Pi_2$ חלוקות

- $\bar{\Sigma}(f, \Pi_1) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi_2) + \lambda(\Pi_1) \omega(f, [a, b])$
- $\underline{\Sigma}(f, \Pi_1) \geq \underline{\Sigma}(f, \Pi_2) - \lambda(\Pi_1) \omega(f, [a, b])$

מסקנה: תהא $f \in R^{[a, b]}$ חסומה ותהיינה $\Pi_1 \cup \{p_1 \dots p_m\} = \Pi_2$ חלוקות

- $\bar{\Sigma}(f, \Pi_1) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi_2) + m\lambda(\Pi_1) \omega(f, [a, b])$
- $\underline{\Sigma}(f, \Pi_1) \geq \underline{\Sigma}(f, \Pi_2) - m\lambda(\Pi_1) \omega(f, [a, b])$

טענה: תהא $f \in R^{[a, b]}$ חסומה אזי לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ לכל Π חלוקה $\lambda(\Pi) < \delta$ מתקיים

- $\underline{\Sigma}(f, \Pi) \leq \underline{I}(f) \leq \underline{\Sigma}(f, \Pi) + \varepsilon$
- $\bar{\Sigma}(f, \Pi) \geq \bar{I}(f) \geq \bar{\Sigma}(f, \Pi) - \varepsilon$

מסקנה: תהא $f \in R^{[a, b]}$ חסומה המקיימת $\underline{I}(f) = \bar{I}(f)$ אזי $f \in R([a, b])$

קריטריון דרבו משופר: תהא $f \in R^{[a, b]}$ חסומה אזי $(f \in R([a, b])) \iff (\varepsilon > 0$ קיימת חלוקה Π עבורה $\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi) < \varepsilon)$

משפט: $C([a, b]) \subseteq R([a, b])$

משפט: תהא $f \in R^{[a, b]}$ חסומה ומונוטונית אזי $f \in R([a, b])$

סימון: תהא $f \in R^{[a, c]}$ חסומה ויהי $b \in [a, c]$ עבורה $f|_{[a, b]} \in R([a, b])$ אזי $f \in R([a, b])$

משפט: תהא $f \in R^{[a, c]}$ חסומה ויהי $b \in [a, c]$ עבורה $(f \in R([a, b])) \wedge (f \in R([b, c]))$ אזי $f \in R([a, c])$

משפט: תהא $f \in R^{[a, d]}$ חסומה ויהיו $b < c \in [a, d]$ עבורה $f \in R([a, d])$ אזי $f \in R([b, c])$

משפט: תהא $f \in R^{[a, c]}$ חסומה המקיימת $f \in R([a, b])$ $\forall b \in (a, c)$ אזי $f \in R([a, c])$

מסקנה: תהא $f \in R^{[a, c]}$ חסומה המקיימת $f \in R([b, c])$ $\forall b \in (a, c)$ אזי $f \in R([a, c])$

טענה: תהא $f \in R([a, c])$ נגדיר $g(x) = \begin{cases} y & x = b \\ f(x) & \text{else} \end{cases}$ אזי $g \in R([a, c])$

מסקנה: נגדיר $f(x) = \begin{cases} \sin(\frac{1}{x}) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ אזי $f \in R([-1, 1])$

מסקנה: תהא $f \in R^{[a, b]}$ חסומה המקיימת מונוטוניות או רציפות למקוטעין אזי $f \in R([a, b])$

משפט: תהיינה $f, g \in R([a, b])$ תהא $H \in C(\mathbb{R})$ וכן $c \in \mathbb{R}$

- $(f + g), (cf) \in R([a, b])$
- $(f \cdot g), (H \circ f), |f| \in R([a, b])$

קבוצה ממידה אפס: $A \subseteq \mathbb{R}$ עבורה לכל $\varepsilon > 0$ קיימים $\{(a_i, b_i)\}_{i=0}^\infty$ עבורם $A \subseteq \bigcup (a_i, b_i)$ וכן $\sum (b_i - a_i) < \varepsilon$

טענה: תהא $A \subseteq \mathbb{R}$ המקיימת $|A| \leq \aleph_0$ אזי A ממידה אפס.

קבוצה צפופה: תהא $B \subseteq \mathbb{R}$ אזי $A \subseteq B$ המקיימת $\forall b \in B. \forall \varepsilon > 0. \exists a \in A. |b - a| < \varepsilon$

טענה: תהיינה $f, g \in R([a, b])$ עבורן קיימת A צפופה עבורה $f|_A = g|_A$ אזי $\int_a^b f = \int_a^b g$

מסקנה: תהא $f \in R([a, c])$ נגדיר $g(x) = \begin{cases} y_i & x \in \{b_1 \dots b_m\} \\ f(x) & \text{else} \end{cases}$ אזי $\int_a^c f = \int_a^c g$

משפט לינאריות האינטגרנד: תהיינה $f, g \in R([a, b])$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ אזי $\alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g = \int_a^b (\alpha f + \beta g)$

משפט לינאריות בתחום האינטגרציה: תהא $f \in R([a, c])$ ויהי $b \in (a, c)$ אזי $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$

הגדרה: תהא $f \in R([a, b])$ אזי $\int_a^b f = - \int_b^a f$

משפט חיוביות: תהא $f \in R([a, b])$ המקיימת $f \geq 0$ אזי $\int_a^b f \geq 0$

מונוטוניות האינטגרל: תהיינה $f, g \in R([a, b])$ המקיימות $f \geq g$ אזי $\int_a^b f \geq \int_a^b g$

טענה: תהא $f \in R([a, b])$ רציפה המקיימת $f \geq 0$ וכן $\int_a^b f = 0$ אזי $f = 0$

טענה: תהא $f \in R([a, b])$ המקיימת $m \leq f \leq M$ אזי $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.

מסקנה: תהא $f \in R([a, b])$ אזי $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \leq \sup_{[a,b]}(|f|)(b-a)$.

משפט רציפות האינטגרל המסוים: תהא $f \in R([a, b])$ נגדיר $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ אזי $F \in C([a, b])$.

משפט ערך ביניים ראשון: תהא $f \in C([a, b])$ ותהא $0 \leq g \in R([a, b])$ אזי קיים $x_0 \in [a, b]$ עבורו $\int_a^b (f \cdot g) = f(x_0) \int_a^b g$.

המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי: תהא $f \in R([a, b])$ ותהא $x_0 \in [a, b]$ נקודת רציפות של f נגדיר

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt \quad \text{אזי} \quad F'(x_0) = f(x_0)$$

משפט ניוטון לייבניץ: תהא $f \in R([a, b])$ ותהא F קדומה של f על $[a, b]$ אזי $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

מסקנה: תהא $f \in R([a, b])$ יהיו $x_1 \dots x_n \in [a, b]$ ותהא F קדומה של f על $[a, b] \setminus \{x_1 \dots x_n\}$ אזי $\int_a^b f(x) = F(b) - F(a)$.

סימון: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ אזי $[f]_a^b = f(b) - f(a)$.

משפט אינטגרציה בחלקים: תהינה $f, g \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ גזירות עבורן $f', g' \in R([a, b])$ אזי $\int_a^b f'g = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b fg'$.

משפט שינוי משתנה: תהא $f \in C([a, b])$ ותהא $\varphi \in C^1([\alpha, \beta], [a, b])$ המקיימת $(\varphi(\alpha) = a) \wedge (\varphi(\beta) = b)$ אזי

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

טענה דעיכת מקדמי פורייה בהינתן גזירות: תהא $f \in C^1([0, 2\pi])$ ויהי $n \in \mathbb{N}$ אזי $\left| \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx \right| \leq \frac{2\pi \sup(|f'|)}{n}$.

אינטגרל רימן לא אמיתי: יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ ותהא $f \in \mathbb{R}^I$ אזי

- חד צדדי חיובי: נניח $I = [a, \infty)$ וכן $f \in R([a, b]) \forall b \in [a, \infty)$ אזי $\int_a^\infty f = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f$.

- חד צדדי שלילי: נניח $I = (-\infty, b]$ וכן $f \in R([a, b]) \forall a \in (-\infty, b]$ אזי $\int_{-\infty}^b f = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f$.

- דו צדדי: נניח $I = \mathbb{R}$ וכן $(f \in R([a, b])) \implies (a < b) \implies (f \in R([a, b]))$ אזי $\int_{-\infty}^\infty f = \int_{-\infty}^0 f + \int_0^\infty f$.

- לא חסום משמאל: נניח $I = (a, b]$ וכן $f \in R([c, b]) \forall c \in I$ אזי $\int_a^b f = \lim_{r \rightarrow a^+} \int_r^b f$.

- לא חסום מימין: נניח $I = [a, b)$ וכן $f \in R([a, c]) \forall c \in I$ אזי $\int_a^b f = \lim_{r \rightarrow b^-} \int_a^r f$.

אינטגרל: תהא $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ כך שלכל $c \in (a, b]$ מתקיים $f \in R([c, b])$ אזי $\int_a^b f = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f$.

סימון: יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ אזי $\int_I f = \{f \in \mathbb{R}^I \mid \text{קיים וסופי } \int_I f\}$.

משפט: יהיו $\omega, \eta \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ אזי

- לינאריות האינטגרל: תהינה $f, g \in R([a, \omega])$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ אזי $\int_a^\omega (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^\omega f + \beta \int_a^\omega g$.

- לינאריות בתחום האינטגרציה: תהא $f \in R([a, \omega])$ ויהי $c \in (a, \omega)$ אזי $\int_a^\omega f = \int_a^c f + \int_c^\omega f$.

- מונוטוניות: תהינה $f, g \in R([a, \omega])$ המקיימות $f \geq g$ אזי $\int_a^\omega f \geq \int_a^\omega g$.

- ניוטון לייבניץ: תהא $f \in R([a, \omega])$ ותהא $F \in \mathbb{R}^{[a, \omega]}$ עבורה $F'(x) = f(x)$ על $[a, \omega)$ אזי $\int_a^\omega f = \lim_{b \rightarrow \omega} F(b) - F(a)$.

- אינטגרציה בחלקים: תהינה $f, g \in \mathbb{R}^{[a, \omega]}$ גזירות עבורן $f', g' \in R([a, \omega])$ אזי $\int_a^\omega f'g = \lim_{b \rightarrow \omega} [f \cdot g]_a^b - \int_a^\omega fg'$.

- שינוי משתנה: תהא $f \in R([a, \omega])$ ותהא $\varphi \in C^1([c, \eta])$ המקיימת $\lim_{b \rightarrow \eta} \varphi(b) = \omega$ אזי $\int_a^\omega f = \int_c^\eta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$.

משפט קריטריון קושי להתכנסות אינטגרל לא אמיתי: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a, \omega]}$ המקיימת $f \in R([a, b]) \forall b \in (a, \omega)$ אזי

$$(f \in R([a, \omega])) \iff \left(\forall \varepsilon > 0. \exists B \in (a, \omega). \forall b_1, b_2 \in [B, \omega). \left| \int_{b_1}^{b_2} f \right| < \varepsilon \right)$$

התכנסות בהחלט: $f \in \mathbb{R}^{[a, \omega]}$ המקיימת $f \in R([a, b]) \forall b \in (a, \omega)$ עבורה $\int_a^\omega |f|$ מתכנס.

התכנסות בתנאי: $f \in \mathbb{R}^{[a, \omega]}$ המקיימת $f \in R([a, b]) \forall b \in (a, \omega)$ עבורה $\int_a^\omega |f|$ אינו מתכנס אך $\int_a^\omega f$ מתכנס.

טענה: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a, \omega]}$ עבורה $\int_a^\omega f$ מתכנס בהחלט אזי $\int_a^\omega f$ מתכנס.

מסקנה: תהא $f \in \mathbb{R}^{[a, \omega]}$ עבורה $\int_a^\omega f$ מתכנס בהחלט אזי $\left| \int_a^\omega f \right| \leq \int_a^\omega |f|$.

טענה: תהא $0 \leq f \in \mathbb{R}^{[a, \omega]}$ המקיימת $f \in R([a, b]) \forall b \in (a, \omega)$ אזי $(\int_a^\omega f < \infty) \iff (F(x) = \int_a^x f(t) dt \text{ חסומה על } [a, \omega))$.

מסקנה: תהינה $0 \leq f \leq g \in \mathbb{R}^{[a, \omega]}$ המקיימות $f, g \in R([a, b]) \forall b \in (a, \omega)$ אזי $(\int_a^\omega g < \infty) \implies (\int_a^\omega f < \infty)$.

מסקנה: תהינה $0 \leq f \leq g \in \mathbb{R}^{[a, \omega]}$ המקיימות $f, g \in R([a, b]) \forall b \in (a, \omega)$ אזי $(\int_a^\omega f = \infty) \implies (\int_a^\omega g = \infty)$.

משפט: תהא $0 \leq f \in \mathbb{R}^{[1, \infty)}$ יורדת אזי $(\sum_{n=1}^\infty f(n) < \infty) \iff (\int_1^\infty f < \infty)$.

טענה: תהא $0 \leq f \in \mathbb{R}^{[1, \infty)}$ יורדת אזי $\sum_{n=2}^\infty f(n) \leq \int_1^\infty f \leq \sum_{n=1}^\infty f(n)$.

טענה נוסחאת סטירלינג: יהי $n \in \mathbb{N}$ אזי $\sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \leq n! \leq \sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} e^{\frac{1}{12n}}$.

מסקנה: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}} = \sqrt{2\pi}$.