

סדרה ממשית: $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

סימון: $a = (a_n)_{n=0}^{\infty}, a_n = a(n)$

סדרה מונוטונית: תהא a סדרה

• עולה ממש: $\forall n, m \in \mathbb{N}. n < m \implies a_n < a_m$

• עולה: $\forall n, m \in \mathbb{N}. n < m \implies a_n \leq a_m$

• יורדת ממש: $\forall n, m \in \mathbb{N}. n < m \implies a_n > a_m$

• יורדת: $\forall n, m \in \mathbb{N}. n < m \implies a_n \geq a_m$

סדרה חסומה: $\exists M \in \mathbb{R}. \forall n \in \mathbb{N}. |a_n| < M$

סדרה חסומה מלמעלה/מלעיל: $\exists M \in \mathbb{R}. \forall n \in \mathbb{N}. a_n < M$

סדרה חסומה מלמטה/מלרע: $\exists M \in \mathbb{R}. \forall n \in \mathbb{N}. a_n > M$

גבול: $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \right) \equiv (\forall \varepsilon > 0. \exists N \in \mathbb{N}. \forall n \geq N. |a_n - L| < \varepsilon)$

סימון: $\left(a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L \right) \equiv \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \right)$

יחידות הגבול: $(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1) \wedge (\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_2) \implies L_1 = L_2$

טענה: $\lim_{n \rightarrow \infty} c = c$

אריתמטיקה של גבולות: נניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L_2$

• $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + b_n = L_1 + L_2$

• $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = L_1 \cdot L_2$

• $\lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot a_n = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

כלל הסנדוויץ': $(\forall n \in \mathbb{N}. a_n \leq b_n \leq c_n) \wedge (\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n) \implies (\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L)$

גבול במובן הרחב: תהא a סדרה ממשית

• $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \right) \equiv (\forall m \in \mathbb{R}. \exists N \in \mathbb{N}. \forall n \geq N. a_n > m)$

• $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \right) \equiv (\forall m \in \mathbb{R}. \exists N \in \mathbb{N}. \forall n \geq N. a_n < m)$

אריתמטיקה של גבולות במובן הרחב: נניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L_2$

• $(L_1 = \infty \wedge L_2 \in \mathbb{R}) \implies (\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + b_n = \infty)$

• $(L_1 = -\infty \wedge L_2 \in \mathbb{R}) \implies (\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + b_n = -\infty)$

• $(L_1 = \infty \wedge (L_2 > 0 \vee L_2 = \infty)) \implies (\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = \infty)$

• $(L_1 = \infty \wedge (L_2 < 0 \vee L_2 = -\infty)) \implies (\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = -\infty)$

כלל הסנדוויץ' במובן הרחב: יהיו a, b סדרות המקיימות $\forall n \in \mathbb{N}. a_n \leq b_n$

• $\left(a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \right) \implies \left(b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \right)$

• $\left(b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty \right) \implies \left(a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty \right)$

הערה: תהא a סדרה אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}$ מתכנסת a מתבדרת a else

משפט בולצאנו וירשטראס: תהא a סדרה מונוטונית וחסומה אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$

מסקנה: יהי $q \in (0, 1)$ אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \inf \{q^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

סדרה גאומטרית: סדרה a המקיימת $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ $\exists q \in \mathbb{R}. \forall n \in \mathbb{N}.$

טענה: תהא a סדרה גאומטרית אזי $a_n = a_0 \cdot q^n$

אי שיוויון ברנולי: $\forall n \in \mathbb{N}. \forall x \in (-1, \infty). (1+x)^n \geq 1+nx$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} 0 & q \in (0, 1) \\ \infty & q \in (1, \infty) \end{cases} \text{ : מסקנה}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} 0 & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \\ \infty & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \end{cases} \text{ מבחן המנה : תהא } a \text{ סדרה המקיימת } \forall n \in \mathbb{N}. a_n > 0 \text{ אזי}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} 0 & \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1 \\ \infty & \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1 \end{cases} \text{ מבחן השורש : תהא } a \text{ סדרה אזי}$$

טענה: יהיו $p, q \in \mathbb{R}[x]$

$$\deg(p) < \deg(q) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{q(n)} = 0 \quad \bullet$$

$$\deg(p) = \deg(q) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{q(n)} = \frac{\text{המקדם המוביל של } p}{\text{המקדם המוביל של } q} \quad \bullet$$

סדרת הסכומים החלקיים: תהא a סדרה אזי $\lambda n \in \mathbb{N}. \sum_{k=0}^n a_k$

$$\lambda n \in \mathbb{N}. \begin{cases} b_0 & n = 0 \\ b_n - b_{n-1} & \text{else} \end{cases} \text{ סדרת ההפרשים : תהא } a \text{ סדרה אזי}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k \quad \text{טור}$$

$$\begin{cases} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \in \mathbb{R} & \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ מתכנס} \\ \text{else} & \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ מתבדר} \end{cases} \text{ הערה : תהא } a \text{ סדרה אזי}$$

$$\forall q \in \mathbb{R}. \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \quad \text{סכום סדרה הנדסית}$$

$$\forall q \in (-1, 1). \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \quad \text{טענה}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \iff \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ מתכנס} \quad \text{משפט}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{הטור ההרמוני}$$

משפט: הטור ההרמוני מתבדר.

טענה: יהיו a, b סדרות המקיימות $(\forall n \in \mathbb{N}. 0 \leq a_n \leq b_n) \wedge (\exists N \in \mathbb{N}. \forall n \geq N. a_n \leq b_n)$

$$(\sum_{n=0}^{\infty} b_n < \infty) \implies (\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty) \quad \bullet$$

$$(\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty) \implies (\sum_{n=0}^{\infty} b_n = \infty) \quad \bullet$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{משפט: מתכנס}$$

אריטמטיקה של טורים: יהיו a, b סדרות

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n + b_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n \quad \bullet$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c \cdot a_n = c \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n \quad \bullet$$

סביבה מנוקבת: יהי $\delta > 0$ ויהי $x \in \mathbb{R}$ אזי $I_x = (x - \delta, x + \delta) \setminus \{x\}$

$$(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L) \equiv (\forall \varepsilon > 0. \exists \delta > 0. \forall x \in I_{x_0}. |f(x) - L| < \varepsilon) \quad \text{גבול נקודתי}$$

$$(\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L) \equiv (\forall \varepsilon > 0. \exists \delta > 0. \forall x \in (x_0 - \delta, x_0). |f(x) - L| < \varepsilon) \quad \text{גבול חד צדדי שמאלי}$$

$$(\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L) \equiv (\forall \varepsilon > 0. \exists \delta > 0. \forall x \in (x_0, x_0 + \delta). |f(x) - L| < \varepsilon) \quad \text{גבול חד צדדי ימני}$$

$$(\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)) \implies (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L) \quad \text{טענה}$$

$$(\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L) \equiv (\forall \varepsilon > 0. \exists M \in \mathbb{R}. \forall x \geq M. |f(x) - L| < \varepsilon) \quad \text{גבול}$$

גבול במובן הרחב:

$\cdot (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty) \equiv (\forall m \in \mathbb{R}. \exists \delta > 0. \forall x \in I_{x_0}. f(x) > m)$
 $\cdot (\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = -\infty) \equiv (\forall m \in \mathbb{R}. \exists \delta > 0. \forall x \in I_{x_0}. f(x) < m)$
קריטריון היינה: $(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L) \iff (\forall y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}. (\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0) \implies (\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = L))$
אריטמטיקה של גבולות: נניח כי $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1$
 $\cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) = L_1 + L_2$
 $\cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = L_1 \cdot L_2$
 $\cdot (L_1 = \infty \wedge L_2 \in (-\infty, \infty)) \implies (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) = \infty)$
 $\cdot (L_1 = -\infty \wedge L_2 \in (-\infty, \infty)) \implies (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) = -\infty)$
 $\cdot (L_1 = \infty \wedge L_2 \in (0, \infty)) \implies (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = \infty)$
 $\cdot (L_1 = -\infty \wedge L_2 \in (0, \infty)) \implies (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = -\infty)$
 $\cdot (L_1 = \infty \wedge L_2 \in (-\infty, 0)) \implies (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = -\infty)$
 $\cdot (L_1 = -\infty \wedge L_2 \in (-\infty, 0)) \implies (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = \infty)$
כלל הסנדוויץ': $(\forall x \in I_{x_0}. h(x) \leq f(x) \leq g(x)) \wedge (\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)) \implies (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L)$
משפט: $\forall x \in \mathbb{R}. |\sin(x)| \leq |x|$
משפט: $\forall x_0 \in \mathbb{R}. (\lim_{x \rightarrow x_0} \sin(x) = \sin(x_0)) \wedge (\lim_{x \rightarrow x_0} \cos(x) = \cos(x_0))$
פונקציה רציפה נקודתית: פונקציה $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
פונקציה רציפה: פונקציה $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת $\forall x_0 \in I. \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
משפט: סכום, כפל והרכבה של פונקציות רציפות היא פונקציה רציפה.
מסקנה: לכל $f \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ מתקיים כי f רציפה.
משפט: הפונקציות הטריגונומטריות והפונקציה המעריכית הינן רציפות.
אי רציפות: תהא $f: I \rightarrow \mathbb{R}$
 \cdot אי רציפות סליקה: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$
 \cdot אי רציפות מסוג שני: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$
 \cdot אי רציפות מסוג שלישי: $(\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)) \neq (\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x))$ (לא קיים).
משפט: אם f פונקציה מונוטונית אז היא יכולה להיות רק אי רציפה מסוג שני.
משפט ערך הביניים: תהא $I \subseteq \mathbb{R}$ ותהא $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה
 \cdot ניסוח ראשון: נניח כי $[a, b] \subseteq I$ כך ש- $f(a) < f(b)$ אזי $\exists c \in (a, b). f(c) = t$ $\forall t \in (f(a), f(b))$.
 \cdot ניסוח שני: נניח כי $[a, b] \subseteq I$ אזי $f([a, b])$ אינטרוול.
מסקנה: פונקציה רציפה ו"ח"ע היא מונוטונית עולה/יורדת ממש.
מסקנה: תהא $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה ח"ע ורציפה אז $f^{-1}: \text{Im}(f) \rightarrow I$ רציפה.
מסקנה: הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות, הפונקציה המעריכית והפונקציה $x^{\frac{1}{k}}$ הינן רציפות.
פונקציית מיקום: יהי חלקיק אזי $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
העתק: יהי חלקיק אזי $x(t)$
משוואת המהירות הבסיסית: זמן \cdot מהירות = דרך.
פונקציה גזירה נקודתית: פונקציה $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת כי $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ קיים.
נגזרת: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
הגדרה: $f^{(n+1)} = (f^{(n)})', f^{(1)} = f', f^{(0)} = f$

סימון הנקודה של ניוטון: $\ddot{x} = x'', \dot{x} = x'$

סימון לייבניץ: $\frac{d^n f}{dx^n} = f^{(n)}$

נוסחת ניוטון: $(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot f^{(k)} \cdot g^{(n-k)}$

מהירות: $\dot{x} = v$

סימון: "פונקציות רציפות ב-I", $C^0(I) =$ "פונקציות גזירות n פעמים ב-I", $C^n(I) =$

טענה: $\forall n \in \mathbb{N}. C^{n+1}(I) \subseteq C^n(I)$

פונקציית סימן: $\text{sign}(x) = \text{sgn}(x) = \frac{|x|}{x}$

טענה: $\lim_{x \rightarrow 0} \text{sign}(x)$ לא מוגדר.

פונקציית דריכלה: $D(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{Q} \\ 1 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

טענה: $D(x)$ לא גזירה באף נקודה.

אריתמטיקה של נגזרות: יהיו $f, g \in C^1(I)$

$$\cdot (x^c)' = cx^{c-1}$$

$$\cdot (c \cdot f)' = c \cdot f'$$

$$\cdot (g + f)' = g' + f'$$

$$\cdot (g \cdot f)' = g' \cdot f + f' \cdot g$$

$$\cdot (g \circ f)' = f' \cdot (g' \circ f)$$

$$\cdot \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - g' \cdot f}{g^2}$$

טענה: $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \sin'(x) = \cos(x)$

טענה: $\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \cos'(x) = -\sin(x)$

טענה: $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$

משפט: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ קיים וסופי.

קבוע אויילר: $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2.71$

מסקנה: $\forall x \in \mathbb{R}. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$

משפט: $\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty\right) \Rightarrow \left(\lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 + \frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)} = e\right)$

לוגריתם טבעי: $\ln = \log_e$

טענה: $\log_a(x)' = \frac{1}{x \ln(a)}$

טענה: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1$

מסקנה: $(e^x)' = e^x, (a^x)' = a^x \ln(a)$

משפט: תהא $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ חח"ע וגזירה אזי $f^{-1}: \text{Im}(f) \rightarrow I$ גזירה ומקיימת $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$

טענה: $\forall x \in \mathbb{R}. 1 + x \leq e^x$

פונקציות היפרבוליות: $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

טענה: $\cosh' = \sinh, \sinh' = \cosh$

טענה: תהא $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ ותהא $x_0 \in I$ נקודת גזירות ב-I

$\cdot (f'(x_0) > 0) \Leftrightarrow$ (קיימת סביבה של x_0 כך ש-I עולה).

$\cdot (f'(x_0) < 0) \Leftrightarrow$ (קיימת סביבה של x_0 כך ש-I יורדת).

מינימום מקומי/לוקאלי: $x_0 \in \text{Dom}(f)$ שמקיים $f(x_0) \leq f(x) \forall x \in I_{x_0}$ $\exists \varepsilon > 0$

מינימום גלובלי: $\forall x \in \text{Dom}(f) . f(x_0) \leq f(x)$ שמקיים $x_0 \in \text{Dom}(f)$.

מקסימום מקומי/לוקאלי: $\exists \varepsilon > 0 . \forall x \in I_{x_0} . f(x) \leq f(x_0)$ שמקיים $x_0 \in \text{Dom}(f)$.

מקסימום גלובלי: $\forall x \in \text{Dom}(f) . f(x) \leq f(x_0)$ שמקיים $x_0 \in \text{Dom}(f)$.

נקודת קיצון: (מינימום מקומי) \vee (מקסימום מקומי).

משפט: אם x נקודת קיצון של f אז $f'(x) = 0$.

משפט רול: תהא f גזירה ב- $[a, b]$ ונניח כי $f(a) = f(b)$ אזי $\exists c \in [a, b] . f'(c) = 0$.

משפט לגראנז': תהא $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה אזי $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ $\exists c \in (a, b)$.

מסקנה: תהא $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה אזי $|f(b) - f(a)| \leq |b - a| \cdot \sup_{c \in (a, b)} |f'(c)|$.

עקום בזייה: יהיו $P_0, \dots, P_n \in \mathbb{R}^m$ נקודות אזי $B(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (1-t)^{n-i} t^i P_i$.

פונקציה קעורה בקטע: $\forall x, y \in I . \forall t \in [0, 1] . (1-t)f(x) + tf(y) \leq f((1-t)x + ty)$.

פונקציה קמורה בקטע: $\forall x, y \in I . \forall t \in [0, 1] . (1-t)f(x) + tf(y) \geq f((1-t)x + ty)$.

טענה: תהא $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ותהא $x_0 \in I$ נקודת גזירות ב- f .

- $(f''(x_0) > 0) \iff$ (קיימת סביבה של x_0 כך ש- f קעורה).
- $(f''(x_0) < 0) \iff$ (קיימת סביבה של x_0 כך ש- f קמורה).

נקודת פיתול: נקודת קיצון של f' .

משפט: אם x נקודת פיתול של f אז $f''(x) = 0$.

תאוצה: $a = \dot{v} = \ddot{x}$.

משוואת ניוטון: $F = ma$.

אסימפטוטה משופעת חיובית: תהא פונקציה f אזי $mx + n$ המקיימת $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - (mx + n) = 0$.

אסימפטוטה משופעת שלילית: תהא פונקציה f אזי $mx + n$ המקיימת $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (mx + n) = 0$.

אסימפטוטה אנכית: תהא פונקציה f אזי $x = x_0$ המקיימת $(\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty) \vee (\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty)$.

הערה: אם קיימת אסימפטוטה משופעת אזי $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m$, $n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx)$.

פונקציה סתומה: תהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ותהא $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ויהי $c \in \mathbb{R}$ אזי $g(x, f(x)) = c$.

גזירה סתומה: $\frac{d}{dx} g(x, f(x)) = 0$.

כלל לופיטל: יהי $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ ונניח כי $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \{0, \pm\infty\} \ni \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ אזי $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

הגדרה: יהי $x_0 \in \mathbb{R}$ אזי $o(f) = \left\{ g \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0 \right\}$.

פונקציית שגיאה: יהיו f, g פונקציות אזי $E = f - g$.

טענה: $\forall f, g \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} . f = g + E$.

קירוב מסדר n : תהא f פונקציה אזי $p \in \mathbb{R}_n[x]$ המקיימת $(E \in o((x - x_0)^n)) \wedge (E(x_0) = 0)$.

משפט: $(f \text{ גזירה } n \text{ פעמים ב-} x_0) \iff (x_0 \text{ קיים קירוב מסדר } n \text{ ל-} f \text{ ב-} x_0)$.

משיק לגרף: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

משפט: $f - g \in o((x - x_0)^n) \iff \forall k \in [n] \cup \{0\} . f^{(k)}(x_0) = g^{(k)}(x_0)$.

טור טיילור/פולינום מקלורן: $p_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$.

משפט: p_n הוא הפולינום היחיד בקירוב מסדר n .

הגדרה: $R_n(x) = f(x) - p_n(x)$.

הערכת השגיאה על פי לגראנז': $\exists c \in (\min(x, x_0), \max(x, x_0)) . R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$.

$$\begin{aligned} \text{מסקנה: } |R_n(x)| &\leq \max_{c' \in (\min(x, x_0), \max(x, x_0))} \left(\frac{|f^{(n+1)}(c')|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \right) \\ \text{מסקנה: } \cos(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}, \sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}, e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \\ \text{שיטת ניוטון רפסון: } &\text{תהא } a_0 \in \mathbb{R} \text{ נגדיר } a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)} \end{aligned}$$

טענה: בעבור פונקציה f ותנאי התחלה מספיק קיימת האפשרות שיתקיים $f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n) = 0$

פונקציה קדומה: תהא f פונקציה אזי פונקציה F המקיימת $F' = f$

טענה: יהיו F_1, F_2 פונקציות קדומות של f אזי $F_1 = F_2 + c$ $\exists c \in \mathbb{R}$

איטגרל לא מסוים: תהא f פונקציה אזי קבוצת הפונקציות הקדומות של f

סימון: האינטגרל הלא מסוים של f הוא $\int f(x) dx$

אריتمטיקה של אינטגרלים: יהיו $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\int x^t dx = \frac{x^{t+1}}{t+1} + c \cdot$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c \cdot$$

$$\int c \cdot f(x) dx = c \cdot \int f(x) dx \cdot$$

$$\int (g(x) + f(x)) dx = \int g(x) dx + \int f(x) dx \cdot$$

$$\int f'(x) \cdot g(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x) dx + c \cdot$$

$$g(f(x)) = \int f'(x) \cdot g'(f(x)) dx \cdot$$

סכום דרבו תחתון: תהא $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אזי $D_n^- = \sum_{i=1}^n \left(\frac{b-a}{n}\right) \cdot \min \left\{ f(x) \mid x \in \left[\frac{(n-i+1)a + (i-1)b}{n}, \frac{(n-i)a + ib}{n} \right] \right\}$

סכום דרבו עליון: תהא $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אזי $D_n^+ = \sum_{i=1}^n \left(\frac{b-a}{n}\right) \cdot \max \left\{ f(x) \mid x \in \left[\frac{(n-i+1)a + (i-1)b}{n}, \frac{(n-i)a + ib}{n} \right] \right\}$

אינטגרל מסוים: תהא $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ונניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} D_n^- = \lim_{n \rightarrow \infty} D_n^+ = L$ אזי $\int_a^b f(x) dx = L$

הערה: ארימטיקת האינטגרל המסוים זהה לארימטיקת האינטגרל הלא מסוים.

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx \text{ טענה:}$$

$$(\forall x \in [a, b]. f(x) \leq g(x)) \implies \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx \text{ טענה:}$$

פונקציה צוברת שטח: תהא $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אזי $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת $F(x) = \int_a^x f(t) dt$

המשפט היסודי של החזו"א: תהא $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ נניח כי F פונקציה צוברת שטח

F רציפה.

$$(f \text{ רציפה ב-} x) \iff (F'(x) = f(x)) \cdot$$

מסקנה: תהא $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה אזי הפונקציה הצוברת שטח שלה היא פונקציה קדומה ל- f .

$$f(x) \Big|_a^b = [f(x)]_a^b = f(b) - f(a) \text{ הצבה:}$$

משפט ניוטון לייבניץ: תהא $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקציה קדומה F אזי $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \text{ תהא } f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ אורך עקומה:}$$

$$\pi \int_a^b f^2(x) dx \text{ תהא } f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ נפח גוף סיבוב סביב ציר } x$$

$$2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx \text{ תהא } f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ נפח גוף סיבוב סביב ציר } y$$