

**אלגברה:** תהא  $\Omega$  קבוצה אזי  $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$  המקיימת

- $\Omega \in \mathcal{F}$

- $\forall E \in \mathcal{F}. E^c \in \mathcal{F}$

- לכל  $E \subseteq \mathcal{F}$  סופית מתקיים  $\bigcup E \in \mathcal{F}$

**למה:** תהא  $\mathcal{F}$  אלגברה אזי  $\emptyset \in \mathcal{F}$

**למה:** תהא  $\mathcal{F}$  אלגברה ותהא  $E \subseteq \mathcal{F}$  סופית אזי  $\bigcap E \in \mathcal{F}$

**$\sigma$ -אלגברה:** תהא  $\Omega$  קבוצה אזי  $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$  המקיימת

- $\Omega \in \mathcal{F}$

- $\forall E \in \mathcal{F}. E^c \in \mathcal{F}$

- לכל  $E \subseteq \mathcal{F}$  בת מנייה מתקיים  $\bigcup E \in \mathcal{F}$

**למה:** תהא  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -אלגברה אזי  $\emptyset \in \mathcal{F}$

**למה:** תהא  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -אלגברה ותהא  $E \subseteq \mathcal{F}$  בת מנייה אזי  $\bigcap E \in \mathcal{F}$

**משפט:** תהא  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -אלגברה מעל  $\Omega$  אזי  $\mathcal{F}$  הינה אלגברה מעל  $\Omega$

**פונקציה אדטיבית:** פונקציה  $\mu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת לכל  $B_1 \dots B_n \in \mathcal{A}$  זרות בזוגות מתקיים  $\mu(\biguplus_{i=1}^n B_i) = \sum_{i=1}^n \mu(B_i)$

**מידה על אלגברה:** תהא  $\mathcal{F}$  אלגברה אזי  $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$  אדטיבית.

**פונקציה  $\sigma$ -אדטיבית:** פונקציה  $\mu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת לכל  $\{B_i\}_{i=1}^\infty \subseteq \mathcal{A}$  זרות בזוגות מתקיים  $\mu(\biguplus_{i=1}^\infty B_i) = \sum_{i=1}^\infty \mu(B_i)$

**מידה על  $\sigma$ -אלגברה:** תהא  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -אלגברה אזי  $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$   $\sigma$ -אדטיבית.

**מרחב מדיד:** תהא  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -אלגברה מעל  $\Omega$  אזי  $(\Omega, \mathcal{F})$

**קבוצה מדידה:** תהא  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -אלגברה מעל  $\Omega$  אזי  $E \in \mathcal{F}$

**למה:** תהא  $\mu$  מידה על  $\mathcal{F}$  המקיימת  $\mu(E) < \infty$  אזי  $\mu(\emptyset) = 0$

**למה:** תהא  $\mu$  מידה מעל  $\sigma$ -אלגברה  $\mathcal{F}$  אזי  $\mu$  אדטיבית.

**למה:** תהא  $\mu$  מידה ותהיינה  $A, B \in \mathcal{F}$  עבורן  $A \subseteq B$  אזי  $\mu(A) \leq \mu(B)$

**סדרת קבוצות מונוטונית:** תהא  $\mathcal{A}$  קבוצה ותהא  $A : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{A}$  אזי

- מונוטונית עולה חלש:  $\forall n \in \mathbb{N}. A_n \subseteq A_{n+1}$

- מונוטונית יורדת חלש:  $\forall n \in \mathbb{N}. A_{n+1} \subseteq A_n$

**סופרמום:** תהא  $\mathcal{A}$  קבוצה ותהא  $A : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{A}$  אזי  $\sup(A) = \bigcup_{i=0}^\infty A_i$

**אינפימום:** תהא  $\mathcal{A}$  קבוצה ותהא  $A : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{A}$  אזי  $\inf(A) = \bigcap_{i=0}^\infty A_i$

**גבול עליון:** תהא  $\mathcal{A}$  קבוצה ותהא  $A : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{A}$  אזי  $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=0}^\infty \bigcup_{i=n}^\infty A_i$

**גבול תחתון:** תהא  $\mathcal{A}$  קבוצה ותהא  $A : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{A}$  אזי  $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=0}^\infty \bigcap_{i=n}^\infty A_i$

**גבול:** תהא  $\mathcal{A}$  קבוצה ותהא  $A : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{A}$  עבורה  $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$  אזי  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$

**טענה:** תהא  $\mu$  מידה מעל  $\sigma$ -אלגברה  $\mathcal{F}$  ותהא  $A : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{F}$  עבורה  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = B$  אזי  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(B)$

**מרחב מידה:** תהא  $\mathcal{F}$  אלגברה/ $\sigma$ -אלגברה מעל  $\Omega$  ותהא  $\mu$  מידה על  $\mathcal{F}$  אזי  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$

**מידת הסתברות:** תהא  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -אלגברה מעל  $\Omega$  אזי מידה  $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$  המקיימת  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

**מרחב הסתברות:** מרחב מידה  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  עבורו  $\mu$  מידת הסתברות.

**מרחב התוצאות:** יהי  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  מרחב הסתברות אזי  $\Omega$

**מאורע:** יהי  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  מרחב הסתברות אזי  $E \in \mathcal{F}$

**מרחב המאורעות:** יהי  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  מרחב הסתברות אזי  $\mathcal{F}$

**אינווריאנטיות להזזות:** מרחב הסתברות  $(\mathcal{F}, \mathbb{P})$  עבורו לכל  $A \subseteq (0, 1]$  ולכל  $b \in (0, 1]$  באשר  $A + b \subseteq (0, 1]$  מתקיים

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A + b)$$

**טענה:** לכל מרחב הסתברות  $(\mathbb{P}, (0, 1], 2^{(0, 1]})$  לא מתקיימת אינווריאנטיות להזזות.

**קבוצה פתוחה:**  $A \subseteq \mathbb{R}$  עבורה  $\forall x \in A. \exists \varepsilon > 0. (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$

**קבוצה סגורה:**  $A \subseteq \mathbb{R}$  עבורה  $A^c$  פתוחה.

**טענה:** תהיינה  $\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}$   $\sigma$ -אלגבראות מעל  $\Omega$  אזי  $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$  הינה  $\sigma$ -אלגברה מעל  $\Omega$

**$\sigma$ -אלגברה בורלית מעל  $\mathbb{R}$ :** תהיינה  $\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}$  כל  $\sigma$ -אלגבראות מעל  $\mathbb{R}$  המכילות את כל הקבוצות הפתוחות אזי  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$

**קבוצה בורלית:**  $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$

**טענה:**  $\sigma$ -אלגברה בורלית הינה  $\sigma$ -אלגברה מעל  $\mathbb{R}$ .

**טענה:** תהא  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -אלגברה מעל  $\mathbb{R}$  המכילה את כל הקבוצות הפתוחות אזי  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathcal{F}$ .

**טענה:** תהא  $\Omega$  קבוצה תהא  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -אלגברה מעל  $\Omega$  ותהא  $A \subseteq \Omega$  אזי  $\{E \cap A \mid E \in \mathcal{F}\}$  הינה  $\sigma$ -אלגברה מעל  $A$ .

$\sigma$ -אלגברה בורלית מעל  $(0, 1]$ :  $\mathcal{B}_{(0,1]} = \{B \cap (0, 1] \mid B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}\}$ .

**מידת לבג:** תהא  $B \in \mathcal{B}$  אזי  $\lambda(B) = \inf \{\sum_{i=1}^{\infty} (b_i - a_i) \mid B \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i)\}$ .

**טענה:**  $(\lambda, \mathcal{B}_{(0,1]}, (0, 1])$  מרחב הסתברות אינווריאנטי להזזות.

**מרחב אחיד על  $A$ :** עבור  $A \subseteq \mathbb{R}$  אזי  $(A, \mathcal{B}_A, \lambda)$ .

$\sigma$ -אלגברה נוצרת: תהא  $\Omega$  קבוצה תהא  $\mathcal{T} \subseteq 2^{\Omega}$  ותהייה  $\{F_i\}_{i \in I}$  כל ה- $\sigma$ -אלגבראות מעל  $\Omega$  המכילות את  $\mathcal{T}$  אזי  $\sigma(\mathcal{T}) = \bigcap_{i \in I} F_i$ .

**הצילינדר של ה- $\sigma$ -אלגברה הנוצרת:** תהא  $\mathcal{T} \subseteq 2^{\Omega}$  ו- $\sigma$ -אלגברה  $\sigma(\mathcal{T})$  אזי  $\mathcal{T}$ .

**טענה:** תהא  $\Omega$  קבוצה ותהא  $\mathcal{T} \subseteq 2^{\Omega}$  נסמן  $\mathcal{F}_0 = \mathcal{T} \cup \{\emptyset, \Omega\}$ , לכל סודר עוקב  $\alpha + 1$  נסמן

$\mathcal{F}_{\alpha+1} = \mathcal{F}_{\alpha} \cup \{A^c \mid A \in \mathcal{F}_{\alpha}\} \cup \{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \mid A_n \in \mathcal{F}_{\alpha}\}$  נסמן  $\mathcal{F}_{\lambda} = \bigcup_{\alpha < \lambda} \mathcal{F}_{\alpha}$  אזי  $\sigma(\mathcal{T}) = \mathcal{F}_{\omega_1}$  באשר  $\omega_1$  הסודר הגבולי הקטן ביותר שאינו בן מניה.

**טענה:** תהא  $\Omega$  קבוצה תהא  $\mathcal{T} \subseteq 2^{\Omega}$  ויהיו  $\omega, \kappa \in \Omega$  עבורן  $\omega \in A \iff \kappa \in A$  ויהיו  $\forall A \in \mathcal{T}. \omega \in A \iff \kappa \in A$  אזי  $\forall A \in \sigma(\mathcal{T}). \omega \in A \iff \kappa \in A$ .

**משתנה מקרי/פונקציה מדידה:** יהי  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  מרחב הסתברות אזי  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  עברה  $X^{-1}[B] \in \mathcal{F}$  עבור  $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ .

**פונקציה מדידה בורל:**  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת  $\varphi^{-1}[B] \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$  עבור  $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ .

**סימון:** יהי  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  מרחב הסתברות ויהי  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  מ"מ נגדיר  $\mathbb{P}_X : \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$  כך  $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}[B])$ .

**טענה:** תהא  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ותהייה  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  אזי

$$\bullet f^{-1}[A \cup B] = f^{-1}[A] \cup f^{-1}[B]$$

$$\bullet f^{-1}[A \cap B] = f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B]$$

$$\bullet f^{-1}[A^c] = f^{-1}[A]^c$$

**טענה:** יהי  $(\Omega, \mathcal{F})$  מרחב מדיד ותהא  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  אזי  $\{E \subseteq \mathbb{R} \mid X^{-1}[E] \in \mathcal{F}\}$  הינה  $\sigma$ -אלגברה מעל  $\mathbb{R}$ .

**משפט:** יהי  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  מרחב הסתברות ותהא  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  אזי  $X$  מ"מ  $\iff (\forall t \in \mathbb{R}. X^{-1}((-\infty, t]) \in \mathcal{F})$ .

**$\sigma$ -אלגברה נוצרת על ידי משתנה מקרי:** יהי  $X$  מ"מ על מרחב הסתברות  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  אזי  $\sigma(X) = \sigma(\{X^{-1}[B] \mid B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}\})$ .

**טענה:** יהיו  $X, Y$  מ"מ על מרחב הסתברות  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  אזי

$\bullet$  יהי  $c \in \mathbb{R}$  אזי  $cX$  מ"מ.

$\bullet$   $X + Y$  מ"מ.

$\bullet$   $XY$  מ"מ.

$\bullet$  יהי  $Z$  מ"מ על  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \mu)$  אזי  $f \circ X$  מ"מ.

**טענה:** תהא  $f \in C(\mathbb{R})$  ותהא  $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}$  פתוחה אזי  $f^{-1}[\mathcal{U}]$  פתוחה.

**מסקנה:** תהא  $f \in C(\mathbb{R})$  אזי  $f$  מ"מ על  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \mu)$ .

**פונקציית התפלגות מצטברת (פה"מ):** יהי  $X$  מ"מ על מרחב הסתברות  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  אזי  $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$  המקיימת  $F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t)$ .

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ על מרחב הסתברות  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  אזי

$$\bullet \lim_{t \rightarrow \infty} F_X(t) = 1$$

$$\bullet \lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0$$

$$\bullet F_X \text{ מונוטונית עולה.}$$

$$\bullet \lim_{t \rightarrow a+} F_X(t) = F_X(a)$$

**משתנים מקריים שוי התפלגות:**  $X, Y$  מ"מ עבורם  $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$ .

**למה:** תהא  $\Omega$  קבוצה תהא  $\mathcal{F}_0 \subseteq 2^{\Omega}$  סגורה לחיתוכים סופיים עברה  $\Omega \in \mathcal{F}_0$  ותהא  $\mathcal{F} \subseteq 2^{\Omega}$  סגורה להפרשים וסגורה לגבולות

אינסופיים עברה  $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}$  אזי  $\sigma(\mathcal{F}_0) \subseteq \mathcal{F}$ .

**טענה:** יהיו  $X, Y$  מ"מ אזי  $(F_X = F_Y) \iff (\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y)$ .

**תומך של משתנה מקרי:** יהי  $X$  מ"מ אזי  $\text{supp}(X) = \{t \in \mathbb{R} \mid \forall \varepsilon > 0. \mathbb{P}(t - \varepsilon < X < t + \varepsilon) > 0\}$ .

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ אזי  $\text{supp}(X)$  הקבוצה הסגורה המינימלית ב- $\mathbb{R}$  עברה  $\mathbb{P}(X \in \text{supp}(X)) = 1$ .

**אטום של משתנה מקרי:** יהי  $X$  מ"מ אזי  $t \in \mathbb{R}$  המקיים  $\mathbb{P}(X = t) > 0$ .

**קבוצת האטומים:** יהי  $X$  מ"מ אזי  $t \in \mathbb{R}$  אטום של  $X$  אזי  $A_X = \{t \in \mathbb{R} \mid X \text{ אטום של } t\}$ .

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ אזי  $|A_X| \leq \aleph_0$ .

**משנתה מקרי בדיד:** משנתה מקרי  $X$  המקיים  $\mathbb{P}(X \in A_X) = 1$ .

**פונקציית צפיפות:**  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  רציפה למקוטעין המקיימת  $f \geq 0$  וכן  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ .

**משנתה מקרי רציף:** משנתה מקרי  $X$  עבורו קיימת  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציית צפיפות עבורה לכל  $a < b$  מתקיים

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

**סימון:** יהי  $X$  מ"מ רציף אזי  $f_X$  פונקציית הצפיפות של  $X$ .

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ רציף אזי

$$\bullet \text{ יהי } t \in \mathbb{R} \text{ אזי } \mathbb{P}(X = t) = 0$$

$$\bullet F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx$$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ רציף ותהא  $a \in \mathbb{R}$  עבורה  $f_X \in C(a)$  אזי  $F'_X(a) = f_X(a)$ .

**האחוזון ה- $p$ :** יהי  $X$  מ"מ עבורו  $F_X$  עולה ממש עד אשר  $F_X = 1$  והי  $p \in (0, 1)$  אזי  $x_p \in \mathbb{R}$  המקיים  $F_X(x_p) = p$ .

**האחוזון ה- $p$ :** יהי  $X$  מ"מ עבורו  $F_X$  עולה והי  $p \in (0, 1)$  אזי  $x_p = \sup\{t \mid F_X(t) \leq p\}$ .

**טענה:** תהא  $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  מונוטונית עולה רציפה מימין עבורה  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  וכן  $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$  אזי קיים מ"מ  $X$  על

מרחב הסתברות  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  עבורו  $F_X = F$ .

**סימון:** תהא  $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  מונוטונית עולה רציפה מימין עבורה  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  וכן  $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$  אזי

$$X^*(s) = \sup\{t \mid F_X(t) \leq s\}$$

**טענה:** תהא  $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  מונוטונית עולה רציפה מימין עבורה  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  וכן  $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$  אזי  $X^* = F$ .

**משפט:** תהא  $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  מונוטונית עולה רציפה מימין עבורה  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  וכן  $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$  אזי  $F_{X^*} = F$ .

**התפלגות ברנולי:** יהי  $p \in [0, 1]$  אזי

**המשנתה המקרי:**  $X$  אינדיקטור להצלחה בניסוי בעל סיכוי הצלחה  $p$  וסיכוי כישלון  $1 - p$ .

**פונקציית הסתברות:**  $\mathbb{P}(X = 1) = p, \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$ .

**סימון:**  $X \sim \text{Ber}(p)$ .

**התפלגות בינומית:** יהי  $p \in [0, 1]$  והי  $n \in \mathbb{N}_+$  אזי

**המשנתה המקרי:**  $X$  מספר הניסויים שצלחו בביצוע  $n$  ניסויי ברנולי בלתי תלויים בסיכוי הצלחה  $p$  לניסוי.

**פונקציית הסתברות:** יהי  $k \in \{0, \dots, n\}$  אזי  $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ .

**סימון:**  $X \sim \text{Bin}(n, p)$ .

**התפלגות גאומטרית:** יהי  $p \in [0, 1]$  אזי

**המשנתה המקרי:**  $X$  מספר ניסויי ברנולי בלתי תלויים בסיכוי הצלחה  $p$  שנדרשו עד הצלחה הראשונה כולל.

**פונקציית הסתברות:** יהי  $k \in \mathbb{N}_+$  אזי  $\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$ .

**סימון:**  $X \sim \text{Geo}(p)$ .

**התפלגות פואסונית:** יהי  $\lambda > 0$  אזי

**המשנתה המקרי:**  $X$  מספר האירועים שקרו בפרק זמן נתון בעל קצב אירועים בפרק זמן זה  $\lambda$ .

**פונקציית הסתברות:** יהי  $k \in \mathbb{N}$  אזי  $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ .

**סימון:**  $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ .

**טענה:** יהי  $\lambda > 0$  יהיו  $X_n \sim \text{Bin}(n, \frac{\lambda}{n})$  מ"מ יהי  $X \sim \text{Poi}(\lambda)$  מ"מ והי  $k \in \mathbb{N}$  אזי  $\mathbb{P}(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X = k)$ .

**תהליך פואסון:** משתנים מקריים  $\{N_t\}_{t \in \mathbb{R}_+}$  כך שלכל  $t \in \mathbb{R}_+$  המ"מ  $N_t$  סופר את מספר האירועים בלתי תלויים שקרו עד זמן  $t$ , בפרט  $N_0 = 0$  וכן  $N_{t+s} - N_s \sim \text{Poi}(\lambda t)$  באשר  $\lambda$  ממוצע האירועים ליחידת זמן.

**התפלגות אחידה:** יהיו  $a < b$  אזי

**המשנתה המקרי:**  $X$  בחירה אקראית של נקודה בקטע  $(a, b)$ .

**פונקציית התפלגות מצטברת:**  $F_X(t) = \begin{cases} 0 & t \leq a \\ \frac{t-a}{b-a} & t \in (a, b) \\ 1 & t \geq b \end{cases}$

**פונקציית צפיפות:**  $f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & t \in (a, b) \\ 0 & \text{else} \end{cases}$

**סימון:**  $X \sim \text{Uni}(a, b)$ .

**התפלגות מעריכית:** יהי  $\lambda > 0$  אזי

**המשנתה המקרי:**  $X$  משך חיים של תהליך הנמשך  $\lambda$  יחידות זמן בממוצע.

**פונקציית התפלגות מצטברת:**  $F_X(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

- פונקציית צפיפות:  $f_X(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$
- סימון:  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

**טענה:** יהי  $\lambda > 0$  ויהי  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$  אזי  $\mathbb{P}(X > a + b | X > a) = \mathbb{P}(X > b)$  ויהי  $a, b > 0$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ המקיים  $\mathbb{P}(X > a + b | X > a) = \mathbb{P}(X > b)$   $\forall a, b > 0$ . אזי קיים  $\lambda > 0$  עבורו  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

**טענה:** הזמן הבינומפעי של תהליך פואסון עם קצב  $\lambda$  מופעים ליחידת זמן מתפלג  $\text{Exp}(\lambda)$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ רציף ותהא  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  על, עולה ממש וגזירה אזי  $f_{\varphi \circ X}(t) = \frac{f_X(\varphi^{-1}(t))}{\varphi'(\varphi^{-1}(t))}$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ רציף ותהא  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  על, יורדת ממש וגזירה אזי  $f_{\varphi \circ X}(t) = -\frac{f_X(\varphi^{-1}(t))}{\varphi'(\varphi^{-1}(t))}$

**הגדרה:** יהי  $X$  מ"מ אזי  $X^- = \min\{X, 0\}$ ,  $X^+ = \max\{X, 0\}$

**תוחלת:** יהי  $X$  מ"מ בדיד אזי  $\mathbb{E}[X] = \sum_{c \in A_X} c \cdot \mathbb{P}(X = c)$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ בדיד אזי  $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X^+] + \mathbb{E}[X^-]$

**משתנה מקרי אינטגרביילי:** מ"מ בדיד  $X$  עבורו  $\mathbb{E}[X]$  סופי.

**משתנה מקרי סימטרי:** יהי  $a \in \mathbb{R}$  אזי מ"מ  $X$  עבורו  $\mathbb{P}(X \geq a + k) = \mathbb{P}(X \leq a - k)$   $\forall k \in \mathbb{R}$

**טענה:** יהי  $a \in \mathbb{R}$  ויהי  $X$  מ"מ בדיד אינטגרביילי סימטרי סביב  $a$  אזי  $\mathbb{E}[X] = a$

**טענה לינאריות התוחלת:** יהיו  $a, b \in \mathbb{R}$  ויהי  $X$  מ"מ בדיד אינטגרביילי אזי  $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$

**משתנה מקרי שולט:** יהיו  $X, Y$  מ"מ אזי  $X$  שולט על  $Y$  אם  $Y \leq X$

**טענה מונוטוניות התוחלת:** יהיו  $X \geq Y$  מ"מ בדידים אזי  $\mathbb{E}[X] \geq \mathbb{E}[Y]$

**תוחלת:** יהי  $X$  מ"מ אזי

$$\mathbb{E}[X^+] = \sup\{\mathbb{E}[Y] \mid (0 \leq Y \leq X^+) \wedge (Y \text{ מ"מ בדיד})\}$$

$$\mathbb{E}[X^-] = -\sup\{\mathbb{E}[Y] \mid (0 \leq Y \leq -X^-) \wedge (Y \text{ מ"מ בדיד})\}$$

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X^+] + \mathbb{E}[X^-]$$

**משתנה מקרי אינטגרביילי:** מ"מ  $X$  עבורו  $\mathbb{E}[X]$  סופי.

**טענה לינאריות התוחלת:** יהיו  $a, b \in \mathbb{R}$  ויהי  $X$  מ"מ אינטגרביילי אזי  $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$

**טענה מונוטוניות התוחלת:** יהיו  $X \geq Y$  מ"מ אזי  $\mathbb{E}[X] \geq \mathbb{E}[Y]$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ אזי  $\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty (1 - F_X(t)) dt + \int_{-\infty}^0 (0 - F_X(t)) dt$

**מסקנה:** יהי  $X$  מ"מ רציף אזי  $\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^\infty t f_X(t) dt$

**משתנה מקרי שולט סטוכסטית:** יהיו  $X, Y$  מ"מ אזי  $X$  שולט סטוכסטית על  $Y$  אם  $F_Y \geq F_X$

**טענה:** יהיו  $X, Y$  מ"מ עבורם  $\mathbb{P}(Y \leq X) = 1$  אזי  $X$  שולט סטוכסטית על  $Y$

**טענה:** יהיו  $X, Y$  מ"מ

• אם  $X$  שולט סטוכסטית על  $Y$  אזי  $\mathbb{E}[Y] \leq \mathbb{E}[X]$

• אם  $\mathbb{P}(Y \leq X) = 1$  אזי  $\mathbb{E}[Y] \leq \mathbb{E}[X]$

• חיבוריות:  $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$

**טענה אי־שוויון מרקוב:** יהי  $X \geq 0$  מ"מ אינטגרביילי ויהי  $b > 0$  אזי  $\mathbb{P}(X \geq b) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{b}$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ אינטגרביילי בדיד ותהא  $\varphi$  מדידה בורל אזי  $\mathbb{E}[\varphi \circ X] = \sum_{c \in A_X} \varphi(c) \cdot \mathbb{P}(X = c)$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ רציף ותהא  $\varphi$  רציפה למקוטעין אזי  $\mathbb{E}[\varphi \circ X] = \int_{-\infty}^\infty \varphi(t) f_X(t) dt$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ חסום אזי  $\mathbb{E}[X] = \int_0^1 X^*(t) dt$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ חסום מלרע אזי  $\mathbb{E}[X] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^{1-\varepsilon} X^*(t) dt$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ חסום מלעיל אזי  $\mathbb{E}[X] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{0+\varepsilon}^1 X^*(t) dt$

**שונויות:** יהי  $X$  מ"מ אינטגרביילי אזי  $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$

**סטיית תקן:** יהי  $X$  מ"מ אינטגרביילי אזי  $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ אינטגרביילי אזי  $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}^2[X]$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ אינטגרביילי ויהיו  $a, b \in \mathbb{R}$  אזי  $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$

**טענה אי־שוויון צ'בישב:** יהי  $X$  מ"מ אינטגרביילי ובעל שונות ויהי  $a > 0$  אזי  $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$

**פונקציה יוצרת מומנטים:** יהי  $X$  מ"מ אזי  $M_X: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת  $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ ויהי  $I$  קטע עבורו  $0 \in I$  וכן  $M_X \in C^n(I)$  אזי  $M_X^{(n)}(0) = \mathbb{E}[X^n]$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ ויהי  $I$  קטע עבורו  $0 \in I$  וכן  $M_X(t)$  קיים וסופי על  $I$  אזי  $\mathbb{E}[|X|^n]$  מתכנס לכל  $n \in \mathbb{N}$

**טענה:** יהי  $X$  מ"מ ויהי  $\varepsilon > 0$  עבורו  $M_X(t)$  קיים וסופי על  $(-\varepsilon, \varepsilon)$  אזי  $M_X(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n \mathbb{E}[X^n]}{n!}$ .