



国药准字H20040798

苦参素氯化钠注射

Marine and Sodium Chloride Injection

【成份】本品主要成份为苦参素、氯化钠。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】用于慢性乙型肝炎的治疗。
【用法用量】静脉滴注。每日一次，每次0.4-0.6g。
【不良反应】不良反应发生率较低。常见的不良反应有头晕、恶心、呕吐、口苦、腹泻、上腹不适或疼痛、偶见皮疹、胸闷、发热、症状一般可自行缓解。个别病人可出现注射部位发红。
【禁忌】1、对本品过敏者禁用。2、有严重血源、心、肝、肾及内分泌疾病者禁用。
【注意事项】1、在医生指导下使用本品。2、严重肾功能不全者慎用，长期使用应密切注意肝功能变化。3、严重肾功能不全者，不建议使用本品。4、用药后出现皮疹者应停药。
【贮藏】避光、密闭保存。

【产品批号】B14

2013

【有效期至】2013

【生产日期】

宜昌三昌
YICHANG





细辛脑氯化钠注射液

Asarone and Sodium Chloride Injection

国药准字H20060817

本品主要成分为细辛脑、氯化钠。
本品为几乎无色或微黄色的澄明液体。
适用于肺炎、支气管炎、慢性阻塞性肺
病、哮喘、喘息等。

用法用量：成人：一次16~24mg（以细
辛脑计）；儿童：一次0.5mg（以细辛脑计）
一日2次。

【不良反应】【禁忌】【注意事项】

本品为注射剂，在凉暗处（避光并不超过

100ml
细辛脑16mg与氯化钠0.9g

【产品批号】 B1613

【有效期至】 2018

【生产日期】 2016



宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

国药准字H20060432

丽科清®

更昔洛韦氯化钠注射液

规格：100ml：更昔洛韦0.1g与氯化钠0.9g

【成份】本品主要成份为更昔洛韦。
【性状】本品为无色澄明液体。
【适应症】本品适用于治疗单纯疱疹病毒感染、巨细胞病毒感染、带状疱疹病毒感染、水痘-带状疱疹病毒感染、单纯疱疹病毒肺炎、带状疱疹后遗神经痛等。
【用法用量】
1. 成人：一次0.5g，一日3次，静脉滴注。
2. 儿童：按体重10mg/kg，一日3次，静脉滴注。
3. 肾功能不全患者：按肌酐清除率调整剂量。
4. 本品为注射剂，使用时应严格无菌操作。
5. 本品为氯化钠注射液，使用时应注意电解质平衡。
6. 本品为处方药，应在医生指导下使用。
【不良反应】本品常见不良反应有：头痛、恶心、呕吐、腹泻、皮疹、过敏反应等。
【禁忌】对本品过敏者禁用。
【注意事项】本品为注射剂，使用时应严格无菌操作。
【规格】100ml：更昔洛韦0.1g与氯化钠0.9g。
【贮藏】遮光，密封保存。
【有效期】24个月。
【批准文号】国药准字H20060432。
【生产企业】宜昌三峡制药有限公司。



宜昌三峡制药有限公司

盐酸赖氨酸
氯化钠注射液

Lysine Hydrochloride
and Sodium Chloride Injection

100ml
3.4g (以赖氨酸计)

【成份】本品主要成分为赖氨酸和氯化钠。

【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。

【适应症】本品能提高细胞通透性，有助于药物进入细胞内，可作为脑病的辅助治疗。可用于赖氨酸缺乏引起的人体食欲不振、营养不良及脑发育不良。

【用法用量】静脉缓慢推注，每次3g（以盐酸赖氨酸计），每日1次，20次为一个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】少数患者出现胃肠道不适。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】急性肾功能衰竭者慎用；本品为含钠制剂，肾功能不全者慎用。

【贮藏】密闭保存。



宜昌三峡制药有限公司

YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
电话号码：0717-6271947 传真号码：0717-6271948

盐酸赖氨酸
氯化钠注射液

Lysine Hydrochloride
and Sodium Chloride Injection

100ml
3.4g (以赖氨酸计)
10.0g (以氯化钠计)

【成份】本品主要成分为赖氨酸和氯化钠。

【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。

【适应症】本品能提高细胞通透性，有助于药物进入细胞内，可作为脑病的辅助治疗。可用于赖氨酸缺乏引起的人体食欲不振、营养不良及脑发育不良。

【用法用量】静脉缓慢推注，每次3g（以盐酸赖氨酸计），每日1次，20次为一个疗程，或遵医嘱。

【不良反应】少数患者出现胃肠道不适。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】急性肾功能衰竭者慎用；本品为含钠制剂，肾功能不全者慎用。

【贮藏】密闭保存。



宜昌三峡制药有限公司

YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
电话号码：0717-6271947 传真号码：0717-6271948

舒明

批准文号：国药准字H20030453

100ml

盐酸赖氨酸
氯化钠注射液

100ml : 盐酸赖氨酸
3g与氯化钠0.9g

Lysine Hydrochloride
And Sodium Chloride Injection



宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.



250ml

氯化钠注射液 0.9%
Sodium Chloride Injection

【规 格】 250ml
【用法用量】 静脉滴注
【不良反应】 无不良反应
【禁忌】 无禁忌
【注意事项】 本品为含氯消毒剂，使用时应注意安全，避免误食。
【贮藏】 密封保存

请一次性使用，如有破损，药液不澄清，可见异物不得使用。

批号：20161022

宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

产品批号：R161004

有效期至：2018年10月21日

生产日期：2016年10月22日

更昔洛韦氯化钠注射液

丽科清®

更昔洛韦氯化钠

GANCICLOVIR AND SODIUM CHLORIDE

【成份】本品主要成份为更昔洛韦与氯化钠。

【性状】本品为无色澄明液体。

【适应症】仅用于1、免疫功能缺陷者（包括艾滋病）

性视网膜炎。2、预防可能发生于接受器官移植的

【用法用量】详见说明书。

【不良反应】详见说明书。

【禁忌】对本品或阿昔洛韦过敏者禁用。

【注意事项】使用前请详加检查，如发现本品瓶

瓶身有破损、漏气、变色、沉淀、异物等

不得使用；本品一经开启，须一次性使用，不得

再用。详见说明书。

【贮藏】密闭保存。



100ml:更昔洛韦0.1g与氯化钠

宜昌三峡制药有限公司

国药准字H20060817

细辛脑氯化钠 注射液

Asarone and Sodium Chloride
Injection

供静脉滴注用



100ml

细辛脑16mg与氯化钠0.9g



宜昌三峡制药有限公司

生产地址：湖北省宜昌市东山经济开发大道
电话：0717-6271847 传真：0717-6271201



250ml

葡萄糖注射液 5%
Glucose Injection

【规格】 5% 250ml:12.5g

【用法用量】 静脉滴注（详见说明书）

【不良反应】 本品含钠离子，禁与【禁忌】等项

【贮藏】 密封保存

【注意事项】 本品含钠离子，禁与【禁忌】等项

【生产企业】 宜昌三峡制药有限公司

宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

产品批号: 161004

有效期至: 2016年10月19日

生产日期: 2016年10月20日

250ml:50g

甘露醇注射液 Mannitol Injection

【成份】本品主要成份为D-甘露糖醇。

【性状】本品为无色的澄明液体。

【适应症】(1) 组织脱水药。(2) 降低眼内压。(3) 渗透性利尿药。(4) 作为辅助性利尿措施治疗肾病综合征、肝硬化腹水，尤其是伴有低蛋白血症时。(5) 对某些药物、毒物中毒（如巴比妥类药物、锂、水杨酸盐和溴化物等）。

【用法用量】(1) 术前肠道准备，详见说明书。

【用法用量】1. 成人常用量：(1) 利尿。常用量为按体重1~2g/kg，一般用20%溶液250ml静脉滴注，并调整剂量使尿量维持每小时30~50ml。详见说明书。

【不良反应】水和电解质紊乱最为常见。详见说明书。

【禁忌】(1) 严重肾功能衰竭。

【禁忌】(2) 严重心力衰竭。

【禁忌】(3) 严重肺水肿。

【禁忌】(4) 严重低蛋白血症。

【禁忌】(5) 严重脱水。

【禁忌】(6) 严重电解质紊乱。

【禁忌】(7) 严重酸碱平衡失调。

【禁忌】(8) 严重肝肾功能不全。

【禁忌】(9) 严重休克。

【禁忌】(10) 严重出血倾向。

【禁忌】(11) 严重过敏反应。

【禁忌】(12) 严重感染。

【禁忌】(13) 严重营养不良。

【禁忌】(14) 严重贫血。

【禁忌】(15) 严重白细胞减少。

【禁忌】(16) 严重血小板减少。

【禁忌】(17) 严重凝血功能障碍。

【禁忌】(18) 严重出血。

【禁忌】(19) 严重休克。

【禁忌】(20) 严重感染。

【禁忌】(21) 严重营养不良。

【禁忌】(22) 严重贫血。

【禁忌】(23) 严重白细胞减少。

【禁忌】(24) 严重血小板减少。

【禁忌】(25) 严重凝血功能障碍。

【禁忌】(26) 严重出血。

【禁忌】(27) 严重休克。

【禁忌】(28) 严重感染。

【禁忌】(29) 严重营养不良。

【禁忌】(30) 严重贫血。

【禁忌】(31) 严重白细胞减少。

【禁忌】(32) 严重血小板减少。

【禁忌】(33) 严重凝血功能障碍。

【禁忌】(34) 严重出血。

【禁忌】(35) 严重休克。

【禁忌】(36) 严重感染。

【禁忌】(37) 严重营养不良。

【禁忌】(38) 严重贫血。

【禁忌】(39) 严重白细胞减少。



宜昌三峡制药有限公司

YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

电话：0717-6271847 传真：0717-6271280

COMPOUND AMINO ACID INJECTION

批准文号：国药准字H19993921



复方氨基酸注射液(18AA)

COMPOUND AMINO ACID INJECTION(18AA)

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

250ml:12.5g(总氨基酸)

YICHANG SANXIA
PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

复方氨基酸注射液(18AA)

【性状】本品为无色澄明液体，无臭，味甜，pH值在5.0-7.0之间。

氨基酸	1.25g	葡萄糖	1.25g
谷氨酸	1.25g	果糖	1.25g
丙氨酸	1.25g	甘露糖	1.25g
异亮氨酸	0.625g	半乳糖	1.25g
亮氨酸	1.25g	乳糖	1.25g
缬氨酸	0.625g	麦芽糖	1.25g
苯丙氨酸	0.625g	蔗糖	1.25g
酪氨酸	0.625g	山梨糖	1.25g
组氨酸	0.625g	海藻糖	1.25g
精氨酸	1.25g	乳糖醇	1.25g
脯氨酸	1.25g	甘露醇	1.25g

【规格】250ml:12.5g(总氨基酸)

【用法】肌肉注射，每日2-3次，每次1-2支。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】本品为氨基酸注射液，使用时应注意无菌操作。

【不良反应】本品不良反应尚不明确。

【规格】250ml:12.5g(总氨基酸)

【贮藏】遮光，密闭，室温保存。

【有效期】24个月。

【批准文号】国药准字H19993921

【生产企业】宜昌三鑫药业有限公司



乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液

Levofloxacin Lactate and Sodium Chloride Injection

100ml: 乳酸左氧氟沙星0.2g (以左氧氟沙星计)

【性状】本品主要成份为乳酸左氧氟沙星与氯化钠。
【性状】本品为微黄绿色的澄明液体。
【适应症】本品适用于敏感细菌所引起的下列中、重度感染：
呼吸系统感染：泌尿系统感染；生殖系统感染；皮肤软组织感染；败血症、粒细胞减少及免疫功能低下者。
【用法用量】静脉滴注。成人一次0.1~0.2g，一日2次，或口服。
【不良反应】本品不良反应与左氧氟沙星类似。
【禁忌】对本品或喹诺酮类药物过敏者禁用。
【注意事项】本品为处方药，应在医生指导下使用。
【规格】100ml: 乳酸左氧氟沙星0.2g (以左氧氟沙星计)

【用法用量】
【不良反应】
【禁忌】
【注意事项】
【规格】

【用法用量】
【不良反应】
【禁忌】
【注意事项】
【规格】



宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
电话号码: 0717-6271047

葡萄糖氯化钠注射液

Glucose and Sodium Chloride Injection

国药准字H42021679

500ml

葡萄糖25g与氯化钠

【用法用量】100ml内含葡萄糖50g（5%）、100g

【用法用量】

【用法用量】用于各种原因引起的进食不足或大量

【用法用量】葡萄糖和氯化钠的用法用量，详见说明书。

【用法用量】本品，可造成钠潴留，引起水肿、血压

【用法用量】升高、神志淡漠、甚至急性左心衰竭。（共8项）

【用法用量】本品，忌用于肾功能不全者。（共5项）详见说明书。

【用法用量】本品，如与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心

【用法用量】本品，本品与强心药、利尿化、脱水、充血性心



宜昌三峡制药有限公司

YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

电话：0717-6271847 传真：0717-6271201



复方氨基酸注射液(17AA)
Compound Amino Acid Injection(17AA)

250ml:18.12g
氨基酸注射液

【成份】本品为复方制剂，是由十七种氨基酸及山梨醇配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】氨基酸类药。用于手术、严重创伤、大面积烧伤引起的严重氮质血症，以及各种疾病引起的低蛋白血症。
【用法用量】中心静脉插管或由周围静脉滴注。常用量：一日250ml~500ml，成人滴速每分钟40滴，儿童、老人及重病者滴速宜更慢。应按年龄、病情和体重增减剂量。
【不良反应】滴注速度过快可引起恶心、呕吐、头痛和气喘。
【禁忌】严重肝肾功能不全者禁用。氮质血症、无尿、心力衰竭及急性肺水肿者禁用。
【注意事项】本品不宜与磺胺类药物、对氨基水杨酸配伍使用。详见说明书。
【贮藏】置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

本品为玻璃瓶包装，瓶身有破
裂、渗漏或瓶塞松动时不得使用；本
品为无菌制剂，严禁二次使用。

三威制药有限公司
SUNWEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
电话：0717-6271201

【产品批号】 B150103
【有效期】至 2017.01.21
【生产日期】 2015.01.21

复方氨基酸注射液 (14AA)
Compound Amino Acid Injection (14AA)

250ml (5.0L)
国药准字H140601

【成份】本品为复方制剂，是由14种氨基酸配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】氨基酸类药。用于改善手术前后病人营养状态，亦用于蛋白质摄入量不足或消耗过多等所致的轻度营养不良。
【用法用量】静脉滴注：一日250~500ml，严重消耗性疾病可增至1000ml。与葡萄糖注射液混合后静脉滴注，或与5%~10%葡萄糖注射液混合后经外周静脉插管滴注，每1分钟15~20滴为宜。详见说明书。
【不良反应】滴注速度过快易产生心悸、胸闷、胃肠道反应、发热、头痛等。
【禁忌】严重酸中毒和充血性心力衰竭患者慎用；尿毒症、肝昏迷和代谢性酸中毒患者禁用。
【注意事项】严格控制滴速。（共4项）详见说明书。
【贮藏】密闭，置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

如发现药液不透明、瓶身有破裂、漏液等现象时不能使用；本品开封后，如发现药液不再透明，请勿再用。

【产品批号】

B140601

【有效期】至

2018.06.30

【生产日期】

2014.06.30

宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
电话：0717-6271847 传真：0717-6271201

复方氨基酸注射液 (9AA)
Compound Amino Acid Injection (9AA)

250ml:13.5g

国药准字H11020194

【成份】本品为复方制剂，由9种氨基酸配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】用于急性和慢性肾功能不全患者的肠道外支持；大手术、外伤或烧伤引起的严重肾功能衰竭以及急性和慢性肾功能衰竭。
【用法用量】静脉滴注：成人每一日250ml ~ 500ml，缓慢滴注。小儿用量遵医嘱。
【不良反应】静滴速度过快能引起恶心、呕吐、心悸、寒战等反应。应适当减慢滴速（静滴每分钟15滴为宜），老年人和危重患者尤要注意。
【禁忌】氨基酸代谢紊乱、严重肝功能损害、心功能不全、水肿、低血钾、低血钙患者禁用。
【注意事项】应严格控制给药速度，不超过每分钟15滴。（共7项）详见说明书。
【贮藏】密闭，置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

本品为注射剂，使用时应注意无菌操作，如有异物或浑浊，请勿使用；本品开封后应在24小时内使用，过期药液不得再用。

【产品批号】

B160801

【有效期至】

2018.08.02

【生产日期】

2016.08.02

三友制药有限公司

SHANYOU PHARMACEUTICAL CO., LTD.
地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道
电话：0574-8271201

复方氨基酸注射液 (15AA)
Compound Amino Acid Injection (15AA)

250ml:25g 15AA
国药准字H20050001

【组成】本品为复方制剂，是由15种氨基酸配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】氨基酸类药。能改善血浆蛋白水平和促进肝功能恢复。用于肝衰竭、急性、慢性重症肝炎及肝昏迷的治疗，并可作为慢性肝炎的支持治疗。
【用法用量】静脉滴注。一日250~500ml，用适量5%~10%葡萄糖注射液稀释。
滴注速度不宜超过每分钟20滴。
【不良反应】输注过快可致心悸、恶心、呕吐等反应。
【禁忌】严重酸中毒、充血性心力衰竭及肾功能衰竭患者慎用。
【注意事项】1.注射后剩余药液不能贮存再用。2.本品遇冷能析出结晶，加热至27℃，澄明后方可使用。但药液如发生浑浊、沉淀时不可使用。3.注射时宜避免。
【贮藏】密闭，置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

本品为处方药，不得随意使用。如有破损，请勿使用。本药仅供医疗使用，不得用于其他用途。

上海医药有限公司
SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
电话：021-6271201

【产品批号】

B130802

【有效期】至

2015.08.27

【生产日期】

2013.08.28



复方氨基酸注射液(17AA)
Compound Amino Acid Injection(17AA)

250ml:18.12g
氨基酸注射液

【成份】本品为复方制剂，是由十七种氨基酸及山梨醇配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】氨基酸类药。用于手术、严重创伤、大面积烧伤引起的严重氮质血症，以及各种疾病引起的低蛋白血症。
【用法用量】中心静脉插管或由周围静脉滴注。常用量：一日250ml-500ml，成人滴速每分钟40滴，儿童、老人及重病者滴速宜更慢。应按年龄、病情和体重增减剂量。
【不良反应】滴注速度过快可引起恶心、呕吐、头痛和气喘。
【禁忌】严重肝肾功能不全者禁用。氮质血症、无尿、心力衰竭及急性肺水肿者禁用。
【注意事项】本品不宜与磺胺类药物、对氨基水杨酸配伍使用。详见说明书。
【贮藏】置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

本品为玻璃瓶包装，瓶身有破损、漏液或瓶塞松动时不得使用；本瓶内溶液不得再用。

三威制药有限公司
SUNWEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
电话：0717-6271201

【产品批号】 B150103
【有效期】至 2017.01.21
【生产日期】 2015.01.21

复方氨基酸注射液(17AA-I)
Compound Amino Acid Injection (17AA-I)

【成份】本品为复方制剂，是由十七种氨基酸及山梨醇配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】用于手术、严重创伤、大面积烧伤引起的严重低蛋白血症。
【用法用量】中心静脉插管或静脉滴注，一日250ml~1000ml，成人滴速宜慢，儿童、老人及重病者滴速宜更慢。应按年龄、病情和体重调整剂量。
【不良反应】滴注速度过快可引起面部潮红、多汗、恶心、呕吐、心悸、气促、低血压、低血糖、低钾血症、低钙血症、低镁血症、低磷血症、低氯血症、低钠血症、低钾血症、低钙血症、低镁血症、低磷血症、低氯血症、低钠血症。
【禁忌】1. 严重肝肾功能不全者禁用。2. 氮质血症、无尿、心力衰竭、休克、严重脱水、严重酸中毒、严重碱中毒、严重电解质紊乱、严重低血糖、严重低钾血症、严重低钙血症、严重低镁血症、严重低磷血症、严重低氯血症、严重低钠血症。
【注意事项】本品不宜与磺胺类药物、对氨基水杨酸配伍使用。
【贮藏】置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

如发现药液不澄明、瓶身有裂纹、漏液、变色、异物等变质现象时不能使用；本品一次注完，残留药液不得再用。

宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANKU PHARMACEUTICAL CO., LTD.
TEL: 010-6271847 传真号码: 0117-6271201

【产品批号】 B 130407
【有效期至】 2015.04
【生产日期】 2013.04

复方氨基酸注射液(3AA)

Compound Amino Acid Injection(3AA)

- 【成份】本品为复方制剂，由3种氨基酸配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】各种原因引起的肝性脑病、重症肝炎以及开颅术、外伤、手术、烧伤、创伤、休克、感染、中毒、营养不良、术后恢复、亦可用于肝胆外科手术前后。
【用法用量】静脉滴注 一日250~500ml或用适量5%~10%葡萄糖注射液稀释后缓慢滴注，每1分钟不超过40滴。
【不良反应】输注过快可致心悸、恶心、呕吐、发热等反应。
【禁忌】严重肾功能损害者及有氨基酸代谢障碍的患者禁用。
【注意事项】（共6项）详见说明书。
【贮藏】密闭，置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

如发现药液不透明、瓶身有破裂、漏液、异物等变质现象时不能使用，本品开封后一次使用完毕，残留药液不得再用。

宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
总机：0717-6271547 传真：0717-6271201

【产品批号】

【有效期】至

【生产日期】

B160702

2018.07

2016.07

复方氨基酸注射液 (9AA)
Compound Amino Acid Injection (9AA)

250ml:13.5g
国药准字H11020367

【成份】本品为复方制剂，由9种氨基酸配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】用于急性和慢性肾功能不全患者的肠道外支持；大手术、外伤或烧伤引起的严重肾功能衰竭以及急性和慢性肾功能衰竭。
【用法用量】静脉滴注：成人每一日250ml ~ 500ml，缓慢滴注。小儿用量遵医嘱。
【不良反应】静滴速度过快能引起恶心、呕吐、心悸、寒战等反应。应适当减慢速度（静滴每分钟15滴为宜），老年人和危重患者尤要注意。
【禁忌】氨基酸代谢紊乱、严重肝功能损害、心功能不全、水肿、低血钾、低血钙患者禁用。
【注意事项】应严格控制给药速度，不超过每分钟15滴。（共7项）详见说明书。
【贮藏】密闭，置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

本品为注射剂，使用时应注意无菌操作，如有异物或瓶塞松动，请勿使用；本品开封后应在24小时内使用，过期药液不得再用。

【产品批号】

B160801

【有效期至】

2018.08.02

【生产日期】

2016.08.02

三友制药有限公司

SHANYOU PHARMACEUTICAL CO., LTD.
地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道新碶社区新碶村
电话：0574-8271201

复方氨基酸注射液 (14AA)
Compound Amino Acid Injection (14AA)

250ml:25g
氨基酸注射液

【成份】本品为复方制剂，是由14种氨基酸配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】氨基酸类药。用于改善手术前后病人营养状态，亦用于蛋白质摄入量不足或消耗过多等所致的轻度营养不良。
【用法用量】静脉滴注：一日250~500ml，严重消耗性疾病可增至1000ml。与葡萄糖注射液混合后静脉滴注，或与5%~10%葡萄糖注射液混合后经外周静脉插管滴注，每1分钟15~20滴为宜。详见说明书。
【不良反应】滴注速度过快易产生心悸、胸闷、胃肠道反应、发热、头痛等。
【禁忌】严重酸中毒和充血性心力衰竭患者慎用；尿毒症、肝昏迷和代谢性酸中毒患者禁用。
【注意事项】严格控制滴速。（共4项）详见说明书。
【贮藏】密闭，置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

如发现药液不透明、瓶身有破裂、漏液等现象时不能使用；本品开封后应在24小时内使用，过期药液不得再用。

【产品批号】

【有效期至】

【生产日期】

B140601
2018.06.01
2014.06.01

宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
电话: 0717-6271847 传真: 0717-6271201

复方氨基酸注射液 (15AA)
Compound Amino Acid Injection (15AA)

250ml:25g 15AA
国药准字H20050001

【组成】本品为复方制剂，是由15种氨基酸配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】氨基酸类药，能改善血浆蛋白水平和促进肝功能恢复。用于肝衰竭、急性、慢性重症肝炎及肝昏迷的治疗，并可作为慢性肝炎的支持治疗。
【用法用量】静脉滴注：一日250~500ml，用适量5%~10%葡萄糖注射液稀释。
滴注速度不宜超过每分钟20滴。
【不良反应】输注过快可致心悸、恶心、呕吐等反应。
【禁忌】严重酸中毒、充血性心力衰竭及肾功能衰竭患者慎用。
【注意事项】1.注射后剩余药液不能贮存再用。2.本品遇冷能析出结晶，加热至27℃，澄明后方可使用。但药液如发生浑浊、沉淀时不可使用。3.忌用铝器盛装。
【贮藏】密闭，置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

本品为注射剂，使用时应注意无菌操作，如有浑浊、沉淀、变色、漏液、瓶身有裂纹等，均不得使用，本品开封后，应立即使用，不得再用。

上海医药有限公司
SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
电话：021-6271201

【产品批号】 B130802
【有效期】至 2015.08.27
【生产日期】 2013.08.28

250

复方氨基酸注射液(6AA)
Compound Amino Acid Injection (6AA)

【成份】本品为复方制剂，由6种氨基酸配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】用于慢性肝性脑病、慢性迁延性肝炎、慢性活动性肝炎、慢性重型肝炎引起的氨基酸代谢紊乱。
【用法用量】静脉滴注。详见说明书。
【不良反应】输注速度过快可引起恶心、呕吐、头痛和发热等反应。
老年患者多见；当再次使用时可引起过敏反应，临床表现为皮疹、低血压、少尿、胸闷、呼吸急促、口唇紫绀、腹内及背痛，严重者可发生率低，但很难纠正。
【禁忌】对本品过敏者禁用。
【注意事项】（共8项）详见说明书。
【贮藏】密闭，置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

本品为注射剂，如发现药液不澄明、瓶身有破裂、漏液、变色、异物等变质现象时不能使用；本品开封后，一次使用完毕，残留药液不得再用。

宜昌三峡制药有限公司
YICHANG JIANYA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
地址：湖北宜昌 443000 电话：0717-6271847 传真：0717-6271201

【产品批号】

【有效期】至

【生产日期】

B160000
2018
2018

In total, I need about 9 000 000 pieces, how are these priced? How long will it take to get these to Cuba? What certifications do you have to validate the quality?