



5% 葡萄糖注射液
Glucose Injection

国药准字H42021682

【成分】本品主要成份为葡萄糖。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体；味甜。
【适应症】(1) 补充能量和体液；用于各种原因引起的进食不足或
吸收不良(如呕吐、腹泻等)，全静脉内营养，饥饿性酮症。
【规格】(3) 高钾血症；(4) 高渗溶液用作组织脱水剂；
【贮藏】避光、密闭、干燥处；(6) 药物稀释剂；(7) 静脉法葡萄糖耐量试
验。本品IGK(极化液)液用。
【包装】每瓶250ml, 12.5g。

【用法用量】(1) 补充热能 患者因某些原因进食减少或不能进食时，
可给予25%葡萄糖注射液静脉注射，并同时补充体液。(共7项) 详
见说明书。

【不良反应】(1) 酮症酸中毒
【禁忌】静脉滴注，静推时勿漏出血管外。
【禁 忌】(1) 禁忌症：高渗状态。
【注意事项】(1) 小儿剂量按体重计算，(2) 生产后婴儿低血糖。(3)
【贮 藏】密封保存。

【产品批号】

【有效期】至

【生产日期】



宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
电话号码: 0717-6271847 传真号码: 0717-6271201

国药准字H20040798

苦参素氯化钠注射液

Marine and Sodium Chloride Injection

【成分】本品主要成份为苦参素、氯化钠。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】用于慢性乙型病毒性肝炎的治疗。
【用法用量】静脉滴注。每日一次，每次0.4-0.6g。
【不良反应】不良反应发生率较低。常见的不良反应有头晕、恶心、呕吐、口苦、腹泻、上腹不适或疼痛，偶见皮疹、胸闷、发热、症状一般可自行缓解。个别病人可能出现注射部位发红。
【禁忌】1、对本品过敏者禁用。2、有严重血友病、心、肝、肾及内分泌疾患者禁用。
【注意事项】1、在医生指导下使用本品。2、严重肝功能不全者慎用，长期使用应密切注意肝功能变化。3、严重肾功能不全者，不建议使用本品。4、用药后出现的疹者应停药。
【贮藏】避光、密闭保存。

【产品批号】B14
2013.01.01
【有效期】至
2013.01.01
【生产日期】
2013.01.01













国药准字H20060432

丽科清®

更昔洛韦氯化钠 注射液

规格：100ml：更昔洛韦0.1g与氯化钠0.9g

[成分]
更昔洛韦
氯化钠
水
[适应症]
1. 本品为抗疱疹病毒药，对单纯疱疹病毒、带状疱疹病毒、巨细胞病毒等有抑制作用。
2. 本品为抗带状疱疹病毒药。
3. 本品为抗巨细胞病毒药。
4. 本品为治疗免疫缺陷者带状疱疹的首选药。
5. 其他：本品可用于治疗免疫缺陷者带状疱疹。
[用法]
本品为静脉滴注。
[贮藏]
避光，密闭保存。
[有效期]
2017.03.11
[批准文号]
国药准字H20060432
[生产日期]
2015-04-22
[批号]



宜昌三峡制药有限公司



盐酸赖氨酸
氯化钠注射液

Lysine Hydrochloride
And Sodium Chloride Injection

100ml
100ml: 赖氨酸2g
氯化钠8.5g

【成 分】本品主要成分为赖氨酸和氯化钠。
【性 状】本品为无色或几乎无色的透明液体。
【适 应 症】本品能提高细胞膜通透性，有助于药物进入细胞内，可作为脑病的辅助治疗。主要用于赖氨酸缺乏引起的儿童食欲不振、营养不良及脑发育不全。
【用法用量】静脉缓慢滴注，每次3g（以盐酸赖氨酸计），每日1次，20次为一个疗程，或遵医嘱。
【不良反应】少数患者出现短时肠不适。
【禁 忌】对本品过敏者禁用。
【注意】急性缺血性脑血管病者慎用；本品为含钠制剂，肾功能不全者慎用。
【贮 藏】密闭保存。



宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

电话号码: 0717-6271847



盐酸赖氨酸
氯化钠注射液

Lysine Hydrochloride
And Sodium Chloride Injection

100ml
100ml: 赖氨酸2g
氯化钠8.5g

【成 份】本品主要成分为赖氨酸和氯化钠。

【性 状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。

【适 应 症】本品能提高细胞膜通透性，有助于药物进入细胞内，可作为脑病的辅助治疗。可用于赖氨酸缺乏引起的儿童食欲不振、营养不良及脑发育不全。

【用法用量】静脉缓慢滴注，每次3g（以盐酸赖氨酸计），每日1次。20次为一个疗程。或遵医嘱。

【不 良 反 应】少数患者出现短时肠不适。

【禁 忌】对本品过敏者禁用。

【注意事 项】急性缺血性脑血管病者慎用；本品为含钠制剂，肾功能不全者慎用。

【贮 藏】密闭保存。



宜昌三峡制药有限公司

YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

电话号码: 0717-6271847

舒朗

批准文号：国药准字H20030453

100ml

盐酸赖氨酸
氯化钠注射液

100ml: 盐酸赖氨酸
0.3g与氯化钠0.9g

Lysine Hydrochloride
And Sodium Chloride Injection



宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



250ml
氯化钠注射液 0.9%
Sodium Chloride Injection

【規 格】 250ml × 5袋
【用法用量】 静脉滴注。详见说明书。
【适 应 症】 【不良反应】 【禁忌】 【妊娠期用药】等详见说明书。

【贮 藏】 常温保存。

一次性使用，如有泄漏，药液不浪费，避免污染不得使用。

批准文号：国药准字H42021678

宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO.,LTD

产品批号：R161004
有效期至：2018年10月21日
生产日期：2016年10月22日



国药准字H20060817

细辛脑氯化钠 注射液

Asarone and Sodium Chloride
Injection

供静脉滴注用



100ml

细辛脑16mg与氯化钠0.9g



宜昌三峡制药有限公司

生产地址：湖北省宜昌市东山经济开发区大连路
电话号码：0717-6271847 传真号码：0717-6271201



250ml:50g

甘露醇注射液
Mannitol Injection

【成分】本品主要成份为D-甘露糖醇。

【性状】本品为无色的澄明液体。

【适应症】(1)组织脱水药。(2)降低眼内压。(3)渗透利尿药。(4)作为辅助性利尿措施治疗肾病综合征、肝硬化腹水，尤其是伴有低蛋白血症时。(5)对某些药物 逾量或毒物中毒(如巴比妥类药物、锂、水杨酸盐和溴化物等)。

(6)作为冲洗剂。(7)术前肠道准备。详见说明书。

【用法用量】1.成人常用量：(1)利尿。常用量为按体重1~2g/kg，一般用20%溶液250ml静脉滴注，并调整剂量使尿量维持在每小时30~50ml。详见说明书。

【不良反应】水和电解质紊乱最为常见。详见说明书。

【禁 忌】

【用法与用量】

【注意事项】

【贮 藏】

【有 效 期】

【生 产 地】



宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

电话号码：0717-6271847 传真号码：0717-6271201







复方氨基酸注射液(17AA)
Compound Amino Acid Injection(17AA)

250ml:19.13g
国药准字H20030386

【成份】本品为复方制剂，是由十七种氨基酸及山梨醇配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】氨基酸类药。用于手术、严重创伤、大面积烧伤引起的蛋白质缺乏，以及各种疾病引起的低蛋白血症。
【用法用量】中心静脉插管或由周围静脉滴注。常用量：一日250ml~1000ml，成人滴速每分钟40滴，儿童、老人及重病者滴速宜更慢。应按年龄、病情和体质调整量。
【不良反应】滴注速度过快可引起恶心、呕吐、头痛和气喘。
【禁忌】严重肝肾功能不全者禁用。氨质血症、无尿、心力衰竭及新生儿禁用。
【注意事项】本品不宜与碘胺类药物、对氨基水杨酸配伍使用。详见说明书。
【贮藏】置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

过敏者请勿用。若身有破
损时请勿用。本
品仅供静脉滴注。
三九制药有限公司

SHANXI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
传真号码：0717-6271201

【产品批号】

E150103

【有效期】至


2017.01.21

【生产日期】

2015.01.22







复方氨基酸注射液(17AA)
Compound Amino Acid Injection(17AA)

250ml:19.13g
国药准字H20030386

【成份】本品为复方制剂，是由十七种氨基酸及山梨醇配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】氨基酸类药。用于手术、严重创伤、大面积烧伤引起的蛋白质缺乏，以及各种疾病引起的低蛋白血症。
【用法用量】中心静脉插管或由周围静脉滴注。常用量：一日250ml~1000ml，成人滴速每分钟40滴，儿童、老人及重病者滴速宜更慢。应按年龄、病情和体质调整量。
【不良反应】滴注速度过快可引起恶心、呕吐、头痛和气喘。
【禁忌】严重肝肾功能不全者禁用。氨质血症、无尿、心力衰竭及新生儿禁用。
【注意事项】本品不宜与碘胺类药物、对氨基水杨酸配伍使用。详见说明书。
【贮藏】置凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

过敏者请勿用。若身有破
损时请勿用。本
品仅供静脉滴注。
三九制药有限公司

JIUJIU PHARMACEUTICAL CO., LTD.
传真号码：0717-6271201

【产品批号】


E150103

【有效期】至

2017.01.21

【生产日期】

2015.01.22



复方氨基酸注射液(3AA)
Compound Amino Acid Injection(3AA)

【成份】本品为复方制剂，由3种氨基酸配制而成。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】各种原因引起的肝性脑病、重症肝炎以及肝硬化、胆管炎。亦可用于肝胆外科手术前后。
【用法用量】静脉滴注。一日250~500ml或用适量5%~10%葡萄糖溶液稀释后缓慢滴注。每1分钟不超过40滴。
【不良反应】输注过快可致心悸、恶心、呕吐、发热等反应。
【禁忌】严重肾功能损害者及有氨基酸代谢障碍的患者。
【注意事项】(共6项)详见说明书。
【贮藏】密闭，置凉暗处(避光并不超过20℃)保存。

如发现药液不透明、瓶身有玻璃破裂、药物霉变或变质时不能使用；本品一经使用完毕，残留药液不得再用。

宜昌三峡制药有限公司
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
电话：0717-6271847 传真号码：0717-6271201

【产品批号】

B16070

【有效期】至

2018.07


【生产日期】

2016.07









In total, I need about 9 000 000 pieces, how are these priced? How long will it take to get these to Cuba? What certifications do you have to validate the quality?