

Exercícios Resolvidos do Livro
Geometria Analítica e Álgebra Linear
de Elon Lages Lima
(Segunda Edição–Oitava Impressão)

Gustavo de Oliveira

16 de agosto de 2020

Seção 1 – Coordenadas na Reta

S1.E1. Sejam $a < b$ respectivamente as coordenadas dos pontos A e B sobre o eixo E . Determine as coordenadas dos pontos X_1, \dots, X_{n-1} que dividem o segmento AB em n partes iguais.

Solução. Para $j \in \{1, \dots, n-1\}$, observamos que $d(X_j, A) = jd(A, B)/n$. Seja x_j a coordenada do ponto X_j . Então $|x_j - a| = j|a - b|/n$, ou seja, $x_j - a = j(b - a)/n$, pois $x_j > a$ e $b > a$. Portanto $x_j = a + j(b - a)/n$, ou ainda $x_j = (1 - j/n)a + (j/n)b$ para $j \in \{1, \dots, n - 1\}$.

S1.E2. Sejam $a < x < b$ respectivamente as coordenadas dos pontos A , X e B do eixo E . Diz-se que o ponto X divide o segmento AB em *média e extrema razão* quando se tem

$$\frac{d(A, X)}{d(A, B)} = \frac{d(X, B)}{d(A, X)}.$$

(O quociente $d(A, X)/d(A, B)$ é chamado *razão áurea*.) Supondo que X divide o segmento de reta AB em média e extrema razão, calcule x em função de a e b .

Solução. Em coordenadas, a condição corresponde a

$$\frac{|a - x|}{|a - b|} = \frac{|x - b|}{|a - x|}.$$

Como $a < x < b$, essa igualdade é equivalente a

$$\frac{x - a}{b - a} = \frac{b - x}{x - a},$$

ou seja,

$$x^2 + (b - 3a)x + (a^2 - b^2 + ab) = 0.$$

O discriminante dessa equação é $\Delta = 5(b - a)^2$. Portanto as raízes são

$$x_{\pm} = \frac{1}{2}(3a - b \pm \sqrt{5}(b - a)).$$

Usando a condição $a < x < b$, obtemos que $a < x_+ < b$ e $x_- < a$. Logo a única raiz no intervalo $[a, b]$ é x_+ . Portanto o ponto X procurado tem coordenada

$$x = \frac{1}{2}((3 - \sqrt{5})a + (\sqrt{5} - 1)b).$$

S1.E3. Se O é a origem do eixo E e A é o ponto desse eixo que tem coordenada 1. Qual é a coordenada do ponto X que divide o segmento de reta OA em média e extrema razão? No Exercício 2, calcule a *razão áurea* $d(O, X)/d(O, A)$.

Solução. O ponto X tem coordenada

$$x = \frac{1}{2}((3 - \sqrt{5})0 + (\sqrt{5} - 1)1) = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

Calculamos $d(O, A) = |0 - 1| = 1$. Portanto a razão áurea é

$$\frac{d(O, X)}{d(O, A)} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

S1.E4. Os pontos A , B e X sobre o eixo E têm coordenadas a , b e x respectivamente. Se X' é o simétrico de X em relação ao ponto A e X'' é o simétrico de X' em relação a B , quais são as coordenadas de X' e X'' ?

Solução. Sejam x' e x'' as coordenadas de X' e X'' . Como A é o ponto médio de XX' , temos $a = (x + x')/2$. Logo $x' = 2a - x$. Como B é o ponto médio de $X'X''$, temos $b = (x' + x'')/2$. Portanto $x'' = 2b - x' = 2(b - a) + x$.

S1.E5. Dados os pontos A , B no eixo E , defina a distância orientada $\delta(A, B)$ entre eles pondo $\delta(A, B) = d(A, B)$ se A está à esquerda de B e $\delta(A, B) = -d(A, B)$ se A está à direita de B . Prove que para quaisquer A , B e C do eixo E tem-se $\delta(A, B) + \delta(B, C) + \delta(C, A) = 0$.

Solução. Sem perda de generalidade podemos supor que A está à esquerda de B e B está à esquerda de C . Logo $\delta(A, B) + \delta(B, C) + \delta(C, A) = d(A, B) + d(B, C) - d(C, A) = 0$ pois $d(A, B) + d(B, C) = d(C, A)$, já que o ponto B pertence ao segmento de reta AC .

S1.E6. Sejam $a < b < c$ respectivamente as coordenadas dos pontos A , B e C situados sobre um eixo. Sabendo que $a = 17$, $c = 32$ e

$$\frac{d(A, B)}{d(A, C)} = \frac{2}{3},$$

qual é o valor de b ?

Solução. Usando a fórmula $d(X, Y) = |x - y|$, temos que

$$\frac{3}{2} = \frac{d(A, B)}{d(A, C)} = \frac{|a - b|}{|a - c|} = \frac{|17 - b|}{|17 - 32|}.$$

Como $b > 17$ e $32 > 17$, essa equação é equivalente a

$$\frac{b - 17}{32 - 17} = \frac{2}{3},$$

ou seja,

$$b = \frac{2}{3}15 + 17 = 27.$$

S1.E7. Qual seria a resposta do exercício anterior se soubéssemos apenas que $a < c$?

Solução. Se soubéssemos apenas que $a < c$, poderíamos ter $a < b$ ou $a \geq b$. Logo, além do caso $b > 17$ considerado no item (a), teríamos o caso em que $b \leq 17$. Dessa forma teríamos $|17 - b| = 17 - b$ e consequentemente

$$\frac{17 - b}{32 - 17} = \frac{2}{3},$$

ou seja,

$$-b = \frac{2}{3}15 - 17 = -7.$$

Isso implica em $b = 7$. Em resumo, $b = 7$ ou $b = 27$.

S1.E9. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que $|f(x) - f(y)| = |x - y|$ para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$.

- (i) Pondo $f(0) = a$, defina a função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ assim: $g(x) = f(x) - a$. Prove então que $|g(x)| = |x|$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Em particular, $g(1) = 1$ ou $g(1) = -1$. Também $(g(x))^2 = x^2$.
- (ii) Use a identidade $xy = \frac{1}{2}[x^2 + y^2 - (x - y)^2]$ para provar a igualdade $xy = g(x)g(y)$.
- (iii) Se $g(1) = 1$, mostre que $g(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Se $g(1) = -1$, mostre que $g(x) = -x$ para todo x .

- (iv) Conclua que $f(x) = x + a$ para todo $x \in \mathbb{R}$ ou então $f(x) = -x + a$ para todo x .

Solução. (i) Observamos que $g(x) = f(x) - a = f(x) - f(0)$. Logo $|g(x)| = |f(x) - f(0)| = |x - 0| = |x|$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Sendo assim, $|g(1)| = 1$, o que implica $g(1) = 1$ ou $g(1) = -1$. Temos também que $g(x)^2 = |g(x)|^2 = |x|^2 = x^2$.

- (ii) Usando as definições e propriedades, calculamos

$$\begin{aligned} xy &= 2^{-1}[x^2 + y^2 - (x - y)^2] \\ &= 2^{-1}[x^2 + y^2 - |x - y|^2] \\ &= 2^{-1}[g(x)^2 + g(y)^2 - |f(x) - f(y)|^2] \\ &= 2^{-1}[g(x)^2 + g(y)^2 - |f(x) - a - f(y) + a|^2] \\ &= 2^{-1}[g(x)^2 + g(y)^2 - |g(x) - g(y)|^2] \\ &= 2^{-1}[g(x)^2 + g(y)^2 - (g(x) - g(y))^2] \\ &= g(x)g(y). \end{aligned}$$

(iii) Se $g(1) = 1$, então $x = x(1) = g(x)g(1) = g(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Se $g(1) = -1$, então $x = x(1) = g(x)g(1) = g(x)(-1) = -g(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Portanto $g(x) = -x$ para todo x .

(iv) Observamos que $f(x) = g(x) + a$. Pela parte (i), temos $g(1) = 1$ ou $g(1) = -1$. Usando (iii), isso implica $g(x) = x$ ou $g(x) = -x$ para todo x , respectivamente. Portanto $f(x) = x + a$ ou $f(x) = -x + a$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Seção 2 – Coordenadas no Plano

S2.E1. Diz-se que o ponto A' é o simétrico do ponto A em relação à reta r quando r é a mediatriz do segmento AA' . Sabendo que $A = (x, y)$, determine os simétricos de A em relação aos eixos OX e OY .

Solução. Sejam A' e A'' os simétricos de A em relação aos eixos OX e OY , respectivamente. Fazendo uma figura, é simples verificar que OX é a mediatriz do segmento AA' com $A' = (x, -y)$ e OY é a mediatriz do segmento AA'' com $A'' = (-x, y)$.

S2.E2. O conjunto r formado pelos pontos $(x, 5)$ cujas ordenadas são iguais a 5 é uma reta paralela ao eixo OX . Determine o simétrico do ponto $P = (3, -2)$ em relação à reta r .

Solução. A reta s perpendicular a r passando por P é formada pelos pontos $(3, y)$ cujas abscissas são iguais a 3. O ponto P está à distância

$5 - (-2) = 7$ da reta r . A intersecção da reta r com a reta s é o ponto $(3, 5)$. Logo o simétrico de P em relação à reta r é o ponto $P' = (3, 5 + 7) = (3, 12)$.

Seção 5 – Escolhendo o Sistema de Coordenadas

S5.E2. O triângulo ABC é equilátero e cada lado mede l . Num sistema de coordenadas em que a origem é equidistante de A , B e C , e o ponto C está sobre o eixo OY , quais são as coordenadas dos três vértices?

Solução. Tomando o sistema de coordenadas OXY da forma sugerida, obtemos os triângulos ABO , BCO e CAO com $O = (0, 0)$, $A = (-a, -b)$, $B = (a, -b)$ e $C = (0, c)$. Esses três triângulos são isóceles e congruentes. Por exemplo, temos ABO com $\hat{A} = \hat{B} = 30^\circ$ e $\hat{O} = 120^\circ$. Logo

$$d(A, O) \cos 30^\circ = l/2,$$

ou seja, $d(A, O)\sqrt{3}/2 = l/2$, ou ainda, $d(A, O) = l/\sqrt{3}$. Seja M o ponto médio de AB . Então

$$d(M, O) = d(A, O) \sin 30^\circ = (l/\sqrt{3})(1/2) = l/(2\sqrt{3}).$$

Logo

$$\begin{aligned} a &= l/2, \\ b &= d(M, O) = l/(2\sqrt{3}), \\ c &= d(O, C) = d(O, A) = l/\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Portanto

$$A = \left(-\frac{l}{2}, -\frac{l}{2\sqrt{3}}\right), \quad B = \left(\frac{l}{2}, \frac{l}{2\sqrt{3}}\right), \quad C = \left(0, \frac{l}{\sqrt{3}}\right).$$

Seção 7 – As Equações da Reta

S7.E10. Sejam $A = (1, 2)$, $B = (2, 4)$ e $C = (3, -1)$. Ache as equações da mediana e da altura do triângulo ABC que partem do vértice A .

Solução. A mediana que parte do vértice A é o segmento AM onde M é o ponto médio do lado BC . Calculando M , obtemos $M = (5/2, 3/2)$. A reta que passa por A e M tem inclinação $[(3/2) - 2]/[(5/2) - 1] = -1/3$, ou seja, a equação dessa reta é da forma $y = -(1/3)x + b$. Calculando b , obtemos $b = 7/3$. Logo a equação da mediana AM é $y = -(1/3)x + 7/3$.

A reta que contém a altura do vértice A é a reta perpendicular ao lado BC passando por A . O lado BC é paralelo a OC' com $C' = (1, -5)$. Logo a equação da altura tem a forma $x - 5y = b$. Como a reta passa por A ,

devemos ter $1 - 5(2) = b$, ou seja, $b = -9$. Portanto a equação da altura é $x - 5y = -9$.

S7.E22. Qual é a distância entre as paralelas $x - 3y = 4$ e $2x - 6y = 1$?

Solução. Sejam r e s as retas definidas por $x - 3y = 4$ e $2x - 6y = 1$, respectivamente. Seja t a reta perpendicular a r (e portanto a s) que passa pela origem. Uma equação para t é $3x + y = 0$. Calculamos $\{P\} = r \cap t$, ou seja, resolvemos o sistema $x - 3y = 4$, $3x + y = 0$. A solução desse sistema é $x = 2/5$ e $y = -6/5$. Portanto $P = (2/5, -6/5)$. Calculamos $\{Q\} = s \cap t$, ou seja, resolvemos o sistema $2x - 6y = 1$, $3x + y = 0$. A solução desse sistema é $x = 1/20$ e $y = -3/20$. Portanto $Q = (1/20, -3/20)$. Observamos que $d(r, s) = d(P, Q)$. Calculando $d(P, Q)$, concluímos que $d(r, s) = 7/(2\sqrt{10})$.

S7.E33. Ache uma representação paramétrica para a reta $5x - 2y = 1$.

Solução. Tomamos $x = t$ e procuramos y tal que $5t - 2y = 1$. Obtemos $y = -1/2 + (5/2)t$. Portanto $t \mapsto (t, -1/2 + (5/2)t)$ é uma parametrização para a reta.

Seção 9 – Distância de um Ponto a uma Reta

S9.E2. Qual é o raio da circunferência que tem centro em $P = (4, 1)$ e é tangente à reta $3x + 7y = 2$?

Solução. Seja Q o ponto em que a reta toca a circunferência. Observamos que o segmento PQ é perpendicular à reta e o comprimento de PQ é igual a distância de P à reta, que por sua vez é igual ao raio r da circunferência. Portanto

$$r = d(P, \text{reta}) = \frac{|2 - (3(4) + 7(1))|}{\sqrt{3^2 + 7^2}} = \frac{17}{\sqrt{58}}.$$

Seção 10 – Área de um Triângulo

S10.E5. Calcule a área do triângulo cujos vértices são intersecções de duas das retas $x + y = 0$, $x - y = 0$ e $2x + y = 3$.

Solução. Calculamos os vértices do triângulo resolvendo sistemas de equações lineares: A intersecção das retas $x + y = 0$ e $x - y = 0$ é o ponto $O = (0, 0)$. A intersecção das retas $x + y = 0$ e $2x + y = 3$ é o ponto $A = (3, -3)$. A intersecção das retas $x - y = 0$ e $2x + y = 3$ é o ponto

$B = (1, 1)$. Portanto

$$\text{Área}_{OAB} = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} 1-0 & 3-0 \\ 1-0 & -3-0 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} |-3-3| = 3.$$

Seção 12 – Equação da Circunferência

S12.E4. Qual é a equação da circunferência que passa pelos pontos $A = (1, 2)$, $B = (3, 4)$ e tem o centro sobre o eixo OY ?

Solução. Como o centro da circunferência está sobre o eixo OY , a equação da circunferência tem a forma $x^2 + (y - b)^2 = r^2$. Como A e B pertencem à circunferência, devemos ter

$$\begin{aligned} 1 + (2 - b)^2 &= r^2 \\ 9 + (4 - b)^2 &= r^2. \end{aligned}$$

Resolvendo esse sistema, obtemos $b = 5$ e $r = \sqrt{10}$. Portanto a equação da circunferência é $x^2 + (y - 5)^2 = 10$.

S12.E5. Escreva a equação da circunferência que tem centro no ponto $P = (2, 5)$ e é tangente à reta $y = 3x + 1$.

Solução. A reta tem equação $3x - y = -1$. Logo

$$d(P, \text{reta}) = \frac{|-1 - (3(2) + (-1)5)|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{10}}.$$

Portanto a equação da circunferência é $(x - 2)^2 + (y - 5)^2 = 2/5$.

S12.E9. A tangente, no ponto P , à circunferência de centro O e raio 3 é paralela à reta $y = -2x + 1$. Quais são as coordenadas de P ? E se o raio da circunferência fosse 5?

Solução. Primeiro, procuramos b tal que $r : 2x + y = b$ passe por P (note que r é paralela à reta $y = -2x + 1$). Calculamos

$$d(O, r) = \frac{|b - (2(0) + 1(0))|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|b|}{\sqrt{5}}.$$

Suponha que $d(O, r) = \rho$ (onde ρ é conhecida). Então $|b|/\sqrt{5} = \rho$. Logo $b = \pm\rho\sqrt{5}$.

Agora, observamos que P é o ponto de interseção da reta r com a reta $-x + 2y = 0$ (que é a reta perpendicular a r passando por O). Calculando o ponto P , obtemos

$$P = \left(\frac{2b}{5}, \frac{b}{5} \right) = \left(\pm 2\rho \frac{\sqrt{5}}{5}, \pm \rho \frac{\sqrt{5}}{5} \right).$$

Portanto, se $\rho = 3$ temos

$$P = \left(\pm \frac{5\sqrt{5}}{5}, \pm \frac{3\sqrt{5}}{5} \right),$$

e se $\rho = 5$ obtemos

$$P = (\pm 2\sqrt{5}, \pm \sqrt{5}).$$

Seção 13 – Reconhecimento da Equação da Circunferência

S13.E4. Completando os quadrados, decida se cada uma das equações abaixo define uma circunferência, um ponto ou o conjunto vazio:

- (a) $2x^2 + 2y^2 - 3x + y - 1 = 0$.
- (b) $-x^2 - y^2 + 6x - 4y + 3 = 0$.
- (c) $x^2 + y^2 - 10x + 2y + 26 = 0$.
- (d) $4x^2 + 4y^2 - 4x - 8y + 21 = 0$.

Solução. (a) Completando os quadrados, obtemos

$$\left(x - \frac{3}{4} \right)^2 + \left(y + \frac{1}{4} \right)^2 = \left(\frac{3}{2\sqrt{2}} \right)^2.$$

Portanto a equação define uma circunferência.

(b) Completando os quadrados, obtemos

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 4^2.$$

Portanto a equação define uma circunferência.

(c) Completando os quadrados, obtemos

$$(x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 0.$$

Portanto a equação define um ponto.

(d) Completando os quadrados, obtemos

$$\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + (y - 1)^2 = -4.$$

Portanto a equação define o conjunto vazio.

Seção 14 – Vetores no Plano

S14.E2. Prove geometricamente que um quadrilátero é um paralelogramo se, e somente se, suas diagonais se cortam mutuamente ao meio.

Solução. (\Rightarrow) Suponha que o quadrilátero (com vértices consecutivos) $ABCD$ é um paralelogramo. Então $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DA} = 0$. Além disso, existem constantes α e β tais que $\vec{AB} = \alpha \vec{DC}$ e $\vec{AD} = \beta \vec{BC}$. Logo $\vec{AB} = -\alpha \vec{CD}$ e $\vec{DA} = -\beta \vec{BC}$. Portanto $-\alpha \vec{CD} + \vec{BC} + \vec{CD} - \beta \vec{BC} = 0$, ou seja, $(1 - \alpha)\vec{CD} + (1 - \beta)\vec{BC} = 0$. Como $ABCD$ é um quadrilátero, os vetores \vec{CD} e \vec{BC} não são colineares. Logo a última igualdade implica $1 - \alpha = 0$ e $1 - \beta = 0$, isto é, $\alpha = 1$ e $\beta = 1$. Portanto $\vec{AB} = \vec{DC}$ e $\vec{AD} = \vec{BC}$. Agora, temos duas relações que envolvem as diagonais do paralelogramo:

$$\begin{aligned}\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} &= 0, \\ \vec{AB} + \vec{BD} + \vec{DA} &= 0.\end{aligned}$$

Vamos eliminar dessas equações os vetores correspondentes aos lados do quadrilátero escrevendo-os em termos das direções diagonais. Usando as relações acima, obtemos

$$\begin{aligned}\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} &= 0, \\ \vec{AB} + \vec{BD} - \vec{BC} &= 0.\end{aligned}$$

Somando as duas igualdades, chegamos a

$$2\vec{AB} + \vec{CA} + \vec{BD} = 0.$$

Como A , B , C e D não são colineares, as retas AC e BD que contêm as diagonais são concorrentes em um ponto M . Sejam λ e γ constantes tais que $\vec{AM} = \lambda \vec{AC}$ e $\vec{MB} = \gamma \vec{DB}$. Calculamos

$$\begin{aligned}2\vec{AB} + \vec{CA} + \vec{BD} &= 0 \\ 2(\vec{AM} + \vec{MB}) + \vec{CA} + \vec{BD} &= 0 \\ 2(\lambda \vec{AC} + \gamma \vec{DB}) - \vec{AC} - \vec{DB} &= 0 \\ (2\lambda - 1)\vec{AC} + (2\gamma - 1)\vec{DB} &= 0.\end{aligned}$$

Essa igualdade implica $2\lambda - 1 = 0$ e $2\gamma - 1 = 0$, ou seja, $\lambda = 1/2$ e $\gamma = 1/2$, como queríamos provar.

(\Leftarrow) Suponha que as diagonais de $ABCD$ se bissectam em um ponto M . Então $\vec{AM} = \vec{MC}$ e $\vec{BM} = \vec{MD}$. Mas $\vec{BC} = \vec{BM} + \vec{MC}$ e $\vec{AD} = \vec{AM} + \vec{MD}$. Logo $\vec{BC} = \vec{AD}$. Analogamente provamos que $\vec{AB} = \vec{DC}$. Portanto $ABCD$ é um paralelogramo.

Seção 15 – Operações com Vetores

S15.E1. Dados os vetores u e v , prove que as seguintes afirmações são equivalentes:

- (a) Uma combinação linear $\alpha u + \beta v$ só pode ser igual a zero quando $\alpha = 0$ e $\beta = 0$.
- (b) Se $\alpha u + \beta v = \alpha' u + \beta' v$, então $\alpha = \alpha'$ e $\beta = \beta'$.
- (c) Nenhum dos vetores u e v é múltiplo do outro.
- (d) Para $u = (a, b)$ e $v = (a', b')$, temos $ab' - a'b \neq 0$.
- (e) Todo vetor do plano é combinação linear de u e v .

(Neste exercício, devem ser provadas as implicações $(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c) \Rightarrow (d) \Rightarrow (e) \Rightarrow (a)$.)

Solução. (a) \Rightarrow (b). Suponha (a), ou seja, suponha que $\alpha u + \beta v = 0$ implica $\alpha = 0$ e $\beta = 0$. Se $\alpha u + \beta v = \alpha' u + \beta' v$, então $(\alpha - \alpha')u + (\beta - \beta')v = 0$. Logo (a) implica $\alpha - \alpha' = 0$ e $\beta - \beta' = 0$, ou seja, $\alpha = \alpha'$ e $\beta = \beta'$.

(b) \Rightarrow (c). Vamos provar que $\neg(c)$ implica $\neg(b)$. Se existe λ tal que $u = \lambda v$, então $\alpha u + \beta v = \alpha' u + \beta' v$ com $\alpha = 1$, $\beta = -\lambda$, $\alpha' = 0$ e $\beta' = 0$, onde $\alpha \neq \alpha'$ e $\beta \neq \beta'$, ou seja, a afirmação $\neg(b)$ é verdadeira.

(c) \Rightarrow (d). Vamos provar que $\neg(d)$ implica $\neg(c)$. Suponha $ab' - a'b = 0$. Se $a = a' = b = b'$, então $u = 0$ e $v = 0$, e portanto $u = \lambda v$ para todo λ , ou seja, a afirmação $\neg(c)$ é verdadeira. Se $a = b = 0$, então $u = 0$, e portanto $u = 0v$. Logo $\neg(c)$ é verdadeira. Se $a \neq 0$ e $b \neq 0$, então $b'/b = a'/a = \lambda$ em que λ é uma constante. Logo $a' = \lambda a$ e $b' = \lambda b$, ou seja, $(a', b') = \lambda(a, b)$, ou seja $v = \lambda u$, ou seja, a afirmação $\neg(c)$ é verdadeira.

(d) \Rightarrow (e). Sejam $u = (a, b)$, $v = (a', b')$ e $w = (\gamma, \delta)$. Então a equação $w = xu + yv$ é equivalente ao sistema de equações

$$\begin{aligned} ax + a'y &= \gamma \\ bx + b'y &= \delta. \end{aligned}$$

Como $ab' - a'b \neq 0$, esse sistema possui apenas uma solução. De fato, a solução é

$$x = \frac{b'\gamma - a'\delta}{b'a - a'b}, \quad y = \frac{b\gamma - a\delta}{ba' - ab'}.$$

(e) \Rightarrow (a). Suponha (e). Então, em particular, o vetor 0 é combinação de u e v . Logo $xu + yv = 0$ para x e y únicos. Como $x = 0$ e $y = 0$ é solução desse sistema, essa deve ser a única solução, ou seja, a afirmação (a) é verdadeira.

S15.E7. Seja P um ponto interior ao triângulo ABC tal que $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 0$. Prove que as retas AP , BP e CP são medianas de ABC , logo P é o baricentro desse triângulo.

Solução. Seja Q o ponto de intersecção da reta BP com o segmento AC . Observamos que $\overrightarrow{QA} = \alpha \overrightarrow{CA}$ para $\alpha \in \mathbb{R}$. Logo

$$\overrightarrow{QC} = \overrightarrow{QA} + \overrightarrow{AC} = \alpha \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CA} = (\alpha - 1) \overrightarrow{CA}.$$

Vamos provar que Q é o ponto médio de AC , ou seja, vamos provar que $\alpha = 1/2$. Escrevemos

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PA} &= \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QA} = \overrightarrow{PQ} + \alpha \overrightarrow{CA}, \\ \overrightarrow{PB} &= \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{PQ} + (\alpha - 1) \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}, \\ \overrightarrow{PC} &= \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QC} = \overrightarrow{PQ} + (\alpha - 1) \overrightarrow{CA}.\end{aligned}$$

Logo

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PQ} + (3\alpha - 2) \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}.$$

Além disso,

$$\overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CQ} = -\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{QC} = -\overrightarrow{CB} + (1 - \alpha) \overrightarrow{CA}.$$

Agora, para algum $\beta \in \mathbb{R}$, temos

$$\overrightarrow{PQ} = \beta \overrightarrow{BQ}.$$

Assim

$$\overrightarrow{PQ} = \beta \overrightarrow{BQ} = -\beta \overrightarrow{CB} + \beta(1 - \alpha) \overrightarrow{CA}.$$

Portanto

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = (3\beta(1 - \alpha) + 3\alpha - 2) \overrightarrow{CA} + (1 - 3\beta) \overrightarrow{CB}.$$

Por outro lado, temos $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 0$. Logo

$$(3\beta(1 - \alpha) + 3\alpha - 2) \overrightarrow{CA} + (1 - 3\beta) \overrightarrow{CB} = 0.$$

Como \overrightarrow{CA} e \overrightarrow{CB} são linearmente independentes, essa igualdade implica (veja o Exercício 1 da Seção 15)

$$(3\beta(1 - \alpha) + 3\alpha - 2) = 0 \quad \text{e} \quad 1 - 3\beta = 0.$$

A segunda equação implica $\beta = 1/3$. Substituindo esse valor de β na primeira equação, obtemos $3(1/3)(1 - \alpha) + 3\alpha - 2 = 0$, ou seja, $\alpha = 1/2$. Portanto Q é o ponto médio de AC . As demonstrações para as medianas correspondentes aos outros vértices do triângulo são idênticas. Basta renomear os pontos.

S15.E9. Mostre que se os vetores u e v têm o mesmo comprimento então $u + v$ e $u - v$ são ortogonais. E a recíproca?

Solução. Observamos que

$$\langle u + v, u - v \rangle = |u|^2 + \langle v, u \rangle - \langle u, v \rangle - |v|^2 = |u|^2 - |v|^2 = (|u| + |v|)(|u| - |v|).$$

Se $|u| = |v|$, então $\langle u + v, u - v \rangle = 0$. Logo $u + v$ e $u - v$ são ortogonais.

Por outro lado, se $u + v$ e $u - v$ são ortogonais, então $\langle u + v, u - v \rangle = 0$, logo $(|u| + |v|)(|u| - |v|) = 0$. Essa igualdade implica $|u| = -|v|$, o que é impossível (exceto se $u = 0$ e $v = 0$), ou $|u| = |v|$. Portanto $|u| = |v|$.

Seção 16 – Equação da Elipse

S16.E10. Quais são as tangentes à elipse $x^2 + 4y^2 = 32$ que têm inclinação igual a $1/2$?

Solução. Uma reta com inclinação $1/2$ é dada por $y = (1/2)x + b$ para $b \in \mathbb{R}$. Vamos determinar os valores de b para os quais essa reta é tangente à elipse $x^2 + 4y^2 = 32$, ou seja, vamos determinar os valores de b para os quais o sistema

$$\begin{aligned}x^2 + 4y^2 &= 32 \\ y &= (1/2)x + b\end{aligned}$$

possui apenas uma solução. Substituindo a segunda equação da primeira e desenvolvendo, obtemos

$$2x^2 + 4bx + (4b^2 - 32) = 0.$$

Essa equação possui apenas uma solução se e somente se o discriminante da equação é igual a zero, ou seja,

$$\Delta = -16b^2 + 16^2 = 0.$$

Isso implica $b = \pm 4$. Portanto, as retas tangentes à elipse são

$$y = \frac{1}{2}x - 4 \quad \text{e} \quad y = \frac{1}{2}x + 4.$$

Seção 17 – Equação da Hipérbole

S17.E2. Para todo ponto $P = (m, n)$ na hipérbole $H : x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, mostre que a reta $r : (m/a^2)x - (n/b^2)y = 1$ tem apenas o ponto P em comum com H . A reta r chama-se a *tangente* a H no ponto P .

Solução. A reta r é tangente à hipérbole H no ponto P se e somente se $x = m$ e $y = n$ é a única solução do sistema

$$\begin{aligned}(m/a^2)x - (n/b^2)y &= 1 \\ x^2/a^2 - y^2/b^2 &= 1.\end{aligned}$$

A primeira equação implica

$$x = \frac{a^2}{m} \left(1 + \frac{n}{b^2}\right).$$

Substituindo essa expressão para x na segunda equação e desenvolvendo, obtemos

$$(a^2n^2 - b^2m^2)y^2 + b^2a^2ny + b^4(a^2 - m^2) = 0.$$

Como P pertence à hipérbole, temos $a^2n^2 - b^2m^2 = -a^2b^2$. Substituindo essa expressão na equação anterior e simplificado, encontramos

$$-a^2y^2 + a^2ny + b^2(a^2 - m^2) = 0.$$

Calculando o discriminante Δ dessa equação quadrática, obtemos

$$\Delta = 4a^2(a^2n^2 - b^2m^2 + b^2a^2) = 4a^2(-a^2b^2 + b^2a^2) = 4a^2(0) = 0.$$

Nesse cálculo, usamos novamente que P pertence a H . Como $\Delta = 0$, a equação para y possui apenas uma solução. Associado a essa solução temos apenas um valor para x . Portanto o sistema de equações possui apenas uma solução (x, y) , ou seja, a reta r é tangente à hipérbole H .

Seção 23 – Transformações Lineares

S23.E11. Uma transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de posto 2 transforma toda reta numa reta. Prove isto.

Solução. Seja $T(x, y) = (ax + by, cx + dy)$ e seja M a matriz de T . Como M tem posto 2, os vetores-coluna de M são não-colineares. Se r é uma reta vertical, então r é formada pelos pontos $(x, y) = (\alpha, t)$ para $t \in \mathbb{R}$. Logo, os pontos

$$T(x, y) = T(\alpha, t) = (a\alpha + bt, c\alpha + dt) = \alpha(a, c) + t(b, d)$$

para $t \in \mathbb{R}$ formam uma reta, pois $(b, d) \neq (0, 0)$ (caso contrário teríamos $ad - bc = 0$, o que é impossível). Se r é uma reta não-vertical, então r é o conjunto dos pontos $(x, y) = (t, \alpha t + \beta)$ para $t \in \mathbb{R}$. Logo, os pontos

$$T(x, y) = T(t, \alpha t + \beta) = \beta(b, d) + t((a, c) + \alpha(b, d))$$

para $t \in \mathbb{R}$ formam uma reta, pois não existe α tal que $(a, c) + \alpha(b, d) = 0$ (caso contrário (a, c) e (b, d) seriam colineares).

S23.E15. Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma transformação linear invertível. Mostre que T transforma retas paralelas em retas paralelas, portanto paralelogramos em paralelogramos. E losangos?

Solução. Seja $T(x, y) = (ax + by, cx + dy)$ e seja M a matriz de T . Como T é invertível, para todo $(m, n) \in \mathbb{R}^2$ existe apenas um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tal que $T(x, y) = (m, n)$. Dito de outra forma, o sistema de equações

$$\begin{aligned} ax + by &= m \\ cx + dy &= n \end{aligned}$$

possui apenas uma solução. Portanto as retas $ax + by = m$ e $cx + dy = n$ são concorrentes. Logo os vetores (a, b) e (c, d) são não-colineares, ou seja, $ad - bc \neq 0$. Isso implica que os vetores (a, c) e (b, d) são não-colineares, ou seja, que a matriz de M tem posto 2. Pela solução do Exercício S23.E11, para qualquer valor de α , a transformação T mapeia a reta $x = \alpha$ em uma reta paralela ao vetor (b, d) que passa por (a, c) . Isso mostra que T transforma as retas paralelas $x = \alpha$ e $x = \alpha'$ em retas paralelas ao vetor (b, d) . Pela solução do Exercício S23.E11, a transformação T mapeia a reta $y = \alpha x + \beta$ em uma reta paralela ao vetor $(a, c) + \alpha(b, d)$ que passa por (a, c) . Analogamente, a transformação T mapeia a reta $y = \alpha'x + \beta$ em uma reta paralela ao vetor $(a, c) + \alpha'(b, d)$ que passa por (a, c) . Como $(a, b) + \alpha(c, d)$ e $(a, c) + \alpha'(b, d)$ são vetores colineares, concluímos que T transforma retas não-verticais paralelas em retas não-verticais paralelas. Além disso, concluímos que T transforma paralelogramos em paralelogramos. A transformação T não mapeia losangos em losangos, em geral. De fato, considere o quadrado cujos vértices são os pontos $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (1, 1)$ e $D = (0, 1)$ (esse é um exemplo de losango). Observamos que os os vetores unitários $\overrightarrow{AB} = (1, 0)$ e $\overrightarrow{AD} = (0, 1)$ são mapeados nos vetores (a, c) e (b, d) , que não são unitários, em geral. Logo o quadrado $ABCD$ não é transformado em um quadrado, em geral.

S23.E17. Dados $u = (1, 2)$, $v = (3, 4)$, $u' = (5, 6)$ e $v' = (7, 8)$, ache uma transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $Tu = u'$ e $Tv = v'$.

Solução. Seja $T(x, y) = (ax + by, cx + dy)$, onde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Procuramos constantes a, b, c e d tais que $T(1, 2) = (5, 6)$ e $T(3, 4) = (7, 8)$, ou seja, $(a + 2b, c + 2d) = (5, 6)$ e $(3a + 4b, 3c + 4d) = (7, 8)$, ou seja, $a + 2b = 5$, $c + 2d = 6$ e $3a + 4b = 7$, $3c + 4d = 8$. Obtemos portanto um sistema de quatro equações e quatro incógnitas, a, b, c e d . De fato, obtemos dois

sistemas de duas equações e duas incógnitas, desacoplados:

$$\begin{array}{ll} a + 2b = 5 & c + 2d = 6 \\ 3a + 4b = 7 & 3c + 4d = 8. \end{array}$$

Resolvendo esses sistemas, encontramos $a = -3$, $b = 4$, $c = -4$ e $d = 5$. Portanto, a transformação linear procurada é

$$T(x, y) = (-3x + 4y, -4x + 5y).$$

Seção 24 – Coordenadas no Espaço

S24.E5. Escreva a equação do plano vertical que passa pelos pontos $P = (2, 3, 4)$ e $Q = (1, 1, 758)$.

Solução. O plano vertical que passa por P e Q deve conter todos os pontos da forma $(2, 3, z)$ e $(1, 1, z')$ para $z \in \mathbb{R}$ e $z' \in \mathbb{R}$. Em particular, o plano vertical deve conter os pontos $P' = (2, 3, 0)$ e $Q' = (1, 1, 0)$. Além disso, observamos que o plano vertical deve conter a reta $\overline{P'Q'}$. As coordenadas de P' e Q' no plano Π_{xy} são $(2, 3)$ e $(1, 1)$. Portanto $\overrightarrow{P'Q'} = (-1, -2)$ no plano Π_{xy} . O vetor $v = (2, -1)$ é ortogonal a $\overrightarrow{P'Q'}$. Logo a equação da reta $\overline{P'Q'}$ no plano Π_{xy} é $2x - y = c = 2(1) - 1(1) = 1$, ou seja, $2x - y = 1$. Portanto, o plano vertical que passa por P e Q é formado por todos os pontos (x, y, z) tais que $2x - y = 1$.

S24.E7. Escreva a equação geral de um plano vertical.

Solução. A equação geral de um plano vertical é $ax + by = c$, onde a , b e c são números reais. De fato, o conjunto de todos os pontos (x, y, z) tais que $ax + by = c$ forma um plano que contém o eixo OZ ou é paralelo ao eixo OZ (veja a solução do Exercício S24.E5).

Seção 25 – As Equações Paramétricas de uma Reta

S25.E6. Dados $A = (1, 2, 3)$ e $B = (4, 5, 6)$, determine os pontos em que a reta AB corta os planos Π_{xy} , Π_{yz} , Π_{zx} .

Solução. As equações paramétricas da reta AB são $x = 1 + 3t$, $y = 2 + 3t$, $z = 3 + 3t$. Na interseção da reta com o plano Π_{xy} , temos $z = 0$, ou seja, $3 + 3t = 0$. Isso implica em $t = -1$. O ponto correspondente é $P = (-2, -1, 0)$. Na interseção da reta com o plano Π_{yz} , temos $x = 0$, ou seja, $1 + 3t = 0$. Isso implica em $t = -1/3$. O ponto correspondente é $Q = (0, 1, 2)$. Na interseção da reta com o plano Π_{zx} , temos $y = 0$, ou

seja, $2 + 3t = 0$. Isso implica em $t = -2/3$. O ponto correspondente é $R = (-1, 0, 1)$.

Seção 28 – Vetores no Espaço

S28.E3. Seja $u = (a, b, c)$ um vetor unitário, com $abc \neq 0$. Determine o valor de t de modo que, pondo $v = (-bt, at, 0)$ e $w = (act, bct - 1/t)$, os vetores u , v e w sejam unitários e mutuamente ortogonais.

Solução. Como u é unitário, temos $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Observamos que $u \cdot v = 0$ e $v \cdot w = 0$ para qualquer valor de t . Por outro lado, $u \cdot w = 0$ implica $t = \pm 1/\sqrt{a^2 + b^2}$. Para esses valores de t , obtemos $\|v\|^2 = (b^2 + a^2)t^2 = 1$ e $\|w\|^2 = c^2 + a^2 + b^2 = 1$. A condição $abc \neq 0$ pode ser substituída por $a^2 + b^2 \neq 0$.

Seção 29 – Equação do Plano

S29.E2. Obtenha uma equação para o plano que contém o ponto P e é perpendicular ao segmento de reta AB nos seguintes casos:

- (a) $P = (0, 0, 0)$, $A = (1, 2, 3)$ e $B = (2, -1, 2)$.
- (b) $P = (1, 1, -2)$, $A = (3, 5, 2)$ e $B = (7, 1, 12)$.
- (c) $P = (3, 3, 3)$, $A = (2, 2, 2)$ e $B = (4, 4, 4)$.
- (d) $P = (x_0, y_0, z_0)$, $A = (x_1, y_1, z_1)$ e $B = (x_2, y_2, z_2)$.

Solução. (a) Observamos que o plano é perpendicular à reta AB se e somente se o plano é perpendicular à reta OB' com $B' = (1, -3, -1)$. Logo uma equação para o plano é $x - 3y - z = d$ para alguma constante d . Como P pertence ao plano, devemos ter $1(0) - 3(0) - 1(0) = d$, ou seja, $d = 0$. Portanto uma equação do plano é $x - 3y - z = 0$.

(b) Procedendo como no item (a), obtemos a equação $4x - 4y + 10z = -20$.

(c) Procedendo como no item (a), obtemos a equação $2x + 2y + 2z = 18$.

(d) Procedendo como no item (a), obtemos a equação

$$(x_2 - x_1)x + (y_2 - y_1)y + (z_2 - z_1)z = (x_2 - x_1)x_0 + (y_2 - y_1)y_0 + (z_2 - z_1)z_0.$$

S29.E4. Sejam $A = (-1, 1, 2)$, $B = (2, 3, 5)$ e $C = (1, 3, -2)$. Obtenha uma equação para o plano que contém a reta AB e o ponto C .

Solução. Procuramos um vetor $v = (a, b, c)$ tal que $\langle v, \overrightarrow{AB} \rangle = 0$ e $\langle v, \overrightarrow{AC} \rangle = 0$. Calculamos $\overrightarrow{AB} = (3, 2, 3)$ e $\overrightarrow{AC} = (2, 2, -4)$. Com isso obtemos o seguinte sistema de equações para (a, b, c) :

$$\begin{aligned} 3a + 2b + 3c &= 0 \\ 2a + 2b - 4c &= 0. \end{aligned}$$

Escrevemos

$$\begin{aligned} 3a + 2b &= -3c \\ 2a + 2b &= 4c \end{aligned}$$

e resolvemos para a e b considerando c como um parâmetro. Obtemos que $(-7c, 9c, c)$ para $c \in \mathbb{R}$ são as soluções do sistema original. Em particular, o vetor $v = (-7, 9, 1)$ é solução do sistema. Portanto, uma equação do plano é $-7x + 9y + z = d$ para alguma constante d . Como A pertence ao plano, devemos ter $-7(-1) + 9(1) + 1(2) = d$, ou seja, $d = 18$. Portanto, uma equação para o plano é $-7x + 9y + z = 18$.

Seção 31 - Sistemas de Equações Lineares com Três Incógnitas

S31.E1. Para cada um dos sistemas a seguir, decida se existem ou não soluções. No caso afirmativo, exiba todas as soluções do sistema em termos de um ou dois parâmetros independentes.

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} & \begin{array}{l} x + 2y + 3z = 4 \\ 2x + 3y + 4z = 5 \end{array} & \begin{array}{l} \text{(b)} \\ 2x - y + 5z = 3 \\ 4x - 2y + 10z = 5 \end{array} & \begin{array}{l} \text{(c)} \\ 6x - 4y + 12z = 2 \\ 9x - 6y + 18z = 3 \end{array} \end{array}$$

Solução. (a) Observamos que os vetores $l_1 = (1, 2, 3)$ e $l_2 = (2, 3, 4)$ não são colineares. Logo os planos definidos pelas equações se intersectam segundo uma reta, ou seja, o sistema possui soluções. A matriz aumentada do sistema é

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Escalonando essa matriz, obtemos

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Portanto as soluções do sistema são $x = -2 + t$, $y = 3 - 2t$, $z = t$ para $t \in \mathbb{R}$.

(b) Vemos que os vetores $l_1 = (2, -1, 5)$ e $l_2 = (4, -2, 10)$ são colineares e os vetores $L_1 = (2, -1, 5, 3)$ e $L_2 = (4, -2, 10, 5)$ não são colineares. Logo os

planos definidos pelas equações são paralelos, ou seja, o sistema não possui soluções.

(c) Observamos que os vetores $l_1 = (6, -4, 12)$ e $l_2 = (9, -6, 18)$ são colineares e os vetores $L_1 = (6, -4, 12, 2)$ e $L_2 = (9, -6, 18, 3)$ são colineares. Logo os planos definidos pelas equações são coincidentes, ou seja, o sistema possui soluções. A matriz aumentada do sistema é

$$\begin{bmatrix} 6 & -4 & 12 & 2 \\ 9 & -6 & 18 & 3 \end{bmatrix}.$$

Escalonando essa matriz, obtemos

$$\begin{bmatrix} 1 & -2/3 & 2 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Portanto as soluções são $x = 1/3 + (2/3)s - 2t$, $y = s$, $z = t$ para $s, t \in \mathbb{R}$.

Seção 41 - Mudança de Coordenadas no Espaço

S41.E1. Ache números α , β de modo que os múltiplos αm e βn das matrizes abaixo sejam matrizes ortogonais

$$m = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad n = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 2 \\ -3 & 2 & 6 \\ 2 & -6 & 3 \end{bmatrix}.$$

Solução. Procuramos α tal que $(\alpha m)(\alpha m)^T = I$, ou seja, $\alpha^2(mm^T) = I$. Calculando mm^T , obtemos

$$\alpha^2(mm^T) = \alpha^2 \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}.$$

Portanto devemos ter $\alpha^2 9 = 1$, ou seja, $\beta = \pm 1/3$.

Procuramos β tal que $(\beta n)(\beta n)^T = I$, ou seja, $\beta^2(nn^T) = I$. Calculando nn^T , obtemos

$$\beta^2(nn^T) = \beta^2 \begin{bmatrix} 49 & 0 & 0 \\ 0 & 49 & 0 \\ 0 & 0 & 49 \end{bmatrix}.$$

Portanto devemos ter $\beta^2 49 = 1$, ou seja, $\beta = \pm 1/7$.