

演習問題 1.29

M 状態の離散確率変数 x を考え、イェンセンの不等式 (1.15) を用いて、確率分布 $p(x)$ のエントロピーが $H[x] \leq \ln M$ を満たすことを示せ。

[エントロピー]

$$H = - \sum_i p(x_i) \ln p(x_i) \quad \cdots (1.98)$$

[イェンセンの不等式]

$$f\left(\sum_{i=1}^M \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^M \lambda_i f(x_i) \quad \cdots (1.115)$$

ここで、上記のイェンセンの不等式の不等号は、 $f(x_i)$ が凸関数である前提で成立することに注意する。 $f(x_i)$ が凹関数である場合、上記の不等式の不等号は逆の形となる。また、 λ_i は $\lambda_i \geq 0$ および、 $\sum_i \lambda_i = 1$ である。

[解]

エントロピー $H[x]$ は、式 (1.98) より、

$$H[x] = - \sum_i p(x_i) \ln p(x_i) = \sum_i p(x_i) \ln \frac{1}{p(x_i)} \quad \cdots ※$$

となる、イェンセンの不等式を用いるにあたり、 $\lambda_i = p(x_i)$ 、 $x_i = \frac{1}{p(x_i)}$ 、 $f(x_i) =$

$\ln \frac{1}{p(x_i)} = \ln x_i$ と置くこととする。ここで、 $f(x) = \ln x$ のグラフの形を調べるために、

$f(x)$ を x について微分すると、 $f'(x) = \frac{1}{x}$ となる。さらに、2 次微分を行うと、 $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$ となり、 $f(x) = \ln x$ は凹関数となることがわかる。イェンセンの不等式は、凹関数に対して、

$$f\left(\sum_{i=1}^M \lambda_i x_i\right) \geq \sum_{i=1}^M \lambda_i f(x_i)$$

となるので、これに、 $\lambda_i = p(x_i)$ 、 $x_i = \frac{1}{p(x_i)}$ 、 $f(x_i) = \ln \frac{1}{p(x_i)} = \ln x_i$ と対応させると、式 ※ は、

$$\begin{aligned} &\leq f\left(\sum_{i=1}^M p(x_i) \frac{1}{p(x_i)}\right) \\ &= f\left(\sum_{i=1}^M 1\right) \end{aligned}$$

$$= f(M)$$

$$= \ln M$$

となる。よって、確率分布 $p(x)$ のエントロピーが $\mathbf{H}[x] \leq \ln M$ を満たすことが示せた。