

GBI Tutorium Nr. 41

Foliensatz 5

Vincent Hahn – vincent.hahn@student.kit.edu | 15. November 2012



Kontextfreie Grammatiken

Relationen

1 Kontextfreie Grammatiken

2 Relationen

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

1 Kontextfreie Grammatiken

2 Relationen

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Definition

Die Menge $G = G(N, T, S, P)$ nennen wir **Kontextfreie Grammatik**.

Definition

Die Menge $G = G(N, T, S, P)$ nennen wir **Kontextfreie Grammatik**.

Was ist was?

N : Menge von Nichtterminalsymbolen

T : Menge von Terminalsymbolen

S : $S \in N$ Startsymbol

$P \subset N \times V^*$: Menge von Produktionen,
 $V := (N \cup T)$

Definition

Als Ableitung wird in der theoretischen Informatik der Vorgang bezeichnet, ein Wort nach den Regeln einer formalen Grammatik zu erzeugen.

Wir schreiben:

- $w \Rightarrow v$, wenn von der Ableitung von v aus w genau 1 Ableitungsschritt liegt.
- $w \Rightarrow^i v$, wenn von der Ableitung von v aus w i Ableitungsschritte liegen ($i \in \mathbb{N}$).
- $w \Rightarrow^* v$, wenn von der Ableitung von v aus w beliebig viele Ableitungsschritte liegen.

Definition

Als Ableitung wird in der theoretischen Informatik der Vorgang bezeichnet, ein Wort nach den Regeln einer formalen Grammatik zu erzeugen.

Wir schreiben:

- $w \Rightarrow v$, wenn von der Ableitung von v aus w genau 1 Ableitungsschritt liegt.
- $w \Rightarrow^i v$, wenn von der Ableitung von v aus w i Ableitungsschritte liegen ($i \in \mathbb{N}$).
- $w \Rightarrow^* v$, wenn von der Ableitung von v aus w beliebig viele Ableitungsschritte liegen.

Definition

Als Ableitung wird in der theoretischen Informatik der Vorgang bezeichnet, ein Wort nach den Regeln einer formalen Grammatik zu erzeugen.

Wir schreiben:

- $w \Rightarrow v$, wenn von der Ableitung von v aus w genau 1 Ableitungsschritt liegt.
- $w \Rightarrow^i v$, wenn von der Ableitung von v aus w i Ableitungsschritte liegen ($i \in \mathbb{N}$).
- $w \Rightarrow^* v$, wenn von der Ableitung von v aus w beliebig viele Ableitungsschritte liegen.

Definition

Als Ableitung wird in der theoretischen Informatik der Vorgang bezeichnet, ein Wort nach den Regeln einer formalen Grammatik zu erzeugen.

Wir schreiben:

- $w \Rightarrow v$, wenn von der Ableitung von v aus w genau 1 Ableitungsschritt liegt.
- $w \Rightarrow^i v$, wenn von der Ableitung von v aus w i Ableitungsschritte liegen ($i \in \mathbb{N}$).
- $w \Rightarrow^* v$, wenn von der Ableitung von v aus w beliebig viele Ableitungsschritte liegen.

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Vorsicht

$$\Rightarrow \neq \rightarrow$$

- \Rightarrow ist die Relation der Ableitung
- \rightarrow ist die Relation der Produktion ($\in P$)

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Frage

Was stimmt? Es ist $w_1, w_2 \in N \cup P$.

- $w_1 \rightarrow w_2$, daraus folgt $w_1 \Rightarrow w_2$
- $w_1 \Rightarrow w_2$, daraus folgt $w_1 \rightarrow w_2$

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Definition

Sei G eine kontextfreie Grammatik. Dann bezeichnen wir die Sprache $L = L(G)$ mit

$$L = \{ w \in T^* \mid S \Rightarrow^* w \}$$

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Definition

Sei G eine kontextfreie Grammatik. Dann bezeichnen wir die Sprache $L = L(G)$ mit

$$L = \{w \in T^* \mid S \Rightarrow^* w\}$$

Was ist \Rightarrow^* ?

Mit \Rightarrow^* ist die *reflexiv-transitive Hülle* der Ableitungsrelation gemeint.

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Fragen

- ① Gibt es Grammatiken für die gilt: $L(G) = \{\}$?
- ② Welche Sprache erzeugt: $G_1 := (\{X\}, \{0\}, X, \{X \rightarrow X\})$
- ③ Ist $G_2 := (\{X\}, \{a, b\}, X, \{X \rightarrow \varepsilon\})$ eine gültige Grammatik?

Lösung

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Fragen

- ① Gibt es Grammatiken für die gilt: $L(G) = \{\}$?
- ② Welche Sprache erzeugt: $G_1 := (\{X\}, \{0\}, X, \{X \rightarrow X\})$
- ③ Ist $G_2 := (\{X\}, \{a, b\}, X, \{X \rightarrow \varepsilon\})$ eine gültige Grammatik?

Lösung

- ① Ja z.B. $G = (\{X\}, \{0\}, X, \{\})$

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Fragen

- ① Gibt es Grammatiken für die gilt: $L(G) = \{\}$?
- ② Welche Sprache erzeugt: $G_1 := (\{X\}, \{0\}, X, \{X \rightarrow X\})$
- ③ Ist $G_2 := (\{X\}, \{a, b\}, X, \{X \rightarrow \varepsilon\})$ eine gültige Grammatik?

Lösung

- ① Ja z.B. $G = (\{X\}, \{0\}, X, \{\})$
- ② $L(G_1) = \{\}$

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Fragen

- ① Gibt es Grammatiken für die gilt: $L(G) = \{\}$?
- ② Welche Sprache erzeugt: $G_1 := (\{X\}, \{0\}, X, \{X \rightarrow X\})$
- ③ Ist $G_2 := (\{X\}, \{a, b\}, X, \{X \rightarrow \varepsilon\})$ eine gültige Grammatik?

Lösung

- ① Ja z.B. $G = (\{X\}, \{0\}, X, \{\})$
- ② $L(G_1) = \{\}$
- ③ Ja und $L(G_2) = \{\varepsilon\}$

Musikgrammatik

(by Nils Braun und Philipp Basler)

Kontextfreie Grammatiken

Gegeben ist die Grammatik

Relationen

$$G = (\{X\}, \{A, B, C, D\}, X, \{X \rightarrow \epsilon \mid AX \mid BX \mid CX \mid DX\})$$

Musikgrammatik

(by Nils Braun und Philipp Basler)

Kontextfreie Grammatiken

Gegeben ist die Grammatik

Relationen

$$G = (\{X\}, \{A, B, C, D\}, X, \{X \rightarrow \epsilon \mid AX \mid BX \mid CX \mid DX\})$$

Leite A ab!

Musikgrammatik

(by Nils Braun und Philipp Basler)

Kontextfreie Grammatiken

Gegeben ist die Grammatik

Relationen

$$G = (\{X\}, \{A, B, C, D\}, X, \{X \rightarrow \epsilon \mid AX \mid BX \mid CX \mid DX\})$$

Leite A ab! Leite ABC ab! Finde weitere Wörter.

Musikgrammatik

(by Nils Braun und Philipp Basler)

Kontextfreie Grammatiken

Gegeben ist die Grammatik

Relationen

$$G = (\{X\}, \{A, B, C, D\}, X, \{X \rightarrow \epsilon \mid AX \mid BX \mid CX \mid DX\})$$

Leite A ab! Leite ABC ab! Finde weitere Wörter.

Musikgrammatik

(by Nils Braun und Philipp Basler)

Kontextfreie Grammatiken

Gegeben ist die Grammatik

Relationen

$$G = (\{X\}, \{A, B, C, D\}, X, \{X \rightarrow \epsilon \mid AX \mid BX \mid CX \mid DX\})$$

Leite A ab! Leite ABC ab! Finde weitere Wörter.

Musikgrammatik

(by Nils Braun und Philipp Basler)

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Gegeben ist die Grammatik

$$G = (\{X\}, \{A, B, C, D\}, X, \{X \rightarrow \epsilon \mid AX \mid BX \mid CX \mid DX\})$$

Leite A ab! Leite ABC ab! Finde weitere Wörter.

Musikgrammatik


(by Nils Braun und Philipp Basler)

Kontextfreie Grammatiken

Gegeben ist die Grammatik

Relationen

$$G = (\{X\}, \{A, B, C, D\}, X, \{X \rightarrow \epsilon \mid AX \mid BX \mid CX \mid DX\})$$

Leite A ab! Leite ABC ab! Finde weitere Wörter.

$$L(G) = \{A, B, C, D\}^*, \text{ oder etwa nicht?}$$

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Welche Sprachen erzeugen folgende Grammatiken.

① $G_1 := (\{X, Y\}, \{a, b\}, X, \{X \rightarrow aY | \varepsilon, Y \rightarrow bX\})$

② $G_2 := (\{X, Y, Z\}, \{a, b, c\}, X, \\ \{X \rightarrow Ya | Yb | Yc, Y \rightarrow ZZY | \varepsilon, Z \rightarrow a | b | c\})$

Gebt eine jeweils Grammatik an für die gilt $L(G) = L_i$:

① $L_1 := \{ab, cd\}^+ \cdot \{a, c\}^2$

② $A := \{0, 1\}, L_2 := \{w \in A^* | \text{Num}_0(w) = \text{Num}_1(w)\}$

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

In Mengen M aus Studenten mit $|M| \leq 3$

Konstruiert eine Grammatik die alle E-Mail-Adresse aus den Buchstaben a , b , c erzeugt. *Hinweis:* $T := \{a, b, c, @, ., -\}$

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

In Mengen M aus Studenten mit $|M| \leq 3$

Konstruiert eine Grammatik die alle E-Mail-Adresse aus den Buchstaben a, b, c erzeugt. *Hinweis:* $T := \{a, b, c, @, ., -\}$

Lösung

$$G = (N, T, S, P)$$

- $N = \{E, A, B\}$
- $T = \{a, b, c, ., -, @\}$
- $S = E$
- $P = \{E \rightarrow A@B.B, A \rightarrow BA|_A.A, B \rightarrow aB|bB|cB|\varepsilon\}$

Aufgabe

- Geben Sie eine kontextfreie Grammatik

$$G = (N, \{a, b\}, S, P)$$

an, für die $L(G)$ die Menge aller Palindrome über dem Alphabet $\{a, b\}$ ist.

- Geben Sie eine Ableitung der Wörter *baaab* und *abaaaba* aus dem Startsymbol Ihrer Grammatik an.
- Beweisen Sie, dass Ihre Grammatik jedes Palindrom über dem Alphabet $\{a, b\}$ erzeugt.

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

1 Kontextfreie Grammatiken

2 Relationen

Definition

- Seien A, B zwei Mengen. $R \subseteq A \times B$
- R ist eine Teilmenge des Kreuzproduktes zweier Mengen und heißt *Relation*.
- Man schreibt auch: xRy für $(x, y) \in R$
- Ist $A = B$ so nennt man R auch eine *homogene* Relation.

Definition

- Seien A, B zwei Mengen. $R \subseteq A \times B$
- R ist eine Teilmenge des Kreuzproduktes zweier Mengen und heißt *Relation*.
- Man schreibt auch: xRy für $(x, y) \in R$
- Ist $A = B$ so nennt man R auch eine *homogene* Relation.

Definition

- Seien A, B zwei Mengen. $R \subseteq A \times B$
- R ist eine Teilmenge des Kreuzproduktes zweier Mengen und heißt *Relation*.
- Man schreibt auch: xRy für $(x, y) \in R$
- Ist $A = B$ so nennt man R auch eine *homogene* Relation.

Definition

- Seien A, B zwei Mengen. $R \subseteq A \times B$
- R ist eine Teilmenge des Kreuzproduktes zweier Mengen und heißt *Relation*.
- Man schreibt auch: xRy für $(x, y) \in R$
- Ist $A = B$ so nennt man R auch eine *homogene* Relation.

Definition

- Seien A, B zwei Mengen. $R \subseteq A \times B$
- R ist eine Teilmenge des Kreuzproduktes zweier Mengen und heißt *Relation*.
- Man schreibt auch: xRy für $(x, y) \in R$
- Ist $A = B$ so nennt man R auch eine *homogene* Relation.

Definition

Sei $R \subset A \times A$ eine (binäre) Relation auf der Menge A . Wir nennen R

- **reflexiv** falls gilt:

$$\forall x \in A : (x, x) \in R$$

- **transitiv** falls gilt:

$$\forall x, y, z \in A : (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$$

- **symmetrisch** falls gilt:

$$\forall x, y \in A : (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$$

Definition

Zwei Relationen $R \subseteq M \times N$, $S \subseteq N \times L$ definieren die Relation des *Produktes von R und S* als

$$R \circ S = \{(x, z) \in M \times L \mid \exists y \in N : (x, y) \in R \text{ und } (y, z) \in S\}$$

Produkt

Definition

Zwei Relationen $R \subseteq M \times N$, $S \subseteq N \times L$ definieren die Relation des *Produktes von R und S* als

$$R \circ S = \{(x, z) \in M \times L \mid \exists y \in N : (x, y) \in R \text{ und } (y, z) \in S\}$$

Potenzschreibweise

$$R^0 = I_M = \{(x, x) \mid x \in M\} \text{ und } R^{i+1} = R^i \circ R$$

Reflexiv-Transitive-Hülle

$$R^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} R^i$$

Definition

Sei R eine homogene Relation über M . $x, y, z \in M$.

Hat R folgende Eigenschaften:

reflexiv xRx

transitiv $xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$

symmetrisch $xRy \Rightarrow yRx$

So heißt R eine *Äquivalenzrelation*.

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Freunde im Netzwerk

Sei $M = \{Gertrud, Holger, Lars, Katja, Martin, Nina\}$ eine Menge von Nutzern.
 $R \subseteq M \times M$ sei die „ist-befreundet-mit“-Relation.

- $R = \{(Martin, Holger), (Lars, Katja), (Nina, Holger), (Gertrud, Holger), (Katja, Nina)\} \cup \{\text{dazu sym. Tupel}\}$
- $R^0 = \{(Martin, Martin), \dots, (Holger, Holger)\}$
- $R^1 = R$ „Freundschaft 1. Grades.“
- $R^2 = \{(Martin, Nina), (Martin, Gertrud), (Martin, Martin), (Lars, Nina), (Lars, Lars), (Nina, Gertrud), (Nina, Martin), (Nina, Nina), (Nina, Lars), (Katja, Katja), (Katja, Holger), (Gertrud, Gertrud), (Gertrud, Martin), (Gertrud, Nina), (Holger, Holger), (Holger, Katja)\}$ „Freundschaft 2. Grades“
- $R^* = ?$ „Gibt es eine Verbindung durch Freunde beliebigen Grades?“

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Freunde im Netzwerk

Sei $M = \{Gertrud, Holger, Lars, Katja, Martin, Nina\}$ eine Menge von Nutzern.
 $R \subseteq M \times M$ sei die „ist-befreundet-mit“-Relation.

- $R = \{(Martin, Holger), (Lars, Katja), (Nina, Holger), (Gertrud, Holger), (Katja, Nina)\} \cup \{\text{dazu sym. Tupel}\}$
- $R^0 = \{(Martin, Martin), \dots, (Holger, Holger)\}$
- $R^1 = R$ „Freundschaft 1. Grades.“
- $R^2 = \{(Martin, Nina), (Martin, Gertrud), (Martin, Martin), (Lars, Nina), (Lars, Lars), (Nina, Gertrud), (Nina, Martin), (Nina, Nina), (Nina, Lars), (Katja, Katja), (Katja, Holger), (Gertrud, Gertrud), (Gertrud, Martin), (Gertrud, Nina), (Holger, Holger), (Holger, Katja)\}$ „Freundschaft 2. Grades“
- $R^* = ?$ „Gibt es eine Verbindung durch Freunde beliebigen Grades?“

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Freunde im Netzwerk

Sei $M = \{Gertrud, Holger, Lars, Katja, Martin, Nina\}$ eine Menge von Nutzern.
 $R \subseteq M \times M$ sei die „ist-befreundet-mit“-Relation.

- $R = \{(Martin, Holger), (Lars, Katja), (Nina, Holger), (Gertrud, Holger), (Katja, Nina)\} \cup \{\text{dazu sym. Tupel}\}$
- $R^0 = \{(Martin, Martin), \dots, (Holger, Holger)\}$
- $R^1 = R$ „Freundschaft 1. Grades.“
- $R^2 = \{(Martin, Nina), (Martin, Gertrud), (Martin, Martin), (Lars, Nina), (Lars, Lars), (Nina, Gertrud), (Nina, Martin), (Nina, Nina), (Nina, Lars), (Katja, Katja), (Katja, Holger), (Gertrud, Gertrud), (Gertrud, Martin), (Gertrud, Nina), (Holger, Holger), (Holger, Katja)\}$ „Freundschaft 2. Grades“
- $R^* = ?$ „Gibt es eine Verbindung durch Freunde beliebigen Grades?“

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Freunde im Netzwerk

Sei $M = \{Gertrud, Holger, Lars, Katja, Martin, Nina\}$ eine Menge von Nutzern.
 $R \subseteq M \times M$ sei die „ist-befreundet-mit“-Relation.

- $R = \{(Martin, Holger), (Lars, Katja), (Nina, Holger), (Gertrud, Holger), (Katja, Nina)\} \cup \{\text{dazu sym. Tupel}\}$
- $R^0 = \{(Martin, Martin), \dots, (Holger, Holger)\}$
- $R^1 = R$ „Freundschaft 1. Grades.“
- $R^2 = \{(Martin, Nina), (Martin, Gertrud), (Martin, Martin), (Lars, Nina), (Lars, Lars), (Nina, Gertrud), (Nina, Martin), (Nina, Nina), (Nina, Lars), (Katja, Katja), (Katja, Holger), (Gertrud, Gertrud), (Gertrud, Martin), (Gertrud, Nina), (Holger, Holger), (Holger, Katja)\}$ „Freundschaft 2. Grades“
- $R^* = ?$ „Gibt es eine Verbindung durch Freunde beliebigen Grades?“

Kontextfreie Grammatiken

Relationen

Freunde im Netzwerk

Sei $M = \{Gertrud, Holger, Lars, Katja, Martin, Nina\}$ eine Menge von Nutzern.
 $R \subseteq M \times M$ sei die „ist-befreundet-mit“-Relation.

- $R = \{(Martin, Holger), (Lars, Katja), (Nina, Holger), (Gertrud, Holger), (Katja, Nina)\} \cup \{\text{dazu sym. Tupel}\}$
- $R^0 = \{(Martin, Martin), \dots, (Holger, Holger)\}$
- $R^1 = R$ „Freundschaft 1. Grades.“
- $R^2 = \{(Martin, Nina), (Martin, Gertrud), (Martin, Martin), (Lars, Nina), (Lars, Lars), (Nina, Gertrud), (Nina, Martin), (Nina, Nina), (Nina, Lars), (Katja, Katja), (Katja, Holger), (Gertrud, Gertrud), (Gertrud, Martin), (Gertrud, Nina), (Holger, Holger), (Holger, Katja)\}$ „Freundschaft 2. Grades“
- $R^* = ?$ „Gibt es eine Verbindung durch Freunde beliebigen Grades?“

Reflexiv-transitive Hülle

Bestimmt die reflexiv-transitive Hülle der Relationen.

$$M := \{1, 2, 3, 4\}, R_i \subset M \times M$$

$$\textcircled{1} \quad R_1 := \{(1, 2), (1, 4), (2, 3)\}$$

$$\textcircled{2} \quad R_2 := \{(1, 1), (2, 2)\}$$

$$\textcircled{3} \quad R_3 := \{(1, 2), (3, 4), (4, 2)\}$$

Reflexiv-transitive Hülle

Bestimmt die reflexiv-transitive Hülle der Relationen.

$$M := \{1, 2, 3, 4\}, R_i \subset M \times M$$

$$\textcircled{1} \quad R_1 := \{(1, 2), (1, 4), (2, 3)\}$$

$$\textcircled{2} \quad R_2 := \{(1, 1), (2, 2)\}$$

$$\textcircled{3} \quad R_3 := \{(1, 2), (3, 4), (4, 2)\}$$

Lösungen

$$\textcircled{1} \quad R_1^* := \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 4)\}$$

$$\textcircled{2} \quad R_2^* := \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$

$$\textcircled{3} \quad R_3^* := \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 2), (4, 4)\}$$