
새 고배율 실험과 규준 실험 비교 · lead별 ΔCSI (새 실험 − 규준)
CSI 차이 ≥5 mm · 신규 실험 − 규준
예측시간
+1 h +0.0242 +0.0224 +0.0405 +0.0431 +0.0388 +0.0390 +0.0381 +0.0465
+2 h -0.0011 -0.0108 -0.0169 -0.0195 +0.0006 -0.0062 -0.0133 -0.0123
+3 h +0.0010 +0.0051 +0.0070 +0.0166 +0.0112 +0.0135 +0.0118 +0.0198
+4 h +0.0076 +0.0128 +0.0040 -0.0056 +0.0150 +0.0117 +0.0065 +0.0007
+5 h +0.0020 +0.0107 +0.0108 +0.0078 +0.0187 +0.0187 +0.0270 +0.0205
+6 h +0.0100 +0.0011 +0.0120 +0.0030 +0.0379 +0.0446 +0.0296 +0.0246
규준 α=1.75
규준 α=2
규준 α=2.5
규준 α=3
개선 α=1.75
개선 α=2
개선 α=2.5
개선 α=3
새 실험 · snow α
CSI 차이 ≥10 mm · 신규 실험 − 규준
예측시간
+1 h +0.0119 +0.0255 +0.0507 +0.0781 +0.0192 +0.0255 +0.0434 +0.0539
+2 h -0.0044 -0.0052 -0.0060 -0.0128 -0.0008 +0.0008 -0.0068 -0.0084
+3 h +0.0010 +0.0016 +0.0023 +0.0023 +0.0040 +0.0033 +0.0047 +0.0047
+4 h -0.0037 +0.0000 -0.0039 -0.0043 -0.0253 -0.0112 -0.0119 -0.0051
+5 h -0.0012 +0.0060 +0.0284 +0.0265 +0.0297 +0.0496 +0.0356 +0.0342
+6 h +0.0079 +0.0058 +0.0295 +0.0080 +0.0591 +0.0193 +0.0179 +0.0086
규준 α=1.75
규준 α=2
규준 α=2.5
규준 α=3
개선 α=1.75
개선 α=2
개선 α=2.5
개선 α=3
새 실험 · snow α
−0.08 −0.06 −0.04 −0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08
ΔCSI = new case − ORIGINAL (shared range ±0.08)