

MANUAL OFICIAL DE CONDICIONAMIENTO PREANALÍTICO Y GUÍA CLÍNICA

GONZALEZ-PRATO Laboratorio Clínico

Directora Técnica: Lic. Luisa Carolina González Ramírez

Ubicación: Urb. El Encanto, Clínica del Niño, Sótano 2, Mérida, Venezuela.

Fecha de Actualización: Septiembre 2026 | Versión 2.0

1. GENERALIDADES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Atención y Citas

- **Atención General:** Por orden de llegada a partir de las 7:00 AM (Lunes a Viernes) y 8:00 AM (Sábados).
- **Horario de Atención:** Lunes a viernes: 7:00 AM a 3:00 PM. Sábados 8:00 AM a 1:00 PM
- **Estudios con Previa Cita Obligatoria:** Únicamente los estudios micológicos (hongos en uñas, piel, cuero cabelludo) y examen microscópico de ácaros *Demodex*.
- **Servicio de Toma de Muestras a Domicilio:**
 - Disponible exclusivamente los días **Lunes, Martes y Jueves**.
 - **Municipio Libertador de Mérida:** Servicio gratuito (sin costo adicional).
 - En clínicas u hospitales: El familiar debe buscar y acompañar a la asistente de laboratorio por normativas de acceso institucional.

1.2 Moneda, Facturación y Medios de Pago

- **Moneda de referencia:** Todos los costos se expresan en Dólares Estadounidenses (\$ USD).
- **Pago en Bolívares:** Se aceptan pagos en Bolívares (Bs.) calculados a la tasa oficial del **Banco Central de Venezuela (BCV)** del día.
- **Modalidades de Pago:** Pago Móvil, Punto de Venta (tarjetas de débito/crédito), Transferencia Bancaria y Efectivo (USD / Bs).
- **Seguros Médicos y Pólizas:** No se manejan convenios directos con aseguradoras. El paciente realiza el pago en el laboratorio y se le entrega la factura legal detallada para su posterior reembolso ante la compañía de seguros.

1.3 Entrega de Resultados

- **Exámenes de Rutina, Química, Hematología, Hormonas y Serología:** Entrega el mismo día de la toma.
- **Cultivos Bacteriológicos y Micológicos:** De 3 a 8 días hábiles dependiendo del desarrollo microbiano y antibiograma.

- **Canales de Entrega:**
 - **Digital (WhatsApp/Email):** Enlace seguro y documento oficial en PDF. *(Nota crítica: El paciente NO debe tener activados mensajes temporales en WhatsApp para garantizar la recepción del reporte).* Físico: Impresión inmediata en la recepción de la sede física.
 - **Físico:** Impresión inmediata en la recepción de la sede física.
- **Interpretación de Resultados:** El laboratorio clínico emite reportes cuantitativos/cualitativos con valores de referencia. La valoración, diagnóstico y prescripción terapéutica corresponden de forma exclusiva al médico tratante.
- **Exclusiones de Servicio:** El laboratorio **NO realiza** ecografías, ultrasonidos, radiografías, tomografías, biopsias de anatomía patológica, endoscopias ni consultas médicas especializadas.

CONDICIONADO:

¿Qué condiciones debe cumplir el paciente para una hematología completa o hemograma?

- La muestra ideal es en ayuno, sin embargo, en caso de requerirse de emergencia se puede
- recolectar la muestra en cualquier momento.
- Se recomienda no haber realizado ejercicio físico intenso o de alto impacto las 24 horas previas a la recolección de la muestra.
- Evitar el consumo de alcohol y tabaco al menos 24 horas antes.
- Debe notificar con precisión cualquier tratamiento que esté cumpliendo (especialmente anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, antiinflamatorios no esteroideos o antibióticos, si fue sometido a transfusiones sanguíneas 3 meses antes de la recolección, hacer mención si padece alguna patología de tipo crónica o aguda.
- Mencionar si tiene tratamiento con hierro.
- Puede tomar agua simple libremente para mantenerse hidratado.

¿Qué condiciones debe cumplir el paciente para una Velocidad de Sedimentación Globular o VSG?

- Informar si cursa con algún proceso febril, infeccioso, o si está embarazada.
- Mencionar si está tomando algún tipo de tratamiento.

¿Qué condiciones debe cumplir el paciente para un Frotis de Sangre Periférica?

- Ninguna

¿Qué condiciones debe cumplir el paciente para los Tiempos de Coagulación (PT o TP, TPT o PTT, Fibrinógeno)

- La muestra ideal es en ayuno o al menos 3 o 4 h sin ingerir alimentos, salvo en caso de una
- emergencia.
- Notificar si toma anticoagulantes orales (Warfarina, Acenocumarol, Rivaroxabán, Apixabán) o Heparina. Notificar la toma de aspirina u otros AINEs.
- Notificar si padece alguna enfermedad que afecte la función hepática normal.

¿Qué condiciones debe cumplir el paciente para un Grupo Sanguíneo y Factor Rh?

- No requiere ayuno estricto obligatorio, aunque se recomienda ayuno ligero de 4 a 6 horas.
- Informar si ha recibido transfusiones sanguíneas en los últimos 3 meses o si ha recibido recientemente inmunoglobulinas.
- En mujeres embarazadas, notificar el antecedente de administración de inmunoglobulina anti-D (RhoGAM).

¿Qué condiciones debe cumplir el paciente para Contaje de Plaquetas?

- Indicar el uso de fármacos antiagregantes plaquetarios (Aspirina, Clopidogrel) o AINEs
- Mencionar si padece alguna enfermedad de tipo aguda o crónica que afecte la función o producción plaquetaria normal.

¿Qué condiciones debe cumplir el paciente para realizar exámenes de química sanguínea?

- **Glicemia basal**
 - Debe tener un ayuno de 8 a 12 horas exactas.
 - Prohibido el consumo de chicles o café (incluso sin azúcar).
 - En caso de tomar un tratamiento para el control glucémico debe preguntar al médico la condición en la cual requiere el estudio, es decir, si se toma o no el tratamiento.
- **Glicemia postprandial**
 - Una vez recolectada la muestra basal debe ir a desayunar inmediatamente, al finalizar debe contar 2 h exactas, durante ese periodo debe permanecer en reposo, si no se encuentra en el laboratorio debe regresar al menos 20 minutos antes de que se cumpla el tiempo.
- **Glicemia post-carga**
 - Una vez recolectada la muestra basal se le dará la solución glucosada, al finalizar la toma de la misma debe contar 2 h exactas (si la curva tiene 2 puntos) o seguir la indicación del médico en cuanto al número de puntos de la curva que desee medir, durante ese periodo debe permanecer en reposo, si no se encuentra en el laboratorio debe regresar al menos 20 minutos antes de que se cumpla el tiempo.
 - Tenga en cuenta que el procedimiento le puede causar náuseas, mareos, etc por lo cual deberá notificarlo inmediatamente.
- **Lipidograma (Colesterol Total, HDL, LDL, VLDL, Triglicéridos):**
 - Debe permanecer en ayuno entre 10 y 12 horas estrictas.
 - Evitar cenas hipergrasas o ingesta excesiva de alimentos la noche anterior. Se recomienda mantener su dieta habitual.
 - Se recomienda cenar antes de las 8:00 pm
 - En caso de eventos infecciosos agudos, traumatismos o cirugías mayores se recomienda posponer la prueba de 2 a 3 semanas

- **Ácido Úrico:**
 - Se recomienda un ayuno de al menos 8 horas o más.
 - Evitar dietas hiperproteicas y el consumo de alcohol (especialmente cerveza) o mariscos en las 48 horas previas.
- **Urea:**
 - Lo ideal es un ayuno de 8 a 12 horas, en caso de ser solicitado de emergencia puede realizarse sin cumplir esta condición.
 - Se recomienda no ingerir exceso de proteínas en las 24 horas anteriores y elevar la concentración de urea en sangre sin reflejar fallo renal.
- **Creatinina:**
 - Lo ideal es un ayuno de 8 a 12 horas, en caso de ser solicitado de emergencia puede realizarse sin cumplir esta condición.
 - Se recomienda restringir el ejercicio extenuante y evitar la ingesta masiva de carne roja cocida las 24 horas previas.
- **Transaminasas (GOT/AST, GPT/ALT) y GGT (Gamma Glutamyltransferasa):**
 - Lo ideal es un ayuno de 8 a 12 horas.
 - Debe suspenderse el ejercicio extenuante 48 horas antes.
 - Suspender el consumo de alcohol por 48 horas.
 - Informar sobre el uso de medicamentos hepatotóxicos o inductores enzimáticos.
 - Informar si padece alguna enfermedad donde se comprometa la función hepática normal.
- **Bilirrubina Total y Fraccionada (Directa e Indirecta):**
 - Se recomienda un ayuno de 8 a 12 horas. Con excepción de los neonatos o recién nacidos.
- **Lactato Deshidrogenasa (LDH):**
 - Se recomienda un ayuno de 8 horas o más.
 - Evitar el ejercicio intenso previa a la recolección de la muestra.
- **Proteínas Totales y Fraccionadas (Albumina y Globulinas):**
 - Se recomienda un ayuno de 8 horas o más
- **Calcio, Fósforo y magnesio:**
 - Se recomienda un ayuno de 8 horas o más.
- **Electrolitos séricos (Sodio, Potasio, Cloro):**
 - Se recomienda un ayuno de 8 horas o más
- **Hormonas Tiroideas (TSH, T4 libre, T3 libre)**
 - Se recomienda un ayuno de 8 horas o más, y la recolección de la muestra debería realizarse entre 7:00 a.m. y 9:00 a.m. No aplica para neonatos y lactantes (2 a 3 h).
 - En caso de recibir Levotiroxina, la muestra debe tomarse antes de administrar la dosis diaria.

- En caso de consumir Biotina (Vitamina B7/B8) se debe suspender mínimo 48 a 72 horas antes de la recolección de la muestra, ya que puede interferir con el resultado de acuerdo a la técnica utilizada.
- **Anticuerpos Antitiroideos (Anti-TPO, Anti-Tiroglobulina)**
 - Se requiere de un ayuno de 8 horas o más.
 - Suspender suplementos con dosis altas de biotina 48–72 horas antes por posible interferencia de acuerdo a la técnica utilizada.
- **LH y FSH**
 - Se requiere de un ayuno de 8 horas o más.
 - La recolección de la muestra debe realizarse de acuerdo a la indicación médica basada en la fase del ciclo que se requiere evaluar.
 - En caso de que no exista la indicación puede recolectarse entre los días 2 y 5 del ciclo (fase folicular temprana) para evaluación basal de reserva ovárica y trastornos del eje gonadotrópico.
 - Es importante indicar la fecha de la última menstruación.
- **Prolactina (PRL)**
 - Se requiere de un ayuno de 8 horas o más
 - Realizar la toma de muestra antes de las 9 am
 - Para la recolección debe cumplir con:
 - Abstención de actividad sexual y estimulación mamaria durante 24–48 horas antes.
 - Evitar ejercicio físico intenso el día anterior.
 - Evitar estados de estrés agudo pre-toma.
 - Notificar el uso de psicofármacos, neurolépticos, antieméticos (metoclopramida) u anticonceptivos, ya que causan hiperprolactinemia farmacológica.
- **Progesterona**
 - Se requiere de un ayuno de 8 horas o más
 - Se recomienda hacer la recolección de la muestra el día 21 de un ciclo de 28 días (o 7 días antes de la menstruación esperada / fase lútea media).
- **Estradiol (E2)**
 - Se requiere de un ayuno de 8 horas o más
 - La recolección de la muestra se realizará de acuerdo a la fase del ciclo menstrual que el médico quiera valorar. En caso de no haber una indicación puede considerarse que para una Evaluación basal / Fertilidad, la recolección se lleve a cabo los días 2 a 4 del ciclo o en caso de monitoreo de ovulación: Según indicación en la fase periovulatoria (días 12–14 del ciclo menstrual).
 - Debe informar el uso de terapia de reemplazo hormonal, anticonceptivos u ovario estáticos.
 - Es importante indicar la fecha de la última menstruación.
- **DHEA-SO4 (Sulfato de Dehidroepiandrosterona)**
 - Se requiere de un ayuno de 8 horas o más

- No se requiere realizar la recolección de la muestra en días específicos de ciclo menstrual, a menos que exista una indicación médica.
- **Cortisol AM y PM**
 - Se requiere de un ayuno de 8 horas o más para cortisol a.m. y un ayuno leve para
 - Cortisol p.m.
 - Para el cortisol AM: Extracción de la muestra se debe realizar a las 8:00 a.m., por lo tanto, el paciente debe estar entre 20 minutos a 30 minutos antes de la hora de recolección ya que debe permanecer en reposo previa a la extracción.
 - Cortisol PM: La extracción debe realizarse a las 4:00 p.m. El paciente debe estar entre 20 minutos a 30 minutos antes de la hora de recolección ya que debe permanecer en reposo previa a la extracción.
 - Evitar situaciones de estrés físico o emocional.
- **Insulina Basal**
 - Ayuno estricto de 8 a 12 horas de ayuno.
 - Suspendir el ejercicio físico intenso el día anterior.
 - Mencionar si tiene algún tratamiento de tipo hipoglicemiante.
- **Insulina post-pandrial**
 - Una vez recolectada la muestra basal debe ir a desayunar inmediatamente, al finalizar debe contar 2 h exactas, durante ese periodo debe permanecer en reposo, si no se encuentra en el laboratorio debe regresar al menos 20 minutos antes de que se cumpla el tiempo.
- **Insulina post-carga**
 - Una vez recolectada la muestra basal se le dará la solución glucosada, al finalizar la toma de la misma debe contar 2 h exactas (si la curva tiene 2 puntos) o seguir la indicación del médico en cuanto al número de puntos de la curva que desee medir, durante ese periodo debe permanecer en reposo, si no se encuentra en el laboratorio debe regresar al menos 20 minutos antes de que se cumpla el tiempo.
 - Tenga en cuenta que el procedimiento le puede causar náuseas, mareos, etc por lo cual deberá notificarlo inmediatamente.
- **Testosterona Total y Testosterona Libre**
 - Se requiere de un ayuno de 8 horas o más
 - Evitar la recolección de la muestra durante procesos infecciosos o metabólicos agudos.
 - En mujeres, idealmente evaluar en la fase folicular temprana (días 2-5 del ciclo menstrual) o de acuerdo a la indicación médica e indicar fecha de última menstruación.
 - Mencionar si tiene algún tratamiento de reemplazo hormonal.
- **Condiciones para recolección de muestras para estudios micológicos**

- El paciente NO debe usar tratamiento tópico (cremas, laca de uñas, lociones) ni oral un mínimo de 7 a 15 días antes de la recolección de la muestra.
- 3 días previos a la recolección de la muestra no aplicar sobre la zona a muestrear ningún tipo de cosmético, crema hidratante, polvo de talco, perfume, esmalte ni antiséptico (yodo, clorhexidina, alcohol).
- **A. Cultivo Micológico de Uñas (Onicomycosis)**
 - No cortarse ni limpiarse las uñas durante la semana previa a la recolección de la muestra.
 - Limpiar las uñas con agua y jabón neutro utilizando un cepillo suave durante los 3 días previos.
 - El día del examen, acudir al laboratorio con calzado cerrado y medias limpias (asegurándose de que no contengan restos de talco ni telas sintéticas desprendibles).
 - Acudir sin esmalte ni endurecedor de uñas por lo menos 3 a 7 días antes.
- **B. Cultivo Micológico de Cabello y Cuero Cabelludo (Tinea capitis o tiña de la cabeza, dermatitis seborreica)**
 - No lavar el cabello 24 horas antes de la toma de muestra.
 - No aplicar fijadores, lacas, gomina, tintes, aceites capilares ni acondicionadores el día previo ni el día de la toma.
 - Evitar el peinado agresivo o cepillado previo que desprende mecánicamente los pelos afectados antes de la evaluación microscópica.
- **C. Cultivo Micológico de Escamas de piel (Pitiriasis versicolor, Tinea corporis, cruris, faciei, pedis, manuum o Tiña del cuerpo, ingle, cara, pies o mano)**
 - Realizar un baño general con agua y jabón neutro 24 horas antes. Evitar la ducha justo antes de la toma para no retirar mecánicamente las escamas córneas superficiales ni deshidratar la zona.
 - La zona afectada debe estar completamente limpia y seca, libre de maquillaje, desodorantes (si es en axila), talcos o cremas corporales durante al menos 3 días.
- **Condiciones para estudios microbiológicos**
 - La muestra debe obtenerse antes de iniciar la terapia antibiótica y antifúngica, o 48 a 72 horas luego de finalizado el tratamiento (salvo indicación médica contraria en este caso indicar el o los antibiótico(s) que está recibiendo).
 - 2. Debe haber una correspondencia inequívoca entre la muestra y la solicitud realizada por el médico tratante.

Urocultivo

- **Orina de Chorro Medio**
 - La muestra ideal es la primera orina de la mañana o con un mínimo de 3 a 4 horas de retención urinaria.

- Para la recolección de la muestra debe realizarse el lavado de los genitales externos con agua y jabón neutro, eliminar con abundante agua (no utilizar ni antisépticos ni desinfectantes). Secarse con una toalla limpia.
- Descartar el primer chorro de la micción y recolectar la muestra del chorro medio directamente en el frasco estéril (debe adquirirlo en la farmacia).
- No se aceptan frascos de vidrio ni otro tipo de envase.
- La muestra debe colocarla en la nevera hasta el momento del traslado al laboratorio para ello deberá colocar el recipiente en otro envase con hielo y de esta manera transportarla al laboratorio.
- **Orina obtenida con bolsa pediátrica**
 - Para la recolección de la muestra debe realizarse el lavado de los genitales externos con agua y jabón neutro, eliminar con abundante agua (no utilizar ni antisépticos ni desinfectantes). Secarse con una toalla limpia.
 - Colocar la bolsa pediátrica de manera adecuada evitando tocar y manipular los genitales externos.
 - Si a los 30 minutos de colocada la bolsa no ha podido recolectar la muestra, debe cambiar la bolsa por una nueva. Repetir hasta obtener la muestra.
- **Pacientes con sonda**
- La muestra ideal es la obtenida con el recambio de la sonda.
- El procedimiento debe ser realizado por personal de salud debidamente entrenado.
- **Coprocultivo (Muestra Fecal)**
 - No ingerir medicamentos antidiarreicos, bismuto, antiácidos, ni aceites minerales antes de la recolección de la muestra.
 - Emitir las heces en un recipiente limpio y seco (no absorbente), evitando la contaminación con orina, agua del inodoro o papel higiénico.
 - Transferir al recolector de heces una porción de la muestra tamaño de una nuez (o 5-10 mL si es líquida), agregando fracciones que presentan moco y/o sangre.
 - No se aceptan recipientes que no sean los adecuados para la recolección de este tipo de muestras.
 - La muestra debe ser trasladada a temperatura ambiente de inmediato al laboratorio.
- **Muestra de heces en lactantes**
 - No deben aplicarse ungüentos, cremas antipañalitis, talcos ni aceites en la zona perianal ni en el pañal antes de la recolección, ya que estas sustancias pueden inhibir el crecimiento bacteriano o alterar la muestra.
 - La muestra de heces no debe estar contaminada con orina.
 - Se recomienda colocar el pañal al revés (con la cara plástica impermeable hacia adentro).
 - Recoger la muestra inmediatamente después de la deposición con la espátula que acompaña el recolector, colocar la muestra en el mismo.
 - Se deben seleccionar preferentemente las zonas con presencia de moco y/o sangre si las hubiera.
 - Transportar a temperatura ambiente de inmediato al laboratorio.

- **Secreciones de Heridas y Úlceras**
 - No colocarse el día de la recolección de la muestra cremas tópicas, ungüentos o cremas antibióticas/desinfectantes por lo menos 24 horas antes.
 - En caso que la muestra no sea recolectada en el laboratorio: la misma debe ser recolectada por personal de salud debidamente entrenado efectuando estrictamente un lavado previo de la superficie de la lesión con agua estéril. Se transporta al laboratorio a temperatura ambiente en el medio de transporte correspondiente.
- **Exudado Faríngeo**
 - Debe asistir al laboratorio sin haber ingerido alimentos y sin cepillarse los dientes y sin realizar enjuagues bucales, ni usar antisépticos.
- **Espuito (Expectoración Profunda)**
 - Realizar un enjuague de la cavidad oral únicamente con agua (sin crema dental ni enjuagues bucales).
 - Preferiblemente obtener la muestra temprano por la mañana, tras un esfuerzo de tos
 - profunda proveniente del árbol bronquial, o Recolectar la muestra en un envase estéril (Ej recolector de orina).
 - Evitar contaminar la muestra con saliva o secreción nasofaríngea, exceso de estas secreciones son criterio de rechazo de la muestra.
 - Transportarla a temperatura ambiente lo antes posible al laboratorio.
- **Secreciones Nasales**
 - Suspender gotas nasales, sprays con corticosteroides o descongestionantes tópicos al menos 12-24 horas antes de la recolección de la muestra.
- **Secreciones Óticas**
 - No aplicar gotas óticas (antibióticas y antisépticas) al menos 48 horas antes.
- **Secreciones Oculares (Conjuntival)**
 - No aplicar medicamentos oftálmicos (gotas, pomadas o lágrimas artificiales) durante las 12 a 24 horas previas.
 - Retirar los lentes de contacto al menos 12 horas antes del estudio.
 - No colocarse maquillaje, cosméticos ni cremas en el área periocular.
- **Abscesos**
 - La muestra ideal es la obtenida por aspirado con jeringa.
 - Trasladar de inmediato la muestra al laboratorio.
- **Líquidos biológicos (Líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido ascítico, líquido peritoneal, líquido pericárdico)**
 - El LCR y otros líquidos biológicos para estudio microbiológico nunca deben refrigerarse,
 - deben trasladarse de inmediato al laboratorio.
 - Estas muestras son estrictamente recolectadas por el personal médico

- **Hemocultivo**

- No se requiere ayuno ni restricciones dietéticas para la toma de hemocultivos.
- Debe realizarse idealmente antes de iniciar cualquier tratamiento antimicrobiano sintomático. Si el paciente ya recibe antibióticos, la toma debe hacerse justo antes de la siguiente dosis del medicamento.
- Se recomienda la extracción en el momento más cercano al inicio de la fiebre o escalofríos (bacteriemia transitoria/intermitente), aunque ante la sospecha de sepsis/choque séptico no debe retrasarse la recolección de la muestra.
- Se recomienda obtener la muestra por venopunción periférica.
- No se recomienda la extracción en forma aislada a través de vías venosas centrales o periféricas preconcebidas. En caso de retrocultivo debe recolectarse la muestra de
- sangre en forma simultánea en una vía periférica y el catéter.
- Solo se aceptan frascos comerciales, los mismo los puede adquirir en el laboratorio.
- Mantener y transportar los frascos siempre a temperatura ambiente y a la brevedad posible.

- **Lavado bronquioalveolar**

- Esta muestra es obtenida estrictamente por personal médico especializado y entrenado
- Una vez obtenida la muestra se debe enviar al laboratorio de microbiología antes de 2 horas a temperatura ambiente.

- **Secreción bronquial**

- Esta muestra es obtenida estrictamente por personal médico especializado y entrenado.
- Tras la aspiración, desconectar la trampa de Lukens del circuito de vacío y de la sonda, y sellar herméticamente conectando los dos tubos adaptadores del mismo frasco entre sí o colocando su tapa rosca estéril.
- La muestra debe enviarse de inmediato (en < 2 horas) al laboratorio a temperatura ambiente

- **Copro Análisis Coproanálisis (coproparasitológico o examen de heces) o Leucograma fecal o Sudan III o Kato Katz/Stoll o Quensel/ Nair o coloración de Zielh Neelsen modificado**

- No ingerir medicamentos antidiarreicos, bismuto, antiácidos, ni aceites minerales antes de la recolección de la muestra.
- Orine primero antes de la recolección de la muestra de heces.
- Emitir las heces en un recipiente limpio y seco (no absorbente), evitando la contaminación con orina, agua del inodoro o papel higiénico.
- Transferir al recolector de heces una porción de la muestra tamaño de una nuez (o 5-10 mL si es líquida), agregando fracciones que presentan moco y/o sangre. No llene demasiado el recolector; solo se requiere la cantidad indicada. Cierre muy bien el envase para evitar derrames o contaminación externa.

- No se aceptan recipientes que no sean los adecuados para la recolección de este tipo de muestras.
 - La muestra debe ser trasladada a temperatura ambiente de inmediato al laboratorio.
- **Concentrado seriado o de heces**
 - Acude al laboratorio para adquirir el kit para la recolección de las muestras. En ese momento se le proporcionará la información necesaria para la recolección y traslado de la muestra.
 - Cuidar no derramar ese líquido en el momento de trasladar el material entregado.
- **Absorción intestinal**
 - No ingerir medicamentos antidiarreicos, bismuto, antiácidos, ni aceites minerales antes de la recolección de la muestra.
 - Orine primero antes de la recolección de la muestra de heces.
 - Emitir las heces en un recipiente limpio y seco (no absorbente), evitando la contaminación con orina, agua del inodoro o papel higiénico.
 - Transferir al recolector de heces una porción de la muestra tamaño de una nuez (o 5-10 mL si es líquida), agregando fracciones que presentan moco y/o sangre. No llene demasiado el recolector; solo se requiere la cantidad indicada. Cierre muy bien el envase para evitar derrames o contaminación externa.
 - No se aceptan recipientes que no sean los adecuados para la recolección de este tipo de muestras.
 - La muestra debe entregarse al laboratorio en un tiempo menor a media hora después de su recolección.
 - En el caso que sean lactantes, deben recoger la muestra preferiblemente en el laboratorio.
- **Graham masculino o femenino**
 - Acuda al laboratorio donde se le suministra un kit con el material pertinente para la recolección de la muestra.
 - El laboratorio le proporcionará la información necesaria para la recolección y traslado de la muestra.
- **Coproantígeno de *Helicobacter pylori***
 - No ingerir medicamentos antidiarreicos, bismuto, antiácidos, ni aceites minerales antes de la recolección de la muestra.
 - Orine primero antes de la recolección de la muestra de heces.
 - Emitir las heces en un recipiente limpio y seco (no absorbente), evitando la contaminación con orina, agua del inodoro o papel higiénico.
 - Transferir al recolector de heces una porción de la muestra tamaño de una nuez (o 5-10 mL si es líquida), agregando fracciones que presentan moco y/o sangre. No llene demasiado el recolector; solo se requiere la cantidad indicada. Cierre muy bien el envase para evitar derrames o contaminación externa.

- No se aceptan recipientes que no sean los adecuados para la recolección de este tipo de muestras.
- La muestra debe ser trasladada a temperatura ambiente de inmediato al laboratorio.
- Las heces deben ser recién emitidas o trasladarse al laboratorio en un lapso menor a 3 horas.
- Indique si mantiene tratamiento con antibióticos o cualquier otro medicamento.

- **Calprotectina fecal**

- No ingerir medicamentos antidiarreicos, bismuto, antiácidos, ni aceites minerales antes de
- la recolección de la muestra.
- Orine primero antes de la recolección de la muestra de heces.
- Emitir las heces en un recipiente limpio y seco (no absorbente), evitando la contaminación con orina, agua del inodoro o papel higiénico.
- Transferir al recolector de heces una porción de la muestra tamaño de una nuez (o 5-10 mL si es líquida), agregando fracciones que presentan moco y/o sangre. No llene demasiado el recolector; solo se requiere la cantidad indicada. Cierre muy bien el envase para evitar derrames o contaminación externa.
- No se aceptan recipientes que no sean los adecuados para la recolección de este tipo de muestras.
- La muestra debe ser trasladada a temperatura ambiente de inmediato al laboratorio.
- Indique si mantiene algún tipo de tratamiento.

- **Coproantígeno de Entamoeba / Giardia/ Cryptosporidium**

- No ingerir medicamentos antidiarreicos, bismuto, antiácidos, ni aceites minerales antes de la recolección de la muestra.
- Orine primero antes de la recolección de la muestra de heces.
- Emitir las heces en un recipiente limpio y seco (no absorbente), evitando la contaminación con orina, agua del inodoro o papel higiénico.
- Transferir al recolector de heces una porción de la muestra tamaño de una nuez (o 5-10 mL si es líquida), agregando fracciones que presentan moco y/o sangre. No llene demasiado el recolector; solo se requiere la cantidad indicada. Cierre muy bien el envase para evitar derrames o contaminación externa.
- No se aceptan recipientes que no sean los adecuados para la recolección de este tipo de muestras.
- La muestra debe ser trasladada a temperatura ambiente de inmediato al laboratorio en un lapso menor a 2 horas.
- Indique si mantiene algún tipo de tratamiento.

- **Esteatocrito ácido**

- No ingerir medicamentos antidiarreicos, bismuto, antiácidos, ni aceites minerales antes de la recolección de la muestra.
- Orine primero antes de la recolección de la muestra de heces.

- Emitir las heces en un recipiente limpio y seco (no absorbente), evitando la contaminación con orina, agua del inodoro o papel higiénico.
- Transferir al recolector de heces una porción de la muestra tamaño de una nuez (o 5-10 mL si es líquida), agregando fracciones que presentan moco y/o sangre. No llene demasiado el recolector; solo se requiere la cantidad indicada. Cierre muy bien el envase para evitar derrames o contaminación externa.
- No se aceptan recipientes que no sean los adecuados para la recolección de este tipo de muestras.
- La muestra debe ser trasladada a temperatura ambiente de inmediato al laboratorio en un lapso no mayor a 2 horas tras su recolección.
- Evitar el uso de supositorios, aceites minerales, enemas o cremas lubricantes antes de la toma, ya que pueden falsear los resultados.

- **Sangre oculta en heces**

- No ingerir medicamentos antidiarreicos, bismuto, antiácidos, ni aceites minerales antes de la recolección de la muestra.
- No requiere dieta específica.
- Evitar el uso de supositorios, enemas ya que pueden falsear los resultados.
- Orine primero antes de la recolección de la muestra de heces.
- Emitir las heces en un recipiente limpio y seco (no absorbente), evitando la contaminación con orina, agua del inodoro o papel higiénico.
- Transferir al recolector de heces una porción de la muestra tamaño de una nuez (o 5-10 mL si es líquida), agregando fracciones que presentan moco y/o sangre. No llene demasiado el recolector; solo se requiere la cantidad indicada. Cierre muy bien el envase para evitar derrames o contaminación externa.
- No se aceptan recipientes que no sean los adecuados para la recolección de este tipo de muestras.
- La muestra debe ser trasladada a temperatura ambiente de inmediato al laboratorio.
- Mencione si tiene algún tipo de tratamiento.

- **UROANÁLISIS**

- Recolecta la primera orina de la mañana, realizando previo aseo en zona genital con agua y jabón.
 - **Mujeres:** Separe los labios vaginales y limpie de adelante hacia atrás, descarte el primer chorro y recoja el chorro medio de la orina. No se debe realizar la recolección durante el período menstrual.
 - **Hombres:** Retire la piel del prepucio si no está circuncidado y limpie el glande. Descarte el primer chorro y recoja el chorro medio. Utilice un envase estéril de tapa de rosca, tape muy bien para evitar derrames y llévelo de inmediato al laboratorio por un periodo máximo 1 hora.
 - **Lactantes:**
 - Uso de bolsa recolectora: Útil para análisis generales de orina, aunque cuenta con un riesgo más elevado de contaminación si se deja puesta demasiado tiempo.

- Limpie y seque la zona rigurosamente. Retire el protector del adhesivo y fíjese firmemente en la piel.
- En varones, introduzca el pene por completo en la bolsa.
- En niñas, asegúrese de cubrir los labios mayores evitando la zona anal.
- Tiempo límite: revise al niño cada 20 o 30 minutos. Si transcurren más de 30 a 60 minutos sin que el niño orine, retire la bolsa, repita la higiene completa y coloque una bolsa nueva para evitar que proliferen bacterias de la piel.
- Una vez obtenida la muestra, retíralo con cuidado y colóquela sellada dentro del frasco estéril

● **DEPURACIÓN DE CREATININA**

- Se requiere toma muestra sanguínea al paciente, medir talla y peso.
- Se requiere orina de 24 horas como se indica a continuación.
- La orina debe recolectarse en un periodo de 24 horas cuidando no perder volumen urinario.

● **Debe seguir los siguientes pasos:**

- Debe tener un envase estéril (botella de agua mineral estéril)
- Tener en cuenta que cada micción debe ser refrigerada, temperatura aproximada a 8 grados centígrados, no congelar.
- **Día 1.**
 - Al levantarse descarte la primera orina de la mañana.
 - Anote la hora exacta ejemplo 6:00 a.m.
 - A partir de ese momento debe recoger todas las micciones diurnas y nocturnas sin descartar ningún volumen urinario, recolectar en la botella estéril y refrigerar luego de cada micción.
 - Cierre la recolección al día siguiente por ejemplo a las 6:00 a.m. colocando esa primera orina de la mañana en el recolector.
 - Lleve al laboratorio.

● **MICROALBUMINURIA**

- Tome en cuenta la indicación médica.
- Se valora en orina de 24 horas y/o orina simple.
- Siga las indicaciones de recolección de muestra de: orina de 24 horas y orina simple (uroanálisis).
- Recoja la muestra en un recolector estéril con tapa de rosca y traslade de inmediato al laboratorio.
- Evite el ejercicio físico intenso 24 horas antes de la prueba, ya que puede alterar los resultados.
- Si tiene fiebre o una infección urinaria, avise a su médico, ya que es mejor posponer el examen.
- En el caso de las mujeres, no se debe realizar la recolección durante el período menstrual.

● **RELACIÓN ALBÚMINA/ CREATININA**

- Recolecta la primera orina de la mañana, realizando previo aseo en zona genital con agua y jabón.

- **Mujeres:** Separe los labios vaginales y limpie de adelante hacia atrás, descarte el primer chorro y recoja el chorro medio de la orina. No se debe realizar la recolección durante el período menstrual.
- **Hombres:** Retire la piel del prepucio si no está circuncidado y limpie el glande. Descarte el primer chorro y recoja el chorro medio.
- Utilice un envase estéril de tapa de rosca, tape muy bien para evitar derrames y llévelo de inmediato al laboratorio por un periodo máximo 1 hora.
- **Lactantes:**
 - Uso de bolsa recolectora: Útil para análisis generales de orina, aunque cuenta con un riesgo más elevado de contaminación si se deja puesta demasiado tiempo.
 - Limpie y seque la zona rigurosamente. Retire el protector del adhesivo y fíjese firmemente en la piel.
 - En varones, introduzca el pene por completo en la bolsa.
 - En niñas, asegúrese de cubrir los labios mayores evitando la zona anal.
 - Tiempo límite: revise al niño cada 20 o 30 minutos. Si transcurren más de 30 a 60 minutos sin que el niño orine, retire la bolsa, repita la higiene completa y coloque una bolsa nueva para evitar que proliferen bacterias de la piel.
 - Una vez obtenida la muestra, retíralo con cuidado y colóquela sellada dentro del frasco estéril
- **PROTEINURIA PARCIAL O DE 24 HORAS**
 - Tome en cuenta la indicación médica.
 - Se valora en orina de 24 horas y/o orina simple.
 - Siga las indicaciones de recolección de muestra de: orina de 24 horas y orina simple (uroanálisis).
 - Recoja la muestra en un recolector estéril con tapa de rosca y traslade de inmediato al laboratorio.
 - Evite el ejercicio físico intenso 24 horas antes de la prueba, ya que puede alterar los resultados.
 - Si tiene fiebre o una infección urinaria, avise a su médico, ya que es mejor posponer el examen.
 - En el caso de las mujeres, no se debe realizar la recolección durante el período menstrual.
- **CONCENTRACIONES URINARIAS DE 24 HORAS**
 - Se valora en orina de 24 horas.
 - La muestra debe recolectarse en un periodo de 24 horas cuidando no perder volumen urinario. Debe seguir los siguientes pasos:
 - Debe tener un envase estéril (botella de agua mineral estéril)
 - Tener en cuenta que cada micción debe ser refrigerada, temperatura aproximada a 8 grados centígrados, no congelar.
 - **Día 1.** Al levantarse descarte la primera orina de la mañana.
 - Anote la hora exacta ejemplo 6:00 a.m.
 - A partir de ese momento debe recoger todas las micciones diurnas y nocturnas sin descartar ningún volumen urinario, recolectar en la botella estéril y refrigerar luego de cada micción.

- Cierre la recolección al día siguiente por ejemplo a las 6:00 a.m. colocando esa primera orina de la mañana en el recolector.
- Lleve al laboratorio de inmediato.

RELACIONES URINARIAS ÁCIDO ÚRICO/CREATININA, FÓSFORO/CREATININA,

● **CALCIO/CREATININA (Orina parcial).**

- Se requiere la segunda muestra de la mañana estando en ayunas. En caso que el paciente sea menor a 2 años se puede omitir el ayuno.
- Tenga en cuenta las indicaciones de recolección de orina en pacientes pediátricos, en el caso de uso de bolsa recolectora, la cual debe cambiarse al pasar más de 2 horas.
- El paciente debe mantener su alimentación e hidratación habituales durante los 3 días previos. Sin exceder o disminuir el consumo de carnes o lácteos.
- Puede beber agua libremente antes de la segunda micción sin sobre hidratarse.
- Recoja en un envase estéril la segunda micción y traslade al laboratorio de inmediato.
- La muestra debe ser llevada al laboratorio idealmente dentro de la primera hora posterior a su emisión.

● **Disbiosis**

- No ingerir medicamentos antidiarreicos, bismuto, antiácidos, ni aceites minerales antes de la recolección de la muestra.
- No debe estar recibiendo antibióticos, antimicóticos ni probióticos, ni yogurt. En caso de recibir estos medicamentos debe esperar al menos 15 días para recolectar la muestra.
- Orine primero antes de la recolección de la muestra de heces.
- Emitir las heces en un recipiente limpio y seco (no absorbente), evitando la contaminación con orina, agua del inodoro o papel higiénico.
- Transferir al recolector de heces una porción de la muestra que ocupe aproximadamente 3/4 partes de la capacidad del recipiente, agregando fracciones que presentan moco y/o sangre.
- No se aceptan recipientes que no sean los adecuados para la recolección de este tipo de muestras.
- La muestra debe ser trasladada a temperatura ambiente de inmediato al laboratorio.

● **INMUNOLOGÍA**

- **1. Serología para Virus de Hepatitis A, B o C (VHA, VHB, VHC), Antígeno de superficie de hepatitis B (HbsAg), Anti Core de Hepatitis B.**
 - El paciente debe tener un ayuno de 4 horas o más.
 - Informar cuantos días de síntomas tiene y cuando comenzó el malestar.
 - Informar si le colocaron recientemente algún tipo de vacuna.
 - En el caso del VHC, el paciente debe informar el uso de antivirales de acción directa o terapias inmunomoduladoras.
- **2- PCR cualitativa o semicuantitativa:**

- Informar al laboratorio si ha tenido o tiene algún evento de tipo inflamatorio agudo reciente (ej. traumatismos, procedimientos dentales, infecciones virales) elevan transitoriamente los valores.
- Informar si padece alguna enfermedad de tipo crónica.
- Informar si está embarazada.
- Informar si ha realizado ejercicio intenso las últimas horas.
- **3- ASLO, RATES**
 - No requiere ayuno estricto, aunque se prefiere de 4 a 6 horas.
 - Indicar si el paciente mantiene tratamiento con antibióticos o corticoides, ya que puede disminuir la respuesta inmunológica y falsear los niveles de anticuerpos.
- **4- VDRL**
 - Se recomienda un ayuno de 4 a 8 horas o evitar comidas con alto contenido lipídico antes de la toma de muestra.
 - Se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas al menos 24 horas antes, pues interfiere en la estabilidad lipídica del suero.
 - El paciente no debe suspender su medicación habitual, pero debe informar sobre la toma de antibióticos (como penicilinas, tetraciclinas y macrólidos). Si el paciente está recibiendo tratamiento antibiótico activo, los títulos de anticuerpos no treponémicos pueden descender o dar falsos negativos temporales.
 - Debe indicar Embarazo, vacunaciones recientes, infecciones virales agudas (mononucleosis, malaria, neumonía por Mycoplasma). O si cursa con:
 - Enfermedades autoinmunes (Lupus Eritematoso Sistémico, síndrome antifosfolípido), adicción a drogas por vía parenteral, hepatopatías crónicas o edad avanzada.
- **5- Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH - 1/2) y HIV de 4ta generación.**
 - El paciente debe tener un ayuno de 4 horas o más.
- **6- Anticuerpos para COVID**
 - El paciente debe tener un ayuno de 4 horas o más.
- **7- Anticuerpos Anti-Treponema pallidum**
 - No requiere ayuno, sin embargo, se recomienda un ayuno leve (mayor a 2 horas).
- **8- Virus del Dengue (NS1, IgM, IgG)**
 - El paciente debe tener un ayuno de 4 horas o más.
 - Es importante indicar el día del inicio de los síntomas. Días 1 a 5 tras inicio de fiebre: El examen indicado es el Antígeno NS1. Del día 6 en adelante: Se realiza la detección de anticuerpos Ig M e Ig G.
 - o Debe indicar si antecedentes de vacunación contra la fiebre amarilla o infecciones previas por otros flavivirus (Zika, Fiebre Amarilla) recientes.
- **9- Prueba de Embarazo (hCG CUALITATIVA en Sangre u Orina)**
 - En suero: No indispensable un ayuno. Indicar la fecha de la última menstruación.
 - **En Orina:**

- Utilizar la primera orina de la mañana (contiene la mayor concentración de la hormona hCG por retención nocturna).
- Evitar la ingesta masiva de líquidos 2 horas antes de la recolección para no diluir la orina y causar falsos negativos en fases tempranas de la gestación.
- Indicar la fecha de la última menstruación.

DETECCIÓN DE ANTICUERPOS

- **Virus de Epstein-Barr (VEB) y Citomegalovirus (CMV)**
 - El paciente debe tener un ayuno de 4 horas o más.
 - Informar los días con sintomatología.
- **Toxoplasma gondii**
 - El paciente debe tener un ayuno de 4 horas o más.
 - En el caso de mujeres debe indicar si está embarazada y el periodo de gestación.
 - Es importante mencionar si mantiene contacto permanente con animales.
- **Chlamydia spp. y Mycoplasma spp.**
 - El paciente debe tener un ayuno de 4 horas o más.
 - No requiere preparación física especial.
 - Mencionar si tiene tratamiento con altas dosis de Biotina.
- **Helicobacter pylori**
 - El paciente debe tener un ayuno de 4 horas o más.

INMUNOGLOBULINAS

- **IgE Total:**
 - El paciente debe tener un ayuno de 4 horas o más.
 - Informar si el paciente está bajo tratamiento con corticosteroides o inmunosupresores a dosis altas.

OTROS

- **Procalcitonina (PCT)**
 - No requiere ayuno estricto, aunque se prefiere de 4 a 6 horas. Sin embargo, la recolección suele ser de urgencia o prioritaria sin restricción de horario.
 - Indicar si el paciente ha recibido terapia con anticuerpos monoclonales, politraumatismos recientes, quemaduras graves o cirugías mayores dentro de las
 - 48 horas previas (condiciones que pueden inducir elevaciones no infecciosas de la procalcitonina).
- **Panel Respiratorio por Inmunocromatografía (VSR, Mycoplasma pneumoniae, Influenza A/B, Adenovirus)**
 - Este estudio no utiliza muestras sanguíneas ni requiere ayuno, sino la recolección de muestra es un hisopado nasal.
 - El paciente no debe realizarse lavados nasales, aplicar sprays/gotas nasales, ni utilizar soluciones antisépticas o colutorios bucales al menos 4 horas antes de la toma de muestra.

- Debe realizarse preferiblemente durante los primeros 3 a 5 días del inicio de los síntomas agudos.
- **Anticuerpos Sars-cov 2**
 - El paciente debe tener un ayuno de 4 horas o más.
 - Es importante indicar el día del inicio de los síntomas.
- **Gases venosos post-prandial**
 - La muestra se recolecta 1 hora posterior al desayuno, 20 minutos antes de la hora de recolección el paciente debe estar en el laboratorio.
 - Si el tiempo de recolección de la muestra no es de 1 hora debe ser indicado por el médico con su respectiva orden.
- **Gases venosos**
 - No requiere ayuno estricto. Se hace la recolección de la muestra de acuerdo a las indicaciones médicas.
- **Hemoglobina Glicada (HbA1)**
 - No requiere ayuno.
 - Informar sobre cuadros de anemia hemolítica, pérdidas agudas de sangre o transfusiones recientes (reducen o alteran falsamente la HbA1).
 - Informar si consume dosis elevadas de Vitamina C o E de forma crónica.
- **Antígenos Febriles (Tífico, Paratífico, Brucella, Rickettsia)**
 - Ayuno estándar de 8 a 12 horas.
 - Preferiblemente tomar la muestra antes del inicio de la terapia antimicrobiana.
 - Se debe indicar el día exacto de inicio de la fiebre (fase aguda o convaleciente)
- **Capa Blanca para Ehrlichia**
 - No requiere de ayuno.
 - Se recomienda que la recolección debe realizarse en la fase febril aguda de la enfermedad.
- **Gota Gruesa (Diagnóstico de Malaria / Hemoparásitos)**
 - No requiere ayuno.
 - La muestra ideal se toma durante el pico febril o justo después de este (máxima parasitemia en sangre periférica).
 - Debe recolectarse antes de iniciar el tratamiento antimalárico. Si el paciente ya consume antipalúdicos, debe indicarse en la boleta médica.
- **Ácido Fólico (Folato Sérico / Eritrocitario)**
 - Requiere de un ayuno de 8 a 12 horas.
 - Prohibición absoluta de consumo de alcohol durante las 24 horas previas a la prueba (el alcohol interfiere con los niveles de folato).
 - Suspender suplementos multivitamínicos o de ácido fólico al menos 24 horas antes (salvo indicación médica contraria). Informar el uso de antifolatos (como metotrexato o trimetoprima).

- **Anti-CCP (Anticuerpos Anti-Péptidos Cíclicos Citrulinados)**
 - Ayuno mínimo de 4 a 8 horas.
 - Suspender la toma de altas dosis de Biotina (Vitamina B7/B8) por lo menos 48 horas antes de la extracción si el laboratorio depende de la técnica utilizada por el laboratorio.
- **Vitamina B12 (Cobalamina)**
 - Se requiere de un ayuno de 8 a 12 horas.
 - Omitir suplementos de complejo B o vitamina B12 por lo menos 48 a 72 horas antes de la toma.
 - Reportar uso crónico de metformina, inhibidores de la bomba de protones (omeprazol) o antagonistas H2.
- **Vitamina D (25-OH Vitamina D)**
 - Se requiere de un ayuno de 8 horas o más.
 - Se aconseja tomar la muestra antes de la dosis diaria de suplementos de vitamina D o suspenderlos el día de la extracción (a menos que el médico evalúe el cumplimiento terapéutico inmediato).

CONDICIONES PARA LOS MARCADORES TUMORALES

- **PSA Total y Libre (Antígeno Prostático Específico)**
 - Ayuno moderado de 8 a 12 horas (mínimo 4 horas)
 - Abstenerse de actividad sexual/eyaculación durante al menos 48 horas previas a la toma de muestra.
 - Tomar la muestra antes del examen rectal o esperar al menos 48 a 72 horas posteriores.
 - Evitar montar en bicicleta o caballo o realizar ejercicio intenso durante las 48 horas previas.
 - En caso de haberse realizado una Cistoscopia o sondaje vesical debe esperar 1 a 2 semanas.
 - En caso de haberse realizado una biopsia prostática o RTUP (Resección Transuretral) debe esperar 4 a 6 semanas antes de realizar el estudio.
- **Beta-HCG Cuantitativa (Gonadotropina Coriónica Humana)**
 - Requiere de un ayuno de 4 h o más.
 - En el caso de las mujeres indicar cuándo fue la fecha de la última menstruación.
- **Alfafetoproteína (AFP)**
 - Requiere de un ayuno de 4 h o más.
 - Si la indicación es tamizaje prenatal, es obligatorio registrar con exactitud la edad gestacional (semanas/días por ecografía), peso de la madre, presencia de diabetes materna y hábitos tabáquicos.
- **Antígeno Carcinoembrionario (CEA)**
 - Requiere de un ayuno de 4 h o más.
 - Debe documentarse explícitamente en la solicitud si el paciente es fumador activo.

- **CA-125 (Antígeno de Cáncer 125)**
 - Requiere de un ayuno de 8 a 12 horas.
 - Evitar realizar la extracción durante la menstruación. Se recomienda tomar la muestra al menos 5 días después de finalizado el sangrado.
 - Indicar si está embarazada (tiempo de gestación), presencia de endometriosis, miomatosis o ascitis, ya que elevan el marcador.
- **CA 15-3 (Antígeno de Cáncer 15-3)**
 - Requiere de un ayuno de 8 a 12 horas.
 - Indicar si presenta patologías hepáticas benignas (p. ej., hepatitis o cirrosis)
- **CA 19-9 (Antígeno Carbohidrato 19-9)**
 - Requiere de un ayuno de 8 a 12 horas.
- **Líquido Cefalorraquídeo (LCR)**
 - La recolección se realiza exclusivamente mediante procedimientos médicos invasivos (punciones)
 - No se requiere un ayuno prolongado para el estudio citoquímico general, pero se recomienda un ayuno de 2 a 4 horas únicamente para estabilizar la glicemia sistémica previa al cálculo de la relación glucosa LCR/plasma.
 - Recolección secuencial en tubos estériles sin aditivos (Tubo 1: Química/Inmunología,
 - Tubo 2: Microbiología, Tubo 3: Hematología/Recuento celular). Nota: Para análisis citoquímico, la celularidad se procesa prioritariamente del último tubo para descartar la contaminación con sangre periférica (punción traumática).
 - El traslado debe realizarse de inmediato al laboratorio (máximo 30-60 minutos tras la extracción) a temperatura ambiente (20-25°C).
- **Líquido Pleural**
 - La recolección se realiza exclusivamente mediante procedimientos médicos invasivos (punciones).
 - No se requiere ayuno estricto (a menos que se sospeche quilotorax y se solicite perfil lipídico/triglicéridos, en cuyo caso se sugieren 8 horas de ayuno).
 - La muestra de líquido pleural debe servirse en 3 tubos totalmente estériles:
 - Sin anticoagulante para estudio microbiológico.
 - Con anticoagulante EDTA para el conteo celular.
 - Sin anticoagulante estudio bioquímico.
 - De no ser posible debe venir en una jeringa con su capuchón (cubierta protectora de plástico que protege la aguja y mantiene su esterilidad)
 - La muestra de líquido pleural debe venir acompañada de una muestra sanguínea con la finalidad de establecer los criterios propios de diagnóstico. La muestra sanguínea debe tomarse al mismo tiempo que se realiza la toracocentesis.
 - El traslado debe realizarse de inmediato al laboratorio (máximo 30-60 minutos tras la extracción) a temperatura ambiente (20-25°C).

- **Líquido Sinovial**

- Ayuno de 4 a 8 horas previo a la artrocentesis únicamente si se requiere medir glucosa en líquido sinovial, para permitir la equilibración de la glucosa entre el suero y la cavidad articular.
- La recolección se realiza exclusivamente mediante procedimientos médicos invasivos (punciones)
- **Muestra debe ser fraccionada en:**
 - Tubo con anticoagulante (EDTA o heparina sódica)
 - Tubo seco para estudio citológico.
- De no ser posible debe venir en una jeringa con su capuchón (cubierta protectora de plástico que protege la aguja y mantiene su esterilidad).
- Debe acompañarse de una toma simultánea de sangre venosa (en un lapso máximo de 30 a 60 minutos) para calcular los gradientes/coeficientes de glucosa, proteínas y LDH (Criterios de Light, índice glucémico LCR/plasma, etc.).
- El traslado debe realizarse de inmediato al laboratorio (máximo 30-60 minutos tras la extracción) a temperatura ambiente (20-25°C).

- **Líquido Ascítico (Peritoneal)**

- No requiere ayuno.
- La recolección se realiza exclusivamente mediante procedimientos médicos invasivos (punciones)
- La muestra de líquido ascítico debe servirse en 3 tubos totalmente estériles:
 - Sin anticoagulante para estudio microbiológico.
 - Con anticoagulante EDTA para el conteo celular.
 - Sin anticoagulante estudio bioquímico.
- De no ser posible debe venir en una jeringa con su capuchón (cubierta protectora de plástico que protege la aguja y mantiene su esterilidad).
- La muestra de líquido ascítico debe venir acompañada de una muestra sanguínea con la finalidad de establecer los criterios propios de diagnóstico. La muestra sanguínea debe tomarse al mismo tiempo que se realiza la paracentesis.
- El traslado debe realizarse de inmediato al laboratorio (máximo 30-60 minutos tras la extracción) a temperatura ambiente (20-25°C).

- **Líquido Pericárdico**

- Ayuno absoluto de 4 a 6 horas previo al procedimiento cuando se realiza de forma programada (debido al riesgo de complicaciones mecánicas, sedación o necesidad de intervención quirúrgica de emergencia). En emergencias por taponamiento cardíaco, el ayuno se omite.
- La recolección se realiza exclusivamente mediante procedimientos médicos invasivos.
- La muestra de líquido ascítico debe servirse en 3 tubos totalmente estériles:
 - Sin anticoagulante para estudio microbiológico.
 - Con anticoagulante EDTA para el conteo celular.
 - Sin anticoagulante estudio bioquímico.
- De no ser posible debe venir en una jeringa con su capuchón (cubierta protectora de plástico que protege la aguja y mantiene su esterilidad).

- La muestra de líquido pericárdico debe venir acompañada de una muestra sanguínea con la finalidad de establecer los criterios propios de diagnóstico. La muestra sanguínea debe tomarse al mismo tiempo que se realiza la paracentesis.
- El traslado debe realizarse de inmediato al laboratorio (máximo 30-60 minutos tras la extracción) a temperatura ambiente (20-25°C).

- **Espermocultivo (Prueba de los 4 vasos)**

- La muestra ideal es sin recibir antibióticos de 7 a 14 días antes del procedimiento, en caso de estarlo recibiendo se realiza de acuerdo a la indicación médica.
- Debe tener una abstinencia sexual de 2 a 3 días previos al examen.
- La retención urinaria ideal es la de toda la noche, en caso de no ser posible debe ser estricta de 4 horas antes de la prueba.
- **Debe realizarse higiene genital de la siguiente manera:**
 - Lavado profiláctico de manos con agua y jabón neutro.
 - Higiene de la zona genital con retraction total del prepucio, lavando el glande y el meato urinario únicamente con agua y jabón.
 - Enjuagado abundante con agua y secado empleando gasa estéril o toalla limpia descartable.
 - (Evitar el uso de antisépticos, lociones o geles).
 - Debe proveer tener 4 recolectores de orina estériles de los adquiridos en la farmacia, los cuales deberá numerar como 1, 2, 3 y 4.
 - En el frasco 1: El paciente inicia la micción y recolecta únicamente la primera fracción de la orina.
 - En el frasco 2: Recolecta la 2da fracción de la orina.
 - En el frasco 3: Recolecta la muestra de semen de la siguiente manera:
 - La muestra debe obtenerse exclusivamente por masturbación en un recipiente de plástico de boca ancha, estéril y con tapa de rosca.
 - No se debe recolectar la muestra mediante el coito interrumpido ni emplear preservativos comerciales estándar (los espermicidas o lubricantes alteran la muestra).
 - Depositar la totalidad del eyaculado dentro del frasco estéril sin tocar las paredes internas ni la tapa.
 - En el frasco 4: el paciente emite orina nuevamente y recoge los primeros mL de la muestra.
 - Las muestras de orina deben trasladarse en hielo y la muestra de semen a temperatura ambiente (20-25 °C) lo antes posible al laboratorio.

- **Condiciones para estudios microbiológicos**

- La muestra debe obtenerse antes de iniciar la terapia antibiótica y antifúngica, o 48 a 72 horas, luego de finalizado el tratamiento (salvo indicación médica contraria en este caso indicar el o los antibiótico(s) que está recibiendo).
- 2. Debe haber una correspondencia inequívoca entre la muestra y la solicitud realizada por el médico tratante.

#LISTA DE EXÁMENES CONVENIO TORRE CARACAS -GONZALEZ PRATO

Todos los exámenes acá listados cuando se haga la solicitud debe remitirse a la secretaría con la siguiente explicación: Estos exámenes son remitidos a un laboratorio en Caracas, por lo tanto, González Prato Laboratorio actúa como enlace para la recolección y envío de las muestras. En consecuencia, el resultado llega vía correo electrónico y se le remite al paciente usando esa misma modalidad, sin ningún tipo de modificaciones. Si acepta esta modalidad en el servicio, en breves momentos la secretaría procederá a enviar el presupuesto.

Los exámenes listados son:

- RAST 120 ALIMENTOS (IgE)
- RAST 20 ALIMENTOS (IgE)
- RAST 60 ALIMENTOS (IgE)
- RAST 90 ALIMENTOS (IgE)
- RAST ALIM. e INHAL.COMPLETO (IgE)
- RAST ALIMENTOS COMPLETO (IgE)
- RAST ALIM-INH. 58 ALERG. (IgE)
- PERFIL CELIACO (PAUTA MUNDIAL)
- PERFIL CELIACO (CON GENETICA)
- HARINA DE TRIGO IgE
- HARINA DE TRIGO IgG
- GLUTEN IgE
- GLUTEN IgG
- GLUTEN IgG4
- AC.ANTI-GLIADINA (IgA)
- AC.ANTI-GLIADINA (IgG)
- AC.ANTI-GLIADINA DEAMINADA (IgA)
- AC.ANTI-GLIADINA DEAMINADA (IgG)
- TEST GENETICO PARA GLUTEN
- ANTI-TRANSGLUTAMINASA (IgA)
- ACIDO LACTICO
- AC.ANTI-BABESIA (IgM)
- AC.ANTI-BABESIA (IgG)
- Zonulina (Heces)
- Panel alimento básicos
- SEROLOGIA DE HONGOS
- AC.ANTI-RICKETTSIA SUERO (IgM-IgG)
- AC. BORRELIA BURGDORFERI (LYME)
- PCR ERLICHIA
- Homocisteína
- IgA Secretora en saliva
- AC ANTI-RICKETTSIA Y ANAPLASMA
- TRIGO Ig E
- CASEINA IgE
- CASEINA IgG
- CASEINA IgG4
- LECHE DE VACA IgE
- LECHE DE VACA IgG

- LECHE DE VACA IgG4
- LECHE DE BUFALA IgE
- LECHE DE CABRA IgE
- LECHE DE OVEJA IgE
- LECHE DE SOYA IgE
- HUEVO y COMPONENTES IgE
- HUEVO y COMPONENTES IgG
- HUEVO Y COMPONENTES IgG4
- YEMA DE HUEVO
- Rast insectos y venenos Ig E
- Panel de agentes químicos
- Rast inhalantes completos Ig E
- Sibclase Ig G1
- Sibclase Ig G2
- Sibclase Ig G3
- Sibclase Ig G4
- Ig A
- Ig G
- Ig M
- ACIDO VALPROICO IgE
- (DROG.TERAP.) ACIDO VALPROICO
- AC.ANTI-EHRLICHIA IgM e IgG
- AC.ANTI-ENT.HISTOLYTICA SUERO (IgG)
- AC.ANTI-ENT.HISTOLITICA SUERO (IgM)
- MEZCLA DE ACAROS IgE
- MEZCLA DE ACAROS IgG
- Panel Inhalantes básicos IgG

Preguntas frecuentes

- **¿Requiere cita previa o la atención es por orden de llegada?**
 - La atención es por orden de llegada. Para estudios micológicos y demodex es por previa cita
- **¿Cuáles son los horarios de atención para la toma de muestras?**
 - Nuestra atención es de lunes a viernes a partir de las 7:00 a.m. y los sábados a partir de las 8:00 a.m., sin embargo, algunos exámenes requieren de ciertas condiciones y horarios específicos, por lo cual deberá indicarnos el tipo de examen se va a realizar.
- **¿Ofrecen servicio de toma de muestras a domicilio y qué costo adicional tiene?**
 - Se lo podemos ofrecer los días lunes, martes y jueves. Si el domicilio es en el municipio Libertador no tiene costo adicional. En caso que sea para un centro de salud, el familiar del paciente debe buscar a la asistente de laboratorio y acompañarla al mismo, ya que dichos centros tienen restricciones en el ingreso de personal externo a la institución. Para mayor información le contactaremos con nuestra secretaria.
- **¿Cuánto tiempo tardan en entregar los resultados?**
 - Los exámenes de rutina, hormonas y serología se entregan el mismo día, salvo alguna eventualidad mayor. Los cultivos bacteriológicos dependen del

tipo de cultivo mínimo 3 días y máximo 8 días. Para otro tipo de análisis le contactaremos con nuestra secretaria.

- **¿Aceptan mi seguro médico / póliza de salud y qué documentos debo presentar (orden médica, autorización, cédula)?**
 - No tenemos convenios directos con seguros. En este caso el paciente efectúa el pago y pide reembolso al seguro.
- **¿Hasta qué hora reciben las muestras de heces?**
 - Hasta las 2:30 p.m. (Lunes a Viernes) y el sábado hasta las 12:30 p.m.
- **¿Me podría decir cómo salieron los exámenes?**
 - No estamos autorizados para valorar o interpretar los resultados, debe enviarlos al médico para que le indique el diagnóstico.
- **¿A qué hora salen mis resultados o ya están listos mis resultados?**
 - En el momento que estén listos usted recibirá una notificación por WhatsApp con el link y el documento en PDF. Es importante que no tenga activado los mensajes temporales, debido a que el sistema no efectúa dicha notificación.
- **No he recibido mis resultados**
 - Por favor, envíe el número de cédula del paciente o en caso de ser de un menor de edad sin este documento el número del padre, madre o representante. A la brevedad posible nuestra secretaria le informará.
- **Perdí mis resultados, ¿Me los pueden enviar nuevamente?**
 - Por favor, envíe el número de cédula del paciente o en caso de ser de un menor de edad sin este documento el número del padre, madre o representante. A la brevedad posible nuestra secretaria se los enviará.
- **¿Cuál es la dirección o dónde están ubicados?**
 - Urbanización El Encanto, clínica del Niño, sótano 2. Detrás de la Contraloría del Estado Mérida. También puedes ubicarnos por Google Maps.
- **¿Puedo hablar con alguna de las licenciadas?**
 - En un momento le atenderemos.
- **¿Me puede dar una cita con médicos especialistas?**
 - Se ha comunicado con un laboratorio. Debe contactar el número de la Clínica.
- **¿Cuáles formas de pagos tienen?**
 - Punto de venta, transferencia, efectivo.
- **¿Entregan los resultados en físico?**
 - Si, puede pasar por nuestra sede y se le imprime en el momento.
- **¿Tienen otra sede?**
 - No, solo estamos ubicados en la urbanización el Encanto, Clínica del Niño, Sótano 2, detrás de las Contraloría del Estado Mérida.
- **¿Este es el número de la clínica del Niño?**
 - No, es González Prato Laboratorio
- **¿Realizan ultrasonidos, biopsias, ecografías, electroencefalogramas, radiografías?**
 - No, somos un laboratorio clínico.