ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN MOTRICIDAD OROFACIAL
FLGO. FELIPE INOSTROZA ALLENDE

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN

EVALUACIÓN MIOFUNCIONAL OROFACIAL – PROTOCOLO MBGR.

Genaro KF, Berretin-Felix G, Rehder MIBC, Marchesan IQ.
Evaluación Miofuncional Orofacial – Protocolo MBGR. Rev. CEFAC 2009; 11(2):237-255.
Traducido al español por Rivera E, Henao J, Susanibar F. Adaptado por el Flgo. Felipe Inostroza Allende.

Nombre: _____ N°_____
Fecha de examen: ____/____/____ Edad: ____ años y ____ meses. F.N: ____/____/____

I. MEDIDAS FACIALES, MOVIMIENTOS MANDIBULARES Y OCLUSIÓN.

Medidas Faciales *(mantener los labios en contacto, tomar cada medida 3 veces con calibrador de vernier y calcular la media)*

	1ª medida (mm)	2ª medida (mm)	3ª medida (mm)	Media (mm)
A. Tercio medio de la cara *(glabela a subnasal)*				
B. Tercio inferior de la cara *(subnasal a mentón)*				
C. Altura de la cara *(glabela a mentón)*				
D. Ancho de la cara *(prominencia de los arcos cigomáticos)*				
E. Canto externo de ojo derecho a comisura de labio derecho				
F. Canto externo de ojo izquierdo a comisura de labio izquierdo				
G. Labio superior *(subnasal al punto más inferior del labio superior)*				
H. Labio inferior (del punto más superior del labio inf. al mentón)				

Observaciones:

Movimientos Mandibulares y Oclusión *(usar calibrador de vernier y lápiz de anilina, tomar cada medida tres veces y calcula la media).*

	1ª medida (mm)	2ª medida (mm)	3ª medida (mm)	Media (mm)
A. Entrecruzamiento vertical EV – Overbite				
B. Entrecruzamiento horizontal EH – Overjet				
C. Lateralidad mandibular derecha				
D. Lateralidad mandibular izquierda				
E. Distancia interincisal máxima activa – DIMA				
F. Abertura de boca (DIMA + Overbite)				
G. DIMA con el ápice tocando la región alveolar (DIMALA)				
H. Calcular: DIMALA x 100 / DIMA				

Observaciones:

II. EXAMEN EXTRAORAL [ ] Sumar puntajes de rostro, labios y maseteros (mejor resultado = 0 y peor = 28)

ROSTRO [ ] Sumar los puntos obtenidos en norma frontal y lateral (mejor resultado = 0 y peor = 16)

Plano Frontal: **[ ]** Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 4)

Tipo facial			
Comparar altura (A) con ancho (An):	(0) medio (A semejante a An)	(1) largo (A>An)	(2) corto (A<An)
Proporción facial			
Comparar tercio medio con inferior:	(0) semejantes	(1) tercio inf. mayor	(1) tercio inf. menor
Comparar canto externo del ojo a la comisura labial D e I:		(0) semejantes	(1) asimétrica

Norma Frontal: **[ ]** Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 10)

	Simétrico	Asimétrico	Describir
Plano infra-orbitario	(0)	(1)	
Región cigomática	(0)	(1)	
Alas de la nariz	(0)	(1)	
Mejillas	(0)	(1)	
Surco nasolabial	(0)	(1)	
Labio superior	(0)	(1)	
Comisura labial	(0)	(1)	
Labio inferior	(0)	(1)	
Mentón	(0)	(1)	
Mandíbula (cuerpo y ramas)	(0)	(1)	

Plano Lateral: **[ ]** Sumar todos los puntos (mejor resultado 0 = y peor = 2)

Patrón facial	(0) Patrón I (recto)	(1) Patrón II (convexo)	(1) Patón III (cóncavo)
Ángulo nasolabial	(0) próximo a 90° - 110°	(1) agudo (<90°)	(1) obtuso (>110°)

Observaciones:_____

LABIOS [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 10)

Postura habitual	(0) cerrados (2) entreabiertos	(1) cerrados con tensión (2) cerrados en contacto dentario	(2) abiertos y cerrados (3) abiertos
Forma -Superior -Inferior	(0) normal (0) normal	(1) en asa de gaviota (1) con eversión discreta	(2) fisurado _____ (2) con eversión acentuada
Longitud labio superior	(0) cubre $^2/_3$ de los incisivos	(1) cubre más de $^2/_3$	(1) cubre menos de $^2/_3$
Mucosa externa	(0) normal (1) con saliva	(1) reseca	(2) herida

Observaciones:_____

MASETERO [ ] (mejor resultado = 0 y peor = 2) Se debe evaluar mediante observación y palpación

En reposo	(0) relajado	(1) contraído (apretamiento dentario)	
Reclutamiento en la contracción isométrica	(0) simultáneo	(1) primero lado D	(1) primero lado I

Observaciones:_____

III. EXAMEN INTRAORAL [ ] Sumar puntajes de labios, lengua, mejillas, paladar, tonsilas, dientes y oclusión (mejor resultado = 0 y peor = 58)

LÁBIOS [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 5)

Mucosa interna	(0) normal	(1) con marcas dentarias		(2) heridas
Frenillo superior	Fijación en el borde alveolar:	(0) adecuada	(1) baja	(2) diastema
	Espesura: (0) adecuada	(1) alterada *(describir):*_____		

Observaciones:_____

PALADAR [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 8)

Paladar duro	profundidad:	(0) normal	(1) reducida (bajo)	(2) aumentado (alto)
	ancho:	(0) normal	(1) aumentado (ancho)	(2) reducido (estrecho)
Velo palatino	simetría:	(0) presente	(1) ausente	
	extensión:	(0) adecuada	(1) largo	(2) corto
Úvula	(0) normal	(1) alterada *(describir):* _____		

Observaciones:_____

MEJILLAS [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 8)

Mucosa	(0) normal	(1) marca dentaria o de aparato D	(1) línea alba D	(2) herida D
		(1) marca dentaria o de aparato I	(1) línea alba I	(2) herida I

Observaciones:_____

TONSILAS PALATINAS [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 4)

Presencia	( ) presentes		( ) removidas		( ) no observadas
Grado (Brodsky, 1989)	(0) Amígdalas cubiertas por el pilar anterior	(1) Menos del 25%	(2) Entre un 25 y 50% de obstrucción	(3) Entre un 50 y 75% de obstrucción	(4) El espacio ocupado es mayor al 75%
Tamaño	(0) normal	(1) hipertrofia D		(1) hipertrofia I	
Coloración	(0) normal	(1) hiperemia D		(1) hiperemia I	

Observaciones:_____

TEST DE MALLAMPATI (Samsoon e Young, 1987)

Clasificación	( ) Clase I *(paladar blando, úvula y pilares visibles)*	( ) Clase III *(paladar blando y base de la úvula visibles)*
	( ) Clase II *(paladar blando y úvula visibles)*	( ) Clase IV *(paladar blando no observable)*

Observaciones:_____

LENGUA [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 20)

Posición habitual	[ ] no observable	(1) en el piso	(1) punta baja y dorso alto	(1) interdental
Simetría	(0) si	(1) no *(describir)*: _____		
Ancho	(0) adecuado	(1) disminuido	(2) aumentado	
Altura	(0) adecuada	(1) aumentada		
Mucosa	(0) normal	(1) geográfica	(1) fisurada	(2) heridas
	(1) marcas de dientes _____		(1) marcas de aparato _____	

Observaciones:_____

FRENILLO LINGUAL - Examen anatómico [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado= 0 y peor resultado= 18)

1. Lengua elevada dentro de la boca sin tocar el paladar:

1.1 redondeada	(0)
1.2 punta rectangular o cuadrada	(1)
1.3 pequeña hendidura en la punta	(2)
1.4 forma de corazón	(4)
1.5 no se eleva	(4)

Cara ventral de lengua:

2. Fijación del frenillo:		**3. Forma del frenillo:**	
2.1 tercio medio (A)	(0)	3.1 puntiforme	(0)
2.2 tercio inferior (B)	(1)	3.2 en abanico	(1)
2.3 tercio superior (C)	(4)	3.3 sumergido	(2)
2.4 ápice (D)	(4)	3.4 fibrosis	(1)

Piso de la boca

4. Fijación del frenillo:		**5. Forma del frenillo:**	
4.1 carúnculas sublinguales (E)	(0)	5.1 puntiforme	(0)
4.2 cresta alveolar inferior (F)	(1)	5.2 en abanico	(1)
4.3 periodontal (G)	(2)	5.3 fibrosis	(1)


6. Espesor del frenillo:	6.1 normal	(0)
	6.2 hipertrófico	(2)

7. Anatomía maxilar:

7.1 paladar normal	[ ]
7.2 paladar alto	[ ]
7.3 paladar estrecho	[ ]
7.4 rugas palatinas gruesas	[ ]

8. Relación periodontal:

8.1 sin relación con piezas dentarias	[ ]
8.2 recesión gingival**	[ ]
8.3 diastema inter-incisivos**	[ ]





Marcar:

puntiforme
normal
sumergido
en abanico
hipertrófico
fibrosis

Observaciones:_____

DIENTES [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 5)

Dentadura	( ) decidua	( ) mixta	( ) permanente	
N° de dientes	superior D _____	superior I _____	inferior D _____	inferior I _____
Ausencia de dientes	(0) no	(1) si *(elementos)* _____		
Salud oral	dientes: (0) buena	(1) regular	(2) mala	
	encías: (0) buena	(1) regular	(2) mala	
Uso de prótesis	( ) no	( ) removible	( ) fija	( ) parcial ( ) total

Observaciones:_____

OCLUSIÓN [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 13)

Línea media	(0) adecuada	(1) desviada D	(1) desviada I	
Clasificación de Angle	lado D: (0) clase I	(1) clase II div. 1ª	(1) clase II div. 2ª	(2) clase III
	lado I: (0) clase I	(1) clase II div. 1ª	(1) clase II div. 2ª	(2) clase III
Guía de desoclusión	(0) presente	(1) ausente D	(1) ausente I	
Relación sagital	(0) adecuada *(EH = 1 a 3mm)*	(1) bis a bis *(EH = 0mm)*	(1) resalte acentuado *(EH > 3mm)*	(1) mordida cruzada ant *(EH < 0mm)*
Relación vertical	(0) adecuada *(EV = 1- 3mm)*	(1) sobremordida *(EV > 3 mm)*	(1) mordida abierta post D	
	(1) mordida bis a bis *(EV = 0 mm)*	(1) mordida abierta ant *(EV < 0 mm)*	(1) mordida abierta post I	
Relación transversal	(0) adecuada	(1) mordida cruzada post D	(1) mordida cruzada post I	
Uso de aparato	( ) no	( ) móvil	( ) fijo	

Observaciones:_____

IV. MOVILIDAD [ ] Sumar puntajes de mandíbula, labios, lengua y velo del paladar (mejor resultado = 0 y peor = 65)

LABIOS [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 24) *Realizar con dientes ocluidos

	Adecuada	Alteración discreta	Alteración grave	No realiza
protrusión cerrados *	(0)	(1)	(2)	(3)
retracción cerrados*	(0)	(1)	(2)	(3)
protrusión abiertos *	(0)	(1)	(2)	(3)
retracción abiertos *	(0)	(1)	(2)	(3)
protrusión cerrados hacia la D*	(0)	(1)	(2)	(3)
protruir cerrados hacia la I*	(0)	(1)	(2)	(3)
estallar protruidos	(0)	(1)	(2)	(3)
estallar retraídos	(0)	(1)	(2)	(3)

Observaciones:_____

LENGUA [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 24)

	Adecuada	Alteración discreta	Alteración grave	No realiza
protruir	(0)	(1)	(2)	(3)
tocar comisuras alternadamente	(0)	(1)	(2)	(3)
tocar con ápice la región alveolar	(0)	(1)	(2)	(3)
tocar con el ápice la mejilla D	(0)	(1)	(2)	(3)
tocar con el ápice la mejilla I	(0)	(1)	(2)	(3)
chasquido con el ápice	(0)	(1)	(2)	(3)
succionar lengua contra el paladar	(0)	(1)	(2)	(3)
vibrar	(0)	(1)	(2)	(3)

Observaciones:_____

PALADAR BLANDO [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 4)

	Adecuada	Reducida	Ausente
emitir "a" repetidamente	(0) D (0) I	(1) D (1) I	(2) D (2) I

Observaciones:_____

MANDÍBULA [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 13)

	Adecuada	Reducida	Aumentada	No realiza	Con desvío	Con ruido	Con dolor
abertura de boca	(0)	(1)	(1)	(2)	(1) D (1) I	(1)	(1)

			Valores esperados: niños= 35 a 50 mm / adulto= 40 a 55 mm				
cierre de la boca	(0)	-	-	-	(1) D	(1) I	(1)	(1)
lateralizar a D	(0)	(1)	(1)	(2)	-		(1)	(1)
lateralizar a I	(0)	(1)	(1)	(2)	-		(1)	(1)
			Valores esperados: niños= 6 a 10 mm / adulto= 8 a 12 mm				

Observaciones:_____

V. FUNCIÓN MUSCULAR [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 6) *Efectuar observación visual y palpación*

	Normal	**Disminuido**	**Aumentado**
labio superior	(0)	(1)	(1)
labio inferior	(0)	(1)	(1)
mentón	(0)	(1)	(1)
lengua	(0)	(1)	(1)
mejilla derecha	(0)	(1)	(1)
mejilla izquierda	(0)	(1)	(1)

Observaciones:_____

VI. FUNCIONES OROFACIALES [ ] Sumar puntos de masticación, respiración, deglución y habla (mejor = 0 y peor = 135)

RESPIRACIÓN [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 5)

Tipo	(0) medio/inferior	(1) medio/superior	(1) otro *(describir)*:_____
Modo	(0) nasal	(1) oronasal	(2) oral
Posibilidad de uso nasal	(0) dos minutos o más	(1) entre uno y dos minutos	(2) menos de un minuto

Prueba terapéutica

Flujo nasal *(usar espejo)*	al llegar:	( ) simetría	( ) asimetría leve	( ) asimetría acentuada
	después de higienizar:	( ) simetría	( ) asimetría leve	( ) asimetría acentuada

Observaciones:_____

MASTICACIÓN [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 10)

Incisión	(0) anterior	(1) lateral	(1) otra _____	
Trituración	(0) dientes posteriores	(1) dientes anteriores	(1) con la lengua	
	(0) eficiente	(1) ineficiente		
Número de ciclos	**1° porción**	**2° porción**	**3° porción**	**Promedio (%)**
derecha:	_____	_____	_____	_____(%)
izquierda:	_____	_____	_____	_____(%)
derecha/izquierda:	_____	_____	_____	_____(%)

total:	_____	_____	_____ _____(%)
Patrón masticatorio	(0) bilateral alternado (50% – 65%) (0) unilateral preferencial (66%– 74%)_____	(1) bilateral simultáneo (>65%) (2) unilateral crónico (≥75)_____	
Cierre labial	(0) sistemático	(1) asistemático	(2) ausente
Masticación ruidosa	(0) no	(1) si	
Contracciones musculares inhabituales	(0) ausente	(1) presentes	
Tiempo masticatorio 1° porción: _____ seg.	2° porción: _____ seg.	3° porción: _____ seg.	Media: _____ seg.
Velocidad	(0) adecuada	(1) aumentada	(1) disminuida

Observaciones:_____

DEGLUCIÓN [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 39)

Deglución habitual *(sólido)* [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 15)

Postura de labios	(0) cerrados	(1) cerrados parcialmente	(2) abiertos
Postura de la lengua	(0) atrás de los dientes	(1) tocando los dientes	(2) entre los dientes
Retención del alimento	(0) adecuada	(1) parcial	(2) inadecuada
Contracción del orbicular	(0) adecuada	(1) leve	(2) acentuada
Contracción del mentoniano	(0) ausente	(1) leve	(2) acentuada
Movimiento de cabeza	(0) ausente	(1) presente	
Ruido	(0) ausente	(1) presente	
Coordinación	(0) adecuada	(1) se atora	(1) tose
Residuos después de deglutir	(0) ausentes	(1) presentes	

Observaciones:_____

Deglución habitual *(líquido-agua)* [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 11)

Postura de la lengua	(0) atrás de los dientes	(1) tocando los dientes	(2) entre los dientes
Retención del líquido	(0) adecuada	(1) inadecuada	
Volumen de líquido	(0) satisfactorio	(1) aumentado	(1) disminuido
Contracción del mentoniano	(0) ausente	(1) leve	(2) acentuada
Movimiento de cabeza	(0) ausente	(1) presente	

Ruido	(0) ausente	(1) presente	
Ritmo	(0) secuencial	(1) sorbo por sorbo	
Coordinación	(0) adecuada	(1) se atora	(1) tose

Observaciones:_____

Deglución dirigida *(líquido-agua)* **[ ]** Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 13)

Postura de labios	(0) cerrados	(1) cerrados parcialmente	(2) abiertos
Postura de la lengua	(0) atrás de los dientes	(1) tocando los dientes	(2) entre los dientes
Retención del líquido	(0) adecuada	(1) inadecuada	
Contracción del orbicular	(0) adecuada	(1) leve	(1) acentuada
Contracción del mentoniano	(0) ausente	(1) leve	(2) acentuada
Movimiento de cabeza	(0) ausente	(1) presente	
Ruido	(0) ausente	(1) presente	
Coordinación	(0) adecuada	(1) se atora	(1) tose

Observaciones:_____

HABLA **[ ]** Sumar puntaje del test articulatorio y aspectos generales (mejor resultado = 0 y peor = 81)

TEST DE ARTICULACIÓN A LA REPETICIÓN **[ ]** Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 63)

(0= logra y 1= no logra punto articulatorio, describir)

	Posición inicial	Posición medial	Posición final	Trabante
B	bote (0) (1) _____	cabeza (0) (1) _____	nube (0) (1) _____	objeto (0) (1) _____
P	pato (0) (1) _____	zapato (0) (1) _____	copa (0) (1) _____	apto (0) (1) _____
M	mano (0) (1) _____	camisa (0) (1) _____	suma (0) (1) _____	campo (0) (1) _____
F	foca (0) (1) _____	bufálo (0) (1) _____	café (0) (1) _____	aftosa (0) (1) _____
D	dama (0) (1) _____	cadena (0) (1) _____	codo (0) (1) _____	pared (0) (1) _____
T	tapa (0) (1) _____	botella (0) (1) _____	mata (0) (1) _____	etna (0) (1) _____
S	sapo (0) (1) _____	cocina (0) (1) _____	taza (0) (1) _____	pasto (0) (1) _____
N	nido (0) (1) _____	panera (0) (1) _____	maní (0) (1) _____	canto (0) (1) _____
L	luna (0) (1) _____	caluga (0) (1) _____	palo (0) (1) _____	dulce (0) (1) _____
R		poroto (0) (1) _____	coro (0) (1) _____	torta (0) (1) _____
RR	rosa (0) (1) _____	carreta (0) (1) _____	perro (0) (1) _____	
Y	llave (0) (1) _____	payaso (0) (1) _____	malla (0) (1) _____	
Ñ	ñato (0) (1) _____	puñete (0) (1) _____	caña (0) (1) _____	
Ĉ	chalo (0) (1) _____	lechuga (0) (1) _____	noche (0) (1) _____	
K	casa (0) (1) _____	paquete (0) (1) _____	taco (0) (1) _____	acto (0) (1) _____
G	gato (0) (1) _____	laguna (0) (1) _____	jugo (0) (1) _____	signo (0) (1) _____

X	josé (0) (1) _____	tejido (0) (1) _____	caja (0) (1) _____	reloj (0) (1) _____

Observaciones:_____

ASPECTOS GENERALES [ ] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 18)

Saliva	(0) deglute	(1) acumula en comisuras	(2) escupe	(3) babeo
		(1) acumula en labio inferior		
Abertura de la boca	(0) normal	(1) reducida	(1) exagerada	
Lengua	(0) adecuada	(1) en el suelo	(2) anteriorizada	(2) posteriorizada	(2) Punta baja y laterales altas
Movimiento labial	(0) normal	(1) reducido	(1) exagerado	
Movimiento mandibular	(0) adecuado	(1) desvío a D	(1) desvío a I	(1) anteriorizada
Resonancia	(0) equilibrada	(1) hiponasal	(1) hipernasal	(1) laringofaríngea
Imprecisión articulatoria	(0) ausente	(1) algunas veces	(2) siempre	
Velocidad	(0) normal	(1) aumentada	(1) reducida	
Coordinación neumofonoarticulatoria		(0) adecuada	(1) alterada	

Observaciones:_____

Hipótesis diagnóstica fonoaudiológica: _____

_____

_____

_____

Pronóstico: _____

_____

_____

_____

Plan terapéutico: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Derivaciones: _____

_____

_____

_____

Orientaciones: _____

_____

_____

_____

_____

EVALUADOR RESPONSABLE:_____