

CORRRIGE

SERIE

RAYONNEMENT

Exercice 1 :

1- Etablir le tableau de classification des rayonnements électromagnétiques en fonction des longueurs d'ondes dans le vide.

2- Déterminez les périodes T et longueurs d'ondes λ correspondant à chacune des radiations électromagnétiques de fréquences suivantes :


$$\nu_1 = 10^{15}(\text{Hz}); \nu_2 = 6.10^{14}(\text{Hz}); \nu_3 = 2,4 \cdot 10^{10}(\text{Hz}); \nu_4 = 121 \cdot 10^5(\text{Hz})$$

a- situer ces radiations par rapport au spectre global des ondes électromagnétiques.

b- sont-elles ionisantes, pourquoi ?

Réponse :

- 1) Tableau de classification des rayonnements électromagnétiques en fonction des longueurs d'ondes dans le vide



- 2) périodes T et longueurs d'ondes λ correspondant à chacune des radiations électromagnétiques de fréquences suivantes :

$$\nu_1 = 10^{15}(\text{Hz}); \nu_2 = 6.10^{14}(\text{Hz}); \nu_3 = 2,4 \cdot 10^{10}(\text{Hz}); \nu_4 = 121 \cdot 10^5(\text{Hz})$$

a- La période est donnée par : $T = \frac{1}{\nu}$

$$T_1 = \frac{1}{\nu_1} \rightarrow T_1 = \frac{1}{10^{15}} \rightarrow T_1 = 10^{-15}(\text{s})$$

$$T_2 = \frac{1}{\nu_2} \rightarrow T_2 = \frac{1}{6.10^{14}} \rightarrow T_2 = 1,67 \cdot 10^{-15}(\text{s})$$

$$T_3 = \frac{1}{\nu_3} \rightarrow T_3 = \frac{1}{2,4 \cdot 10^{10}} \rightarrow T_3 = 4,17 \cdot 10^{-11}(\text{s})$$

$$T_4 = \frac{1}{\nu_4} \rightarrow T_4 = \frac{1}{121 \cdot 10^5} \rightarrow T_4 = 8,26 \cdot 10^{-8}(\text{s})$$

b- la longueur d'onde est donnée par : $\lambda = C \times T$

$$\lambda_1 = C \times T_1 \rightarrow \lambda_1 = 3 \cdot 10^{-7}(\text{m}) \quad \lambda_1 = 3000(\text{\AA}) \rightarrow \text{radiation ultraviolette}$$

$$\lambda_2 = C \times T_2 \rightarrow \lambda_2 = 5 \cdot 10^{-7}(\text{m}) \quad \lambda_2 = 5000(\text{\AA}) \rightarrow \text{Visible}$$

$$\lambda_3 = C \times T_3 \rightarrow \lambda_3 = 1,25 \cdot 10^{-4}(\text{m}) \quad \lambda_3 = 0,0125 \text{ m} \rightarrow \text{Micro - onde}$$

$$\lambda_4 = C \times T_4 \rightarrow \lambda_4 = 3 \cdot 10^{-7}(\text{m}) \quad \lambda_4 = 24,8(\text{m}) \rightarrow \text{onde - Radio.}$$

c- Sont-elles ionisantes, pourquoi ?

Une radiation est ionisante si son énergie E vérifie : $E > 13,6(\text{eV})$.

une radiation est ionisante si : $E \geq 13.6 \text{ eV}$

$$E = \frac{12400 \text{ eV} \cdot \text{\AA}}{\lambda(\text{\AA})} \quad \text{donc} \quad \frac{12400 \text{ eV} \cdot \text{\AA}}{\lambda(\text{\AA})} \geq 13.6 \text{ eV} \quad \lambda \leq 911 \text{ \AA}$$

On a $E = h \cdot \nu$ $E \geq 13.6 \text{ eV}$ $h \cdot \nu \geq 13.6 \text{ eV}$ cette relation donne l'énergie on joule donc on aura

$$h \cdot \nu \geq 13.6 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \quad \nu \geq \frac{13.6 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}{h} \quad \nu \geq \frac{13.6 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}{6.62 \cdot 10^{-34}} \quad \nu \geq 3.3 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

Conclusion : une radiation est ionisante si :

En énergie : $E \geq 13.6 \text{ eV}$

En longueur d'onde : $\lambda \leq 911 \text{ \AA}$

En fréquence : $\nu \geq 3.3 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$

Donc :

$$\lambda_1 = 3000 (\text{\AA}) > 911(\text{\AA}) \rightarrow \text{radiation non ionisante}$$

$$\lambda_2 = 5000 (\text{\AA}) > 911(\text{\AA}) \rightarrow \text{radiation non ionisante}$$

$$\lambda_3 = 0,0125 \text{ m} > 911(\text{\AA}) \rightarrow \text{radiation non ionisante}$$

$$\lambda_4 = 24,8 (m) > 911(\text{\AA}) \rightarrow \text{radiation non ionisante}$$

Exercice 2 :

Une onde électromagnétique se propage dans l'eau. Cette onde se caractérise par une énergie E :

- a- supérieure à celle qu'elle aurait dans le vide.
- b- égale à celle qu'elle aurait dans le vide.
- c- inférieure à celle qu'elle aurait dans le vide.
- d- toutes ces réponses sont fausses.

Réponse :

L'énergie d'une radiation est donnée par : $E = h \times \nu$

h = constante de Planck

ν = fréquence

La fréquence est un paramètre temps ; Les paramètres temps sont indépendants du milieu de propagation ; donc l'énergie est constante et ne dépend pas du milieu et elle est égale à celle qu'elle aurait dans le vide.

Exercice 3 :

Un rayonnement électromagnétique composé respectivement de deux radiations de longueur d'onde dans le vide λ_1 et λ_2 (avec $\lambda_1 = 0,4 \text{ }\mu\text{m}$ et $\lambda_2 = 0,005 \text{ }\mu\text{m}$). Ce rayonnement est :

- a- un rayonnement électromagnétique ionisant.
- b- un rayonnement particulaire non ionisant.
- c- un rayonnement électromagnétique non ionisant.
- d- toutes ces réponses sont fausses.

Réponse :

Un rayonnement est l'ensemble de plusieurs radiations, et si une seule radiation est ionisante le rayonnement est dit ionisant.

$$\lambda_1 = 0,4 \text{ }\mu\text{m} = 4000 (\text{\AA}) > 911 (\text{\AA}) \rightarrow \text{radiation non ionisante}$$

$$\lambda_2 = 0,005 \text{ }\mu\text{m} = 50 (\text{\AA}) < 911 (\text{\AA}) \rightarrow \text{radiation ionisante}$$

Conclusion : Le rayonnement est donc ionisant.

Exercice 4 :

Soit une radiation de longueur d'onde $0,3 \text{ }\mu\text{m}$ dans le vide. Est-elle ionisante vis-à-vis des structures moléculaires biologiques ?

Soit une radiation de longueur d'onde $0,4 \text{ }\mu\text{m}$ dans le vide, celle-ci est-elle ionisante ? Qu'en est-il alors pour les autres radiations du visible ?

Réponse :

Une radiation est ionisante si son énergie E vérifie : $E > 13,6 \text{ (eV)}$.

Ou si sa longueur d'onde vérifie : $\lambda < 911 \text{ (Å)}$

$$\lambda = 0,3 \mu\text{m} = 3000 \text{ (Å)} > 911 \text{ (Å)} \rightarrow \text{radiation non ionisante}$$

$$\lambda = 0,4 \mu\text{m} = 4000 \text{ (Å)} > 911 \text{ (Å)} \rightarrow \text{radiation non ionisante}$$

Qu'en est-il pour les autres radiations du visible ?

Le visible est compris entre : $4000 < \lambda < 8000 \text{ (Å)}$

$$\lambda = 8000 \text{ (Å)} > 911 \text{ (Å)} \rightarrow \text{radiation non ionisante}$$

Conclusion : La lumière visible n'est pas ionisante.

Exercice 5 :

Situer les radiations électromagnétiques suivantes :

1- onde de fréquence ν ($\nu = 3.10^8 \text{ Hz}$).

2- onde de longueur d'onde λ ($\lambda = 6000.10^{-10} \text{ m}$) dans un milieu transparent d'indice $n = 2$.

3- onde de longueur d'onde λ ($\lambda = 0,3 \text{ mm}$) dans un milieu où la vitesse v de propagation de la lumière est $v = 2.10^8 \text{ m/s}$.

Réponse :

1- Onde de fréquence $\nu = 3.10^8 \text{ Hz}$.

$$\lambda = \frac{C}{\nu} \quad \lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^8} \rightarrow \lambda = 1 \text{ (m)} \rightarrow \text{onde - radio.}$$

2- Onde de longueur d'onde ($\lambda = 6000.10^{-10} \text{ m}$) dans un milieu transparent d'indice $n = 2$.

Dans le vide la longueur d'onde est donnée par : $\lambda = C \times T$

Dans un milieu d'indice n la vitesse de l'onde est V , sa longueur d'onde est donnée par : $\lambda_m = V \times T$

$$\frac{\lambda}{\lambda_m} = \frac{C \times T}{V \times T} \quad \frac{\lambda}{\lambda_m} = \frac{C}{V}$$

$$\text{Sachant que } n = \frac{C}{V} \text{ on a donc } \frac{\lambda}{\lambda_m} = n \quad \lambda = n \times \lambda_m$$

$$\lambda = 2 \times 6000 \quad \lambda = 12000 \text{ (Å)} \rightarrow \text{Micro - onde}$$

3- Onde de longueur d'onde $0,3 \text{ mm}$ dans un milieu où la vitesse de propagation de la lumière est égale à 2.10^8 m/s .

$$\frac{\lambda}{\lambda_m} = \frac{C \times T}{V \times T} \quad \frac{\lambda}{\lambda_m} = \frac{C}{V}$$

$$\lambda = \frac{C}{V} \times \lambda_m \quad \lambda = \frac{3.10^8}{2.10^8} \times 0,3 \quad \lambda = 4,5 \text{ (mm)} \rightarrow \text{infra - rouge}$$

Exercice 6 :

Les particules matérielles suivantes sont-elles relativistes ?

a- une particule de vitesse $v = 4.10^6 \text{ m/s}$.

b- une bille de masse au repos 10 g et d'énergie cinétique 5 J .

d- un deuton d'énergie totale $3,8 \text{ GeV}$ et d'énergie au repos $1,9.10^9 \text{ eV}$. d- un muon d'énergie cinétique 300 MeV et énergie totale 4.10^8 eV .

Réponse :

Pour vérifier si la particule est classique ou relativiste :

➤ En termes de vitesse :

$$\beta = \frac{V}{c} \begin{cases} \text{si } \beta > 0,1 & \text{la particule est relativiste.} \\ \text{si } \beta \leq 0,1 & \text{la particule est classique.} \end{cases}$$

➤ En termes d'énergie

$$\begin{cases} \text{si } \left(\frac{E_c}{E_0}\right) > \frac{1}{200} = 5 \cdot 10^{-3} & \text{la particule est relativiste.} \\ \text{si } \left(\frac{E_c}{E_0}\right) \leq \frac{1}{200} = 5 \cdot 10^{-3} & \text{la particule est classique.} \end{cases}$$

Avec E_c = énergie cinétique E_0 = énergie au repos

1) Une particule de vitesse $V = 4 \cdot 10^6 \left(\frac{m}{s}\right)$.

$$\beta = \frac{V}{c} \quad \beta = \frac{4 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^8} \quad \beta = 0,013 < 0,1 \quad \text{particule classique}$$

2) Une bille de masse au repos 10 gr et d'énergie cinétique 5 J.

On calcule l'énergie au repos de la particule : $E_0 = m_0 \times c^2$ $E_0 = 10 \cdot 10^{-3} \times (3 \cdot 10^8)^2 \rightarrow E_0 = 9 \cdot 10^{14} (J)$

$$\frac{E_c}{E_0} = \frac{5}{9 \cdot 10^{14}} \quad \frac{E_c}{E_0} = 5,5 \cdot 10^{-15} \ll 5 \cdot 10^{-3} \rightarrow \text{particule classique.}$$

3) Un deuton d'énergie totale 3,8 GeV et d'énergie au repos $1,9 \cdot 10^9$ eV.

Le deuton (^2H ou D) est un isotope naturel de l'hydrogène, il possède un proton et un neutron.

Le tritium (^3H ou T) est un isotope naturel de l'hydrogène ; il possède un proton et deux neutrons.

On calcule l'énergie cinétique du deuton :

L'énergie totale E est donnée par :

$$E = E_0 + E_c \rightarrow E_c = E - E_0 \rightarrow E_c = 3,8 \cdot 10^9 - 1,9 \cdot 10^9 \rightarrow E_c = 1,9 \cdot 10^9 (\text{eV})$$

$$\frac{E_c}{E_0} = \frac{1,9 \cdot 10^9}{1,9 \cdot 10^9} \quad \frac{E_c}{E_0} = 1 > \frac{1}{200} = 5 \cdot 10^{-3} \rightarrow \text{particule relativiste}$$

4) Un muon d'énergie cinétique 300 MeV et énergie totale $4 \cdot 10^8$ eV.

Le muon est une particule instable de même charge électrique que l'électron avec une masse 207 fois plus grande.

$$E = E_0 + E_c \rightarrow E_0 = E - E_c \rightarrow E_0 = 3,8 \cdot 10^9 - 1,9 \cdot 10^9 \rightarrow E_0 = 1,9 \cdot 10^9 (\text{eV})$$

$$\frac{E_c}{E_0} = \frac{3 \cdot 10^8}{10^8} \quad \frac{E_c}{E_0} = 3 > \frac{1}{200} = 5 \cdot 10^{-3} \rightarrow \text{particule relativiste}$$

Exercice 7 :

Calculez l'énergie et la quantité de mouvement des photons associés aux ondes électromagnétiques de longueurs d'ondes suivantes, se propageant dans le vide :

$$\lambda_1 = 10^3 \text{ m} ; \lambda_2 = 10^{-2} \text{ m} \quad \lambda_3 = 10^{-4} \text{ m} \quad \lambda_4 = 4,9 \cdot 10^{-6} \text{ m} \quad \lambda_5 = 1,4 \cdot 10^{-7} \text{ m} \quad \lambda_6 = 3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

Classez ces radiations dans le spectre global des ondes électromagnétiques.

Quelles sont les radiations ionisantes ?

Réponse :

L'énergie d'un photon est donnée par :

$$E = \frac{124000 \text{ (eV} \cdot \text{\AA)}}{\lambda \text{ (\AA)}}$$

et sa quantité de mouvement par :

$$P = \frac{E}{c} \quad P = \frac{h}{\lambda}$$

Longueur d'onde λ (m)	Longueur d'onde λ (Å)	Energie E (eV)	Quantité de mouvement kg.m/s	Type de radiation	Ionisante ou non
10^3	10^7	0,00124	$6,61 \cdot 10^{-31}$	O.H	non
10^{-2}	10^8	0,000124	$6,61 \cdot 10^{-32}$	O.H	non
10^{-4}	10^6	0,01240	$6,61 \cdot 10^{-30}$	I.R	non
$4,9 \cdot 10^{-6}$	$4,9 \cdot 10^4$	0,25	$1,33 \cdot 10^{-28}$	I.R	non
$1,4 \cdot 10^{-7}$	1400	8,85	$4,7 \cdot 10^{-27}$	VISIBLE	non
$3 \cdot 10^{-10}$	3	4133	$2,2 \cdot 10^{-24}$	R.GAMA	oui

Exercice 8 :

Calculez la quantité de mouvement des photons suivants dans le vide.

- 1- pour un photon d'énergie $E = 900 \text{ KeV}$.
- 2- pour un photon associé à une onde de fréquence $2,4 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$.
- 3- pour un photon associé à une onde de longueur d'onde $2 \mu\text{m}$.

Réponse :

- 1- La quantité de mouvement d'un photon d'énergie $E = 900 \text{ keV}$:

$$p = \frac{E}{c} \quad p = \frac{900 \cdot 10^3 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{3 \cdot 10^8} \quad p = 4,8 \cdot 10^{-22} \left(\frac{\text{J.s}}{\text{m}} \right).$$

- 2- Photon associé à une onde de fréquence $2,4 \cdot 10^{15} \text{ (Hz)}$.

$$p = \frac{E}{c} \quad p = \frac{h \cdot \nu}{c} \quad p = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 2,4 \cdot 10^{15}}{3 \cdot 10^8} \quad p = 5,3 \cdot 10^{-27} \left(\frac{\text{J.s}}{\text{m}} \right).$$

- 3- Photon associé à une onde de longueur d'onde $2 \mu\text{m}$.

$$p = \frac{E}{c} \quad p = \frac{h \cdot c}{\lambda \cdot c} \quad p = \frac{h}{\lambda} \quad p = \frac{6,62 \cdot 10^{-34}}{2 \cdot 10^{-6}} \quad p = 3,31 \cdot 10^{-28} \left(\frac{\text{J.s}}{\text{m}} \right).$$

Exercice 9 :

L'énergie d'un électron en mouvement est trois fois plus grande que son énergie au repos.

- 1- calculez l'énergie cinétique et la vitesse de cet électron.
- 2- quelle est la longueur d'onde associée ?
- 3- quelle serait l'énergie d'un proton de même vitesse que l'électron ?
- 4- un électron et un neutron d'énergie cinétique 50 KeV sont-ils des particules relevant de la mécanique relativiste ?

Réponse :

- 1- calcul de l'énergie cinétique de l'électron :

L'énergie totale E est donnée par : $E = E_0 + E_C$ $E_C = E - E_0$

L'énergie est trois fois plus grande que son énergie au repos donc $E = 3 \cdot E_0$

$$E_C = E - E_0 \quad E_C = 3 \cdot E_0 - E_0 \quad E_C = 2 \cdot E_0 \quad E_C = 2 \cdot 0,511 \quad E_C = 1,022 \text{ MeV}$$

➤ Calcul de la vitesse de l'électron

$$\text{On a } E_C = 2 \cdot E_0$$

$$\frac{E_C}{E_0} = \frac{2 \cdot E_0}{E_0} \quad \frac{E_C}{E_0} = 2 > \frac{1}{200} \quad \text{donc électron relativiste.}$$

Le calcul de la vitesse revient au calcul de β ($\beta = \frac{v}{c} \rightarrow v = \beta \times c$)

$$E = \frac{E_0}{\sqrt{1-\beta^2}} \rightarrow \sqrt{1-\beta^2} = \frac{E_0}{E} \rightarrow \beta = \sqrt{1 - \left(\frac{E_0}{E}\right)^2} \rightarrow \beta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} \rightarrow \beta = 0,94$$

La vitesse de cet électron est donc : $\beta = \frac{v}{c} \rightarrow v = \beta \times c = 0,866 \times 3 \cdot 10^8 \rightarrow v = 2,6 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

2- La longueur d'onde de cet électron est donnée par :

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \text{on a } p = \frac{E \times \beta}{c} \quad \text{donc } \lambda = \frac{h}{\frac{E \times \beta}{c}} \quad \lambda = \frac{h \cdot c}{E \times \beta} \quad \lambda = \frac{h \cdot c}{3 \cdot E_0 \times \beta}$$

$$\lambda = \frac{12400}{3 \cdot 0,511 \cdot 10^6 \cdot 0,94} \quad \lambda = 0,0086 \text{ (Å)}$$

3- énergie d'un proton de même vitesse que l'électron.

$$\text{On a: } E = \frac{E_{0p}}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad \beta = 0,94 \quad \text{et } E_{0p} = 938 \text{ MeV}$$

$$E = \frac{938}{\sqrt{1-0,94^2}} \quad E = 2749,3 \text{ MeV}$$

3- un électron et un neutron d'énergie cinétique 50 KeV sont-ils des particules relevant de la mécanique Relativiste ?

$$\text{Pour l'électron: } \frac{E_c}{E_0} = \frac{2,50 \cdot 10^3}{0,511 \cdot 10^6} \quad \frac{E_c}{E_0} = 0,195 > \frac{1}{200} \quad \text{donc électron relativiste.}$$

$$\text{Pour le neutron: } \frac{E_c}{E_{0n}} = \frac{2,50 \cdot 10^3}{939 \cdot 10^6} \quad \frac{E_c}{E_{0n}} = 10^{-4} < \frac{1}{200} \quad \text{donc neutron classique.}$$

Exercice 10 :

Soient des photons associés à une onde électromagnétique de fréquence $6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$. Quelle est leur quantité de mouvement dans le vide ? Même question pour des protons de masse m ($m = 1,25 m_0$)

Réponse :

La quantité de mouvement d'un photon est donnée par :

$$p = \frac{E}{c} \quad p = \frac{h \cdot \nu}{c} \quad p = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 6 \cdot 10^{14}}{3 \cdot 10^8} \quad p = 13,2 \cdot 10^{-28} \left(\frac{\text{J} \cdot \text{s}}{\text{m}}\right).$$

La quantité de mouvement d'un proton est donnée par :

$$p = \beta \frac{E}{c} \quad \text{avec } E = m_p \cdot c^2 \quad E = 1,25 m_{0p} \cdot c^2 \quad E = 1,25 E_{0p}$$

Calcul de β :

$$E = \frac{E_{0p}}{\sqrt{1-\beta^2}} \rightarrow \sqrt{1-\beta^2} = \frac{E_{0p}}{E} \rightarrow \beta = \sqrt{1 - \left(\frac{E_{0p}}{E}\right)^2} \rightarrow \beta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{1,25}\right)^2} \rightarrow \beta = 0,6$$

$$p = \beta \frac{1,25 E_{0p}}{c} \quad p = 0,6 \frac{1,25 \cdot 938 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{3 \cdot 10^8} \quad p = 3,75 \cdot 10^{-21} \left(\frac{\text{J} \cdot \text{s}}{\text{m}}\right)$$

Exercice 11 :

Un électron se déplace avec une vitesse $v = 0,6 c$.

1- calculez :

a- son énergie cinétique.

b- sa quantité de mouvement.

2- déterminez la vitesse d'un proton ayant :

a- même énergie cinétique que cet électron.

b- même quantité de mouvement que cet électron.

Réponse:

1-a – calcul de l'énergie cinétique de l'électron :

$$E = E_0 + E_C \quad \text{avec} \quad E = \frac{E_0}{\sqrt{1-\beta^2}} \rightarrow \frac{E_0}{\sqrt{1-\beta^2}} = E_0 + E_C \rightarrow E_C = \frac{E_0}{\sqrt{1-\beta^2}} - E_0 \rightarrow E_C = E_0 \left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1 \right)$$

$$\rightarrow E_C = 0,511 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1-0,6^2}} - 1 \right) \rightarrow \text{avec } \beta = 0,6 \quad \text{on aura} \quad E_C = 0,128 \text{ MeV}$$

1-b-La quantité de mouvement de l'électron est donnée par :

$$p = \beta \frac{E}{c} \quad \text{on a} \quad E = \frac{E_{0p}}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad \text{donc} \quad p = \beta \frac{\frac{E_{0p}}{\sqrt{1-\beta^2}}}{c} \quad p = \beta \frac{E_{0p}}{c \sqrt{1-\beta^2}} \quad p = 0,6 \cdot \frac{0,511 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{3 \cdot 10^8 \cdot \sqrt{1-0,6^2}} \quad p = 2 \cdot 10^{-22} \left(\frac{\text{J.s}}{\text{m}} \right)$$

2-a- calcul de la vitesse d'un proton ayant même énergie cinétique que cet électron :

$$E_C = 0,128 \text{ MeV}$$

$$\text{On vérifie si le proton est relativiste : } \frac{E_C}{E_0} = \frac{0,128}{938} \quad \frac{E_C}{E_0} = 1,3 \cdot 10^{-4} < \frac{1}{200} \quad \text{donc proton classique}$$

$$\text{L'énergie cinétique est donnée par : } E_C = \frac{1}{2} m_{0p} \cdot V^2 \quad \text{avec } V = \beta \cdot c \quad \text{on aura} \quad E_C = \frac{1}{2} m_{0p} \cdot (\beta \cdot c)^2$$

$$E_C = \frac{(\beta)^2}{2} m_{0p} \cdot (c)^2 \quad E_C = \frac{(\beta)^2 \cdot E_{0p}}{2} \quad \beta = \sqrt{\frac{2 \cdot E_C}{E_{0p}}} \quad \beta = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,128}{938}} \quad \beta = 0,0165$$

$$\text{La vitesse de cet électron est donc : } \beta = \frac{v}{c} \rightarrow v = \beta \times c \quad v = 0,0165 \times 3 \cdot 10^8 \rightarrow v = 4,95 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

2-b- calcul de la vitesse d'un proton ayant la même quantité de mouvement que cet électron:

$$\text{On a pour le proton} \quad p = 2 \cdot 10^{-22} \left(\frac{\text{J.s}}{\text{m}} \right)$$

Le proton étant classique on écrit :

$$p = \beta \frac{E_{0p}}{c} \quad \beta = \frac{p \cdot c}{E_{0p}} \quad \beta = \frac{2 \cdot 10^{-22} \cdot 3 \cdot 10^8}{938 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} \quad \beta = 4 \cdot 10^{-4}$$

$$v = \beta \cdot c \quad v = 4 \cdot 10^{-4} \cdot 3 \cdot 10^8 \quad v = 1,23 \cdot 10^5 \text{ m/s} = 1,23 \cdot 10^5 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$