

Всемирная организация здравоохранения Примерный перечень основных лекарственных средств

22-й перечень
2021 г.



Всемирная организация
здравоохранения

Европейский регион

© Всемирная организация здравоохранения, 2022 г.

Некоторые права защищены. Настоящая публикация распространяется на условиях лицензии Creative Commons 3.0 IGO «С указанием авторства – Некоммерческая – Распространение на тех же условиях» (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo>).

Лицензией допускается копирование, распространение и адаптация публикации в некоммерческих целях с указанием библиографической ссылки согласно нижеприведенному образцу. Никакое использование публикации не означает одобрения ВОЗ какой-либо организации, товара или услуги. Использование логотипа ВОЗ не допускается. Распространение адаптированных вариантов публикации допускается на условиях указанной или эквивалентной лицензии Creative Commons. При переводе публикации на другие языки приводится библиографическая ссылка согласно нижеприведенному образцу и следующая оговорка: «Настоящий перевод не был выполнен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ не несет ответственности за его содержание и точность. Аутентичным подлинным текстом является оригинальное издание на английском языке «World Health Organization Model List of Essential Medicines – 22nd List, 2021. Geneva: World Health Organization; 2021 (WHO/MHP/HPS/EML/2021.02). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021».

Урегулирование споров, связанных с условиями лицензии, производится в соответствии с согласительным регламентом Всемирной организации интеллектуальной собственности (<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/>).

Образец библиографической ссылки. Всемирная организация здравоохранения. Примерный перечень основных лекарственных средств, 22-й перечень, 2021 г. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2022 г. Лицензия: [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](#).

Данные каталогизации перед публикацией (CIP). Данные CIP доступны по ссылке: <http://apps.who.int/iris/>.

Приобретение, авторские права и лицензирование. По вопросам приобретения публикаций ВОЗ см. <http://apps.who.int/bookorders>. По вопросам оформления заявок на коммерческое использование и направления запросов, касающихся права пользования и лицензирования, см. <http://www.who.int/about/licensing/>.

Материалы третьих сторон. Пользователь, желающий использовать в своих целях содержащиеся в настоящей публикации материалы, принадлежащие третьим сторонам, например таблицы, рисунки или изображения, должен установить, требуется ли для этого разрешение обладателя авторского права, и при необходимости получить такое разрешение. Ответственность за нарушение прав на содержащиеся в публикации материалы третьих сторон несет пользователь.

Оговорки общего характера. Используемые в настоящей публикации обозначения и приводимые в ней материалы не означают выражения мнения ВОЗ относительно правового статуса любой страны, территории, города или района или их органов власти или относительно делимитации границ. Штрихпунктирные линии на картах обозначают приблизительные границы, которые могут быть не полностью согласованы.

Упоминание определенных компаний или продукции определенных производителей не означает, что они одобрены или рекомендованы ВОЗ в отличие от аналогичных компаний или продукции, не названных в тексте. Названия патентованных изделий, исключая ошибки и пропуски в тексте, выделяются начальными прописными буквами.

ВОЗ приняты все разумные меры для проверки точности информации, содержащейся в настоящей публикации. Однако данные материалы публикуются без каких-либо прямых или косвенных гарантий. Ответственность за интерпретацию и использование материалов несет пользователь. ВОЗ не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с использованием материалов.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

Пояснительные примечания

Основной перечень представляет собой список минимальных потребностей в лекарственных средствах базовой системы здравоохранения, в который включены наиболее эффективные, безопасные и эффективные с точки зрения затрат лекарственные средства, предназначенные для применения при приоритетных патологических состояниях. Приоритетные патологические состояния отбираются исходя из их нынешней и предполагаемой будущей значимости для общественного здравоохранения с учетом возможностей для безопасного и экономичного с точки зрения затрат лечения.

Если символ [с] сопровождает отдельный препарат в Основном перечне или относится к определенной дозировке активного вещества в препарате, это означает, что имеются особые указания, ограничивающие его применение у детей.

Дополнительный перечень представляет собой список основных лекарственных средств, предназначенных для лечения приоритетных заболеваний, для которых требуются специализированные учреждения в целях диагностики или мониторинга, и/или специализированная медицинская помощь, и/или специализированная подготовка медицинских работников. В сомнительных случаях лекарственные средства можно также классифицировать в качестве дополнительных на основании их более высокой стоимости или меньшей экономичности с точки зрения затрат в различных условиях.

Если символ [с] сопровождает конкретный препарат в Дополнительном перечне или относится к определенной дозировке активного вещества в препарате, это означает, что для использования данного(-ых) лекарственного(-ых) средства(средств) у детей необходимы специализированные учреждения для диагностики или мониторинга и/или специализированная медицинская помощь, и/или специальная подготовка медицинского персонала.

Символ «квадратик» (□) указывает на наличие терапевтических альтернатив внесенному в перечень лекарственному средству, которые могут быть рассмотрены в процессе отбора при составлении национальных перечней основных лекарственных средств. В числе таких альтернатив могут быть индивидуальные лекарства или несколько лекарств, относящихся к тому или иному фармакологическому классу или химической подгруппе, определенным на 4-ом уровне [Анатомо-терапевтико-химической классификации \(АТХ\)](#), которые обладают схожей клинической эффективностью и безопасностью. Такое лекарственное средство, включенное в перечень, должно служить примером класса или подгруппы, в отношении которых имеются данные, наилучшим образом свидетельствующие об эффективности и безопасности. В ряде случаев препарат может быть первым лекарственным средством, разрешенным к реализации на рынке; в иных случаях препараты, зарегистрированные позже, могут оказаться более безопасными или действенными. В случаях, когда не наблюдается различий по данным об эффективности и безопасности, в Перечень включается лекарственный препарат, который обычно доступен по самой низкой цене, определенной на основе международных источников информации о ценах на лекарственные средства. Пометка «квадратик» не всегда применима к выбору лекарственных препаратов для детей. Символ «квадратик» не применяется в качестве указателя на альтернативные генерические брендовые наименования таких же низкомолекулярных лекарственных средств или же альтернативных биоаналогов биологических лекарственных препаратов. Вместе с тем, рекомендуется на уровне стран отбирать и использовать генерики и биоаналоги основных лекарственных средств гарантированного качества.

В национальных перечнях не следует использовать подобный символ; в них необходимо вносить окончательно отобранные препараты на основании данных о наличии и ценах в стране.

Символ [а] указывает на наличие ограничений на использование препарата в зависимости от возраста или веса; подробная информация по каждому лекарственному средству приведена в Таблице 1.1.

Присутствие препарата в Перечне основных лекарственных средств не гарантирует его фармацевтическое качество. Задача соответствующих национальных или региональных регуляторных органов состоит в том, чтобы обеспечить надлежащее фармацевтическое качество препарата (включая его стабильность), а также взаимозаменяемость различных препаратов, если это актуально.

Для получения рекомендаций и консультаций относительно любых вопросов, касающихся обеспечения качества лекарственных средств, можно обратиться к веб-сайту ВОЗ по лекарственным средствам: <https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/standards-and-specifications/norms-and-standards-for-pharmaceuticals/guidelines/quality-assurance>.

В каждом разделе препараты и лекарственные формы препаратов перечислены в алфавитном порядке, и нет никакого скрытого предпочтения одной формы по сравнению с другой. В целях получения информации о надлежащих лекарственных формах следует обращаться к стандартным клиническим руководствам.

Основные термины, используемые для обозначения лекарственных форм в Перечне основных лекарственных средств, приводятся в Таблице 1.2.

Определения многих из этих терминов и требования к фармацевтическому качеству применительно к различным категориям лекарственных средств опубликованы в действующей версии *Международной Фармакопеи*. <https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/standards-and-specifications/norms-and-standards-for-pharmaceuticals/pharmacopoeia>.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

1. АНЕСТЕТИКИ, ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗЫ	
1.1 Средства для общей анестезии и кислород	
1.1.1 Ингаляционные средства	
галотан	Для ингаляции.
изофлуран	Для ингаляции.
кислород	Для ингаляции (медицинский газ).
оксид азота	Для ингаляции.
1.1.2 Инъекционные средства	
кетамин	Для инъекций: 50 мг/мл (в виде гидрохлорида) в 10 мл флаконе.
☐ пропофол Терапевтические альтернативы: - тиопентал	Для инъекций: 10 мг/мл; 20 мг/мл.
1.2 Средства для местной анестезии	
☐ бупивакаин Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023).	Для инъекций: 0,25%; 0,5% (гидрохлорид) во флаконе. Для инъекций для спинномозговой анестезии: 0,5% (гидрохлорид) в 4 мл ампуле для смешивания с 7,5% раствором глюкозы.
☐ лидокаин Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023)	Для инъекций: 1%; 2% (гидрохлорид) во флаконе. Для инъекций для спинномозговой анестезии: 5% (гидрохлорид) в 2 мл ампуле для смешивания с 7,5% раствором глюкозы. Для поверхностной анестезии: 2%-4% (гидрохлорид).
лидокаин + эпинефрин (адреналин)	Зубной картридж: 2% (гидрохлорид) + эпинефрин 1:80 000. Для инъекций: 1%; 2% (гидрохлорид или сульфат) + эпинефрин 1:200 000 во флаконе.
<i>Дополнительный перечень</i>	
<i>эфедрин</i>	Для инъекций: 30 мг/мл (гидрохлорид) в 1 мл ампуле. (Для спинномозговой анестезии во время родов с целью профилактики гипотензии).
1.3 Средства для премедикации перед операцией и для седации при непродолжительных процедурах	
атропин	Для инъекций: 1 мг (сульфат) в 1 мл ампуле.
☐ мидазолам Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023)	Для инъекций: 1 мг/мл. Жидкость для перорального применения: 2 мг/мл [с]. Таблетка: 7,5 мг; 15 мг.
морфин	Для инъекций: 10 мг (сульфат или гидрохлорид) в 1 мл ампуле.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

1.4 Медицинские газы	
кислород*	Для ингаляции. Для использования при гипоксемии. *Концентрация кислорода для начала реанимации новорожденных с гестационным возрастом 32 недели и менее не должна превышать 30%.
2. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ БОЛИ И СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ТЕРАПИИ	
2.1 Неопиоидные анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)	
ацетилсалициловая кислота	Суппозитории: 50 мг – 150 мг. Таблетка: 100 мг – 500 мг.
ибупрофен ^a	Жидкость для перорального применения: 200 мг/5 мл. Таблетка: 200 мг; 400 мг; 600 мг. ^a Не допускается применение у детей в возрасте младше 3 месяцев.
парацетамол*	Жидкость для перорального применения: 120 мг/5 мл; 125 мг/5 мл. Суппозитории: 100 мг. Таблетка: 100 мг – 500 мг. *Не рекомендуется для противовоспалительной терапии в связи отсутствием доказанного эффекта по данному показанию.
2.2 Опиоидные анальгетики	
кодеин	Таблетка: 30 мг (фосфат).
□ морфин Терапевтические альтернативы: - гидроморфон - оксикодон	Гранулы (замедленного высвобождения; для смешивания с водой): 20 мг – 200 мг (морфина сульфат). Для инъекций: 10 мг (морфина гидрохлорид или морфина сульфат) в 1 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: Таблетка (замедленного высвобождения): 10 мг – 200 мг (морфина гидрохлорид или морфина сульфат). Таблетка (немедленного высвобождения): 10 мг (морфина сульфат).
фентанил*	Трансдермальный пластырь: 12 мкг/час; 25 мкг/час; 50 мкг/час, 75 мкг/час; 100 мкг/час. * Для уменьшения болей, связанных с онкологическими заболеваниями.
<i>Дополнительный перечень</i>	
метадон*	Таблетка: 5 мг; 10 мг (гидрохлорид). Жидкость для перорального применения: 5мг/5мл; 10мг/5мл (гидрохлорид). Концентрат для приготовления жидкости для перорального применения: 5 мг/мл; 10 мг/мл (гидрохлорид). * Для уменьшения болей, связанных с онкологическими заболеваниями.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

2.3 Лекарственные средства, применяемые при других общих симптомах в паллиативной терапии	
амитриптилин	Таблетка: 10 мг; 25 мг; 75 мг.
дексаметазон	Для инъекций: 4 мг/мл (в виде динатрия фосфата) в 1 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 2 мг/5 мл. Таблетка: 2 мг [с]; 4 мг.
диазепам	Для инъекций: 5 мг/мл. Жидкость для перорального применения: 2 мг/5 мл. Раствор для ректального применения: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг. Таблетка: 5 мг; 10 мг.
докузат натрия	Капсула: 100 мг. Жидкость для перорального применения: 50 мг/5 мл.
галоперидол	Для инъекций: 5 мг в 1 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 2 мг/мл. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 0,5 мг; 2 мг; 5 мг.
гиосцина бутилбромид	Для инъекций: 20 мг/мл.
гиосцина гидробромид [с]	Для инъекций: 400 мкг/мл; 600 мкг/мл. Трансдермальные пластыри: 1 мг/72 часа.
лактuloза [с]	Жидкость для перорального применения: 3,1–3,7 г/5 мл.
лоперамид	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 2 мг.
метоклопрамид	Для инъекций: 5 мг/мл (гидрохлорид) в 2 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 5 мг/5 мл. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 10 мг (гидрохлорид).
мидазолам	Для инъекций: 1 мг/мл; 5 мг/мл. Жидкость для перорального применения: 2 мг/мл [с]. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 7,5 мг; 15 мг.
метадон*	Таблетка: 5 мг; 10 мг (гидрохлорид). Жидкость для перорального применения: 5мг/5мл; 10мг/5мл (гидрохлорид). Концентрат для приготовления жидкости для перорального применения: 5 мг/мл; 10 мг/мл (гидрохлорид). * Для уменьшения болей, связанных с онкологическими заболеваниями.
☐ ондансетрон  Терапевтические альтернативы: - гранисетрон - доласетрон - палонсетрон - трописетрон	Для инъекций: 2 мг основы/мл в 2 мл ампуле (в виде гидрохлорида). Жидкость для перорального применения: 4 мг основы/5 мл. Твердая лекарственная форма для перорального применения: эквивалент 4 мг основы; эквивалент 8 мг основы.  > 1 месяца.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

сенна	Жидкость для перорального применения: 7,5 мг/5 мл.
флуоксетин ^a	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 20 мг (в виде гидрохлорида). ^a > 8 лет.
циклизин [с]	Для инъекций: 50 мг/мл. Таблетка: 50 мг.
3. ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ	
дексаметазон	Для инъекций: 4 мг/мл (в виде динатрия фосфата) в 1 мл ампуле.
гидрокортизон	Порошок для инъекций: 100 мг (в виде натрия сукцината) во флаконе.
☐ лоратадин* Терапевтические альтернативы: - фексофенадин - цетиризин	Жидкость для перорального применения: 1 мг/мл. Таблетка: 10 мг. <i>*По ряду показаний могут применяться антигистаминные препараты с седативным эффектом (Перечень ВОЗ основных лекарственных средств для детей).</i>
☐ преднизолон Терапевтические альтернативы: - преднизон	Жидкость для перорального применения: 5 мг/мл [с]. Таблетка: 5 мг; 25 мг.
эпинефрин (адреналин)	Для инъекций: 1 мг/мл (в виде гидрохлорида или гидротартрата) в 1 мл ампуле.
4. АНТИДОТЫ И ДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ	
4.1 Неспецифические	
уголь, активированный	Порошок.
4.2 Специфические	
ацетилцистеин	Для инъекций: 200 мг/мл в 10 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 10% [с]; 20% [с].
атропин	Для инъекций: 1 мг (сульфат) в 1 мл ампуле.
калия-железа гексацианоферрат(II) ·2H ₂ O (прусский синий)	Порошок для перорального применения.
кальция глюконат	Для инъекций: 100 мг/мл в 10 мл ампуле.
метилтиониния хлорид (метиленовый синий)	Для инъекций: 10 мг/мл в 10 мл ампуле.
налоксон	Для инъекций: 400 мкг (гидрохлорид) в 1 мл ампуле.
натрия нитрит	Для инъекций: 30 мг/мл в 10 мл ампуле.
натрия тиосульфат	Для инъекций: 250 мг/мл в 50 мл ампуле.
пеницилламин	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 250 мг.
<i>Дополнительный перечень</i>	
дефероксамин	Порошок для инъекций: 500 мг (мезилат) во флаконе.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

димеркапрол	Для инъекций (масляный раствор): 50 мг/мл в 2 мл ампуле.
натрия кальция эдетат	Для инъекций: 200 мг/мл в 5 мл ампуле.
сукцимер	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 100 мг.
фомепизол	Для инъекций: 5 мг/мл (сульфат) в 20 мл ампуле или 1 г/мл (основы) в 1,5 мл ампуле.
5. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ И ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	
вальпроевая кислота (натрия вальпроат)* <i>*Избегать использования при беременности, а также у женщин и девочек, способных к деторождению, кроме ситуации неэффективности или непереносимости терапевтических альтернатив, в связи с высоким риском врожденных пороков развития и нарушений развития у детей, подвергавшихся внутриутробному воздействию вальпроата.</i>	Жидкость для перорального применения: 200 мг/5 мл. Таблетка (дробимая): 100 мг. Таблетка (кишечнорастворимая): 200 мг; 500 мг.
диазепам	Гель или раствор для ректального применения: 5 мг/мл в 0,5 мл; 2 мл; 4 мл тубах.
карбамазепин	Жидкость для перорального применения: 100 мг/5 мл. Таблетка (жевательная): 100 мг; 200 мг. Таблетка (с риской): 100 мг; 200 мг.
ламотриджин*	Таблетка: 25 мг; 50 мг; 100 мг; 200 мг. Таблетка (жевательная, диспергируемая): 2 мг; 5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг; 200 мг. <i>*В качестве дополнительной терапии при парциальных или генерализованных припадках, резистентных к лечению.</i>
□ лоразепам Терапевтические альтернативы: - диазепам (инъекция) - мидазолам (инъекция)	Для инъекций: 2 мг/мл в 1 мл ампуле; 4 мг/мл в 1 мл ампуле.
магния сульфат*	Для инъекций: 0,5 г/мл в 2 мл ампуле (эквивалент 1 г в 2 мл; 50% вес/объем); 0,5 г/мл в 10 мл ампуле (эквивалент 5 г в 10 мл; 50% вес/объем). <i>*Для применения при эклампсии и тяжелой преэклампсии, но не при других судорожных состояниях.</i>
мидазолам	Раствор для оромукозного применения: 5 мг/мл; 10 мг/мл. Ампула*: 1 мг/мл; 10 мг/мл. <i>*Для трансбуккального применения, если отсутствует раствор для оромукозного применения.</i>
фенобарбитал	Для инъекций: 200 мг/мл (натриевая соль). Жидкость для перорального применения: 15 мг/5 мл. Таблетка: 15 мг – 100 мг.
фениитоин	Для инъекций: 50 мг/мл (натриевая соль) в 5 мл флаконе. Жидкость для перорального применения: 25 мг – 30 мг/5 мл.*

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 25 мг; 50 мг; 100 мг (натриевая соль). Таблетка (жевательная): 50 мг. *Наличие обеих дозировок – 25 мг/5 мл и 30 мг/5 мл – на одном и том же рынке может привести к ошибкам при назначении и отпуске препарата, и этого следует избегать.
Дополнительный перечень	
<i>вальпроевая кислота (натрия вальпроат)*</i> <i>*Избегать использования при беременности, а также у женщин и девочек, способных к деторождению, кроме ситуации неэффективности или непереносимости терапевтических альтернатив, в связи с высоким риском врожденных пороков развития и нарушений развития у детей, подвергавшихся внутриутробному воздействию вальпроата.</i>	Для инъекций: 100 мг/мл в 4 мл ампуле; 100 мг/мл в 10 мл ампуле.
этосуксимид	Капсула: 250 мг. Жидкость для перорального применения: 250 мг/5 мл.
6. ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	
6.1 Антигельминтные средства	
6.1.1 Средства, действующие на кишечных паразитов	
альбендазол	Таблетка (жевательная): 400 мг.
ивермектин	Таблетка (с риской): 3 мг.
левамизол	Таблетка: 50 мг; 150 мг (в виде гидрохлорида).
мебендазол	Таблетка (жевательная): 100 мг; 500 мг.
никлозамид	Таблетка (жевательная): 500 мг.
пирантел	Жидкость для перорального применения: 50 мг/мл (в виде эмбоната или памоата). Таблетка (жевательная): 250 мг (в виде эмбоната или памоата).
празиквантел	Таблетка: 150 мг; 600 мг.
6.1.2 Средства, применяемые при филяриозе	
альбендазол	Таблетка (жевательная): 400 мг.
диэтилкарбамазин	Таблетка: 50 мг; 100 мг (дигидроцитрат).
ивермектин	Таблетка (с риской): 3 мг.
6.1.3 Средства, применяемые при шистосомозах и других трематодозах	
празиквантел	Таблетка: 600 мг.
триклабендазол	Таблетка: 250 мг.
Дополнительный перечень	
оксамнихин*	Капсула: 250 мг. Жидкость для перорального применения: 250 мг/5 мл.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

		*Оксамнихин предназначен для использования при неэффективности лечения празиквантелом.
6.1.4 Цистицидные лекарственные средства		
Дополнительный перечень		
альбендазол	Таблетка (жевательная): 400 мг.	
мебендазол	Таблетка (жевательная): 500 мг.	
празиквантел	Таблетка: 500 мг; 600 мг.	
6.2 Антибактериальные лекарственные средства		
В помощь при разработке инструментов реализации стратегий рационального использования антибиотиков на местном, национальном и глобальном уровнях и в целях снижения резистентности микроорганизмов к противомикробным препаратам была создана классификация антибиотиков AWARe (доступ, наблюдение, резерв), в соответствии с которой антибиотики подразделены на разные группы, чтобы подчеркнуть важность их надлежащего использования. ГРУППА ДОСТУПА В эту группу вошли антибиотики, которые обладают активностью в отношении широкого спектра распространенных чувствительных к ним бактериальных патогенов и имеют меньший потенциал формирования резистентности к ним по сравнению с антибиотиками других групп. Ряд антибиотиков группы доступа рекомендованы в качестве основных препаратов первого или второго выбора при назначении эмпирической терапии инфекционных синдромов, рассмотренных Комитетом экспертов по отбору и использованию основных лекарственных средств, и внесены в Примерные перечни отдельными записями с целью улучшить доступ к этим антибиотикам и стимулировать надлежащее их использование. Эти основные антибиотики должны быть гарантированного качества и широко доступны, в том числе и экономически. ГРУППА НАБЛЮДЕНИЯ В эту группу входят классы антибиотиков, которые обладают более высоким потенциалом формирования резистентности, а также большинство наиболее приоритетных препаратов, внесенных в Перечень критических важных противомикробных препаратов для медицинского применения, и/или антибиотики со сравнительно высоким риском селекции бактериальной резистентности. Эти лекарственные средства должны рассматриваться в качестве приоритетных при реализации стратегий рационального использования антибактериальных препаратов и мониторинга. Ряд антибиотиков группы наблюдения рекомендованы в качестве основных препаратов первого или второго выбора при назначении эмпирической терапии ограниченного числа специфических инфекционных синдромов и внесены в Примерные перечни отдельными записями. ГРУППА РЕЗЕРВА К этой группе относятся антибиотики и классы антибиотиков, которые должны применяться исключительно для лечения подтвержденных или подозреваемых инфекций, вызванных бактериальными возбудителями с множественной лекарственной устойчивостью. Антибиотики группы резерва должны рассматриваться в качестве препаратов «крайней меры». Ряд антибиотиков резервной группы включены в Примерные перечни в виде отдельных записей на основании данных о благоприятном соотношении риска и пользы и доказанной эффективности в отношении патогенных микроорганизмов из категорий «крайне приоритетных» и «высокоприоритетных», которые представлены в Списке ВОЗ приоритетных возбудителей заболеваний, в частности <i>Enterobacteriaceae</i>, резистентных к карбапенемам. Эти антибиотики должны быть в наличии, но их применение необходимо ограничить исключительно специфическими случаями и условиями, когда все другие альтернативы оказываются недейственными или неподходящими. Для сохранения эффективности этих лекарственных препаратов их необходимо держать в резерве и рассматривать в качестве приоритетных целей национальных и международных программ рационального использования антибактериальных средств, предусматривающих мониторинг и отчетность о применении.		
6.2.1 Антибиотики группы доступа		
амикацин	Для инъекций: 250 мг/мл (в виде сульфата) в 2 мл флаконе.	

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Пиелонефрит или простатит (тяжелый) – Фебрильная нейтропения высокого риска	ВТОРОЙ ВЫБОР – Сепсис у новорожденных и детей [с]
амоксициллин	Порошок для инъекций: 250 мг; 500 мг; 1 г (в виде натриевой соли) во флаконе. Порошок для приготовления жидкости для перорального применения: 125 мг/5 мл; 250 мг/5 мл (в виде тригидрата) [с]. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 250 мг; 500 мг, 1 г (в виде тригидрата).	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Внебольничная пневмония (от легкой до средней тяжести) – Внебольничная пневмония (тяжелая) [с] – Неосложненная тяжелая острая недостаточность питания [с] – Обострения ХОБЛ – Осложненная тяжелая острая недостаточность питания [с] – Прогрессирующий периапикальный абсцесс зуба – Сепсис у новорожденных и детей [с] – Синусит – Средний отит – Фарингит	ВТОРОЙ ВЫБОР – Острый бактериальный менингит
амоксициллин + клавулановая кислота	Порошок для инъекций: 500 мг (в виде натриевой соли) + 100 мг (в виде калиевой соли); 1000 мг (в виде натриевой соли) + 200 мг (в виде калиевой соли) во флаконе. Порошок для приготовления жидкости для перорального применения: 125 мг (в виде тригидрата) + 31,25 мг (в виде калиевой соли)/5 мл; 250 мг (в виде тригидрата) + 62,5 мг (в виде калиевой соли)/5 мл [с]. Таблетка: 500 мг (в виде тригидрата) + 125 мг (в виде калиевой соли); 875 мг (в виде тригидрата) + 125 мг (в виде калиевой соли).	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Внебольничная пневмония (тяжелая) [с] – Внутрибольничная пневмония – Инфекции кожи и мягких тканей – Инфекции нижних мочевых путей – Обострения ХОБЛ – Осложненные инфекции брюшной полости (от легкой до средней тяжести) – Синусит – Фебрильная нейтропения низкого риска	ВТОРОЙ ВЫБОР – Внебольничная пневмония (от легкой до средней тяжести) – Внебольничная пневмония (тяжелая) – Инфекции костей и суставов – Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений – Средний отит
ампициллин	Порошок для инъекций: 500 мг; 1 г (в виде натриевой соли) во флаконе.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР	ВТОРОЙ ВЫБОР – Острый бактериальный менингит

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

	– Внебольничная пневмония (тяжелая) [с] – Осложненная тяжелая острая недостаточность питания [с] – Осложненные инфекции брюшной полости [с] – Сепсис у новорожденных и детей [с]	
бензатин-бензилпенициллин	Порошок для инъекций: 1,2 млн МЕ ($\approx$ 900 мг) во флаконе [с]; 2,4 млн МЕ ($\approx$ 1,8 г) во флаконе.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Сифилис	ВТОРОЙ ВЫБОР
бензилпенициллин	Порошок для инъекций: 600 мг (= 1 млн МЕ); 3 г (= 5 млн МЕ) (натриевая или калиевая соль) во флаконе.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Внебольничная пневмония (тяжелая) [с] – Осложненная тяжелая острая недостаточность питания [с] – Сепсис у новорожденных и детей [с] – Сифилис	ВТОРОЙ ВЫБОР – Острый бактериальный менингит [с]
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений	ВТОРОЙ ВЫБОР – Инфекции костей и суставов
гентамицин	Для инъекций: 10 мг/мл (в виде сульфата); 40 мг/мл (в виде сульфата) в 2 мл флаконе.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Внебольничная пневмония (тяжелая) [с] – Осложненная тяжелая острая недостаточность питания [с] – Осложненные инфекции брюшной полости [с] – Острый бактериальный менингит у новорожденных [с] – Сепсис у новорожденных и детей [с]	ВТОРОЙ ВЫБОР – Гонорея – Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений
доксациклин ^a	Жидкость для перорального применения: 25 мг/5 мл [с]; 50 мг/5 мл (безводный) [с]. Порошок для инъекций: 100 мг во флаконе. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 50 мг [с]; 100 мг (в виде хиклата). ^a Применение у детей в возрасте <8 лет разрешается исключительно при жизнеугрожающих инфекциях при отсутствии альтернативы.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР	ВТОРОЙ ВЫБОР – Внебольничная пневмония (от легкой до средней тяжести)

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

	– Инфекция, передающаяся половым путем, вызванная <i>Chlamydia trachomatis</i> – <i>Холера</i>	– <i>Обострения ХОБЛ</i> – <i>Холера [с]</i>
клиндамицин	Капсула: 150 мг (в виде гидрохлорида). Для инъекций: 150 мг/мл (в виде фосфата); 600 мг/4 мл (в виде фосфата); 900 мг/6 мл (в виде фосфата). Жидкость для перорального применения: 75 мг/5 мл (в виде пальмитата) [с].	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – <i>Некротизирующий фасциит</i>	ВТОРОЙ ВЫБОР – <i>Инфекции костей и суставов</i>
□ клоксациллин* Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (J01CF Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам)	Капсула: 500 мг; 1 г (в виде натриевой соли). Порошок для инъекций: 500 мг (в виде натриевой соли) во флаконе. Порошок для приготовления жидкости для перорального применения: 125 мг/5 мл (в виде натриевой соли). *Для перорального применения предпочтительно использовать клоксациллин, диклоксациллин и флуклоксациллин ввиду их лучшей биодоступности.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – <i>Инфекции кожи и мягких тканей</i> – <i>Инфекции костей и суставов</i>	ВТОРОЙ ВЫБОР – <i>Сепсис у новорожденных и детей [с]</i>
метронидазол	Для инъекций: 500 мг в 100 мл флаконе. Жидкость для перорального применения: 200 мг/5 мл (в виде бензоата). Суппозитории: 500 мг; 1 г. Таблетка: 200 мг – 500 мг.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – <i>Инфекция, вызванная C. difficile</i> – <i>Некротизирующий фасциит</i> – <i>Осложненные инфекции брюшной полости (от легких до средней тяжести)</i> – <i>Осложненные инфекции брюшной полости (тяжелые)</i> – <i>Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений</i> – <i>Трихомоноз</i>	ВТОРОЙ ВЫБОР – <i>Осложненные инфекции брюшной полости (от легких до средней тяжести)</i>
нитрофурантоин	Жидкость для перорального применения: 25 мг/5 мл [с]. Таблетка: 100 мг.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – <i>Инфекции нижних мочевых путей</i>	ВТОРОЙ ВЫБОР
феноксиметилпенициллин	Порошок для приготовления жидкости для перорального применения: 250 мг/5 мл (в виде калиевой соли). Таблетка: 250 мг; 500 мг (в виде калиевой соли).	

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Внебольничная пневмония (от легкой до средней тяжести) – Прогрессирующий периапикальный абсцесс зуба – Фарингит	ВТОРОЙ ВЫБОР
прокаи́н-бензилпеницилли́н*	Порошок для инъекций: 1 г (=1 млн МЕ); 3 г (=3 млн МЕ) во флаконе. *Прокаин-бензилпенициллин не рекомендован для терапии первой линии при неонатальном сепсисе за исключением территорий с высокой неонатальной смертностью, где лечение осуществляется квалифицированными медработниками в случае отсутствия возможностей госпитальной помощи.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Сифилис (врожденный) [с]	ВТОРОЙ ВЫБОР – Сифилис
спектиномицин	Порошок для инъекций: 2 г (в виде гидрохлорида) во флаконе.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР	ВТОРОЙ ВЫБОР – Гонорея
сульфаметоксазол + триметоприм	Для инъекций: 80 мг + 16 мг/мл в 5 мл ампуле; 80 мг + 16 мг/мл в 10 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 200 мг + 40 мг/5 мл. Таблетка: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг; 800 мг + 160 мг.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Инфекции нижних мочевых путей	ВТОРОЙ ВЫБОР – Острая инвазивная диарея/ бактериальная дизентерия
триметоприм	Таблетка: 100 мг; 200 мг. Жидкость для перорального применения: 50 мг/5 мл [с].	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Инфекции нижних мочевых путей	ВТОРОЙ ВЫБОР
феноксиметилпенициллин	Порошок для приготовления жидкости для перорального применения: 250 мг/5 мл (в виде калиевой соли). Таблетка: 250 мг; 500 мг (в виде калиевой соли).	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Внебольничная пневмония (от легкой до средней тяжести) – Прогрессирующий периапикальный абсцесс зуба – Фарингит	ВТОРОЙ ВЫБОР
хлорамфеникол	Капсула: 250 мг. Масляная суспензия для инъекций*: 0,5 г/мл (в виде натрия сукцината) в 2 мл ампуле. *Только для эмпирической терапии эпидемического менингита у детей в возрасте старше 2 лет и взрослых.	

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

	Жидкость для перорального применения: 150 мг/5 мл (в виде пальмитата). Порошок для инъекций: 1 г (натрия сукцинат) во флаконе.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР	ВТОРОЙ ВЫБОР – <i>Острый бактериальный менингит</i>
цефалексин	Порошок для приготовления жидкости для перорального применения: 125 мг/5 мл; 250 мг/5 мл (безводный). Твердая лекарственная форма для перорального применения: 250 мг; 500 мг (в виде моногидрата).	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – <i>Инфекции кожи и мягких тканей</i>	ВТОРОЙ ВЫБОР – <i>Обострения ХОБЛ</i> – <i>Фарингит</i>
цефазолин ^a	Порошок для инъекций: 1 г (в виде натриевой соли) во флаконе. ^a > 1 месяца.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – <i>Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений</i>	ВТОРОЙ ВЫБОР – <i>Инфекции костей и суставов</i>
6.2.2 Антибиотики группы наблюдения		
азитромицин	Капсула: 250 мг; 500 мг (безводный). Жидкость для перорального применения: 200 мг/5 мл.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – <i>Гонорея</i> – <i>Инфекция, передающаяся половым путем, вызванная Chlamydia trachomatis</i> – <i>Кишечная лихорадка</i> – <i>Трахома</i> – <i>Фрамбезия</i> – <i>Холера [с]</i>	ВТОРОЙ ВЫБОР – <i>Гонорея</i> – <i>Острая инвазивная бактериальная диарея / дизентерия</i>
цефиксим	Порошок для приготовления жидкости для перорального применения: 100 мг /5 мл [с]. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 200 мг; 400 мг (в виде тригидрата).	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР	ВТОРОЙ ВЫБОР – <i>Гонорея</i> – <i>Острая инвазивная бактериальная диарея / дизентерия</i>
цефотаксим*	Порошок для инъекций: 250 мг (в виде натриевой соли) во флаконе. *Цефалоспорины 3-го поколения, являющийся препаратом выбора при лечении новорожденных в условиях стационара.	

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Внебольничная пневмония (тяжелая) – Внутрибольничная пневмония – Осложненные инфекции брюшной полости (от легких до средней тяжести) – Осложненные инфекции брюшной полости (тяжелые) – Острый бактериальный менингит – Пиелонефрит или простатит (тяжелый)	ВТОРОЙ ВЫБОР – Инфекции костей и суставов – Пиелонефрит или простатит (от легкого до средней тяжести) – Сепсис у новорожденных и детей [с]
ванкомицин	Капсула: 125 мг; 250 мг (в виде гидрохлорида).	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР	ВТОРОЙ ВЫБОР – Инфекция, вызванная <i>C. difficile</i>
☐ кларитромицин† Терапевтические альтернативы: – эритромицин* *В качестве терапии второго выбора при фарингите у детей (только Перечень ОЛС для детей)	Порошок для приготовления жидкости для перорального применения: 125 мг/5 мл; 250 мг/5 мл. Порошок для инъекций: 500 мг во флаконе. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 500 мг. † Кларитромицин также может применяться в комбинированных режимах терапии для эрадикации <i>H. pylori</i> у взрослых.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Внебольничная пневмония (тяжелая)	ВТОРОЙ ВЫБОР – Фарингит
пиперациллин + тазобактам	Порошок для инъекций: 2 г (в виде натриевой соли) + 250 мг (в виде натриевой соли); 4 г (в виде натриевой соли) + 500 мг (в виде натриевой соли) во флаконе.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Внутрибольничная пневмония – Некротизирующий фасциит – Осложненные инфекции брюшной полости (тяжелые) – Фебрильная нейтропения высокого риска	ВТОРОЙ ВЫБОР
цефтриаксон* 	Порошок для инъекций: 250 мг; 1 г; 2 г (в виде натриевой соли) во флаконе. *Нельзя вводить вместе с кальцием, следует избегать применения у детей в возрасте до 1 года с гипербилирубинемией  > 41 недели скорректированного гестационного возраста.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Внебольничная пневмония (тяжелая) – Внутрибольничная пневмония – Гонорея – Кишечная лихорадка – Некротизирующий фасциит – Осложненные инфекции брюшной полости (от легких до средней тяжести) – Осложненные инфекции брюшной полости (тяжелые)	ВТОРОЙ ВЫБОР – Инфекции костей и суставов – Острая инвазивная бактериальная диарея / дизентерия – Пиелонефрит или простатит (от легкого до средней тяжести) – Сепсис у новорожденных и детей [с]

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

	– Острый бактериальный менингит – Пиелонефрит или простатит (тяжелый) – Эндофтальмит	
цефуроксим	Порошок для инъекций: 250 мг, 750 мг, 1,5 г (в виде натриевой соли) во флаконе.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР	ВТОРОЙ ВЫБОР – Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений
ципрофлоксацин	Жидкость для перорального применения: 250 мг/5 мл (безводный) [с]. Раствор для в/в инфузий: 2 мг/мл (в виде хиклата) [с]. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 250 мг; 500 мг (в виде гидрохлорида).	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Кишечная лихорадка – Острая инвазивная бактериальная диарея / дизентерия – Пиелонефрит или простатит (от легкого до средней тяжести) – Фебрильная нейтропения низкого риска	ВТОРОЙ ВЫБОР – Осложненные инфекции брюшной полости (от легких до средней тяжести) – Холера
Дополнительный перечень		
ванкомицин	Порошок для инъекций: 250 мг; 500 мг; 1 г (в виде гидрохлорида) во флаконе.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Некротизирующий фасциит – Эндофтальмит	ВТОРОЙ ВЫБОР – Фебрильная нейтропения высокого риска
☐ меропенем* ^a Терапевтические альтернативы*: - имипенем + циластатин *Только при осложненных инфекциях брюшной полости и фебрильной нейтропии высокого риска. Меропенем является предпочтительным вариантом для лечения острого бактериального менингита у новорожденных.	Порошок для инъекций: 500 мг (в виде тригидрата); 1 г (в виде тригидрата) во флаконе. ^a > 3 месяцев.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР	ВТОРОЙ ВЫБОР – Осложненные инфекции брюшной полости (тяжелые) – Острый бактериальный менингит у новорожденных [с] – Фебрильная нейтропения высокого риска
цефтазидим	Порошок для инъекций: 250 мг; 1 г (в виде пентагидрата) во флаконе.	
	ПЕРВЫЙ ВЫБОР – Эндофтальмит	ВТОРОЙ ВЫБОР
6.2.3 Антибиотики группы резерва		
Дополнительный перечень		
колистин	Порошок для инъекций: 1 млн МЕ (в виде натрия колистеметата) во флаконе.	

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

линезолид	Для внутривенных инъекций: 2 мг/мл в пакете 300 мл. Порошок для приготовления жидкости для перорального применения: 100 мг/5 мл. Таблетка: 400 мг; 600 мг.
меропенем + ваборбактам	Порошок для инъекций: 1 г (в виде тригидрата) + 1 г во флаконе.
плазომидин	Для инъекций: 500 мг/10 мл.
полимиксин В	Порошок для инъекций: 500 000 МЕ во флаконе.
фосфомицин	Порошок для инъекций: 2 г; 4 г (в виде натриевой соли) во флаконе.
цефидерокол	Порошок для инъекций: 1 г (в виде сульфата токсилата) во флаконе.
цефтазидим + авибактам	Порошок для инъекций: 2 г + 0,5 г во флаконе.
6.2.4 Противопрозные лекарственные средства	
Лекарственные средства, применяемые при лечении лепры, следует использовать лишь в комбинации. Комбинированная терапия чрезвычайно важна для предупреждения развития лекарственной устойчивости. Следует использовать блистерные упаковки с цветовым кодом (блистерные упаковки для комбинированной терапии, MDT), содержащие стандартную комбинацию из двух препаратов (при олигобациллярной лепре) или трех препаратов (при мультибациллярной лепре) для взрослых и детей. Блистерные упаковки для комбинированной терапии (MDT) можно получить бесплатно через ВОЗ.	
клофазимин	Капсула: 50 мг; 100 мг.
дапсон	Таблетка: 25 мг; 50 мг; 100 мг.
рифампицин	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 150 мг; 300 мг.
6.2.5 Противотуберкулезные лекарственные средства	
ВОЗ рекомендует и поддерживает использование комбинированных препаратов с фиксированными дозировками и разработку соответствующих новых комбинаций с фиксированными дозировками, включая лекарственные формы с модифицированным высвобождением активного вещества, препараты, не требующие хранения в холодильнике, и детские лекарственные формы гарантированного фармацевтического качества.	
изониазид	Жидкость для перорального применения: 50 мг/5 мл [с]. Таблетка: 100 мг; 300 мг. Таблетка (диспергируемая): 100 мг [с].
изониазид + пиразинамид + рифампицин	Таблетка (диспергируемая): 50 мг + 150 мг + 75 мг [с].
изониазид + рифампицин	Таблетка: 75 мг + 150 мг; 150 мг + 300 мг. Таблетка (диспергируемая): 50 мг + 75 мг [с].
изониазид + рифапентин	Таблетка (с риской): 300 мг + 300 мг.
моксифлоксацин	Таблетка: 400 мг.
пиразинамид	Жидкость для перорального применения: 30 мг/мл [с]. Таблетка: 400 мг; 500 мг. Таблетка (диспергируемая): 150 мг.
рифабутин	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 150 мг.* * Для использования исключительно у пациентов с ВИЧ-инфекцией, принимающих ингибиторы протеазы.
рифампицин	Жидкость для перорального применения: 20 мг/мл [с].

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 150 мг; 300 мг.
рифампентин	Таблетка: 150 мг; 300 мг.
этамбутол	Жидкость для перорального применения: 25 мг/мл [с]. Таблетка: 100 мг; 400 мг (гидрохлорид). Таблетка (диспергируемая): 100 мг [с].
этамбутол + изониазид + пиразинамид + рифампицин	Таблетка: 275 мг + 75 мг + 400 мг + 150 мг.
этамбутол + изониазид + рифампицин	Таблетка: 275 мг + 75 мг + 150 мг.
Дополнительный перечень	
Лекарственные препараты для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (ТБ-МЛУ) следует применять в специализированных учреждениях, придерживающихся стандартов ВОЗ относительно борьбы с туберкулезом.	
амикацин	Для инъекций: 100 мг/2 мл (в виде сульфата) в 2 мл флаконе; 250 мг/мл (в виде сульфата) в 2 мл флаконе.
амоксиклав + клавулановая кислота*	Порошок для приготовления жидкости для перорального применения: 250 мг (в виде тригидрата) + 62,5 мг (в виде калиевой соли)/5 мл [с]. Таблетка: 500 мг (в виде тригидрата) + 125 мг (в виде калиевой соли). *Для использования исключительно в рамках комбинированной терапии с меропенемом или комбинацией имипенем+циластатин.
бедаквилин ^a	Таблетка: 20 мг [с]; 100 мг. ^a ≥ 5 лет
деламанид ^a	Таблетка (диспергируемая): 25 мг [с]. ^a ≥ 3 лет Таблетка: 50 мг. ^a ≥ 6 лет
клофазимин	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 50 мг; 100 мг.
левофлоксацин	Таблетка: 250 мг; 500 мг; 750 мг. Таблетка (диспергируемая): 100 мг [с].
линезолид	Порошок для приготовления жидкости для перорального применения: 100 мг/5 мл. Таблетка: 600 мг. Таблетка (диспергируемая): 150 мг [с].
□ меропенем Терапевтические альтернативы: - имипенем + циластатин	Порошок для инъекций: 500 мг (в виде тригидрата); 1 г (в виде тригидрата) во флаконе.
моксифлоксацин	Таблетка: 400 мг. Таблетка (диспергируемая): 100 мг [с].
p-аминосалициловая кислота	Гранулы: 4 г в саше.
стрептомицин [с]	Порошок для инъекций: 1 г (в виде сульфата) во флаконе.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

□ циклосерин Терапевтические альтернативы: - теризидон	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 125 мг [с]; 250 мг.
□ этионамид Терапевтические альтернативы: - протионамид	Таблетка: 125 мг; 250 мг. Таблетка (диспергируемая): 125 мг [с].
6.3 Противогрибковые лекарственные средства	
амфотерицин В	Порошок для инъекций: 50 мг (в виде натрия деоксихолата или липосомального комплекса) во флаконе.
вориконазол*	Таблетка: 50 мг; 200 мг. Порошок для инъекций: 200 мг во флаконе. Порошок для приготовления жидкости для перорального применения: 40 мг/мл. *Для лечения хронического аспергиллеза легких и острого инвазивного аспергиллеза.
гризеофульвин	Жидкость для перорального применения: 125 мг/5 мл [с]. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 125 мг; 250 мг.
итраконазол*	Капсула: 100 мг. Жидкость для перорального применения: 10 мг/мл. *Для лечения хронического аспергиллеза легких, гистоплазмоза, споротрихоза, паракокцидиоидомикоза, микозов, вызванных <i>T. marneffe</i> , и хромобластомикоза; а также для профилактики гистоплазмоза и инфекций, вызываемых <i>T. marneffe</i> , у пациентов со СПИДом.
клотримазол	Вагинальный крем: 1%; 10%. Вагинальная таблетка: 100 мг; 500 мг.
нистатин	Таблетка для рассасывания: 100 000 МЕ. Жидкость для перорального применения: 50 мг/5 мл [с]; 100 000 МЕ/мл [с]. Пессарий: 100 000 МЕ. Таблетка: 100 000 МЕ; 500 000 МЕ.
флуконазол	Капсула: 50 мг. Для инъекций: 2 мг/мл во флаконе. Жидкость для перорального применения: 50 мг/5 мл.
флуцитозин	Капсула: 250 мг. Для инфузий: 2,5 г в 250 мл.
Дополнительный перечень	
калия йодид	Насыщенный раствор.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

☐ микафунгин Терапевтические альтернативы: - анидулафунгин - каспофунгин	Порошок для инъекций: 50 мг (в виде натриевой соли); 100 мг (в виде натриевой соли) во флаконе.
6.4 Противовирусные лекарственные средства	
6.4.1 Противогерпетические лекарственные средства	
☐ ацикловир Терапевтические альтернативы: - валацикловир (перорально)	Жидкость для перорального применения: 200 мг/5 мл [с]. Порошок для инъекций: 250 мг (в виде натриевой соли) во флаконе. Таблетка: 200 мг.
6.4.2 Антиретровирусные лекарственные средства	
На основе существующих фактических данных и опыта использования в список в качестве основных лекарственных средств для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции (профилактика передачи от матери ребенку, доконтактная профилактика (по показаниям) и постконтактная профилактика) включены препараты, относящиеся к следующим классам антиретровирусных препаратов. ВОЗ подчеркивает важность использования этих препаратов в соответствии с глобальными и национальными рекомендациями. ВОЗ рекомендует и поддерживает использование комбинированных препаратов с фиксированными дозировками и разработку соответствующих новых комбинаций препаратов с фиксированными дозировками, включая модифицированные лекарственные формы, препараты, не требующие хранения в холодильнике, а также детские лекарственные формы гарантированного фармацевтического качества. Таблетки с риской могут применяться у детей и, соответственно, можно рассмотреть возможность их включения в список в виде таблеток при условии наличия препаратов надлежащего качества.	
6.4.2.1 Нуклеозидные/нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы	
абакавир	Таблетка: 300 мг (в виде сульфата).
зидовудин	Капсула: 250 мг. Жидкость для перорального применения: 50 мг/5 мл. Раствор для в/в инфузий: 10 мг/мл в 20 мл флаконе. Таблетка: 300 мг.
ламивудин	Жидкость для перорального применения: 50 мг/5 мл [с]. Таблетка: 150 мг.
тенофовира дизопроксил фумарат†	Таблетка: 300 мг (тенофовира дизопроксил фумарат – эквивалент 245 мг тенофовира дизопроксила). †также показан для доконтактной профилактики.
6.4.2.2 Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы	
невирапин a	Жидкость для перорального применения: 50 мг/5 мл. Таблетка: 50 мг (диспергируемая); 200 мг. a > 6 недель
эфаверенц	Таблетка: 600 мг.
6.4.2.3 Ингибиторы протеазы	
Выбор ингибитора(ов) протеазы из Примерного перечня определяется каждой страной индивидуально, исходя из международных и национальных клинических рекомендаций и опыта. Ритонавир рекомендуется использовать в качестве фармакокинетического усилителя (бустера) в сочетании с другими препаратами, а не для антиретровирусной монотерапии. Все другие ингибиторы протеазы необходимо применять в усиленных формах (например, в сочетании с ритонавиром).	
атазанавир + ритонавир	Таблетка (термостойкая): 300 мг (в виде сульфата) + 100 мг.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

дарунавир ^a	Таблетка: 75 мг; 400 мг; 600 мг; 800 мг. ^a > 3 лет
лопинавир + ритонавир	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 40 мг + 10 мг [с]. Таблетка (термостойкая): 100 мг + 25 мг; 200 мг + 50 мг.
ритонавир	Таблетка (термостойкая): 25 мг; 100 мг.
6.4.2.4 Ингибиторы интегразы	
долутегравир ^a	Таблетка (диспергируемая, с риской): 10 мг [с]. ^a ≥ 4 недели и ≥ 3 кг Таблетка: 50 мг. ^a ≥ 25 кг
ралтегравир*	Гранулы для приготовления суспензии для перорального применения: 100 мг в саше. Таблетка (жевательная): 25 мг. Таблетка: 400 мг. *Для применения у беременных женщин и в рамках режимов терапии второй линии в соответствии с клиническими рекомендациями ВОЗ.
6.4.2.5 Комбинации антиретровирусных лекарственных средств с фиксированными дозировками	
абакавир + ламивудин	Таблетка (диспергируемая, с риской): 120 мг (в виде сульфата) + 60 мг.
долутегравир + ламивудин + тенофовир	Таблетка: 50 мг + 300 мг + 300 мг (тенофовира дизопроксил фумарат – эквивалент 245 мг тенофовира дизопроксила).
ламивудин + зидовудин	Таблетка: 30 мг + 60 мг [с]; 150 мг + 300 мг.
эфавиренц + [□] эмтрицитабин + тенофовир Терапевтические альтернативы: - ламивудин (для эмтрицитабина)	Таблетка: 600 мг + 200 мг + 300 мг (тенофовира дизопроксил фумарат – эквивалент 245 мг тенофовира дизопроксила).
эфавиренц + ламивудин + тенофовир	Таблетка: 400 мг + 300 мг + 300 мг (тенофовира дизопроксил фумарат – эквивалент 245 мг тенофовира дизопроксила).
[□] эмтрицитабин + тенофовир† Терапевтические альтернативы: - ламивудин (для эмтрицитабина)	Таблетка: 200 мг + 300 мг (тенофовира дизопроксил фумарат – эквивалент 245 мг тенофовира дизопроксила). † комбинация также показана для доконтактной профилактики
6.4.2.6 Лекарственные средства для профилактики оппортунистических инфекций, связанных с ВИЧ-инфекцией	
изониазид + пиридоксин + сульфаметоксазол + триметоприм	Таблетка (с риской): 300 мг + 25 мг + 800 мг + 160 мг.
6.4.3 Другие противовирусные лекарственные средства	
валганцикловир*	Таблетка: 450 мг. *Для лечения ретинита, вызванного цитомегаловирусом (ЦМВр).

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

рибавирин*	Для внутривенных инъекций: 800 мг и 1 г в 10 мл фосфатного буферного раствора. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 200 мг; 400 мг; 600 мг. *Для лечения вирусных геморрагических лихорадок.
<i>Дополнительный перечень</i>	
валганцикловир*[с]	Порошок для приготовления раствора для перорального применения: 50 мг/мл. Таблетка: 450 мг. *Для лечения ретинита, вызванного цитомегаловирусом (ЦМВр).
осельтамивир*	Капсула: 30 мг; 45 мг; 75 мг (в виде фосфата). * Для лечения тяжелых форм заболеваний, связанных с подтвержденной или подозреваемой гриппозной инфекцией, у госпитализированных пациентов в критическом состоянии.
6.4.4 Лекарственные средства для лечения гепатитов	
6.4.4.1 Лекарственные средства, применяемые при гепатите В	
6.4.4.1.1 Нуклеозидные/нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы	
тенофовира дизопроксил фумарат	Таблетка: 300 мг (тенофовира дизопроксил фумарат – эквивалент 245 мг тенофовира дизопроксила).
энтекавир	Жидкость для перорального применения: 0,05 мг/мл. Таблетка: 0,5 мг; 1 мг
6.4.4.2 Лекарственные средства, применяемые при гепатите С	
В целях выбора и закупки на национальном уровне в качестве терапевтических альтернатив следует рассматривать пангенотипические противовирусные препараты прямого действия.	
6.4.4.2.1 ☐ Пангенотипические комбинации противовирусных препаратов прямого действия	
даклатасвир*	Таблетка: 30 мг; 60 мг (в виде гидрохлорида). *Пангенотипическое действие обеспечивается при комбинации с софосбувиром.
даклатасвир + софосбувир	Таблетка: 60 мг + 400 мг.
глекапревир + пибрентасвир	Таблетка: 100 мг + 40 мг Гранулы: 50 мг + 20 мг в саше [с].
софосбувир*	Таблетка: 200 мг; 400 мг. *Пангенотипическое действие обеспечивается при комбинации с даклатасвиром.
софосбувир + велпатасвир	Таблетка: 200 мг + 50 мг [с]; 400 мг + 100 мг.
6.4.4.2.2 Непангенотипические комбинации противовирусных препаратов прямого действия	
дасабувир	Таблетка: 250 мг.
ледипасвир + софосбувир	Таблетка: 90 мг + 400 мг.
омбитасвир + паритапревир + ритонавир	Таблетка: 12,5 мг + 75 мг + 50 мг.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

6.4.4.2.3 Другие противовирусные лекарственные средства, применяемые при гепатите С	
рибавирин*	Для внутривенных инъекций: 800 мг и 1 г в 10 мл фосфатного буферного раствора. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 200 мг; 400 мг; 600 мг. *Для лечения гепатита С в сочетании с противовирусными препаратами прямого действия.
Дополнительный перечень	
пегилированный интерферон-альфа (2a или 2b) *	Флакон или предварительно заполненный шприц: 180 мкг (пегинтерферон альфа-2a). 80 мкг, 100 мкг (пегинтерферон альфа-2b). *Для использования в комбинации с рибавирином.
6.5 Антипротозойные лекарственные средства	
6.5.1 Лекарственные средства, применяемые при амебиазе и лямблиозе	
дилоксанид 	Таблетка: 500 мг (фуроат).  > 25 кг.
☐ метронидазол Терапевтические альтернативы: - тинидазол	Для инъекций: 500 мг в 100 мл флаконе. Жидкость для перорального применения: 200 мг/5 мл (в виде бензоата). Таблетка: 200 мг – 500 мг.
6.5.2 Противолейшманиозные лекарственные средства	
амфотерицин В	Порошок для инъекций: 50 мг во флаконе (в виде натрия деоксихолата или липосомального комплекса).
милтефозин	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 10 мг; 50 мг.
натрия стибоглюконат или меглумина антимононат	Для инъекций: 100 мг/мл, 1 флакон = 30 мл или 30%, эквивалент приблизительно 8,1% сурьмы (пентавалентной) в 5 мл ампуле.
паромомицин	Раствор для внутримышечных инъекций: 750 мг основы паромомицина (в виде сульфата).
6.5.3 Противомаларийные лекарственные средства	
6.5.3.1 Для лечения	
Лекарственные средства для лечения малярии, вызванной <i>P. falciparum</i>, следует использовать в режиме комбинированной терапии. В настоящее время в списке представлены рекомендуемые комбинации в соответствии с клиническими рекомендациями. ВОЗ осознает, что не все комбинированные препараты с фиксированными дозировками, упоминаемые в клинических рекомендациях ВОЗ, уже существуют и потому призывает разработать и провести строгое тестирование этих препаратов. ВОЗ также призывает к разработке и тестированию лекарственных форм для ректального применения.	
амодиахин*	Таблетка: 153 мг или 200 мг (в виде гидрохлорида). *Для использования в сочетании с артемизинином 50 мг.
артемизинин*	Масляный раствор для инъекций: 80 мг/мл в 1 мл ампуле. *Для лечения тяжелой формы малярии.
артемизинин + лумефантрин*	Таблетка: 20 мг + 120 мг.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

	Таблетка (диспергируемая): 20 мг + 120 мг [с]. *Не рекомендуется в первом триместре беременности или у детей с массой тела менее 5 кг.
артесунат*	Для инъекций: ампулы, содержащие 60 мг безводной артезуновой кислоты, с 5% раствором натрия бикарбоната в отдельной ампуле. Для лечения тяжелой формы малярии. Лекарственная форма для ректального применения: 50 мг [с]; 100 мг [с]; 200 мг капсулы (исключительно для лечения тяжелой формы малярии на догоспитальном этапе; для дальнейшего лечения пациенты должны быть направлены в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение) [с]. Таблетка: 50 мг. *Для применения в комбинации с амодиахином, мефлохином или сульфадоксином + пириметамином.
артесунат + амодиахин*	Таблетка: 25 мг + 67,5 мг; 50 мг + 135 мг; 100 мг + 270 мг. *Альтернативно могут применяться и другие комбинации, которые обеспечивают поступление в организм амодиахина (в виде гидрохлорида) в таких целевых дозах, как, например 153 мг или 200 мг и 50 мг артезуната.
артесунат + мефлохин	Таблетка: 25 мг + 55 мг; 100 мг + 220 мг.
артесунат + пиронаридина тетрафосфат ^a	Гранулы: 20 мг + 60 мг [с]. Таблетка: 60 мг + 180 мг. ^a > 5 кг
дигидроартемизинин + пиперахина фосфат ^a	Таблетка: 20 мг + 160 мг; 40 мг + 320 мг. ^a > 5 кг
доксациклин*	Капсула: 100 мг (в виде гидрохлорида или хиклата). Таблетка (диспергируемая): 100 мг (в виде моногидрата). *Для применения исключительно в комбинации с хинином.
мефлохин*	Таблетка: 250 мг (в виде гидрохлорида). *Для применения в комбинации с артезунатом 50 мг.
примахин*	Таблетка: 7,5 мг; 15 мг (в виде дифосфата). *Для применения исключительно для радикального излечения от инфекций, вызванных <i>Plasmodium vivax</i> и <i>Plasmodium ovale</i>. Продолжительность приема 14 дней.
сульфадоксин + пириметамин*	Таблетка: 500 мг + 25 мг. *Исключительно в сочетании с артезунатом 50 мг.
хинин*	Для инъекций: 300 мг хинина гидрохлорида/мл в 2 мл ампуле. Таблетка: 300 мг (хинина сульфат) или 300 мг (хинина бисульфат). *Для применения исключительно для лечения тяжелой формы малярии и следует использовать в сочетании с доксациклином.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

хлорохин*	Жидкость для перорального применения: 50 мг/5 мл (в виде фосфата или сульфата). Таблетка: 100 мг; 150 мг (в виде фосфата или сульфата). *Для применения только для лечения инфекции, вызванной <i>Plasmodium vivax</i>.
6.5.3.2 Для химиопрофилактики	
амодиахин – сульфадоксин + пириметамин [с]	Таблетки диспергируемые в единой упаковке: амодиахин 76,5 мг (в виде гидрохлорида) [3] и сульфадоксин + пириметамин 250 мг + 12,5 мг [1]; амодиахин 153 мг (в виде гидрохлорида) [3] и сульфадоксин + пириметамин 500 мг + 25 мг [1].
доксациклин a	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 100 мг (в виде гидрохлорида или хиклата). a > 8 лет.
мефлохин a	Таблетка: 250 мг (в виде гидрохлорида). a > 5 кг или > 3 месяцев.
прогуанил*	Таблетка: 100 мг (в виде гидрохлорида). *Для применения исключительно в сочетании с хлорохином.
сульфадоксин + пириметамин	Таблетка: 250 мг + 12,5 мг [с]; 500 мг + 25 мг.
хлорохин*	Жидкость для перорального применения: 50 мг/5 мл (в виде фосфата или сульфата). Таблетка: 150 мг (в виде фосфата или сульфата). *Для применения исключительно в регионах Центральной Америки для лечения инфекций, вызванных <i>Plasmodium vivax</i>.
6.5.4 Лекарственные средства, применяемые при пневмоцистозе и токсоплазмозе	
пириметамин	Таблетка: 25 мг.
сульфадиазин	Таблетка: 500 мг.
сульфаметоксазол + триметоприм	Для инъекций: 80 мг + 16 мг/мл в 5 мл ампуле; 80 мг + 16 мг/мл в 10 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 200 мг + 40 мг/5 мл [с]. Таблетка: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг [с]; 800 мг + 160 мг
Дополнительный перечень	
пентамидин	Таблетка: 200 мг; 300 мг (в виде изетионата).
6.5.5 Лекарственные средства, применяемые при трипаносомозе	
6.5.5.1 Африканский трипаносомоз	
фексинидазол*	Таблетка: 600 мг. *Для лечения африканского трипаносомоза человека, вызванного инфекцией <i>Trypanosoma brucei gambiense</i>, на 1-й и 2-й стадиях заболевания.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

Лекарственные средства для лечения 1-й стадии африканского трипаносомоза	
пентамидин*	Порошок для инъекций: 200 мг (в виде изетионата) во флаконе. *Для лечения инфекции, вызванной <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .
сурамин натрий*	Порошок для инъекций: 1 г во флаконе. *Для лечения начальной фазы инфекции, вызванной <i>Trypanosoma brucei rhodesiense</i> .
Лекарственные средства для лечения 2-й стадии африканского трипаносомоза	
меларсопрол	Для инъекций: 180 мг/5 мл в 5 мл ампуле (3,6% раствор).
нифуртимокс *	Таблетка: 120 мг. *Для применения исключительно в сочетании с эфлорнитином для лечения инфекции, вызванной <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .
эфлорнитин*	Для инъекций: 200 мг/мл (гидрохлорид) в 100 мл флаконе. *Для лечения инфекции, вызванной <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .
Дополнительный перечень	
меларсопрол [с]	Для инъекций: 180 мг/5 мл в 5 мл ампуле (3,6% раствор).
6.5.5.2 Американский трипаносомоз	
бензнидазол	Таблетка: 12,5 мг [с]; 100 мг. Таблетка (с риской): 50 мг.
нифуртимокс	Таблетка: 30 мг; 120 мг; 250 мг.
6.6 Лекарственные средства для лечения эктопаразитарных инфекций	
ивермектин	Таблетка (с риской): 3 мг.
7. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МИГРЕНИ	
7.1 Для лечения острых приступов	
ацетилсалициловая кислота	Таблетка: 300 мг – 500 мг.
ибупрофен [с]	Таблетка: 200 мг; 400 мг.
парацетамол	Жидкость для перорального применения: 120 мг/5 мл [с]; 125 мг/5 мл [с]. Таблетка: 300 мг – 500 мг.
суматриптан	Таблетка: 50 мг.
7.2 Для профилактики	
□ пропранолол Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023)	Таблетка: 20 мг; 40 мг (гидрохлорид).

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

8. ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ И ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	
8.1 Иммуномодуляторы для применения при незлокачественных заболеваниях	
<i>Дополнительный перечень</i>	
☐ <i>адалимумаб*</i> <i>Терапевтические альтернативы*:</i> - голимумаб - инфликсимаб - цертолизумаба пэгол - этанерцепт <i>*в том числе биоаналоги гарантированного качества</i>	<i>Для инъекций: 40 мг/0,8 мл; 40 мг/0,4 мл.</i>
<i>азатиоприн</i>	<i>Порошок для инъекций: 100 мг (в виде натриевой соли) во флаконе.</i> <i>Таблетка (с риской): 50 мг.</i>
<i>такролимус</i>	<i>Капсула (с немедленным высвобождением): 0,5 мг; 0,75 мг; 1 мг; 2 мг; 5 мг.</i> <i>Гранулы для приготовления суспензии для перорального применения: 0,2 мг; 1 мг.</i> <i>Для инъекций: 5 мг/мл в 1 мл флаконе.</i>
<i>циклоспорин</i>	<i>Капсула: 25 мг.</i> <i>Концентрат для инъекций: 50 мг/мл в 1 мл ампуле.</i>
8.2 Противоопухолевые лекарственные средства и средства для поддерживающей терапии	
Перечисленные далее лекарственные средства следует применять в соответствии с протоколами лечения заболеваний.	
8.2.1 Цитотоксические лекарственные средства	
<i>Дополнительный перечень</i>	
<i>аспарагиназа*</i> <i>*в том числе биоаналоги гарантированного качества</i>	<i>Порошок для инъекций: 10 000 МЕ во флаконе.</i> – Острый лимфобластный лейкоз.
<i>бендамустин</i>	<i>Для инъекций: 45 мг/0,5 мл; 180 мг/2 мл.</i> – Фолликулярная лимфома – Хронический лимфоцитарный лейкоз
<i>блеомицин</i>	<i>Порошок для инъекций: 15 мг (в виде сульфата) во флаконе.</i> – Герминогенная опухоль яичек – Герминогенная опухоль яичников – Лимфома Ходжкина – Саркома Капоши
<i>винбластин</i>	<i>Для инъекций: 10 мг/10 мл (сульфат) во флаконе.</i> <i>Порошок для инъекций: 10 мг (сульфат) во флаконе.</i> – Герминогенная опухоль яичек – Герминогенная опухоль яичников – Глиома низкой степени злокачественности – Лимфома Ходжкина <i>Саркома Капоши</i>

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

винкристин	Для инъекций: 1 мг/мл (сульфат); 2 мг/2 мл (сульфат) во флаконе. Порошок для инъекций: 1 мг; 5 мг (сульфат) во флаконе. – Гестационная трофобластическая неоплазия – Глиома низкой степени злокачественности – Диффузная В-крупноклеточная лимфома – Лимфома Беркитта – Лимфома Ходжкина – Нефробластома (опухоль Вильмса) – Острый лимфобластный лейкоз – Рабдомиосаркома – Ретинобластома – Саркома Капоши – Саркома Юинга Фолликулярная лимфома
винорелбин	Капсула: 20 мг; 30 мг; 80 мг. Для инъекций: 10 мг/мл в 1 мл флаконе; 50 мг/5 мл в 5 мл флаконе. – Метастатический рак молочной железы – Немелкоклеточный рак легких Рабдомиосаркома
гемцитабин	Порошок для инъекций: 200 мг; 1 г во флаконе. – Немелкоклеточный рак легких Эпителиальный рак яичников
гидроксикарбамид	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 200 мг; 250 мг; 300 мг; 400 мг; 500 мг; 1 г. Хронический миелолейкоз
дакарбазин	Порошок для инъекций: 100 мг во флаконе. Лимфома Ходжкина
дактиномицин	Порошок для инъекций: 500 мкг во флаконе. – Гестационная трофобластическая неоплазия – Нефробластома (опухоль Вильмса) – Рабдомиосаркома Саркома Юинга
даунорубин	Порошок для инъекций: 50 мг (гидрохлорид) во флаконе. – Острый лимфобластный лейкоз – Острый миелолейкоз Острый промиелоцитарный лейкоз
доцетаксел	Для инъекций: 20 мг/мл; 40 мг/мл. – Метастатический рак молочной железы – Метастатический рак предстательной железы Ранняя стадия рака молочной железы
доксорубин	Порошок для инъекций: 10 мг; 50 мг (гидрохлорид) во флаконе. – Диффузная В-крупноклеточная лимфома

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

	– Лимфома Беркитта – Лимфома Ходжкина – Метастатический рак молочной железы – Множественная миелома – Нефробластома (опухоль Вильмса) – Остеосаркома – Острый лимфобластный лейкоз – Ранняя стадия рака молочной железы – Саркома Капоши – Саркома Юинга Фолликулярная лимфома
иринотекан	Для инъекций: 40 мг/2 мл в 2 мл флаконе; 100 мг/5 мл в 5 мл флаконе; 500 мг/25 мл в 25 мл флаконе. – Метастатический колоректальный рак – Нефробластома (опухоль Вильмса) Рабдомиосаркома
ифосфамид	Порошок для инъекций: 500 мг; 1 г; 2 г во флаконе. – Герминогенная опухоль яичек – Герминогенная опухоль яичников – Лимфома Беркитта – Нефробластома (опухоль Вильмса) – Остеосаркома – Рабдомиосаркома Саркома Юинга
кальция фолинат	Для инъекций: 3 мг/мл в 10 мл ампуле. Таблетка: 5 мг; 15 мг; 25 мг. – Гестационная трофобластическая неоплазия – Лимфома Беркитта – Метастатический колоректальный рак – Остеосаркома – Ранняя стадия рака прямой кишки – Ранняя стадия рака толстой кишки
капецитабин	Таблетка: 150 мг; 500 мг. – Метастатический колоректальный рак – Метастатический рак молочной железы – Ранняя стадия рака прямой кишки – Ранняя стадия рака толстой кишки
карбоплатин	Для инъекций: 50 мг/5 мл; 150 мг/15 мл; 450 мг/45 мл; 600 мг/60 мл. – Герминогенная опухоль яичек – Герминогенная опухоль яичников – Глиома низкой степени злокачественности – Немелкоклеточный рак легких – Нефробластома (опухоль Вильмса) – Остеосаркома – Рак головы и шеи (как радиосенсибилизатор) – Рак носоглотки – Рак шейки матки – Ранняя стадия рака молочной железы

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

	– Ретинобластома – Эпителиальный рак яичников
мелфалан	Таблетка: 2 мг Порошок для инъекций: 50 мг во флаконе Множественная миелома.
меркаптопурин	Таблетка: 50 мг. – Острый лимфобластный лейкоз Острый промиелоцитарный лейкоз.
метотрексат	Порошок для инъекций: 50 мг (в виде натриевой соли) во флаконе. Таблетка: 2,5 мг (в виде натриевой соли). – Гестационная трофобластическая неоплазия – Лимфома Беркитта – Остеосаркома – Острый лимфобластный лейкоз – Острый промиелоцитарный лейкоз Ранняя стадия рака молочной железы
мышьяка триоксид	Концентрат для приготовления раствора для инфузий: 1 мг/мл Острый промиелоцитарный лейкоз
оксалиплатин	Для инъекций: 50 мг/10 мл в 10 мл флаконе; 100 мг/20 мл в 20 мл флаконе; 200 мг/40 мл в 40 мл флаконе. Порошок для инъекций: 50 мг; 100 мг во флаконе. – Метастатический колоректальный рак Ранняя стадия рака толстой кишки
паклитаксел	Для инъекций: 6 мг/мл во флаконе. – Герминогенная опухоль яичников – Метастатический рак молочной железы – Немелкоклеточный рак легких – Рак носоглотки – Рак шейки матки – Ранняя стадия рака молочной железы – Саркома Капоши – Эпителиальный рак яичников
пегаспаргаза* *в том числе биоаналоги гарантированного качества	Для инъекций: 3750 единиц/5 мл во флаконе. – Острый лимфобластный лейкоз
прокарбазин [с]	Капсула: 50 мг (в виде гидрохлорида). – Лимфома Ходжкина
средство на основе реальгара-индиго натурального	Таблетка: 270 мг (содержит 30 мг тетрасульфида тетрамышьяка). – Острый промиелоцитарный лейкоз

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

тиогуанин [с]	<i>Твердая лекарственная форма для перорального применения:</i> 40 мг. – Острый лимфобластный лейкоз
флударабин	<i>Порошок для инъекций:</i> 50 мг (фосфат) во флаконе. <i>Таблетка:</i> 10 мг Хронический лимфоцитарный лейкоз.
фторурацил	<i>Для инъекций:</i> 50 мг/мл в 5 мл ампуле. – Метастатический колоректальный рак – Рак носоглотки – Ранняя стадия рака молочной железы – Ранняя стадия рака прямой кишки Ранняя стадия рака толстой кишки
хлорамбуцил	<i>Таблетка:</i> 2 мг. Хронический лимфоцитарный лейкоз.
цисплатин	<i>Для инъекций:</i> 10 мг/10 мл; 20 мг/20 мл; 50 мг/50 мл; 100 мг/100 мл. – Герминогенная опухоль яичек – Герминогенная опухоль яичников – Глиома низкой степени злокачественности – Немелкоклеточный рак легких – Остеосаркома – Рак головы и шеи (в качестве радиосенсибилизирующего средства) – Рак носоглотки (в качестве радиосенсибилизирующего средства) Рак шейки матки
циклофосфамид	<i>Порошок для инъекций:</i> 500 мг; 1 г; 2 г во флаконе. <i>Таблетка:</i> 25 мг; 50 мг. – Гестационная трофобластическая неоплазия – Глиома низкой степени злокачественности – Диффузная В-крупноклеточная лимфома – Лимфома Беркитта – Лимфома Ходжкина – Метастатический рак молочной железы – Множественная миелома – Нефробластома (опухоль Вильмса) – Острый лимфобластный лейкоз – Рабдомиосаркома – Ранняя стадия рака молочной железы – Саркома Юинга – Фолликулярная лимфома Хронический лимфоцитарный лейкоз
цитарабин	<i>Порошок для инъекций:</i> 100 мг во флаконе. – Лимфома Беркитта – Острый лимфобластный лейкоз – Острый миелолейкоз Острый промиелоцитарный лейкоз

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

этопозид	Капсула: 50 мг, 100 мг. Для инъекций: 20 мг/мл в 5 мл ампуле. – Герминогенная опухоль яичек – Герминогенная опухоль яичников – Гестационная трофобластическая неоплазия – Лимфома Беркитта – Лимфома Ходжкина – Немелкоклеточный рак легких – Нейробластома (опухоль Вильмса) – Остеосаркома – Острый лимфобластный лейкоз – Острый миелолейкоз – Ретинобластома Саркома Юинга
8.2.2 Таргетные лекарственные средства (противоопухолевые лекарственные средства направленного действия)	
Дополнительный перечень	
полностью транс-ретиноевая кислота (ATRA)	Капсула: 10 мг. – Острый промиелоцитарный лейкоз.
бортезомиб	Порошок для инъекций: 3,5 мг во флаконе. – Множественная миелома
дазатиниб	Таблетка: 20 мг; 50 мг; 70 мг; 80 мг; 100 мг; 140 мг. – Хронический миелолейкоз, резистентный к иматинибу
ибрутиниб	Капсула: 140 мг. Рецидивирующий/рефрактерный хронический лимфоцитарный лейкоз
иматиниб	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 100 мг; 400 мг. – Гастроинтестинальная стромальная опухоль – Положительный по филадельфийской хромосоме острый лимфобластный лейкоз Хронический миелолейкоз
нилотиниб	Капсула: 150 мг; 200 мг. Хронический миелолейкоз, резистентный к иматинибу
ритуксимаб* *в том числе биоаналоги гарантированного качества	Для внутривенных инъекций: 100 мг/10 мл в 10 мл флаконе; 500 мг/50 мл в 50 мл флаконе. – Диффузная В-крупноклеточная лимфома – Фолликулярная лимфома Хронический лимфоцитарный лейкоз
трастузумаб* *в том числе биоаналоги гарантированного качества	Порошок для инъекций: 60 мг; 150 мг; 440 мг во флаконе. – Местастатический HER2-позитивный рак молочной железы Ранняя стадия HER2-позитивного рака молочной железы

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

☐ эрлотиниб Терапевтические альтернативы: - афатиниб - гефитиниб	Таблетка: 100 мг, 150 мг. – Распространенный немелкоклеточный рак легких с мутацией гена EGFR
эверолимус	Таблетка: 2,5 мг; 5 мг; 7,5 мг; 10 мг. Таблетка (диспергируемая): 2 мг; 3 мг; 5 мг. – Субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома
Дополнительный перечень	
леналидомид	Капсула: 25 мг. – Множественная миелома
☐ ниволумаб* Терапевтические альтернативы*: - пембролизумаб *в том числе биоаналоги гарантированного качества	Концентрированный раствор для инфузий: 10 мг/мл. – Метастатическая меланома
талидомид	Капсула: 50 мг. – Множественная миелома
филграстим* *в том числе биоаналоги гарантированного качества	Для инъекций: 120 мкг/0,2 мл; 300 мкг/0,5 мл; 480 мкг/0,8 мл в предварительно заполненном шприце. Для инъекций: 300 мкг/мл в 1 мл флаконе, 480 мкг/1,6 мл в 1,6 мл флаконе. – Вторичная профилактика у пациентов, у которых ранее развивалась нейтропения на фоне проведения миелотоксичной химиотерапии. – Для облегчения проведения режимов химиотерапии с сокращенными интервалами. Первичная профилактика у пациентов с высоким риском развития фебрильной нейтропении, связанной с миелотоксичной химиотерапией.
8.2.4 Гормональные и антигормональные лекарственные средства	
Дополнительный перечень	
☐ абиратерон Терапевтические альтернативы: - энзалутамид	Таблетка: 250 мг; 500 мг. – Метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы.
☐ анастрозол Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (L02BG Ингибиторы ароматазы)	Таблетка: 1 мг. – Метастатический рак молочной железы – Ранняя стадия рака молочной железы

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

☐ бикалутамид Терапевтические альтернативы: - нилутамид - флутамид	Таблетка: 50 мг. – Метастатический рак предстательной железы
дексаметазон	Для инъекций: 4 мг/мл (в виде динатрия фосфата) в 1 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 2 мг/5 мл [с]. Таблетка: 2 мг [с]; 4 мг. – Лимфома Беркитта – Множественная миелома – Острый лимфобластный лейкоз
гидрокортизон	Порошок для инъекций: 100 мг (в виде натрия сукцината) во флаконе. – Лимфома Беркитта – Острый лимфобластный лейкоз
☐ лейпрорелин Терапевтические альтернативы: - гозерелин - трипторелин	Для инъекций: 7,5 мг; 22,5 мг в предварительно заполненном шприце – Метастатический рак предстательной железы – Ранняя стадия рака молочной железы
метилпреднизолон [с]	Для инъекций: 40 мг/мл (в виде натрия сукцината) в 1 мл однодозовых флаконах и 5 мл многодозовых флаконах; 80 мг/мл (в виде натрия сукцината) в 1 мл однодозовых флаконах. – Лимфома Беркитта – Острый лимфобластный лейкоз
☐ преднизолон Терапевтические альтернативы: - преднизон	Жидкость для перорального применения: 5 мг/мл [с]. Таблетка: 5 мг; 25 мг. – Диффузная В-крупноклеточная лимфома – Лимфома Беркитта – Лимфома Ходжкина – Метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы – Множественная миелома – Острый лимфобластный лейкоз – Фолликулярная лимфома – Хронический лимфоцитарный лейкоз
тамоксифен	Таблетка: 10 мг; 20 мг (в виде цитрата). – Метастатический рак молочной железы – Ранняя стадия рака молочной железы
8.2.5 Лекарственные средства для поддерживающей терапии	
Дополнительный перечень	
аллопуринол [с]	Таблетка: 100 мг; 300 мг. – Синдром лизиса опухоли
золедроновая кислота	Концентрированный раствор для инфузий: 4 мг/5 мл в 5 мл флаконе.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

	<i>Раствор для инфузий: 4 мг/100 мл в 100 мл флаконе.</i> <i>Поражения костной ткани, обусловленные злокачественным заболеванием</i>
<i>месна</i>	<i>Для инъекций: 100 мг/мл в 4 мл и 10 мл ампулах.</i> <i>Таблетка: 400 мг; 600 мг.</i> – Герминогенная опухоль яичек – Герминогенная опухоль яичников – Лимфома Беркитта – Нейробластома (опухоль Вильмса) – Остеосаркома – Рабдомиосаркома – Саркома Юинга
<i>расбуриказа</i>	<i>Порошок и растворитель для приготовления раствора для инфузий: 1,5 мг; 7,5 мг во флаконе.</i> – Синдром лизиса опухоли
9. ПРОТИВОПАРКИНСОНОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	
☐ бипериден Терапевтические альтернативы: – тригексифенидил	<i>Для инъекций: 5 мг (лактат) в 1 мл ампуле.</i> <i>Таблетка: 2 мг (гидрохлорид).</i>
леводопа + ☐ карбидопа Терапевтические альтернативы: – бензеразид (для карбидопы)	<i>Таблетка: 100 мг + 10 мг; 100 мг + 25 мг; 250 мг + 25 мг.</i>
10. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ	
10.1 Антианемические лекарственные средства	
гидроксокобаламин	<i>Для инъекций: 1 мг/мл (в виде ацетата, в виде гидрохлорида или в виде сульфата) в 1 мл ампуле.</i>
соль двухвалентного железа	<i>Жидкость для перорального применения: эквивалент 25 мг железа (в виде сульфата)/мл.</i> <i>Таблетка: эквивалент 60 мг железа.</i>
соль двухвалентного железа + фолиевая кислота	<i>Таблетка: эквивалент 60 мг железа + 400 мкг фолиевой кислоты.</i> *пищевая добавка для применения во время беременности
фолиевая кислота	<i>Таблетка: 400 мкг*; 1 мг; 5 мг.</i> * для применения в околозачаточный период для профилактики возникновения дефектов развития нервной трубки
Дополнительный перечень	
☐ эритропоз-стимулирующие средства* <i>Терапевтические альтернативы:</i> – дарбепоэтин альфа – метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета – эпоэтин альфа, бета и тета *в том числе биоаналоги гарантированного качества	<i>Для инъекций: предварительно заполненный шприц</i> <i>1000 МЕ/0,5 мл; 2000 МЕ/0,5 мл; 3000 МЕ/0,3 мл;</i> <i>4000 МЕ/0,4 мл; 5000 МЕ/0,5 мл; 6000 МЕ/0,6 мл;</i> <i>8000 МЕ/0,8 мл; 10 000 МЕ/1 мл; 20 000 МЕ/0,5 мл;</i> <i>40 000 МЕ/1 мл.</i>

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

10.2 Лекарственные средства, влияющие на свертывание крови	
☐ варфарин Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023 г.)	Таблетка: 1 мг; 2 мг; 5 мг (натриевая соль).
☐ дабигатран Терапевтические альтернативы: - аликсабан - ривароксабан - эдоксабан	Капсула: 110 мг; 150 мг.
гепарин натрий	Для инъекций: 1000 МЕ/мл; 5000 МЕ/мл; 20 000 МЕ/мл в 1 мл ампуле.
протамина сульфат	Для инъекций: 10 мг/мл в 5 мл ампуле.
транексамовая кислота	Для инъекций: 100 мг/мл в 10 мл ампуле.
фитоменадион	Для инъекций: 1 мг/мл [с]; 10 мг/мл в ампуле. Таблетка: 10 мг.
☐ эноксапарин* Терапевтические альтернативы*: - далтепарин - надропарин <i>*в том числе биоаналоги гарантированного качества</i>	Для инъекций: в ампуле или предварительно заполненном шприце 20 мг/0,2 мл; 40 мг/0,4 мл; 60 мг/0,6 мл; 80 мг/0,8 мл; 100 мг/1 мл; 120 мг/0,8 мл; 150 мг/1 мл.
Дополнительный перечень	
☐ варфарин[с] Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023 г.)	Таблетка: 0,5 мг; 1 мг; 2 мг; 5 мг (натриевая соль).
десмопрессин[с]	Для инъекций: 4 мкг/мл (в виде ацетата) в 1 мл ампуле. Назальный спрей: 10 мкг (в виде ацетата) в одной дозе.
гепарин натрий[с]	Для инъекций: 1000 МЕ/мл; 5000 МЕ/мл в 1 мл ампуле.
протамина сульфат[с]	Для инъекций: 10 мг/мл в 5 мл ампуле.
10.3 Другие лекарственные средства, применяемые при гемоглобинопатиях	
Дополнительный перечень	
гидроксикарбамид	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 200 мг; 500 мг; 1 г.
☐ дефероксамин Терапевтические альтернативы: - деферазирокс (перорально)	Порошок для инъекций: 500 мг (мезилат) во флаконе.
11. ПРЕПАРАТЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И ЗАМЕНТЕЛИ ПЛАЗМЫ	
11.1 Кровь и компоненты крови	
В соответствии с резолюцией WHA63.12 Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ признает, что достижение, если этому не препятствуют особые обстоятельства, самообеспеченности по запасам безопасных компонентов крови, основанных на добровольном безвозмездном донорстве крови, и безопасность этих запасов являются важными национальными задачами по	

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

предупреждению нехватки крови и по удовлетворению потребностей больных в переливании крови. Все препараты крови должны соответствовать требованиям ВОЗ.	
свежезамороженная плазма	
тромбоцитарная масса	
цельная кровь	
эритроцитарная масса	
11.2 Лекарственные средства, полученные из человеческой плазмы	
Все полученные из человеческой плазмы лекарственные средства должны соответствовать требованиям ВОЗ.	
11.2.1 Иммуноглобулины человека	
анти-D иммуноглобулин	Для инъекций: 250 мкг в однодозовом флаконе.
антирабический иммуноглобулин	Для инъекций: 150 МЕ/мл во флаконе.
противостолбнячный иммуноглобулин	Для инъекций: 500 МЕ во флаконе.
<i>Дополнительный перечень</i>	
иммуноглобулин, нормальный	Для внутримышечного введения: 16% белковый раствор.* Для внутривенного введения: 5%; 10% белковый раствор.** Для подкожного введения: 15%; 16% белковый раствор.* *Показан при первичном иммунодефиците. **Показан при первичном иммунодефиците и болезни Kawasaki.
11.2.2 Факторы свертывания крови	
<i>Дополнительный перечень</i>	
☐ фактор свертывания VIII Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023 г.)	Порошок для инъекций: 500 МЕ/во флаконе.
☐ фактор свертывания IX Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023 г.)	Порошок для инъекций: 500 МЕ/во флаконе, 1000 МЕ/во флаконе.
11.3 Заменители плазмы	
☐ декстран 70 Терапевтические альтернативы: - полигелин, 3,5% раствор для инъекций	Раствор для инъекций: 6%.
12. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	
12.1 Антиангинальные лекарственные средства	
☐ бисопролол Терапевтические альтернативы: - карведилол - метопролол	Таблетка: 1,25 мг; 5 мг.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

верапамил	Таблетка: 40 мг; 80 мг (гидрохлорид).
глицерил тринитрат	Таблетка (сублингвальная): 500 мкг.
изосорбида динитрат	Таблетка (сублингвальная): 5 мг.
12.2 Антиаритмические лекарственные средства	
☐ бисопролол Терапевтические альтернативы: - карведилол - метопролол	Таблетка: 1,25 мг; 5 мг.
верапамил	Для инъекций: 2,5 мг/мл (гидрохлорид) в 2 мл ампуле. Таблетка: 40 мг; 80 мг (гидрохлорид).
дигоксин	Для инъекций: 250 мкг/ мл в 2 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 50 мкг/ мл. Таблетка: 62,5 мкг; 250 мкг.
лидокаин	Для инъекций: 20 мг/мл (гидрохлорид) в 5 мл ампуле.
эпинефрин (адреналин)	Для инъекций: 100 мкг/мл (в виде кислой соли винной кислоты или гидрохлорида) в 10 мл ампуле.
<i>Дополнительный перечень</i>	
<i>амиодарон</i>	Для инъекций: 50 мг/мл (гидрохлорид) в 3 мл ампуле. Таблетка: 100 мг; 200 мг; 400 мг (гидрохлорид).
12.3 Антигипертензивные лекарственные средства	
☐ амлодипин Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (C08CA Дигидропиридиновые производные)	Таблетка: 5 мг (в виде малеата, мезилата или безилата).
☐ бисопролол Терапевтические альтернативы: - атенолол* - карведилол - метопролол	Таблетка: 1,25 мг; 5 мг. *Атенолол не следует использовать в качестве препарата первой линии при неосложненной гипертензии у пациентов в возрасте >60 лет.
гидралазин*	Порошок для инъекций: 20 мг (гидрохлорид) в ампуле. Таблетка: 25 мг; 50 мг (гидрохлорид). *Гидралазин внесен в список исключительно для экстренного применения при тяжелой гипертензии, связанной с беременностью. Применение препарата при эссенциальной гипертензии не рекомендуется в связи с наличием фактических данных о большей эффективности и безопасности других лекарственных средств.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

☐ гидрохлоротиазид Терапевтические альтернативы: - индапамид - хлорталидон - хлортиазид	Жидкость для перорального применения: 50 мг/5 мл. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 12,5 мг; 25 мг.
☐ лизиноприл + ☐ амлодипин Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (C09AA Ингибиторы АПФ монокомпонентные) (для лизиноприла) - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (C08CA Дигидропиридиновые производные) (для амлодипина)	Таблетка: 10 мг + 5 мг; 20 мг + 5 мг; 20 мг + 10 мг.
☐ лизиноприл + ☐ гидрохлоротиазид Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (C09AA Ингибиторы АПФ монокомпонентные) (для лизиноприла) - хлорталидон, хлортиазид, индапамид (для гидрохлоротиазида)	Таблетка: 10 мг + 12,5 мг; 20 мг + 12,5 мг; 20 мг + 25 мг
☐ лозартан Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (C09CA Простые препараты блокаторов рецепторов ангиотензина II)	Таблетка: 25 мг; 50 мг; 100 мг.
метилдопа*	Таблетка: 250 мг. *Метилдопа внесена в список исключительно для лечения гипертензии, связанной с беременностью. Применение препарата при эссенциальной гипертензии не рекомендуется в связи с наличием фактических данных о большей эффективности и безопасности других лекарственных средств.
☐ телмисартан + ☐ амлодипин Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (C09CA Простые препараты блокаторов рецепторов ангиотензина II) (для телмисартана) - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (C08CA Дигидропиридиновые производные) (для амлодипина)	Таблетка: 40 мг + 5 мг; 80 мг + 5 мг; 80 мг + 10 мг.
☐ телмисартан + ☐ гидрохлоротиазид Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (C09CA Простые препараты блокаторов рецепторов ангиотензина II) (для телмисартана) - хлорталидон, хлортиазид, индапамид (для гидрохлоротиазида)	Таблетка: 40 мг + 12,5 мг; 80 мг + 12,5 мг; 80 мг + 25 мг.
☐ эналаприл Терапевтические альтернативы:	Таблетка: 2,5 мг; 5 мг (в виде гидромалеата).

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

- Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (C09AA Ингибиторы АПФ монокомпонентные)	
Дополнительный перечень	
<i>натрия нитропруссид</i>	<i>Порошок для инфузий: 50 мг в ампуле.</i>
12.4 Лекарственные средства, применяемые при сердечной недостаточности	
☐ бисопролол Терапевтические альтернативы: - карведилол - метопролол	Таблетка: 1,25 мг; 5 мг.
☐ гидрохлоротиазид Терапевтические альтернативы: - индапамид - хлорталидон - хлортазид	Жидкость для перорального применения: 50 мг/5 мл. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 25 мг.
дигоксин	Для инъекций: 250 мкг/ мл в 2 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 50 мкг/мл. Таблетка: 62,5 мкг; 250 мкг.
☐ лозартан Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (C09CA Простые препараты блокаторов рецепторов ангиотензина II)	Таблетка: 25 мг; 50 мг; 100 мг.
спиронолактон	Таблетка: 25 мг.
☐ фуросемид Терапевтические альтернативы: - буметанид - торасемид	Для инъекций: 10 мг/мл в 2 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 20 мг/5 мл [с]. Таблетка: 40 мг.
☐ эналаприл Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (C09AA Ингибиторы АПФ монокомпонентные)	Таблетка: 2,5 мг; 5 мг (в виде гидромалеата).
Дополнительный перечень	
<i>допамин</i>	<i>Для инъекций: 40 мг/мл (гидрохлорид) в 5 мл флаконе.</i>
12.5 Антитромботические лекарственные средства	
12.5.1 Антиагреганты	
ацетилсалициловая кислота	Таблетка: 100 мг.
клопидогрел	Таблетка: 75 мг; 300 мг
12.5.2 Тромболитические лекарственные средства	
Дополнительный перечень	

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

<i>альтеплаза</i>	<i>Порошок для инъекций: 10 мг; 20 мг; 50 мг во флаконе</i>
<i>стрептокиназа</i>	<i>Порошок для инъекций: 1,5 млн МЕ во флаконе.</i>
12.6 Гиполипидемические лекарственные средства	
☐ симвастатин* Терапевтические альтернативы: - аторвастатин - ловастатин - правастатин - флувастатин	Таблетка: 5 мг; 10 мг; 20 мг; 40 мг. *Для применения у пациентов высокого риска.
13. ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (для местного применения)	
13.1 Противогрибковые лекарственные средства	
☐ миконазол Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (D01AC Производные имидазола и триазола) за исключением комбинаций	Крем или мазь: 2% (нитрат).
натрия тиосульфат	Раствор: 15%.
селена сульфид	Суспензия на основе детергента: 2%.
тербинафин	Крем или мазь: 1% (гидрохлорид).
13.2 Противомикробные лекарственные средства	
мунироцин	Крем: 2% (в виде мунироцина кальция). Мазь: 2%.
калия перманганат	Водный раствор: 1:10 000.
серебра сульфадиазин a	Крем: 1%. a > 2 месяцев.
13.3 Противовоспалительные и противоаллергические лекарственные средства	
☐ бетаметазон a Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (D07AC Кортикостероиды активные (группа III))	Крем или мазь: 0,1% (в виде валерата). a Для новорожденных предпочтительнее гидрокортизон.
☐ гидрокортизон Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (D07AA Кортикостероиды слабоактивные (группа I))	Крем или мазь: 1% (ацетат).
каламин	Лосьон.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

13.4 Лекарственные средства, влияющие на процессы дифференцировки и пролиферации клеток кожи	
бензоила пероксид	Крем или лосьон: 5%.
деготь каменноугольный	Раствор: 5%.
☐ кальципотриол Терапевтические альтернативы: - кальцитриол - такальцитол	Крем или мазь: 50 мкг/мл (0,005%). Лосьон: 50 мкг/мл (0,005%).
мочевина	Крем или мазь: 5%; 10%.
☐ подофилла смола Терапевтические альтернативы: - подофиллотоксин	Раствор: 10% – 25%.
салициловая кислота	Раствор: 5%.
фторурацил	Мазь: 5%.
13.5 Скабицидные и педикулицидные лекарственные средства	
☐ бензилбензоат a Терапевтические альтернативы: - мазь местного применения с содержанием серы осажженной	Лосьон: 25%. a > 2 лет.
перметрин	Крем: 5%. Лосьон: 1%.
14. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ	
14.1 Офтальмологические лекарственные средства	
☐ тропикамид Терапевтические альтернативы: - атропин - циклопентолат	Глазные капли: 0,5%.
флуоресцеин	Глазные капли: 1% (натриевая соль).
14.2 Рентгеноконтрастные среды	
☐ амидотризоат Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023)	Для инъекций: 140 мг – 420 мг йода/мл (в виде натриевой или меглуминовой соли) в 20 мл ампуле.
бария сульфат	Водная суспензия.
☐ йогексол Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023)	Для инъекций: 140 мг – 350 мг йода/мл в 5 мл; 10 мл; 20 мл ампулах.
<i>Дополнительный перечень</i>	
<i>бария сульфат [с]</i>	<i>Водная суспензия.</i>
☐ меглумина йотроксат	<i>Раствор: 5 г – 8 г йода в 100 мл – 250 мл.</i>

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023 г.)	
15. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА	
15.1 Антисептики	
☐ повидон-йод Терапевтические альтернативы: - йод	Раствор: 10% (эквивалент 1% р-ра активного йода).
☐ хлоргексидин Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023)	Раствор: 5% (биглюконат).
☐ этанол Терапевтические альтернативы: - пропанол	Раствор: 70% (денатурированный).
15.2 Дезинфицирующие средства	
глутарал	Раствор: 2%.
средство для обработки рук на основе спирта	Раствор: содержит этанол 80% (объемные проценты). Раствор: содержит изопропиловый спирт 75% (объемные проценты).
хлорсодержащее соединение	Жидкая форма: (0,1% активного хлора) для приготовления раствора. Порошок: (0,1% активного хлора) для приготовления раствора. Твердая форма: (0,1% активного хлора) для приготовления раствора.
☐ хлорокисленол Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (D08AE Фенол и его производные)	Раствор: 4,8%.
16. ДИУРЕТИКИ	
амилорид	Таблетка: 5 мг (гидрохлорид).
☐ гидрохлоротиазид Терапевтические альтернативы: - индапамид - хлорталидон - хлортиазид	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 25 мг.
маннитол	Раствор для инъекций: 10%; 20%.
спиронолактон	Таблетка: 25 мг.
☐ фуросемид Терапевтические альтернативы: - буметанид - торасемид	Для инъекций: 10 мг/мл в 2 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 20 мг/5 мл [с]. Таблетка: 10 мг [с]; 20 мг [с]; 40 мг.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

<i>Дополнительный перечень</i>	
☐ гидрохлоротиазид[с] Терапевтические альтернативы: - хлорталидон - хлортиазид	Таблетка (с риской): 25 мг.
маннитол [с]	Раствор для инъекций: 10%; 20%.
спиронолактон[с]	Жидкость для перорального применения: 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл; 25 мг/5 мл. Таблетка: 25 мг.
17. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ	
<i>Дополнительный перечень</i>	
ферменты поджелудочной железы[с]	Адаптированные к возрасту формы выпуска и дозировки, включающие липазу, протеазу и амилазу.
17.1 Противоязвенные лекарственные средства	
☐ омепразол Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (A02BC Ингибиторы протонного насоса) за исключением комбинаций	Порошок для инъекций: 40 мг во флаконе. Порошок для приготовления жидкой лекарственной формы для перорального применения: 20 мг; 40 мг саше. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 10 мг; 20 мг; 40 мг.
☐ ранитидин Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (A02BA Блокаторы H ₂ -гистаминовых рецепторов) за исключением комбинаций	Для инъекций: 25 мг/мл (в виде гидрохлорида) в 2 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 75 мг/5 мл (в виде гидрохлорида). Таблетка: 150 мг (в виде гидрохлорида).
17.2 Противорвотные лекарственные средства	
дексаметазон	Для инъекций: 4 мг/мл (в виде динамического фосфата) в 1 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 0,5 мг/5 мл; 2 мг/5 мл. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 0,5 мг; 0,75 мг; 1,5 мг; 4 мг.
метоклопрамид ☐	Для инъекций: 5 мг/мл (гидрохлорид) в 2 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 5 мг/5 мл [с]. Таблетка: 10 мг (гидрохлорид). ☐ Не для применения у новорожденных.
☐ ондансетрон ☐ Терапевтические альтернативы: - гранисетрон - доласетрон - палонсетрон - трописетрон	Для инъекций: 2 мг основы/мл в 2 мл ампуле (в виде гидрохлорида). Жидкость для перорального применения: 4 мг основы/5 мл. Твердая лекарственная форма для перорального применения: эквивалент 4 мг основы; эквивалент 8 мг основы; эквивалент 24 мг основы. ☐ > 1 месяца.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

<i>Дополнительный перечень</i>	
<i>аппетитант</i>	<i>Капсула: 80 мг; 125 мг; 165 мг</i> <i>Порошок для приготовления суспензии для перорального применения: 125 мг в саше</i>
17.3 Противовоспалительные лекарственные средства	
☐ сульфасалазин Терапевтические альтернативы: - месалазин	Удерживающая клизма. Суппозитории: 500 мг. Таблетка: 500 мг.
<i>Дополнительный перечень</i>	
<i>гидрокортизон</i>	<i>Удерживающая клизма: 100 мг/60 мл.</i> <i>Суппозитории: 25 мг (ацетат).</i>
<i>преднизолон</i>	<i>Удерживающая клизма: 20 мг/100 мл (в виде фосфата натрия).</i>
17.4 Слабительные средства	
☐ сенна Терапевтические альтернативы: - бисакодил	Таблетка: 7,5 мг (сеннозиды) (или традиционные лекарственные формы).
17.5 Лекарственные средства, применяемые при диарее	
пероральные регидратационные соли – цинка сульфат [с]	Совместная упаковка, содержащая: ПРС, порошок для растворения (см. Раздел 17.5.1) – цинка сульфат, твердая лекарственная форма для перорального применения 20 мг (см. Раздел 17.5.2)
17.5.1 Средства для пероральной регидратации	
пероральные регидратационные соли	Порошок для растворения в 200 мл; 500 мл; 1 л. глюкоза: 75 мэкв натрий: 75 мэкв или ммоль/л хлорид: 65 мэкв или ммоль/л калий: 20 мэкв или ммоль/л цитрат: 10 ммоль/л осмолярность: 245 миллиосмоль/л глюкоза: 13,5 г/л натрия хлорид: 2,6 г/л калия хлорид: 1,5 г/л тринатрия цитрат дигидрат*: 2,9 г/л *тринатрия цитрат дигидрат можно заменить на натрия гидрокарбонат (натрия бикарбонат) 2,5 г/л. Однако с учетом того, что стабильность последнего препарата в условиях тропиков очень низкая, препарат рекомендован только при его изготовлении для немедленного использования.
17.5.2 Лекарственные средства, применяемые при диарее	
цинка сульфат*	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 20 мг. *При острой диарее цинка сульфат следует применять как дополнение к пероральным регидратационным солям.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

18. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ СО СТОРОНЫ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ	
18.1 Гормоны надпочечников и их синтетические заменители	
гидрокортизон	Таблетка: 5 мг; 10 мг; 20 мг.
флудрокортизон	Таблетка: 100 мкг (ацетат).
18.2 Андрогены	
<i>Дополнительный перечень</i>	
<i>тестостерон</i>	<i>Для инъекций: 200 мг (энантат) в 1 мл ампуле.</i>
18.3 Эстрогены	
18.4 Прогестогены	
☐ медроксипрогестерона ацетат Терапевтические альтернативы: - норэтистерон	Таблетка: 5 мг.
18.5 Лекарственные средства, применяемые при диабете	
18.5.1 Инсулины	
инсулин для инъекций (растворимый)* <i>*в том числе биоаналоги гарантированно качества</i>	Для инъекций: 40 МЕ/мл в 10 мл флаконе; 100 МЕ/мл в 10 мл флаконе
инсулин средней продолжительности действия* <i>*в том числе биоаналоги гарантированно качества</i>	Для инъекций: 40 МЕ/мл в 10 мл флаконе; 100 МЕ/мл в 10 мл флаконе (в виде комбинированной суспензии инсулина и цинка или изофан-инсулина).
☐ аналоги инсулина длительного действия* Терапевтические альтернативы: - инсулин гларгин - инсулин деглудек - инсулин детемир <i>*в том числе биоаналоги гарантированно качества</i>	Для инъекций: 100 МЕ/мл в 3 мл картридже или предварительно заполненной шприц-ручке.
18.5.2 Пероральные гипогликемические лекарственные средства	
☐ гликлазид* Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (А10ВВ Производные сульфонилмочевины)	Твердая лекарственная форма для перорального применения: (таблетки контролируемого высвобождения) 30 мг; 60 мг; 80 мг. *глибенкламид нельзя применять в возрасте старше 60 лет.
метформин	Таблетка: 500 мг (гидрохлорид).
☐ эмпаглифлозин Терапевтические альтернативы: - дапаглифлозин - канаглифлозин	Таблетка: 10 мг; 25 мг.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

<i>Дополнительный перечень</i>	
<i>метформин [с]</i>	<i>Таблетка: 500 мг (гидрохлорид).</i>
18.6 Лекарственные средства, применяемые при гипогликемии	
глюкагон	Для инъекций: 1 мг/мл.
<i>Дополнительный перечень</i>	
<i>диазоксид [с]</i>	<i>Жидкость для перорального применения: 50 мг/мл. Таблетка: 50 мг.</i>
18.7 Гормоны щитовидной железы и антигипотиреоидные лекарственные средства	
калия йодид	Таблетка: 60 мг.
левотироксин	Таблетка: 25 мкг [с]; 50 мкг; 100 мкг (натриевая соль).
☐ метимазол Терапевтические альтернативы: - карбимазол (в зависимости от наличия на местах)	Таблетка: 5мг, 10мг, 20мг.
пропилтиоурацил*	Таблетка: 50 мг. *Используется, когда альтернативная терапия первой линии не подходит или отсутствует; а также у пациенток на первом триместре беременности.
<i>Дополнительный перечень</i>	
<i>калия йодид [с]</i>	<i>Таблетка: 60 мг.</i>
<i>раствор Люголя [с]</i>	<i>Жидкость для перорального применения: приблизительно 130 мг йода/мл.</i>
☐ метимазол [с] Терапевтические альтернативы: - карбимазол (в зависимости от наличия на местах)	<i>Таблетка: 5 мг, 10 мг, 20 мг.</i>
<i>пропилтиоурацил* [с]</i>	<i>Таблетка: 50 мг. *Используется, когда альтернативная терапия первой линии не подходит или отсутствует.</i>
19. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ	
19.1 Диагностические препараты	
Все туберкулины должны соответствовать требованиям ВОЗ к туберкулинам.	
туберкулин, очищенный белковый дериват (PPD)	Для инъекций.
19.2 Сыворотки, иммуноглобулины и моноклональные антитела	
Все фракции плазмы крови должны соответствовать требованиям ВОЗ.	
антирабические моноклональные антитела* <i>*в том числе бианалоги гарантированного качества</i>	Для инъекций: 40 МЕ/мл в 1,25 мл, 2,5 мл флаконе; 100 МЕ/мл в 2,5 мл флаконе (человека). Для инъекций: 300 МЕ/мл в 10 мл флаконе; 600 МЕ/мл в 1 мл, 2,5 мл и 5 мл флаконе (подсемейства мышиных).

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

дифтерийный антитоксин	Для инъекций: 10 000 МЕ; 20 000 МЕ во флаконе.
иммуноглобулин антирабический лошадиный	Для инъекций: 150 МЕ/мл; 200 МЕ/мл; 300 МЕ/мл; 400 МЕ/мл во флаконе.
иммуноглобулин против змеиного яда*	Для инъекций. *Конкретный тип определяется на местном уровне.
19.3 Вакцины	
Рекомендации ВОЗ по политике иммунизации публикуются в документах с изложением позиции ВОЗ в отношении вакцин и основываются на рекомендациях Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (СКГЭ). Документы с изложением позиции ВОЗ в отношении вакцин обновляются от трех до четырех раз в год. В нижеприведенном перечне подробно указаны вакцины, которые рекомендованы СКГЭ и описаны в соответствующем документе с изложением позиции ВОЗ по состоянию на сентябрь 2020 г. Для получения самых последних версий документов с изложением позиции ВОЗ, в которых отражена текущая доказательная база по конкретным вакцинам и представлены соответствующие рекомендации, можно обратиться в любое время по следующей ссылке на веб-сайт ВОЗ: https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/policies/position-papers Рекомендации в отношении вакцин могут носить универсальный или условный характер (например, для определенных регионов, для ряда групп населения высокого риска или в рамках программ иммунизации с определенными характеристиками). Детальная информация представлена в соответствующих документах с изложением позиции ВОЗ и в Сводных таблицах рекомендаций ВОЗ относительно плановой иммунизации, которые размещены на веб-сайте ВОЗ по ссылке: https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/policies/who-recommendations-for-routine-immunization---summary-tables Выбор вакцин из Примерного перечня необходимо будет определить каждой стране после рассмотрения международных рекомендаций, эпидемиологии и национальных приоритетов. Все вакцины должны удовлетворять требованиям ВОЗ в отношении биологических веществ. ВОЗ отметила потребность в поливалентных вакцинах для применения у детей.	
<i>Всеобщие рекомендации</i>	
вакцина БЦЖ	
вакцина против дифтерии	
вакцина против Haemophilus influenzae типа b	
вакцина против гепатита В	
вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ)	
вакцина против кори	
вакцина против коклюша	
пневмококковая вакцина	
вакцина против полиомиелита	
ротавирусная вакцина	
вакцина против краснухи	
вакцина против столбняка	
<i>Рекомендации для отдельных регионов</i>	
вакцина против японского энцефалита	
вакцина против клещевого энцефалита	

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

вакцина против желтой лихорадки	
<i>Рекомендации для некоторых групп населения высокого риска</i>	
вакцина против холеры	
вакцина против лихорадки денге	
вакцина против гепатита А	
вакцина против менингококкового менингита	
вакцина против бешенства	
вакцина против брюшного тифа	
<i>Рекомендации для программ иммунизации с определенными характеристиками</i>	
вакцина против гриппа (сезонная)	
вакцина против паротита	
вакцина против ветряной оспы	
20. МИОРЕЛАКСАНТЫ (ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ) И ИНГИБИТОРЫ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ	
☐ атракурий Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023 г.)	Для инъекций: 10 мг/мл (безилат).
☐ векуроний [с] Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023 г.)	Порошок для инъекций: 10 мг (бромид) во флаконе.
неостигмин	Для инъекций: 500 мкг/мл (метилсульфат) в 1 мл ампуле; 2,5 мг/мл (метилсульфат) в 1 мл ампуле. Таблетка: 15 мг (бромид).
суксаметоний	Для инъекций: 50 мг/мл (хлорид) в 2 мл ампуле. Порошок для инъекций: (хлорид), во флаконе.
<i>Дополнительный перечень</i>	
☐ векуроний Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023 г.)	Порошок для инъекций: 10 мг (бромид) во флаконе.
пиридостигмин	Для инъекций: 1 мг в 1 мл ампуле. Таблетка: 60 мг (бромид).
21. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	
21.1 Противомикробные лекарственные средства	
ацикловир	Мазь: 3% по весу.
азитромицин	Раствор (глазные капли): 1,5%. – Трахома

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

☐ гентамицин Терапевтические альтернативы: - амикацин - канамицин - нетилмицин - тобрамицин	Раствор (глазные капли): 0,3% (сульфат). - <i>Бактериальный блефарит</i> - <i>Бактериальный конъюнктивит</i>
натамицин	Суспензия: (глазные капли): 5% - <i>Грибковый кератит</i>
☐ офлоксацин Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (S01AE Фторхинолоны)	Раствор (глазные капли): 0,3%. - <i>Бактериальный конъюнктивит</i> - <i>Бактериальный кератит</i>
☐ тетрациклин Терапевтические альтернативы: - окситетрациклин - хлортетрациклин	Глазная мазь: 1% (гидрохлорид). - <i>Бактериальный блефарит</i> - <i>Бактериальный конъюнктивит</i> - <i>Бактериальный кератит</i> - <i>Трахома</i>
эритромицин	Мазь: 0,5% [с]. <i>Для лечения инфекций, вызванных Chlamydia trachomatis или Neisseria gonorrhoeae.</i>
21.2 Противовоспалительные лекарственные средства	
☐ преднизолон Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023)	Раствор (глазные капли): 0,5% (натрия фосфат).
21.3 Средства для местной анестезии	
☐ тетракаин a Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (S01HA Местные анестетики) за исключением кокаина и комбинаций	Раствор (глазные капли): 0,5% (гидрохлорид). a Не для применения у недоношенных новорожденных.
21.4 Миотические и противоглаукомные лекарственные средства	
ацетазоламид	Таблетка: 250 мг.
латанопрол	Раствор (глазные капли): 50 мкг/мл.
☐ пилокарпин Терапевтические альтернативы: - карбахол	Раствор (глазные капли): 2%; 4% (гидрохлорид или нитрат).
☐ тимолол Терапевтические альтернативы: - Химическая подгруппа 4-го уровня АТХ (S01ED Бета-адреноблокаторы) за исключением комбинаций	Раствор (глазные капли): 0,25%; 0,5% (в виде гидромалеата).
21.5 Мидриатические лекарственные средства	
☐ атропин a	Раствор (глазные капли): 0,1%; 0,5%; 1% (сульфат).

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

Терапевтические альтернативы*: - гоматропина гидробромид - циклопентолата гидрохлорид * Только Перечень ОЛС для детей	a > 3 месяцев.
Дополнительный перечень	
эпинефрин (адреналин)	Раствор (глазные капли): 2% (в виде гидрохлорида).
21.6 Ингибиторы сосудисто-эндотелиального фактора роста (СЭФР)	
Дополнительный перечень	
бевацизумаб* *в том числе биоаналоги гарантированного качества	Для инъекций: 25 мг/мл.
22. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ	
22.1 Контрацептивы	
22.1.1 Пероральные гормональные контрацептивы	
левоноргестрел	Таблетка: 30 мкг; 750 мкг (2 таблетки в упаковке); 1.5 мг.
улипристал	Таблетка: 30 мг (в виде ацетата)
☐ этинилэстрадиол + ☐ левоноргестрел Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023)	Таблетка: 30 мкг + 150 мкг.
☐ этинилэстрадиол + ☐ норэтистерон Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023)	Таблетка: 35 мкг + 1 мг.
22.1.2 Инъекционные гормональные контрацептивы	
медроксипрогестерона ацетат	Для инъекций (внутримышечных): 150 мг/мл в 1 мл флаконе. Для инъекций (подкожных): 104 мг/0,65 мл в предварительно заполненном шприце или инъекционной системе для доставки одной дозы.
норэтистерона энантат	Масляный раствор: 200 мг/мл в 1 мл ампуле.
эстрадиола ципионат + медроксипрогестерона ацетат	Для инъекций: 5 мг + 25 мг.
22.1.3 Внутриматочные контрацептивные средства	
внутриматочная система с высвобождением левоноргестрела	Внутриматочная система: с резервуаром, содержащим 52 мг левоноргестрела.
медьсодержащее контрацептивное средство	
22.1.4 Барьерные средства контрацепции	
диафрагмы	
презервативы	
22.1.5 Имплантируемые контрацептивные средства	
имплантат с высвобождением этоноргестрела	Одностержневой имплантат с высвобождением этоноргестрела: содержащий 68 мг этоноргестрела.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

имплантат с высвобождением левоноргестрела	Двухстержневой имплантат с высвобождением левоноргестрела: каждый стержень содержит 75 мг левоноргестрела (всего 150 мг).
22.1.6 Интравагинальные контрацептивные средства	
интравагинальное кольцо с прогестероном*	Интравагинальное кольцо с высвобождением прогестерона: с содержанием 2,074 г микронизированного прогестерона. *Для применения у женщин, активно кормящих грудью не менее 4 раз в день
этинилэстрадиол + этоноргестрел	Вагинальное кольцо: с содержанием 2,27 мг + 11,7 мг.
22.2 Стимуляторы овуляции	
<i>Дополнительный перечень</i>	
кломифен	Таблетка: 50 мг (цитрат).
22.3 Средства, повышающие сократительную активность миометрия (утеротоники)	
карбетоцин	Для инъекций (термостойкий раствор): 100 мкг/мл.
мифепристон – мизопростол В тех случаях, когда не противоречит национальному законодательству и культурным нормам.	Таблетка 200 мг – таблетка 200 мкг. Единая упаковка, содержащая: мифепристон таблетка 200 мг [1] и мизопростол таблетка 200 мкг [4].
мизопростол	Таблетка: 200 мкг. – Ведение незавершенного медицинского или спонтанного аборта – Профилактика и лечение послеродовых кровотечений в условиях отсутствия окситоцина или невозможности его безопасного применения Вагинальная таблетка: 25 мкг.* *Применяется для стимуляции родовой деятельности только при наличии соответствующих лечебных учреждений.
окситоцин	Для инъекций: 10 МЕ в 1 мл.
☐ эргометрин Терапевтические альтернативы: - метилэргометрин	Для инъекций: 200 мкг (гидромалеат) в 1 мл ампуле.
22.4 Средства, угнетающие сократительную активность миометрия (токолитики)	
нифедипин	Капсула немедленного высвобождения: 10 мг.
22.5 Другие лекарственные средства, применяемые у матерей	
дексаметазон	Для инъекций: 4 мг/мл (в виде динатрия фосфата) в 1 мл ампуле.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

добавка с комплексом питательных микроэлементов	Таблетка с содержанием: Витамин А (ретинола ацетат) 800 мкг эквивалент активности ретинола Витамин С (аскорбиновая кислота) 70 мг Витамин D (холекальциферол) 5 мкг (200 МЕ) Витамин Е (альфа токоферол суццинат) 10 мг эквивалент альфа токоферола Витамин В1 (тиамина мононитрат) 1,4 мг Витамин В2 (рибофлавин) 1,4 мг Витамин В3 (ниацинамид) 18 мг ниацин-эквивалент Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 1,9 мг Фолиевая кислота (фолиевая кислота) 680 мкг пищевой фолатный эквивалент (400 мкг) Витамин В12 (цианокобаламин) 2,6 мкг Железо (фумарат железа) 30 мг Иод (калия йодид) 150 мкг Цинк (оксид цинка) 15 мг Селен (селенит натрия) 65 мкг Медь (оксид меди) 2 мг
	транексамовая кислота
22.6 Лекарственные средства для применения у новорожденных [с]	
кофеина цитрат [с]	Для инъекций: 20 мг/мл (эквивалент 10 мг основной дозы кофеина/мл). Жидкость для перорального применения: 20 мг/мл (эквивалент 10 мг основной дозы кофеина/мл).
хлоргексидин [с]	Раствор или гель: 7,1% (биглюконат), содержащий 4% хлоргексидина (для обработки пупочной ранки).
Дополнительный перечень	
☐ ибупрофен [с] Терапевтические альтернативы: - индометацин	Раствор для инъекций: 5 мг/мл.
☐ простагландин E1 [с] Терапевтические альтернативы: - простагландин E2	Раствор для инъекций: 0,5 мг/мл в спирте.
сурфактант [с]	Суспензия для эндотрахеальной инстилляций: 25 мг/мл или 80 мг/мл.
23. РАСТВОР ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА	
Дополнительный перечень	
раствор для перитонеального диализа (соответствующего состава)	Парентеральный раствор.
24. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ И РАССТРОЙСТВАХ ПОВЕДЕНИЯ	
24.1 Антипсихотические лекарственные средства	
☐ галоперидол Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023 г.)	Для инъекций: 5 мг в 1 мл ампуле. Таблетка: 2 мг; 5 мг.
☐ палиперидон Терапевтические альтернативы: - инъекция рисперидона	Для инъекций (замедленного высвобождения): 25 мг; 50 мг; 75 мг; 100 мг; 150 мг (в виде пальмитата) в предварительно заполненном шприце.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

рисперидон	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 0,25 мг – 6,0 мг.
☐ флуфеназин Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023 г.)	Для инъекций: 25 мг (деканоат или энантат) в 1 мл ампуле.
☐ хлорпромазин Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023 г.)	Для инъекций: 25 мг/мл (гидрохлорид) в 2 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 25 мг/5 мл (гидрохлорид). Таблетка: 100 мг (гидрохлорид).
Дополнительный перечень	
галоперидол [с]	Для инъекций: 5 мг в 1 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 2 мг/мл. Твердая лекарственная форма для перорального применения: 0,5 мг; 2 мг; 5 мг.
клозапин	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 25 – 200 мг.
хлорпромазин [с]	Для инъекций: 25 мг/мл (гидрохлорид) в 2 мл ампуле. Жидкость для перорального применения: 25 мг/5 мл (гидрохлорид). Таблетка: 10 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг (гидрохлорид).
24.2 Лекарственные средства, применяемые при расстройствах настроения	
24.2.1 Лекарственные средства, применяемые при депрессивных расстройствах	
☐ амитриптилин Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023)	Таблетка: 25 мг; 75 мг (гидрохлорид).
☐ флуоксетин Терапевтические альтернативы: - пароксетин - сертралин - флувоксамин - циталопрам - эсциталопрам	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 20 мг (в виде гидрохлорида).
Дополнительный перечень	
флуоксетин  [с]	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 20 мг (в виде гидрохлорида).  > 8 лет.
24.2.2 Лекарственные средства, применяемые при биполярных расстройствах	
вальпроевая кислота (натрия вальпроат)* *Избегать использования при беременности, а также у женщин и девочек, способных к деторождению, кроме ситуации неэффективности или непереносимости терапевтических альтернатив, в связи с высоким риском врожденных пороков развития и нарушений развития у детей, подвергавшихся внутриутробному воздействию вальпроата.	Таблетка (кишечнорастворимая): 200 мг; 500 мг.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

карбамазепин	Таблетка (с риской): 100 мг; 200 мг.
лития карбонат	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 300 мг.
24.3 Лекарственные средства, применяемые при тревожных расстройствах	
☐ диазепам Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023 г.)	Таблетка (с риской): 2 мг; 5 мг.
24.4 Лекарственные средства, применяемые при обсессивно-компульсивных расстройствах	
кломипрамин	Капсула: 10 мг; 25 мг (гидрохлорид).
24.5 Лекарственные средства, применяемые при расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ	
бупропион	Таблетка (замедленного высвобождения): 150 мг (гидрохлорид)
варениклин	Таблетка: 0,5 мг, 1 мг
никотинзаместительные средства (НЗС)	Жевательная резинка: 2 мг; 4 мг (в виде полакрилекса). Трансдермальный пластырь: 5 мг – 30 мг/16 часов; 7 мг – 21 мг/24 часа.
Дополнительный перечень	
☐ метадон* Терапевтические альтернативы: - бупренорфин	Жидкость для перорального применения, концентрат: 5 мг/мл; 10 мг/мл (гидрохлорид). Жидкость для перорального применения: 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл (гидрохлорид). *Эти препараты должны использоваться только в рамках организованной программы поддержки.
25. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ	
25.1 Противоастматические лекарственные средства и средства, применяемые при хронической обструктивной болезни легких	
☐ будесонид Терапевтические альтернативы: - беклометазон - мометазон - флунизолид - флутиказон - циклесонид	Ингаляция (аэрозоль): 100 мкг в 1 дозе; 200 мкг в 1 дозе.
☐ будесонид + ☐ формотерол Терапевтические альтернативы: - беклометазон + формотерол - будесонид + салметерол - мометазон + формотерол - флутиказон + формотерол - флутиказона фуруат + вилантерол	Ингалятор с сухим порошком: 100 мкг + 6 мкг в 1 дозе; 200 мкг + 6 мкг в 1 дозе
ипратропия бромид	Ингаляция (аэрозоль): 20 мкг/отмеренная доза.
☐ сальбутамол Терапевтические альтернативы: - тербуталин	Ингаляция (аэрозоль): 100 мкг (в виде сульфата) в 1 дозе. Для инъекций: 50 мкг/мл (в виде сульфата) в 5 мл ампуле.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

	Дозированный ингалятор (аэрозоль): 100 мкг (в виде сульфата) в 1 дозе. Раствор для ингаляций для использования в небулайзерах: 5 мг/мл (в виде сульфата).
☐ тиотропий Терапевтические альтернативы: - аклидиниум - гликопирроний - умеклидиниум	Порошок для ингаляции в капсулах: 18 мкг. Раствор для ингаляции: 1,25 мкг; 2,5 мкг на 1 нажатие.
эпинефрин (адреналин)	Для инъекций: 1 мг/мл (в виде гидрохлорида или гидротартрата) в 1 мл ампуле.
26. РАСТВОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ВОДНОГО, ЭЛЕКТРОЛИТНОГО И КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА	
26.1 Пероральные растворы	
калия хлорид	Порошок для приготовления раствора.
пероральные регидратационные соли	См. раздел 17.5.1.
26.2 Парентеральные растворы	
глюкоза	Раствор для инъекций: 5% (изотонический); 10% (гипертонический); 50% (гипертонический).
глюкоза с натрия хлоридом	Раствор для инъекций: 4% глюкоза, 0,18% натрия хлорид (эквивалент Na⁺ 30 ммоль/л, Cl⁻ 30 ммоль/л). Раствор для инъекций: 5% глюкоза, 0,9% натрия хлорид (эквивалент Na⁺ 150 ммоль/л и Cl⁻ 150 ммоль/л); 5% глюкоза, 0,45% натрия хлорид (эквивалент Na⁺ 75 ммоль/л и Cl⁻ 75 ммоль/л) [с].
калия хлорид	Раствор: 11,2% в 20 мл ампуле (эквивалент K⁺ 1,5 ммоль/мл, Cl⁻ 1,5 ммоль/мл). Раствор для разведения: 7,5% (эквивалент K 1 ммоль/мл и Cl 1 ммоль/мл) [с]; 15% (эквивалент K 2 ммоль/мл и Cl 2 ммоль/мл) [с].
натрия хлорид	Раствор для инъекций: 0,9% изотонический (эквивалент Na ⁺ 154 ммоль/л, Cl ⁻ 154 ммоль/л).
натрия бикарбонат	Раствор для инъекций: 1,4% изотонический (эквивалент Na⁺ 167 ммоль/л, HCO₃⁻ 167 ммоль/л). Раствор: 8,4% в 10 мл ампуле (эквивалент Na⁺ 1000 ммоль/л, HCO₃⁻ 1000 ммоль/л).
натрия лактат, сложный раствор	Раствор для инъекций.
26.3 Дополнительные средства	
вода для инъекций	2 мл; 5 мл; 10 мл ампулы.
27. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА	
аскорбиновая кислота	Таблетка: 50 мг.
кальций	Таблетка: 500 мг (элементарный).
☐ колекальциферол [с]	Жидкость для перорального применения: 400 МЕ/мл.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

Терапевтические альтернативы: - эргокальциферол	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 400 МЕ; 1000 МЕ.
йод	Капсула: 190 мг. Йодированный масляный раствор: 1 мл (480 мг йода); 0,5 мл (240 мг йода) в ампуле (для перорального применения или для инъекций); 0,57 мл (308 мг йода) во флаконе-дозаторе.
никотинамид	Таблетка: 50 мг.
пиридоксин	Таблетка: 25 мг (гидрохлорид).
питательные микроэлементы в порошке [с]	Саше с содержанием: - железо (элементарное) 12,5 мг (в виде fumarate железа в оболочке) - цинк (элементарный) 5 мг - витамин А 300 мкг - с другими микроэлементами или без них, в рекомендуемых суточных дозах
ретинол	Капсула: 50 000 МЕ; 100 000 МЕ; 200 000 МЕ (в виде пальмитата). Масляный раствор для перорального применения: 100 000 МЕ/мл (в виде пальмитата) в многодозовом флаконе-дозаторе. Таблетка (с дражированной оболочкой): 10 000 МЕ (в виде пальмитата). Водорастворимая форма для инъекций: 100 000 МЕ (в виде пальмитата) в 2 мл ампуле.
рибофлавин	Таблетка: 5 мг.
тиамин	Таблетка: 50 мг (гидрохлорид).
☐ эргокальциферол Терапевтические альтернативы: - колекальциферол	Жидкость для перорального применения: 250 мкг/мл (10 000 МЕ/мл). Твердая лекарственная форма для перорального применения: 1,25 мг (50 000 МЕ).
Дополнительный перечень	
кальция глюконат	Для инъекций: 100 мг/мл в 10 мл ампуле.
28. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ УША, НОСА И ГОРЛА	
☐ будесонид [с] Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023)	Назальный спрей: 100 мкг в 1 дозе.
☐ ксилометазолин ☒ [с] Обзор терапевтических альтернатив планируется (2023)	Назальный спрей: 0,05%. ☒ Не для применения у детей в возрасте младше 3 месяцев.
уксусная кислота [с]	Для местного применения: 2%, в спирте.
☐ ципрофлоксацин [с] Терапевтические альтернативы: - офлоксацин	Раствор (ушные капли): 0,3% (в виде гидрохлорида).

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

29. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ	
29.1 Лекарственные средства, применяемые для лечения подагры	
аллопуринол	Таблетка: 100 мг.
29.2 Противоревматоидные препараты, модифицирующие течение болезни	
хлорохин	Таблетка: 100 мг; 150 мг (в виде фосфата или сульфата).
<i>Дополнительный перечень</i>	
азатиоприн	Таблетка: 50 мг.
гидроксихлорохин	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 200 мг (в виде сульфата).
метотрексат	Таблетка: 2,5 мг (в виде натриевой соли).
пеницилламин	Твердая лекарственная форма для перорального применения: 250 мг.
сульфасалазин	Таблетка: 500 мг.
29.3 Ювенильные заболевания суставов	
<i>Дополнительный перечень</i>	
ацетилсалициловая кислота* (при остром и хроническом течении)	Суппозитории: 50 мг – 150 мг. Таблетка: 100 мг – 500 мг. *Для применения при ревматических атаках, ювенильном артрите, болезни Кавасаки.
30. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ	
диамин фторид серебра	Раствор: 38% м/об.
стеклоиономерный цемент	Капсулы разового использования: 0,4 г порошка + 0,09 мл жидкости. Многоразовый флакон: порошок + жидкость. Порошок (фтор-алюмосиликатное стекло) содержит: 25–50% силиката, 20–40% оксида алюминия, 1–20% фторида, 15–40% оксида металла, 0–15% фосфата, оставшиеся вещества – порошок полиакриловой кислоты и металлы в минимальных количествах. Жидкость (водная) содержит: 7–25% многоосновной карбоновой кислоты, 45–60% полиакриловой кислоты.
фторид	Паста, крем или гель: с содержанием от 1000 до 1500 ч./млн. (частей на миллион) фторида (любого типа). В прочих соответствующих лекарственных формах для местного применения.

Таблица 1.1. Лекарственные средства, в отношении которых действуют возрастные ограничения или ограничения по массе тела

артесунат + пиронаридина тетрафосфат	> 5 кг
атропин	> 3 месяцев
бедаквилин	≥ 5 лет
бензилбензоат	>2 лет
бетаметазон для местного применения	Для новорожденных предпочтителен гидрокортизон

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

дарунавир	> 3 лет
деламанид	≥ 3 лет (диспергируемая таблетка 25 мг) ≥ 6 лет (таблетка 50 мг)
дигидроартемизинин + пиперахина фосфат	> 5 кг
дилоксанид	>25 кг
долутегравир	≥ 4 недель и ≥ 3 кг (диспергируемая таблетка 10 мг) ≥ 25 кг (таблетка 50 мг)
доксациклин	> 8 лет (за исключением серьезных инфекций, например, при холере)
ибупрофен	> 3 месяцев (кроме формы для внутривенного введения для применения при открытом артериальном протоке)
ксилометазолин	> 3 месяцев
метоклопрамид	Не для новорожденных
мефлохин	>5 кг или >3 месяцев
невирапин	> 6 недель
ондансетрон	> 1 месяца
серебра сульфадiazин	> 2 месяцев
тетракаин	Не для недоношенных новорожденных
флуоксетин	> 8 лет
цефазолин	> 1 месяца
цефтриаксон	> 41 недели скорректированного гестационного возраста

Таблица 1.2. Описание лекарственных форм

А. Основные лекарственные формы, представленные в Примерном перечне ВОЗ основных лекарственных средств – для перорального применения

Термин	Определение
Твердая лекарственная форма для перорального применения	Относится к таблеткам или капсулам, или другим твердым лекарственным формам, например, препаратам «для рассасывания», которые являются средствами немедленного высвобождения. Подразумевается, что различия по клинической эффективности или безопасности между имеющимися лекарственными формами отсутствуют, и, соответственно, странам следует выбирать лекарственную(ые) форму(ы) для национального перечня, исходя из соображений качества и наличия. Термин 'твердая лекарственная форма для перорального применения' <i>никогда</i> не используется в отношении какого-либо типа таблеток с модифицированным высвобождением лекарственного вещества.
Таблетка	Термин охватывает: • таблетки, не покрытые и покрытые оболочкой (пленочной или дражированной), которые предназначены для приема внутрь целиком; • без риски (насечки) и с риской*;

*Таблетки с риской могут быть разделены на части для упрощения проглатывания при условии, что доза определена целым числом таблеток.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

Термин	Определение
	• таблетки для разжевывания перед проглатыванием; • таблетки для измельчения или растворения в воде или другой подходящей жидкости до их приема внутрь; • таблетки, которые требуют дробления до их приема внутрь. Термин 'таблетка' без дополнительной характеристики <i>никогда</i> не используется в отношении какого-либо типа таблеток с модифицированным высвобождением лекарственного вещества.
Таблетка (охарактеризованная)	Термин относится к определенному типу таблеток: жевательные – таблетки, предназначенные для разжевывания до проглатывания; диспергируемые – таблетки для измельчения и разведения в воде или другой подходящей жидкости до их приема внутрь; растворимые – таблетки для растворения в воде или другой подходящей жидкости до их приема внутрь; дробимые – таблетки для дробления до приема внутрь; с риской – таблетки с разделительной насечкой или насечками для разделения на дозы, меньшие одной таблетки; сублингвальные – таблетки для рассасывания под языком. Термин «таблетка» <i>всегда</i> четко охарактеризован с помощью дополнительных терминов (в скобках) в записях, если подразумевается один из следующих типов таблеток: гастрорезистентные (иногда такие таблетки описывают как кишечнорастворимые или отсроченного высвобождения), замедленного высвобождения или другие формы модифицированного высвобождения.
Капсулы	Термин относится к твердым или мягким капсулам. Термин 'капсула' без дополнительной характеристики <i>никогда</i> не используется в отношении какого-либо вида капсул с модифицированным высвобождением.
Капсулы (охарактеризованные)	Термин 'капсула' с дополнительными характеристиками относится к гастрорезистентным (иногда такие капсулы описывают как кишечнорастворимые или отсроченного высвобождения), замедленного высвобождения или к другим формам модифицированного высвобождения.
Гранулы	Препараты, предоставляемые пациенту в виде гранул, предназначенных для проглатывания без дополнительных манипуляций, для разжевывания или для приема внутрь с водой или другой подходящей жидкостью. Термин 'гранулы' без дополнительной характеристики <i>никогда</i> не используется в отношении какого-либо вида гранул с модифицированным высвобождением.
Порошок для перорального применения	Препараты, предоставляемые пациенту в виде порошка (обычно в объеме одной дозы) для приема внутрь или вместе с водой, или с другой подходящей жидкостью.

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.
22-е издание (2021 г.)

Термин	Определение
Жидкость для перорального применения	Жидкие препараты, предназначенные для <i>проглатывания</i>, т.е. пероральные растворы, суспензии, эмульсии и пероральные капли, включая приготовленные из порошков или гранул. <i>Не относится</i> к препаратам, предназначенным для <i>оромукозного применения</i>, например, жидкостям для полоскания горла или ротовой полости. Жидкие лекарственные формы для перорального применения, представленные в виде порошков или гранул, могут обладать преимуществами с точки зрения стабильности и более низких затрат на транспортировку. Если на рынке присутствует более одного типа жидкой лекарственной формы для перорального применения (например, раствор, суспензия, гранулы для разведения), их можно рассматривать как взаимозаменяемые, и в таких случаях они должны быть биоэквивалентны. Предпочтительно выбирать жидкие лекарственные формы для перорального применения, которые не содержат сахар, а для детей – растворы, не содержащие спирт.

В. Основные лекарственные формы, представленные в Примерном перечне ВОЗ основных лекарственных средств – для парентерального введения

Термин	Определение
Для инъекций	Относится к растворам, суспензиям и эмульсиям, включая приготовленные из порошков или концентрированных растворов.
Для инъекций (охарактеризованные)	Если актуально, путь введения указан в скобках.
Для инъекций (масляный раствор)	Для соответствующих записей термин «для инъекций» дополняется указанием (масляный раствор).
Для внутривенных инфузий	Относится к растворам и эмульсиям, включая приготовленные из порошков или концентрированных растворов.

С. Другие лекарственные формы

Способ применения	Надлежащий термин
Для глаз	Глазные капли, глазные мази.
Для местного применения	Для жидкостей: лосьоны, красители. Для мягких форм: крем, мазь.
Для ректального применения	Суппозитории, гель или раствор.
Для вагинального применения	Пессарии или вагинальные таблетки.
Для ингаляций	Порошок для ингаляций, ингалятор под давлением, небулайзер

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

Указатель

р-аминосалициловая кислота	16	бупивакаин	1
абакавир	18	бупропион	53
абакавир + ламивудин	19	вакцина БЦЖ	46
абиратерон	31	вакцина против	46
адалimumаб	25	вакцина против Haemophilus influenzae типа b	46
азатиоприн	25, 56	вакцина против бешенства	47
азитромицин	12, 47	вакцина против брюшного тифа	47
аллопуринол	32, 56	вакцина против ветряной оспы	47
альбендазол	6, 7	вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ)	46
альтеплаза	39	вакцина против гепатита В	46
амидотризоат	40	вакцина против гепатита А	47
амикацин	7, 16	вакцина против гриппа (сезонная)	47
амилорид	41	вакцина против дифтерии	46
амиодарон	36	вакцина против желтой лихорадки	47
амитриптилин	3, 52	вакцина против клещевого энцефалита	46
амлодипин	36	вакцина против коклюша	46
амодиахин	21	вакцина против кори	46
амодиахин – сульфадоксин + пириметамин	23	вакцина против лихорадки денге	47
амоксциллин	8	вакцина против менингококкового менингита	47
амоксциллин + клавулановая кислота	8, 16	вакцина против паротита	47
ампициллин	8	вакцина против полиомиелита	46
амфотерицин В	17, 21	вакцина против столбняка	46
аналоги инсулина длительного действия	44	вакцина против холеры	47
анастрозол	31	вакцина против японского энцефалита	46
анти-D иммуноглобулин	35	валганцикловир	19, 20
антирабические моноклональные антитела	45	вальпроевая кислота (натрия вальпроат)	5, 6, 52
антирабический иммуноглобулин	35	ванкомицин	13, 14
апипитант	43	варениклин	53
артемизинин	21	варфарин	34
артемизинин + лумефантрин	21	векуроний	47
артесунат	22	верапамил	36
артесунат + амодиахин	22	винбластин	25
артесунат + мефлохин	22	винкристин	26
артесунат + пионаридина тетрафосфат	22	винорелбин	26
аскорбиновая кислота	54	внутриматочная система с высвобождением	
аспарагиназа	25	левоноргестрел	49
атазанавир + ритонавир	18	вода для инъекций	54
атракурий	47	вориконазол	17
атропин	1, 4, 48	галоперидол	3, 51, 52
ацетазоламид	48	галотан	1
ацетилсалициловая кислота	2, 24, 38, 56	гемцитабин	26
ацетилцистеин	4	гентамицин	9, 48
ацикловир	18, 47	гепарин натрий	34
бария сульфат	40	гидралазин	36
бевацизумаб	49	гидрокортизон	4, 32, 39, 43, 44
бедаквилин	16	гидроксикарбамид	26, 34
бендамустин	25	гидроксихлорохин	56
бензатин-бензилпенициллин	9	гидрокобаламин	33
бензилбензоат	40	гидрохлортиазид	37, 38, 41, 42
бензилпенициллин	9	гиосцина бутилбромид	3
бензнидазол	24	гиосцина гидробромид	3
бензоила пероксид	40	глекапревир + пибрентасвир	20
бетаметазон	39	гликлазид	44
бикалутамид	32	глицерил тринитрат	36
бипериден	33	глутарал	41
биспролол	35, 36, 38	глюкагон	45
блеомицин	25	глюкоза	54
бортезомиб	30	глюкоза с натрия хлоридом	54
будесонид	53, 55	гризеофульвин	17
будесонид + формотерол	53	дабигатран	34

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

дазатиниб 30		калия-железа гексацианоферрат(II) -2H ₂ O (прусский синий)	4
дакарбазин	26	кальций	54
даклатасвир	20	кальципотриол	40
даклатасвир + софосбувир	20	кальция глюконат	4, 55
дактиномицин	26	кальция фолинат	27
дапсон	15	капецитабин	27
дарунавир	19	карбамазепин	5, 53
дасабувир	20	карбетоцин	50
даунорубицин	26	карбоплатин	27
деготь каменноугольный	40	кетамин	1
дексаметазон	3, 4, 32, 42, 50	кислород	1, 2
декстран 70	35	кларитромицин	13
деламанид	16	клиндамицин	10
десмопрессин	34	клозапин	52
дефероксамин	4, 34	клоксациллин	10
дiazepam	3, 5, 53	кломипрамин	53
диазоксид	45	кломифен	50
диамин фторид серебра	56	клопидогрел	38
дигидроартемизинин + пиперахина фосфат	22	клотримазол	17
дигоксин	36, 38	клофазимин	15, 16
дилоксанид	21	кодеин	2
димеркапрол	5	колекальциферол	54
дифтерийный антитоксин	46	колистин	14
диэтилкарбамазин	6	кофеина цитрат	51
добавка с комплексом питательных микроэлементов	51	ксилометазолин	55
доксидиклин	9, 22, 23	лактuloза	3
доксорубицин	26	ламивудин	18
докузат натрия	3	ламивудин + зидовудин	19
долутегравир	19	ламотриджин	5
долутегравир + ламивудин + тенофовир	19	латанопрост	48
допамин	38	левamisол	6
доцетаксел	26	леводопа + карбидопа	33
зидовудин	18	левоноргестрел	49
золедроновая кислота	32	левотироксин	45
ибрутиниб	30	левофлоксацин	16
ибупрофен	2, 24, 51	ледипасвир + софосбувир	20
ивермектин	6, 24	лейпрорелин	32
изониазид	15	леналидомид	31
изониазид + пиразинамид + рифампицин	15	лидокаин	1, 36
изониазид + пиридоксин + сульфаметоксазол + триметоприм	19	лидокаин + эпинефрин (адреналин)	1
изониазид + рифампицин	15	лизиноприл + амлодипин	37
изониазид + рифапентин	15	лизиноприл + гидрохлоротиазид	37
изосорбида динитрат	36	линезолид	15, 16
изофлуран	1	лития карбонат	53
иматиниб	30	лозартан	37, 38
иммуноглобулин антирабический лошадиный	46	лоперамид	3
иммуноглобулин против змеиного яда	46	лопинавир + ритонавир	19
иммуноглобулин, нормальный	35	лоразепам	5
имплантат с высвобождением левоноргестрела	50	лоратадин	4
имплантат с высвобождением этоноргестрела	49	магния сульфат	5
инсулин для инъекций (растворимый)	44	маннитол	41, 42
инсулин средней продолжительности действия	44	мебендазол	6, 7
интравагинальное кольцо с прогестероном	50	меглюмина антимонат	21
йогексол	40	меглюмина йотроксат	40
йод	55	медоксипрогестерона ацетат	44, 49
ипратропия бромид	53	меларсопрол	24
иринотекан	27	мелфалан	28
итраконазол	17	меркаптопуриин	28
ифосфамид	27	меропенем	14, 16
каламид	39	меропенем + ваборбактам	15
калия йодид	17, 45	месна	33
калия перманганат	39	метадон	2, 3, 53
калия хлорид	54	метилдопа	37

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

метилпреднизолон	32	пиразинамид	15
метильтиониния хлорид (метиленовый синий)	4	пирантел	6
метимазол	45	пиридоксин	55
метоклопрамид	3, 42	пиридостигмин	47
метотрексат	28, 56	пириметамин	23
метронидазол	10, 21	питательные микроэлементы в порошке	55
метформин	44, 45	плазомицин	15
мефлохин	22, 23	пневмококковая вакцина	46
мидазолам	1, 3, 5	повидон-йод	41
мизопростол	50	подофилла смола	40
микафунгин	18	полимиксин В	15
миконазол	39	полностью транс-ретиноевая кислота (ATRA)	30
милтефозин	21	празиквантел	6, 7
мифепристон – мизопростол	50	преднизолон	4, 32, 43, 48
моксифлоксацин	15, 16	презервативы	49
морфин	1, 2	примахин	22
мочевина	40	прогуанил	23
мупиноцин	39	прокаин-бензилпенициллин	11
мышьяка триоксид	28	прокарбазин	28
налоксон	4	пропилтиоурацил	45
натамицин	48	пропофол	1
натрия бикарбонат	54	пропранолол	24
натрия кальция эдетат	5	простагландин E1	51
натрия лактат	54	протамина сульфат	34
натрия нитрит	4	противостолбнячный иммуноглобулин	35
натрия нитропруссид	38	ралтегравир	19
натрия стибоглюконат	21	ранитидин	42
натрия тиосульфат	4, 39	расбуриказа	33
натрия хлорид	54	раствор для перитонеального диализа (соответствующего состава)	51
невирапин	18	раствор Люголя	45
неостигмин	47	ретинол	55
ниволумаб	31	рибавирин	20, 21
никлозамид	6	рибофлавин	55
никотинамид	55	рисперидон	52
никотинзаместительные средства (НЗС)	53	ритонавир 19	
нилотиниб	30	ритуксимаб	30
нистатин	17	рифабутин	15
нитрофурантоин	10	рифампицин	15
нифедипин	50	рифапентин	16
нифуртимокс	24	ротавирусная вакцина	46
норэтистерона энантат	49	салициловая кислота	40
оксалиплатин	28	сальбутамол	53
оксамнихин	6	свежезамороженная плазма	35
оксид азота	1	селена сульфид	39
окситоцин	50	сенна	4, 43
омбитасвир + паритапревир + ритонавир	20	серебра сульфадиазин	39
омепразол	42	симвастатин	39
ондансетрон	3, 42	соль двухвалентного железа	33
осельтамивир	20	соль двухвалентного железа + фолиевая кислота	33
офлоксацин	48	софосбувир	20
паклитаксел	28	софосбувир + велпатасвир	20
палиперидон	51	спектиномицин	11
парацетамол	2, 24	спиринолактон	38, 41, 42
паромомицин	21	средство для обработки рук на основе спирта	41
пегаспаргаза	28	средство на основе реалгара-индиго натурального	28
пегилированный интерферон-альфа 2a	21	стеклоиономерный цемент	56
пеницилламин	4, 56	стрептокиназа	39
пентамидин	23, 24	стрептомицин	16
перметрин	40	суксаметоний	47
пероральные регидратационные соли	43, 54	сукцимер	5
пероральные регидратационные соли – цинка сульфат	43	сульфадиазин	23
пилокарпин	48	сульфадоксин + пириметамин	22, 23
пиперациллин + тазобактам	13	сульфаметоксазол + триметоприм	11, 23

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 22-е издание (2021 г.)

сульфасалазин	43, 56	хлоргексидин	41, 51
суматриптан	24	хлороксиленол	41
сурамин натрий	24	хлорохин	23, 56
сурфактант	51	хлорпромазин	52
такролимус	25	хлорсодержащее соединение	41
талидомид	31	цельная кровь	35
тамоксифен	32	цефазолин	12
телмисартан + амлодипин	37	цефалексин	12
телмисартан + гидрохлоротиазид	37	цефидерокол	15
тенофовира дизопроксил фумарат	18, 20	цефиксим	12
тербинафин	39	цефотаксим	12
тестостерон	44	цефтазидим	14
тетракаин	48	цефтазидим + авибактам	15
тетрациклин	48	цефтриаксон	13
тиамин	55	цефуроксим	14
тимолол	48	циклизин	4
тиогуанин	29	циклосерин	17
тиотропий	54	циклоспорин	25
транексамовая кислота	34, 51	циклофосфамид	29
трастузумаб	30	цинка сульфат	43
триклабендазол	6	ципрофлоксацин	14, 55
триметоприм	11	цисплатин	29
тромбоцитарная масса	35	цитарабин	29
тропикамид	40	эверолимус	31
туберкулин, очищенный белковый дериват (PPD)	45	эмпаглифлозин	44
уголь, активированный	4	эмтрицитабин + тенофовир	19
уксусная кислота	55	эналаприл	37, 38
улипристал	49	эноксапарин	34
фактор свертывания IX	35	энтекавир	20
фактор свертывания VIII	35	эпинефрин (адреналин)	4, 36, 49, 54
фексинидазол	23	эргокальциферол	55
фенитоин	5	эргометрин	50
фенобарбитал	5	эритромицин	48
феноксиметилпенициллин	10, 11	эритропоз-стимулирующие средства	33
фентанил	2	эритроцитарная масса	35
ферменты поджелудочной железы	42	эрлотиниб	31
филграстим	31	эстрадиола ципионат + медроксипрогестерона ацетат	49
фитоменадион	34	этамбутол	16
флударабин	29	этамбутол + изониазид + пипразинамид + рифампицин	16
флудрокортизон	44	этамбутол + изониазид + рифампицин	16
флуконазол	17	этанол	41
флуоксетин	4, 52	этинилэстрадиол + левоноргестрел	49
флуоресцеин	40	этинилэстрадиол + норэтистерон	49
флуфеназин	52	этинилэстрадиол + этоноргестрел	50
флуцитозин	17	этионамид	17
фолиевая кислота	33	этопозид	30
фомепизол	5	этосуксимид	6
фосфомоцин	15	эфавиренц	18
фторид	56	эфавиренц + □ эмтрицитабин + тенофовир	19
фторурацил	29, 40	эфавиренц + ламивудин + тенофовир	19
фуросемид	38, 41	эфедрин	1
хинин	22	эфлорнитин	24
хлорамбуцил	29		
хлорамфеникол	11		

Европейское региональное бюро ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, созданное в 1948 г., основная функция которого состоит в решении международных проблем здравоохранения и охраны здоровья населения. Европейское региональное бюро ВОЗ является одним из шести региональных бюро в различных частях земного шара, каждое из которых имеет свою собственную программу деятельности, направленную на решение конкретных проблем здравоохранения обслуживаемых ими стран.

Государства-члены

Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония

Всемирная организация здравоохранения Европейское региональное бюро

UN City, Marmorvej 51, DK-2100
Copenhagen Ø, Denmark
Тел.: +45 45 33 70 00 Факс: +45 45 33 70 01
Эл. адрес: eurocontact@who.int
Веб-сайт: who.int/europe

Номер документа: WHO/EURO:2022-5238-45002-64095