# 심리도식 (Schema)

학습용 정리 자료 · What(개념) – Why(원인) – How(치료) – 관련 개념과의 차이

**한 줄 요약** — 초기 부적응 도식(Early Maladaptive Schema)은 아동기에 핵심 정서 욕구가 충족되지 못한 경험에서 형성되어, 이후 삶 전반에서 자기와 타인을 해석하는 **기억·감정·신체감각·인지가 뭉친 틀**이다. 도식은 스스로를 확인시키는 방향으로 작동하기 때문에, 고통스러워도 익숙해서 반복된다.

## 1. What — 개념

### 1-1. 정의

제프리 영(J. Young)은 초기 부적응 도식을 다음과 같이 정의했다.

- 자기 자신 및 타인과의 관계에 관한 **광범위하고 전반적인 주제나 패턴**
- **기억, 감정, 인지, 신체감각**으로 구성됨 — 단순한 '생각'이 아님
- **아동기·청소년기**에 형성되어 **평생에 걸쳐 정교화**됨
- 상당한 정도로 **역기능적**임

도식은 "나는 사랑받을 수 없다"는 문장 하나라기보다, 그 문장이 건드려질 때 함께 올라오는 **몸의 긴장, 오래된 장면, 익숙한 감정의 덩어리**에 가깝다.

### 1-2. 개념의 배경

- '도식'이라는 용어는 피아제의 인지발달 이론, 벡(A. Beck)의 인지치료에서 먼저 사용되었다.
- 영은 벡의 인지치료에 반응하지 않는 **성격장애·만성 문제 내담자**를 위해 인지행동치료, 애착이론, 게슈탈트, 대상관계, 구성주의, 정신분석적 요소를 통합한 **심리도식치료(Schema Therapy)**를 개발했다(1990년대).

### 1-3. 도식이 유지되는 원리

- **자기 영속성:** 도식은 익숙함과 예측 가능성을 주므로, 사람은 도식에 맞는 정보에 주의를 기울이고 맞지 않는 정보는 무시·왜곡한다.
- **도식 화학(schema chemistry):** 도식을 활성화시키는 사람에게 강하게 끌린다. 예) 정서적 결핍 도식을 가진 사람이 정서적으로 차가운 상대에게 매력을 느낌.
- **활성화:** 평소에는 잠잠하다가, 원래의 상처와 비슷한 상황에서 강한 감정과 함께 촉발된다.

### 1-4. 5개 영역 · 18개 도식

| 영역 (좌절된 욕구) | 도식 | 핵심 신념의 예 |
|---|---|---|
| **단절과 거절**<br>(안정 애착·수용) | 버림받음 / 불안정 | “결국 모두 나를 떠날 것이다” |
| | 불신 / 학대 | “사람들은 나를 이용하고 상처 줄 것이다” |
| | 정서적 결핍 | “아무도 나를 진심으로 이해하거나 돌봐주지 않는다” |
| | 결함 / 수치심 | “나는 근본적으로 결함이 있어서 사랑받을 수 없다” |
| | 사회적 고립 / 소외 | “나는 어디에도 속하지 않는다” |
| **손상된 자율성과 수행**<br>(자율성·유능감·정체성) | 의존 / 무능감 | “나 혼자서는 일상을 감당할 수 없다” |
| | 위험·질병에 대한 취약성 | “언제든 재앙이 닥칠 수 있다” |
| | 융합 / 미발달된 자기 | “엄마(아빠) 없이는 내가 누군지 모르겠다” |
| | 실패 | “나는 남들보다 못하고 결국 실패할 것이다” |
| **손상된 한계**<br>(현실적 한계·자기통제) | 특권의식 / 과대성 | “나는 특별하니 규칙은 나에게 해당되지 않는다” |
| | 부족한 자기통제 / 자기훈련 | “불편한 건 참을 수 없다” |
| **타인 중심성**<br>(욕구·감정 표현의 자유) | 복종 | “내 뜻대로 하면 화를 입거나 버림받는다” |
| | 자기희생 | “다른 사람의 필요가 내 필요보다 중요하다” |
| | 승인 / 인정 추구 | “인정받아야 내 가치가 있다” |
| **과잉경계와 억제**<br>(자발성·놀이) | 부정성 / 비관주의 | “결국 나쁜 쪽으로 흘러갈 것이다” |
| | 정서적 억제 | “감정을 드러내면 통제를 잃거나 창피를 당한다” |
| | 엄격한 기준 / 과잉비판 | “완벽하지 않으면 실패한 것이다” |
| | 처벌 | “실수한 사람은 (나를 포함해) 벌을 받아야 한다” |

※ 단절과 거절 영역의 도식이 일반적으로 가장 깊고 손상이 크며, 발달 트라우마와 가장 직접적으로 연결된다.

## 2. Why — 원인과 형성 기제

### 2-1. 다섯 가지 핵심 정서 욕구

심리도식치료는 모든 아동에게 보편적인 핵심 정서 욕구가 있고, 이 욕구가 충족되지 못할 때 도식이 형성된다고 본다.

| 핵심 정서 욕구 | 좌절될 때 형성되는 도식 영역 |
|---|---|
| **안정 애착 (안전, 안정, 돌봄, 수용)** | 단절과 거절 |
| **자율성, 유능감, 정체감** | 손상된 자율성과 수행 |
| **타당한 욕구와 감정을 표현할 자유** | 타인 중심성 |
| **자발성과 놀이** | 과잉경계와 억제 |
| **현실적 한계와 자기통제** | 손상된 한계 |

### 2-2. 도식을 만드는 네 가지 초기 경험

| 경험 유형 | 내용 | 관련 도식 예 |
|---|---|---|
| **욕구의 해로운 좌절** | 필요한 것이 너무 적게 주어짐 (안정, 이해, 사랑의 결핍) | 정서적 결핍, 버림받음 |
| **외상 · 피해** | 학대, 통제, 비난, 위협을 당함 | 불신/학대, 결함/수치심, 취약성 |
| **지나친 충족** | 좋은 것이 너무 많이 주어짐 (과잉보호, 과잉허용, 한계 없음) | 의존/무능감, 특권의식 |
| **선택적 내면화 · 동일시** | 중요한 타인의 생각·감정·행동 방식을 그대로 받아들임 | 정서적 억제, 엄격한 기준, 처벌 |

### 2-3. 기질과 환경의 상호작용

- 같은 환경에서도 아이의 **정서적 기질**(예: 예민함, 수줍음, 공격성)에 따라 다른 도식이 형성된다.
- 예민한 기질의 아이는 같은 양육 결핍에도 더 깊은 상처를 받을 수 있고, 반대로 양육 환경이 좋으면 기질적 취약성이 상당 부분 완충된다.

### 2-4. 대처 방식 — 도식에 반응하는 세 가지 길

도식 자체보다 **도식에 대처하는 방식**이 문제 행동을 만드는 경우가 많다. 세 가지는 위협에 대한 생존 반응(얼어붙음·도피·투쟁)과 대응된다.

| 대처 방식 | 생존 반응 | 작동 방식 | 예: 결함/수치심 도식 |
|---|---|---|---|
| **굴복** | 얼어붙음 | 도식이 사실인 것처럼 받아들이고 그대로 행동 | 비판적인 친구만 사귀고, 무시당해도 당연하게 여김 |
| **회피** | 도피 | 도식이 건드려지지 않도록 상황·감정·생각을 피함 | 친밀한 관계를 피하고, 게임·음주로 감정을 마비시킴 |
| **과잉보상** | 투쟁 | 도식의 정반대인 것처럼 행동 | 남을 깎아내리고 우월한 척하며, 비판에 공격적으로 반응 |

※ 대처 방식은 아동기에는 생존에 적응적이었으나, 성인기에는 도식을 강화하고 유지시키는 역할을 한다.

### 2-5. 양식(Mode) — 지금 이 순간의 상태

도식이 '성격적 특성(trait)'이라면, 양식은 **지금 이 순간 활성화된 도식과 대처 반응의 상태(state)**다. 심한 성격 문제를 가진 내담자는 양식 사이를 빠르게 전환하기 때문에, 양식 개념이 치료 현장에서 특히 유용하다.

| 범주 | 주요 양식 | 특징 |
|---|---|---|
| **아동 양식** | 취약한 아동, 화난 아동, 충동적/훈육되지 않은 아동, 행복한 아동 | 충족되지 못한 욕구와 그에 따른 원초적 감정 |
| **역기능적 대처 양식** | 순응적 굴복자, 분리된 보호자, 분리된 자기위안자, 자기과시자, 가해·공격자 | 굴복·회피·과잉보상이 상태로 나타난 것 |
| **역기능적 부모 양식** | 처벌적 부모, 요구적 부모 | 내면화된 양육자의 목소리 ("너는 벌 받아야 해", "더 잘해야 해") |
| **건강한 양식** | 건강한 성인 | 취약한 아동을 돌보고, 부모 양식을 제한하며, 대처 양식을 조율함 |

## 3. How — 치료와 개입

### 3-1. 치료 목표

- **핵심 목표:** 내담자가 자신의 핵심 정서 욕구를 건강하게 충족할 수 있도록 돕는 것
- **도식 치유:** 도식과 관련된 기억의 강도, 감정의 강렬함, 신체감각의 강도를 약화시키고 부적응적 인지를 수정
- **양식 차원:** 건강한 성인 양식을 강화하고, 취약한 아동을 돌보며, 처벌적 부모 양식을 약화시킴

### 3-2. 치료 단계

| 단계 | 주요 작업 |
|---|---|
| **평가 · 교육 단계** | 생활사 탐색, 도식 질문지(YSQ), 양육 질문지(YPI), 양식 검사(SMI), 심상을 통한 도식 활성화 · 도식과 대처 방식, 양식에 대한 심리교육 · 사례개념화 공유 |
| **변화 단계** | 인지적 · 체험적 · 행동적 기법과 치료 관계를 통합적으로 사용하여 도식과 양식을 변화시킴 |

### 3-3. 네 가지 개입 기법

| 기법 | 목적 | 대표 기법 |
|---|---|---|
| **인지적 기법** | 도식이 사실이 아님을 머리로 이해 | 증거 검토, 장단점 분석, 도식 측과 건강한 측의 대화, 도식 플래시카드 |
| **체험적 기법** | 도식을 정서적 수준에서 변화 (머리로 아는 것을 가슴으로 느끼게) | 심상 재구성(imagery rescripting), 의자 기법(양식 대화), 부모에게 편지 쓰기 |

| 기법 | 목적 | 대표 기법 |
|---|---|---|
| **행동적 패턴 파괴** | 도식을 유지시키는 대처 행동을 건강한 행동으로 교체 | 행동 과제, 역할 연습, 도식 화학을 거스르는 관계 선택 |
| **치료 관계** | 치료자와의 관계 자체를 통한 교정적 경험 | 제한된 재양육, 공감적 직면 |

### 3-4. 치료 관계의 두 축

- **제한된 재양육(Limited Reparenting):** 치료 관계의 전문적 경계 안에서, 어린 시절 충족되지 못한 핵심 정서 욕구를 부분적으로 채워준다. 예) 정서적 결핍 도식에는 따뜻함과 관심을, 엄격한 기준 도식에는 실수를 허용하는 태도를 제공.
- **공감적 직면(Empathic Confrontation):** 도식과 대처 방식이 왜 생겼는지 공감하면서도, 그것이 지금의 삶에 미치는 해로운 영향을 분명히 직면시킨다.

> "네가 사람들에게 먼저 공격적으로 대하는 건, 어릴 때 무시당하지 않으려고 배운 방법이라는 걸 알아. 그때는 그게 너를 지켜줬지.
> 그런데 지금은 그 방법 때문에 정말 가까워지고 싶은 사람들까지 떠나가고 있는 것 같아."

### 3-5. 적용 대상과 형태

- **주요 대상:** 경계선 성격장애, 기타 성격장애, 만성 우울·불안, 반복되는 관계 문제, 인지행동치료에 반응하지 않는 만성 문제
- **형태:** 개인 심리도식치료, 집단 심리도식치료, 부부 심리도식치료, 아동·청소년 심리도식치료(부모 참여 병행)
- **청소년 적용 시:** 도식이 아직 형성 중이므로 변화 가능성이 크고, 현재 진행 중인 양육 환경에 대한 개입(부모 상담)이 함께 이루어져야 효과적이다.

## 4. 관련 개념과의 차이

### 4-1. 벡의 인지도식(핵심신념) vs 영의 초기 부적응 도식

| 구분 | 벡의 인지도식 · 핵심신념 (인지치료) | 영의 초기 부적응 도식 (심리도식치료) |
|---|---|---|
| **구성 요소** | 주로 인지 — 자기·타인·세계에 대한 신념 | 기억, 감정, 인지, 신체감각의 복합체 |
| **기원** | 경험을 통해 학습된 신념 (발달적 기원을 덜 강조) | 아동기 핵심 정서 욕구의 좌절에서 형성 (발달적 기원 강조) |
| **변화 가능성** | 증거 검토와 합리적 반박으로 비교적 수정 가능 | 깊이 뿌리내려 변화에 강하게 저항, 장기 작업 필요 |
| **주요 대상** | 우울, 불안 등 증상 중심 문제 | 성격장애, 만성적·특질적 문제 |
| **치료 기간** | 단기 (주로 12–20회기) | 중장기 (1–3년, 경계선 성격장애는 더 길 수 있음) |

| 구분 | 벡의 인지도식 · 핵심신념 (인지치료) | 영의 초기 부적응 도식 (심리도식치료) |
|---|---|---|
| **주요 기법** | 인지적 재구조화, 행동 실험 | 인지적 기법 + 체험적 기법 + 행동 패턴 파괴 + 치료 관계 |
| **치료 관계** | 협력적 경험주의 — 치료의 도구 | 제한된 재양육 — 치료 관계 자체가 변화의 핵심 요소 |

### 4-2. 도식 vs 양식

| 구분 | 도식 (Schema) | 양식 (Mode) |
|---|---|---|
| **성격** | 특성(trait) — 비교적 안정적인 성격 구조 | 상태(state) — 지금 이 순간의 정서·행동 상태 |
| **비유** | 지하에 묻힌 지뢰 | 지뢰가 터진 순간의 모습 |
| **개수** | 18개 | 10여 개 (연구에 따라 확장) |
| **유용한 대상** | 비교적 안정된 내담자, 특정 도식이 두드러지는 경우 | 상태 전환이 빠른 내담자 (경계선 성격장애 등) |

### 4-3. 발달 트라우마와의 관계

| 구분 | 발달 트라우마 | 심리도식 |
|---|---|---|
| **초점** | 신경계 조절의 손상 — 몸과 뇌의 수준 | 의미·관계 패턴의 형성 — 자기와 타인에 대한 틀 |
| **설명 범위** | 심각한 관계 외상(학대·방임) | 외상뿐 아니라 과잉보호, 과잉허용, 동일시까지 포함 |
| **개입 순서** | 상향식 — 안정화가 먼저 | 인지 · 체험 · 행동 · 관계의 통합 |
| **연결 지점** | 발달 트라우마는 주로 **단절과 거절 영역**의 도식(버림받음, 불신/학대, 결함/수치심)을 형성한다. 두 관점은 상호보완적이며, 실제 치료에서는 신경계 안정화로 각성을 조절한 뒤 심리도식 작업으로 의미 구조를 다루는 순서가 유용하다. | |