



РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖЕЛУДКА¹

ПОКАЗАНИЯ К РЕНТГЕНОСКОПИИ ЖЕЛУДКА:

- Боли за грудиной и в эпигастральной области, связанные с приемом пищи (или ночные «голодные»)
- Периодические тошнота и рвота
- Дисфагия
- Нарушения стула (констипация, диарея)
- Отрыжка
- Изжога
- Наличие крови в кале
- Стремительная потеря веса
- Анемия неизвестного происхождения
- Признаки нарушения проходимости пищевода или желудка
- Для отслеживания динамики течения болезни (язва желудка, ахалазия пищевода, онкология и др.)
- Подозрение на онкологическое заболеваний ЖКТ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Тяжелое состояние больного
- Беременность
- Непрекращающееся пищеводное или желудочно-кишечное кровотечение

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ:

1 Рентгеноскопия проводится натощак. Накануне нельзя пить и есть, курить и жевать жвачку в течение 8-10 часов.

2 Чтобы получить максимально объективные данные, в течение 3 суток до процедуры рекомендуется **соблюдать диету**. Исключаются продукты, вызывающие метеоризм (бобовые, черный хлеб, жирные, жареные, копченые блюда, фрукты, овощи). **Предпочтение отдается нежирному отварному мясу (курица, говядина), нежирной рыбе, белому черствому хлебу, кашам на воде, яйцам.**

3 При запоре накануне обследования надо сделать **очистительную клизму**.

4 Если у больного имеется **непроходимость пилорического отдела**, то перед проведением рентгена с барием желудок промывают с помощью зонда.

5 **Непосредственно перед процедурой необходимо** снять с себя любые украшения, удалить съемные зубные протезы.

1. Hinkle J, Cheever K. Brunner & Suddarth's Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests. 2nd Ed, Kindle. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins; c2014. Barium Swallow; p. 79.