

OMS - ASSIST V3.0

ENTREVISTADOR		País		CLÍ	NICA		
Nº PARTICIPANTE			FECHA				
INTRODUCCIÓN (1)	éalo nor favor al narticinante)	' 					

Gracias por aceptar a participar en esta breve entrevista sobre el alcohol, tabaco y otras drogas. Le voy hacer algunas preguntas sobre su experiencia de consumo de sustancias a lo largo de su vida, así como en los últimos tres meses. Estas sustancias pueden ser fumadas, ingeridas, inhaladas, invectadas o consumidas en forma de pastillas (muestre la tarjeta de drogas).

Algunas de las sustancias incluidas pueden haber sido recetadas por un médico (p.ej. pastillas adelgazantes, tranquilizantes, o determinados medicamentos para el dolor). Para esta entrevista, no vamos a anotar fármacos que hayan sido consumidos tal como han sido prescritos por su médico. Sin embargo, si ha tomado alguno de estos medicamentos por motivos distintos a los que fueron prescritos o los toma más frecuentemente o a dosis más altas a las prescritas, entonces díganoslo. Si bien estamos interesados en conocer su consumo de diversas drogas, por favor tenga por seguro que esta información será tratada con absoluta confidencialidad.

NOTA: ANTES DE FORMULAR LAS PREGUNTAS, ENTREGUE LAS TARJETAS DE RESPUESTA A LOS PARTICIPANTES

Pregunta 1 (al completar el seguimiento compare por favor las respuestas del participante con las que dio a la P1 del cuestionario basal. Cualquier diferencia en esta pregunta deben ser exploradas)

A lo largo de su vida, ¿cual de las siguientes sustancias ha consumido <u>alguna vez</u> ? (SOLO PARA USOS NO-MÉDICOS)	No	Si
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)	0	3
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)	0	3
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)	0	3
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, base, etc.)	0	3
e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.)	0	3
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)	0	3
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)	0	3
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)	0	3
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.)	0	3
j. Otros - especifique:	0	3

Compruebe si todas las respuestas son

"¿Tampoco incluso cuando iba al colegio?"

Si contestó "No" a todos los ítems, pare la entrevista.

Si contestó "Si" a alguno de estos ítems, siga a la Pregunta 2 para cada sustancia que ha consumido alguna vez.

Agosto 2003 1



Pregunta 2

¿Con qué frecuencia ha consumido las sustancias que ha mencionado en los <u>últimos tres meses</u> , (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)?		1 ó 2 veces	Cada mes	Cada semana	A diario o casi a diario
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)	0	2	3	4	6
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)	0	2	3	4	6
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)	0	2	3	4	6
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.)	0	2	3	4	6
e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.)	0	2	3	4	6
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)	0	2	3	4	6
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)	0	2	3	4	6
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)	0	2	3	4	6
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.)	0	2	3	4	6
j. Otros - especifique:	0	2	3	4	6

Si ha respondido "Nunca" a todos los items en la Pregunta 2, salte a la Pregunta 6.

Si ha consumido alguna de las sustancias de la Pregunta 2 en los últimos tres meses, continúe con las preguntas 3, 4 & 5 para cada una de las sustancias que ha consumido.

Pregunta 3

En los <u>últimos tres meses</u> , ¿con qué frecuencia ha tenido deseos fuertes o ansias de consumir (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)?	Nunca	1 ó 2 veces	Cada mes	Cada semana	A diario o casi a diario
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)	0	3	4	5	6
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)	0	3	4	5	6
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)	0	3	4	5	6
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.)	0	3	4	5	6
e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.)	0	3	4	5	6
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)	0	3	4	5	6
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)	0	3	4	5	6
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)	0	3	4	5	6
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.)	0	3	4	5	6
j. Otros - especifique:	0	3	4	5	6



Pregunta 4

En los <u>últimos tres meses</u> , ¿con qué frecuencia le ha llevado su consumo de <i>(PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)</i> a problemas de salud, sociales, legales o económicos?		1 ó 2 veces	Cada mes	Cada semana	A diario o casi a diario
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)	0	4	5	6	7
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)	0	4	5	6	7
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)	0	4	5	6	7
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.)	0	4	5	6	7
e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.)	0	4	5	6	7
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)	0	4	5	6	7
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)	0	4	5	6	7
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)	0	4	5	6	7
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.)	0	4	5	6	7
j. Otros - especifique:	0	4	5	6	7

Pregunta 5

En los <u>últimos tres meses</u> , ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que se esperaba de usted habitualmente por el consumo de (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)?		1 ó 2 veces	Cada mes	Cada semana	A diario o casi a diario
a. Tabaco					
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)	0	5	6	7	8
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)	0	5	6	7	8
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.)	0	5	6	7	8
e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.)	0	5	6	7	8
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)	0	5	6	7	8
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)	0	5	6	7	8
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)	0	5	6	7	8
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.)	0	5	6	7	8
j. Otros - especifique:	0	5	6	7	8



Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias que ha consumido alguna vez (es decir, aquellas abordadas en la Pregunta 1)

Pregunta 6

¿Un amigo, un familiar o alguien más <u>alguna vez</u> ha mostrado preocupación por su consume de <i>(PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)</i> ?	No, Nunca	Si, en los últimos 3 meses	Si, pero no en los últimos 3 meses
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)	0	6	3
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)	0	6	3
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)	0	6	3
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.)	0	6	3
e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.)	0	6	3
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)	0	6	3
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)	0	6	3
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)	0	6	3
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.)	0	6	3
j. Otros - especifique:	0	6	3

Pregunta 7

¿Ha intentado <u>alguna vez</u> controlar, reducir o dejar de consumir (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC) y no lo ha logrado?	No, Nunca	Si, en los últimos 3 meses	Si, pero no en los últimos 3 meses
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)	0	6	3
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)	0	6	3
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)	0	6	3
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.)	0	6	3
e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.)	0	6	3
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)	0	6	3
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)	0	6	3
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)	0	6	3
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.)	0	6	3
j. Otros - especifique:	0	6	3




Pregunta 8

	No, Nunca	Si, en los últimos 3 meses	Si, pero no en los últimos 3 meses
¿Ha consumido <u>alguna vez</u> alguna droga por vía inyectada? (ÚNICAMENTE PARA USOS NO MÉDICOS)	0	2	1

NOTA IMPORTANTE:

A los pacientes que se han inyectado drogas en los últimos 3 meses se les debe preguntar sobre su patrón de inyección en este período, para determinar los niveles de riesgo y el mejor tipo de intervención.



CÓMO CALCULAR UNA PUNTUACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA SUSTANCIA.

Para cada sustancia (etiquetadas de la **a.** la **j.**) sume las puntuaciones de las preguntas 2 a la 7, ambas inclusive. No incluya los resultados ni de la pregunta 1 ni de la 8 en esta puntuación. Por ejemplo, la puntuación para el cannabis se calcula como: **P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + P7c**

Note que la P5 para el tabaco no está codificada, y se calcula como: P2a + P3a + P4a + P6a + P7a

EL TIPO DE INTERVENCIÓN SE DETERMINA POR LA PUNTUACIÓN ESPECÍFICA DEL PACIENTE PARA CADA SUSTANCIA

	Registre la puntuación para sustancia específica	Sin intervención	Intervención Breve	Tratamiento más intensivo *
a. tabaco		0 – 3	4 – 26	27+
b. alcohol		0 – 10	11 – 26	27+
c. cannabis		0 – 3	4 – 26	27+
d. cocaína		0 – 3	4 – 26	27+
e. anfetaminas		0 – 3	4 – 26	27+
f. inhalantes		0 – 3	4 – 26	27+
g. sedantes		0 – 3	4 – 26	27+
h. alucinógenos		0 – 3	4 – 26	27+
i. opiáceos		0 – 3	4 – 26	27+
j. otras drogas		0 – 3	4 – 26	27+

NOTA: *UNA MAYOR EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO MÁS INTENSIVO puede ser proporcionado por profesionales sanitarios dentro del ámbito de Atención Primaria, o por un servicio especializado para las adicciones cuando esté disponible.

OMS ASSIST V3.0 TARJETAS DE RESPUESTA para los Pacientes

Tarjeta de respuesta - sustancias

- a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)
- b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)
- c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)
- d. Cocaína (coca, farlopa, crack, base, etc.)
- e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.)
- f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)
- g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Diazepam/Valium, Alprazolam/Trankimazin/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)
- h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)
- i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, petidina/dolantina, etc.)
- j. Otros especifique:

Tarjeta de respuesta (ASSIST Preguntas 2 – 5)

Nunca: no he consumido en los últimos 3 meses.

Una o dos veces: 1-2 veces en los últimos 3 meses.

Mensualmente: 1 a 3 veces en el ultimo mes.

Semanalmente: 1 a 4 veces por semana.

Diariamente o casi a diario: 5 a 7 días por semana.

Tarjeta de respuesta (ASSIST Preguntas 6 - 8)

No, nunca

Si, pero no en los últimos 3 meses

Si, en los últimos 3 meses

<u>A</u>Icohol, <u>S</u>moking and <u>S</u>ubstance <u>Involvement S</u>creening <u>T</u>est (OMS ASSIST V3.0) TARJETAS DE RESPUESTA para los Pacientes

Nombre recha del l'est	Nombre	Fecha del Test
------------------------	--------	----------------

Puntuaciones Específicas para cada Sustancia

Sustancia	Puntuación	Nive	l de Riesgo
a. Productos derivados del tabaco		0-3 4-26 27+	Bajo Moderado Alto
b. Bebidas alcohólicas		0-10 11-26 27+	Bajo Moderado Alto
c. Cannabis		0-3 4-26 27+	Bajo Moderado Alto
d. Cocaína		0-3 4-26 27+	Bajo Moderado Alto
e. Estimulantes de tipo anfetamínico		0-3 4-26 27+	Bajo Moderado Alto
f. Inhalantes		0-3 4-26 27+	Bajo Moderado Alto
g. Sedantes o Pastillas para dormir		0-3 4-26 27+	Bajo Moderado Alto
h. Alucinógenos		0-3 4-26 27+	Bajo Moderado Alto
i. Opiáceos		27+	Bajo Moderado Alto
j. Otros – especificar		0-3 4-26 27+	Bajo Moderado Alto

¿Qué significan sus puntuaciones?

Bajo: Su actual patrón de consumo representa un riesgo bajo sobre su salud y de

otros problemas.

Moderado: Usted presenta riesgo para su salud y de otro tipos de problemas derivados

de su actual patrón de consumo de sustancias.

Alto: Usted presenta un riesgo elevado de experimentar problemas graves (de

salud, sociales, económicos, legales, de pareja, ...) derivado de su patrón

actual de consumo y probablemente sea dependiente.

¿Está preocupado sobre su consumo de sustancias?

a.	Su riesgo de experimentar estos daños es: Bajo □ Moderado □ Alto □			
Tabaco	El consumo habitual de tabaco se asocia con: (marque una)			
	Envejecimiento prematuro, arrugas en la piel			
	Infecciones respiratorias y asma			
	Aumento de la presión arterial, diabetes			
	Infecciones respiratorias, alergias y asma en hijos de fumadores			
	Abortos, partos prematuros y niños con bajos pesos al nacer de madres fumadores embarazadas			
	Enfermedades renales			
	Enfermedad respiratoria obstructiva crónica			
	Enfermedad cardíaca, infartos cerebrales, enfermedades vasculares			
	Cánceres			
b.	Su riesgo de experimentar estos daños es: Bajo □ Moderado □ Alto □			
Alcohol	La ingesta excesiva habitual de alcohol se asocia con: (marque una)			
	Resacas, conductas agresivas y violentas, accidentes y lesiones			
	Reducción en la actividad y capacidad sexual, envejecimiento prematuro			
_	Problemas digestivos, úlceras, inflamación del páncreas, aumento de la presión arterial			
	Ansiedad y depresión, problemas de pareja, problemas económicos y laborales			
	Dificultad para recordar y solucionar problemas			
	Deformidades y daño cerebral en recién nacidos de embarazadas bebedoras			
	Ataque cerebral, lesión cerebral permanente, daño muscular y neurológico			
	Enfermedad hepática, enfermedad pancreática			
	Cánceres, suicidio			
C.	Su riesgo de experimentar estos daños es:			
Cannabis	El consumo habitual de cannabis se asocia con: Bajo □ Moderado □ Alto □ (marque una)			
	Problemas con la atención y motivación			
	Ansiedad, paranoia, pánico, depresión			
	Pérdida de memoria y en la capacidad de solución de problemas			
	Aumento de la presión arterial			
	Asma, bronquitis			
	Psicosis en aquellas personas con antecedentes familiares de esquizofrenia			
	Enfermedad cardíaca y enfermedad respiratoria obstructiva crónica			

Cánceres

d.	Su rie	esgo de experimentar estos daños es:	Bajo □ Moderado □ Alto □		
Cocaína	El consumo habitual de cocaína se asocia con:		(marque una)		
	Dificultades para dormir, palpitaciones, dolores de cabeza, pérdida de peso				
	Sensación de adormecimiento, acartonamiento en la piel, rascado en la piel				
	Accidentes y lesiones, problemas económicos				
	Pensamientos irracionales				
	Cambios de humor - ansiedad, depresión, manía				
	Agresividad y paranoia				
	Craving o deseo intenso, stress debido al estilo de vida				
	Psicosis tras el consumo repetido a altas dosis				
	Muerte súbita debido a problemas cardíacos				
e.		Su riesgo de experimentar estos daños es:	Bajo □ Moderado □ Alto □		
Estimula	ntes de	El consumo habitual de estimulantes de tino	(marque una)		

e.		Su riesgo de experimentar estos daños es: Bajo □ Moderado □ Alto □		
Estimulantes de tipo anfetamínico		El consumo habitual de estimulantes de tipo anfetamínico se asocia con:		
	Dificultades para dormir, pérdida de apetito y de peso, deshidratación			
	Tensión mandibular, dolores de cabeza, dolores musculares			
	Cambios de humor – ansiedad, depresión, agitación, manía, pánico, paranoia			
	Temblores, palpitaciones y latidos cardíacos irregulares, falta de aire/disnea			
	Agresividad y conducta violenta			
	Psicosis tras el consumo continuado a altas dosis			
	Daño cerebral permanente			
	Daño hepático, hemorragias cerebrales, muerte súbita (del éxtasis) en situaciones raras			

f.	Su riesgo de experimentar estos daños es: Bajo □ Moderado □ Alto □			
Inhalante	El consumo habitual de inhalantes se asocia con:			
	Mareos y alucinaciones, sedación, desorientación, visión borrosa			
	Síntomas pseudo-gripales, sinusitis, hemorragias nasales			
	Indigestión, úlceras estomacales			
	Accidentes y lesiones			
	Pérdida de memoria, confusión, depresión, agresión			
	Alteraciones en la coordinación, enlentecimiento en las reacciones, hipoxia			
	Delirio, convulsiones, coma, daño orgánico (corazón, pulmón, hígado, riñones)			
	Muerte por fallo cardíaco			

g.	Su riesgo de experimentar estos daños es: Bajo □ Moderado □ Alto □
Sedantes	El consumo habitual de sedantes se asocia con:
9	Sedación, mareo y confusión
	Difficultad para concentrarse y recordar cosas
1	láuseas, dolor de cabeza, inestabilidad al andar
F	Problemas de sueño
ļ ,	Ansiedad y depresión
7	olerancia y dependencia después de un período breve de consumo.
	Síntomas de abstinencia graves
9	Sobredosis y muerte si se consumen con alcohol, opíáceos u otras drogas depresoras.

h. Alucinógenos		Su riesgo de experimentar estos daños es:	Bajo □	Moderado □	Alto □
		El consumo habitual de alucinógenos se asocia con:	(marque una)		
	Alucinaciones (placenteras o molestas) – visuales, auditivas, táctiles, olfatorias				
	Dificultades para dormir				
	Náuseas y vómitos				
	Aumento en la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial				
	Cambios de humor				
	Ansiedad, pánico, paranoia				
	Flash	n-backs			
	Aume	ento en los efectos de enfermedades mentales como la esq	uizofrenia		

i.	Su riesgo de experimentar estos daños es:	Bajo □ Moderado □ Alto □
opíáceos	El consumo habitual de opiáceos se asocia con:	(marque una)
	Picor, náusea y vómitos	
	Mareos	
	Estreñimiento, deterioro de los dientes	
	Dificultad para concentrarse y recordar cosas	
	Disminución del deseo sexual y de la actividad sexual	
	Dificultades de pareja	
	Problemas económicos y laborales, delincuencia	
	Tolerancia y dependencia, síntomas de abstinencia	
	Sobredosis y muerte por depresión respiratoria	

OMS-ASSIST

Tarjeta sobre Riesgos asociados con Inyectarse – Información para pacientes

El consumo de sustancias por vía inyectada aumenta el riesgo de daños debido a las propias sustancias.

El daño puede provenir de:

La sustancia

- > Si consume cualquier droga inyectada, tiene más probabilidades de desarrollar dependencia.
- > Si se inyecta anfetaminas o cocaína tiene un mayor riesgo de experimentar síntomas psicóticos.
- Si se inyecta heroína u otro tipo de sedantes tiene más riesgo de sobredosis.

La conducta de invección

- Al inyectarse dañar su piel, sus venas y padecer infecciones.
- Puede provocarse cicatrices, hematomas, hinchazones, abscesos y úlceras.
- Sus venas pueden colapsar.
- > Si se inyecta en el cuello puede provocarse una embolia cerebral.

Compartir material de invección

> Si comparte material de inyección (agujas y jeringas, cucharas, esponjas, filtros, etc.) tiene más probabilidades de transmitir infecciones víricas a través de la sangre como la Hepatitis B, la Hepatitis C y el VIH.

Es más seguro no inyectarse

❖ Si se inyecta:

- ✓ use siempre equipamiento limpio (e.g., agujas y jeringa, cucharas, esponjas, filtros, etc.)
- ✓ use siempre una aguja y una jeringuilla nuevas
- √ no comparta el material con otras personas
- ✓ limpie el área de preparación
- ✓ límpiese las manos
- √ limpie el lugar de inyección
- ✓ utilice un lugar de invección distinto cada vez
- ✓ inyéctese lentamente
- ✓ ponga su aguja y jeringa usadas en un recipiente rígido y deshéchelo de forma segura

❖ Si consume drogas estimulantes como las anfetaminas o la cocaína, los siguientes consejos le ayudarán a reducir el riesgo de psicosis.

- ✓ evite inyectarse y fumar
- ✓ evite consumir a diario

Si consume drogas depresoras como la heroína, los siguientes consejos le ayudarán a reducir el riesgo de sobredosis.

- ✓ evite consumir otras drogas el mismo día, especialmente sedantes o alcohol
 ✓ consuma pequeñas cantidades y "pruebe" la droga cuando tenga una nueva dosis
- √ tenga a alguien cerca cuando consume
- ✓ evite inyectarse en un lugar en el que nadie pueda llegar a usted si tiene una
- √ tenga a mano los números de teléfono de los servicios de urgencia/ambulancia