

Основные формулы комбинаторики

1) Факториал (произведение всех натуральных чисел от 1 до n включительно)

$$1! = 1$$

$$2! = 1 \cdot 2 = 2$$

$$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$$

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

$$6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$$

$$7! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 = 5040$$

...

$$(n-1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-2)(n-1)$$

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-2)(n-1)n$$

$$(n+1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-2)(n-1)n(n+1)$$

...

Кроме того: $0! = 1$

2) Перестановки, сочетания и размещения без повторений

Участники действий: множество, состоящее из n **различных** объектов (либо объектов, считающихся в контексте той или иной задачи различными)

Формула количества перестановок: $P_n = n!$

Типичная смысловая нагрузка: «Сколькими способами можно переставить n объектов?»

Формула количества сочетаний: $C_n^m = \frac{n!}{(n-m)! \cdot m!}$

Типичная смысловая нагрузка: «Сколькими способами можно выбрать m объектов из n ?». Поскольку выборка проводится из множества, состоящего из n объектов, то справедливо неравенство $0 \leq m \leq n$

Формула количества размещений: $A_n^m = (n-m+1) \cdot \dots \cdot (n-1)n$

Типичная смысловая нагрузка: «сколькими способами можно выбрать m объектов (из n объектов) и в каждой выборке переставить их местами (либо распределить между ними какие-нибудь уникальные атрибуты)»

Исходя из вышесказанного, справедлива следующая формула:

$$C_n^m \cdot P_m = A_n^m$$

И в самом деле:

$$C_n^m \cdot P_m = \frac{n!}{(n-m)! \cdot m!} \cdot m! = \frac{n!}{(n-m)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-m)(n-m+1) \cdot \dots \cdot (n-1)n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-m)} = (n-m+1) \cdot \dots \cdot (n-1)n = A_n^m$$

4) Комбинаторное правило суммы и комбинаторное правило произведения

Если объект A можно выбрать из некоторого множества объектов m способами, а другой объект B – n способами, то выбор объекта A **или** объекта B (без разницы какого) возможен $m + n$ способами.

Если объект A можно выбрать из некоторого множества объектов m способами **и** после каждого такого выбора объект B можно выбрать n способами, то упорядоченная пара объектов $(A; B)$ может быть выбрана mn способами.

Данные принципы справедливы и для бОльшего количества объектов.

Важная содержательная часть правил состоит в том, знак «плюс» понимается и читается как союз **ИЛИ**, а знак «умножить» – как союз **И**.

5) Перестановки, сочетания и размещения с повторениями

Участники действий: множество, состоящее из объектов, среди которых есть одинаковые (либо считающиеся таковыми по смыслу задачи)

Формула количества перестановок с повторениями: $P_{n(повт)} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot n_3! \cdot \dots \cdot n_k!}$,

где $n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k = n$

Типичная смысловая нагрузка: «Количество способов, которыми можно переставить n объектов, среди которых 1-й объект повторяется n_1 раз, 2-й объект повторяется n_2 раз, 3-й объект – n_3 раз, ..., k -й объект – n_k раз»

Следует отметить, что в подавляющем большинстве задач в совокупности есть и уникальные (не повторяющиеся) объекты, в этом случае соответствующие значения n_i равны единице, и в практических расчётах их можно не записывать в знаменатель.

Формула количества сочетаний с повторениями: $C_{n(повт)}^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{(n-1)! \cdot m!}$

Типичная смысловая нагрузка: «Для выбора предложено n множеств, каждое из которых состоит из одинаковых объектов. Сколькими способами можно выбрать m объектов?»

То есть, здесь в выборке могут оказаться одинаковые объекты, и если $m > n$, то совпадения точно будут. По умолчанию предполагается, что исходная совокупность содержит не менее m объектов **каждого вида**, и поэтому выборка может полностью состоять из одинаковых объектов.

Формула количества размещений с повторениями: $A_{n(повт)}^m = n^m$

Типичная смысловая нагрузка: «Дано множество, состоящее из n объектов, при этом любой объект можно выбирать **неоднократно**. Сколькими способами можно выбрать m объектов, если **важен порядок их расположения** в выборке?»

Для бОльшей ясности здесь удобно представить, что объекты извлекаются последовательно (хотя это вовсе не обязательное условие). В частности, возможен случай, когда из n имеющихся объектов m раз будет выбран какой-то один объект.

Основные формулы теории вероятностей
Сводный справочный материал раздела «Теория вероятностей»

Часть первая. Случайные события

1. Классическое определение вероятности

Вероятностью наступления события A в некотором испытании называют отношение

$P(A) = \frac{m}{n}$, где n – общее число всех равновозможных, элементарных исходов этого

испытания, а m – количество элементарных исходов, благоприятствующих событию A .

2. Геометрическое определение вероятности

Вероятность наступления события A в испытании равна отношению

$P(A) = \frac{g}{G}$, где G – геометрическая мера (длина, площадь, объем), выражающая общее число

всех возможных и равновозможных исходов данного испытания, а g – мера, выражающая количество благоприятствующих событию A исходов.

3. Статистическое определение вероятности

Вероятность наступления некоторого события A – есть относительная частота

$W(A) = \frac{m}{n}$, где n – общее число фактически проведённых испытаний, а m – число

испытаний, в которых появилось событие A .

4. Полная группа событий

Сумма вероятностей событий $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$, образующих полную группу, равна единице:

$$P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots + P(A_n) = 1$$

5. Теорема сложения вероятностей противоположных событий

Сумма вероятностей противоположных событий A, \bar{A} равна единице:

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

7. Теорема сложения вероятностей несовместных событий

Вероятность появления одного из двух несовместных событий A или B (без разницы какого), равна сумме вероятностей этих событий:

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

Аналогичный факт справедлив и для бОльшего количества несовместных событий, например, для трёх:

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

8. Теорема сложения вероятностей совместных событий

Вероятность появления *хотя бы одного* из двух совместных событий A, B равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

9. Теорема умножения вероятностей независимых событий

Вероятность совместного появления двух независимых событий A и B равна произведению вероятностей этих событий:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

Данный факт справедлив и для большего количества событий, например, для трёх:

$$P(ABC) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

10. Теорема умножения вероятностей зависимых событий

Вероятность совместного появления двух зависимых событий равна произведению вероятности одного события на условную вероятность другого события:

$P(AB) = P(A) \cdot P_A(B)$, где $P_A(B)$ – вероятность появления события B при условии, что событие A уже произошло.

Данный факт справедлив и для большего количества событий, например, для трёх:

$P(ABC) = P(A) \cdot P_A(B) \cdot P_{AB}(C)$, где $P_{AB}(C)$ – вероятность появления события C при условии, что события A и B уже произошли.

11. Формула полной вероятности

Вероятность события A , которое может наступить лишь при условии появления одного из несовместных событий $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$, образующих полную группу, равна сумме произведений вероятностей каждого из этих событий на соответствующие условные вероятности события A :

$$P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A) + P(B_3) \cdot P_{B_3}(A) + \dots + P(B_n) \cdot P_{B_n}(A)$$

12. Формулы Байеса

Пусть в результате осуществления одной из гипотез $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$ событие A произошло. Тогда:

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(A)} \text{ – вероятность того, что имела место гипотеза } B_1;$$

$$P_A(B_2) = \frac{P(B_2) \cdot P_{B_2}(A)}{P(A)} \text{ – вероятность того, что имела место гипотеза } B_2;$$

$$P_A(B_3) = \frac{P(B_3) \cdot P_{B_3}(A)}{P(A)} \text{ – вероятность того, что имела место гипотеза } B_3;$$

...

$$P_A(B_n) = \frac{P(B_n) \cdot P_{B_n}(A)}{P(A)} \text{ – вероятность того, что имела место гипотеза } B_n.$$

13. Формула Бернулли

$$P_n^m = C_n^m p^m q^{n-m}, \text{ где:}$$

n – количество независимых испытаний;

p – вероятность появления события A в каждом испытании и $q = 1 - p$ – не появления;

P_n^m – вероятность того, что в n испытаниях событие A появится ровно m раз.

(C_n^m – [биномиальный коэффициент](#))

14. Формула Пуассона

$$P_m \approx \frac{\lambda^m}{m!} \cdot e^{-\lambda}, \text{ где } \lambda = np, \text{ где:}$$

n – количество независимых испытаний;

p – вероятность появления события A в каждом испытании;

P_m – вероятность того, что в n испытаниях событие A появится ровно m раз,

при этом количество испытаний должно быть достаточно велико (*сотни, тысячи и больше*), а вероятность появления события в каждом испытании весьма мала (*сотые, тысячные и меньше*), в противном случае приближение к точному результату P_n^m (см. п. 13) будет плохим.

15. Локальная теорема Лапласа

Пусть проводится достаточно большое ($> 50-100$) количество n независимых испытаний, в каждом из которых событие A может появиться с вероятностью p . Тогда вероятность $P_n(m)$ того, что в n испытаниях событие A наступит ровно m раз, приближённо равна:

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi(x), \text{ где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} - \text{функция Гаусса, а } x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} \quad (q = 1 - p).$$

Значения функции Гаусса можно найти напрямую, с помощью таблицы либо в [MS Excel](#).

Теорема обеспечивает хорошее приближение к точному результату P_n^m (см. п. 13) при условии $npq > 10$ (≈ 10), в противном случае значение $P_n(m)$ будет далеко от истины.

16. Интегральная теорема Лапласа

Если вероятность p появления случайного события A в каждом независимом испытании постоянна, то вероятность того, что в n испытаниях событие A наступит не менее m_1 и не более m_2 раз, приближённо равна:

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1), \text{ где:}$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz - \text{функция Лапласа, } x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}, \quad x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}$$

Значения функции Лапласа можно найти с помощью таблицы либо в [MS Excel](#).

Теорема применима при тех же условиях: количество испытаний должно быть достаточно велико ($n > 50-100$) и произведение $npq > 10$ (≈ 10). В противном случае точность приближения будет неудовлетворительной.

Точное значение можно рассчитать по формуле:

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) = P_n^{m_1} + P_n^{m_1+1} + P_n^{m_1+2} + \dots + P_n^{m_2-1} + P_n^{m_2}, \text{ где } P_n^{m_i} = C_n^{m_i} p^{m_i} q^{n-m_i} \text{ (см. п. 13)}$$

Часть вторая. Случайные величины

17. Математическое ожидание

а) дискретной случайной величины:

$$M(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i, \text{ где:}$$

x_i – все возможные значения случайной величины и p_i – соответствующие вероятности.

б) непрерывной случайной величины:

$$M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx, \text{ где } f(x) \text{ – функция плотности распределения этой случайной величины.}$$

18. Свойства математического ожидания

$M(C) = C$ – математическое ожидание константы равно этой константе.

$M(CX) = CM(X)$ – постоянный множитель можно вынести за знак математического ожидания.

$M(X + Y) = M(X) + M(Y)$ – математическое ожидание суммы двух случайных величин равно сумме их математических ожиданий.

Для независимых случайных величин справедливо свойство:

$$M(XY) = M(X) \cdot M(Y)$$

19. Дисперсия

$D(X) = M[(X - M(X))^2]$ – есть математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от её математического ожидания.

а) Дисперсию дискретной случайной величины можно рассчитать по определению:

$$D(X) = M[(X - M(X))^2] = (x_1 - M(X))^2 p_1 + (x_2 - M(X))^2 p_2 + \dots + (x_n - M(X))^2 p_n = \sum_{i=1}^n (x_i - M(X))^2 p_i$$

либо по формуле $D(X) = M(X^2) - (M(X))^2$, где $M(X^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i$

б) и аналогичные способы для непрерывной случайной величины:

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - M(X)]^2 f(x) dx \text{ либо } D(X) = M(X^2) - (M(X))^2, \text{ где } M(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

20. Свойства дисперсии

$D(C) = 0$ – дисперсия постоянной величины равна нулю.

$D(CX) = C^2 D(X)$ – константу можно вынести за знак дисперсии, возведя её в квадрат.

$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + \text{cov}(X; Y)$, где $\text{cov}(X; Y)$ – коэффициент ковариации (см. ниже) случайных величин X, Y . Если случайные величины независимы, то $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$.

и для независимых случайных величин:

$$D(X - Y) = D(X + (-Y)) = D(X) + D(-1 \cdot Y) = D(X) + (-1)^2 D(Y) = D(X) + D(Y)$$

21. Среднее квадратическое (стандартное) отклонение

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

22. Вероятность того, что случайная величина X примет значение из промежутка
 $P(a < X < b)$, $P(a \leq X < b)$, $P(a < X \leq b)$ либо $P(a \leq X \leq b)$ рассчитывается по единой формуле:

$F(b) - F(a)$, где $F(x)$ – функция распределения данной случайной величины.

Для непрерывной случайной величины эти вероятности можно найти и другим способом – с

помощью интеграла $\int_a^b f(x)dx$, где $f(x)$ – функция плотности распределения.

23. Распространённые виды распределений и их числовые характеристики**а) дискретные:**

Название распределения	Формула расчёта вероятностей	Возможные значения m	Математическое ожидание	Дисперсия
Биномиальное	$P_n^m = C_n^m p^m q^{n-m}$	0, 1, 2, 3, ..., n	np	npq
Пуассона	$P_m = \frac{\lambda^m}{m!} \cdot e^{-\lambda}$	1, 2, 3, ..., n , ...	λ	λ
Геометрическое	$P_m = q^{m-1} p$	1, 2, 3, ..., n , ...	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
Гипергеометрическое	$P_m = \frac{C_M^m \cdot C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$	0, 1, ..., $\min(M, n)$	$\frac{M}{N} \cdot n$	$\frac{M(N-M)n(N-n)}{N^2(N-1)}$

б) непрерывные:

Название распределения	Функция плотности $f(x)$	Математическое ожидание	Дисперсия
Равномерное	$\frac{1}{b-a}$ на промежутке от a до b и 0 вне этого промежутка	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(a-b)^2}{12}$
Показательное	$\lambda e^{-\lambda x}$, если $x \geq 0$ и 0, если $x < 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Нормальное	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < +\infty$	a	σ^2

24. Коэффициент ковариации (совместной вариации) случайных величин

$$\text{cov}(X; Y) = M[(X - M(X)) \cdot (Y - M(Y))] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i - M(X))(y_j - M(Y))p_{ij} \quad \text{— математическое}$$

ожидание произведения линейных отклонений случайных величин от соответствующих математических ожиданий.

Данный коэффициент удобно вычислять по формуле:

$$\text{cov}(X; Y) = M(XY) - M(X) \cdot M(Y), \text{ где } M(XY) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j p_{ij} \text{ для дискретной и}$$

$$M(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy \quad \text{— для непрерывной случайной величины.}$$

Значение коэффициента не превосходит по модулю $|\text{cov}(X; Y)| \leq \sqrt{D(X) \cdot D(Y)}$, где $D(X)$, $D(Y)$ — дисперсии случайных величин.

Если случайные величины независимы, то $\text{cov}(X; Y) = 0$, обратное в общем случае неверно.

25. Коэффициент линейной корреляции

$$r_{xy} = \frac{\text{cov}(X; Y)}{\sigma(X) \cdot \sigma(Y)}, \text{ где } \sigma(X), \sigma(Y) \text{ — стандартные отклонения случайных величин.}$$

Данный коэффициент принимает значения из промежутка $-1 \leq r_{xy} \leq 1$

26. Неравенство Чебышева

Вероятность того, что отклонение случайной величины X от её математического ожидания по абсолютной величине меньше положительного числа ε , не меньше, чем:

$$P(|X - M(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}, \text{ где } D(X) \text{ — дисперсия этой случайной величины.}$$

27. Теорема Чебышева

Если $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ — попарно независимые случайные величины, причём дисперсии их равномерно ограничены (не превосходят постоянного числа C), то, как бы ни было мало положительное число ε , вероятность неравенства

$$\left| \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \frac{M(X_1) + M(X_2) + \dots + M(X_n)}{n} \right| < \varepsilon \text{ будет сколь угодно близка к единице,}$$

если число случайных величин достаточно велико. Иными словами:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\left| \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \frac{M(X_1) + M(X_2) + \dots + M(X_n)}{n} \right| < \varepsilon \right) = 1$$