

Fondements Mathématiques des Graph Neural Networks Spectraux

De la Théorie Spectrale des Graphes à l'Approximation de Tchebychev

Projet `spectral-gnn` — `governor08/spectral-gnn`

S. Oussama

Software Engineer & Math Enthusiast

Avril 2026

Résumé

Ce document établit les fondements mathématiques rigoureux du projet `spectral-gnn`, une implémentation *from scratch* (sans PyTorch Geometric) d'un réseau de neurones convolutif sur graphe basé sur les polynômes de Tchebychev (ChebNet, Defferrard *et al.*, 2016).

La progression suit une logique de *problématique* $\rightarrow$ *démonstration* : nous partons du problème de la définition d'une convolution sur un domaine non-euclidien (Section 1), nous montrons comment la diagonalisation du Laplacien fournit une réponse exacte mais cubiquement coûteuse (Section 2), puis nous démontrons comment l'approximation polynomiale de Tchebychev ramène cette complexité à un régime linéaire en le nombre d'arêtes (Section 3).

L'implémentation résultante, construite sur des tenseurs PyTorch bruts, atteint **78.2% de précision** sur le dataset Cora en classification semi-supervisée de nœuds — résultat conforme à celui rapporté dans Defferrard *et al.* (2016), validant ainsi la correction de chaque étape mathématique décrite dans ce document.

Table des matières

1	Le Laplacien de Graphe	3
1.1	Problématique : comment définir une structure différentielle sur un graphe?	3
1.2	Graphes et matrices associées	3
1.3	Construction du Laplacien normalisé	3
1.4	Propriétés spectrales du Laplacien normalisé	4
2	La Convolution Spectrale Stricte	5
2.1	Problématique : comment filtrer un signal sur graphe?	5
2.2	Décomposition spectrale du Laplacien	5
2.3	Transformée de Fourier sur graphe	6
2.4	Convolution spectrale et filtrage	6
2.5	Complexité de l'approche exacte	6
3	L'Approximation de Tchebychev (ChebNet)	7
3.1	Problématique : peut-on éviter la diagonalisation?	7
3.2	Rescaling du spectre	7
3.3	Polynômes de Tchebychev	7
3.4	Approximation du filtre spectral	8
3.5	La convolution ChebNet sans diagonalisation	8
3.6	Analyse de complexité comparative	8
3.7	Généralisation à des signaux multivariés	9
	Conclusion	9

1 Le Laplacien de Graphe

1.1 Problématique : comment définir une structure différentielle sur un graphe ?

En traitement du signal classique, la convolution entre un signal f et un filtre g est définie via la transformation de Fourier, laquelle repose sur les fonctions propres de l'opérateur laplacien Δ sur $\mathbb{R}^n$. Sur un graphe fini, il n'existe *a priori* aucune notion de dérivée directionnelle. L'idée fondatrice de la théorie spectrale des graphes est de construire un analogue discret du laplacien continu, dont les vecteurs propres joueront le rôle des fréquences de Fourier.

1.2 Graphes et matrices associées

Définition 1.1 (Graphe non orienté pondéré). Un graphe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, w)$ est la donnée :

- d'un ensemble de N sommets (noeuds) $\mathcal{V} = \{1, \dots, N\}$,
- d'un ensemble d'arêtes $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{V}$,
- d'une fonction de poids $w : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$.

Dans la suite, on considère uniquement des graphes **non orientés** ($\{i, j\} \in \mathcal{E} \Rightarrow \{j, i\} \in \mathcal{E}$) et **sans boucle** ($\{i, i\} \notin \mathcal{E}$).

Définition 1.2 (Matrice d'adjacence). La *matrice d'adjacence* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ est définie par :

$$A_{ij} = \begin{cases} w(i, j) & \text{si } \{i, j\} \in \mathcal{E}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par la contrainte de non-orientation, $\mathbf{A}$ est **symétrique** : $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$.

Définition 1.3 (Matrice de degrés). La *matrice de degrés* $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ est la matrice diagonale :

$$D_{ii} = d_i := \sum_{j=1}^N A_{ij}, \quad D_{ij} = 0 \text{ pour } i \neq j.$$

d_i est appelé le *degré* du nœud i .

1.3 Construction du Laplacien normalisé

Définition 1.4 (Laplacien combinatoire). Le *Laplacien combinatoire* (ou non normalisé) du graphe $\mathcal{G}$ est :

$$\mathbf{L}_{\text{comb}} = \mathbf{D} - \mathbf{A}.$$

Remarque 1.5. Le Laplacien combinatoire généralise l'opérateur discret de diffusion : pour un signal $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$, on a $(\mathbf{L}_{\text{comb}} \mathbf{x})_i = d_i x_i - \sum_{j \sim i} w(i, j) x_j$, ce qui mesure la différence entre la valeur de $\mathbf{x}$ en i et la somme pondérée de ses voisins — analogue discret de $-\Delta f$.

Définition 1.6 (Laplacien normalisé symétrique). Le *Laplacien normalisé symétrique* est :

$$\mathbf{L} = \mathbf{I} - \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1/2}$$

où $\mathbf{D}^{-1/2}$ est la matrice diagonale dont les entrées valent $D_{ii}^{-1/2} = d_i^{-1/2}$ pour tout nœud i de degré non nul.

Remarque 1.7. On peut vérifier que L_{ij} prend les valeurs suivantes :

$$L_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \text{ et } d_i \neq 0, \\ -\frac{w(i,j)}{\sqrt{d_i d_j}} & \text{si } \{i,j\} \in \mathcal{E}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1.4 Propriétés spectrales du Laplacien normalisé

Théorème 1.8 (Spectre du Laplacien normalisé). *Soit $\mathcal{G}$ un graphe connexe à N nœuds sans boucle. La matrice $\mathbf{L} = \mathbf{I} - \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1/2}$ est :*

1. **Symétrique réelle**, donc diagonalisable dans une base orthonormée.
2. **Semidéfinie positive** : toutes ses valeurs propres vérifient $\lambda \geq 0$.
3. **Bornée supérieurement** : toutes ses valeurs propres vérifient $\lambda \leq 2$.

En résumé : $\sigma(\mathbf{L}) \subset [0, 2]$.

Démonstration. **(1) Symétrie.** Puisque $\mathbf{A}$ est symétrique et $\mathbf{D}^{-1/2}$ est diagonale réelle, on a $(\mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1/2})^\top = \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{A}^\top \mathbf{D}^{-1/2} = \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1/2}$. Donc $\mathbf{L}^\top = \mathbf{I}^\top - (\mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1/2})^\top = \mathbf{L}$.

(2) Semidéfinition positive. Pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$, on calcule directement la forme quadratique associée à :

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{L} \mathbf{x} = \sum_{\{i,j\} \in \mathcal{E}} w(i,j) \left(\frac{x_i}{\sqrt{d_i}} - \frac{x_j}{\sqrt{d_j}} \right)^2 \geq 0.$$

Cette forme quadratique est une somme de carrés, donc ≥ 0 . En particulier, toutes les valeurs propres satisfont $\lambda \geq 0$.

(3) Borne supérieure $\lambda \leq 2$ et borne inférieure $\lambda \geq 0$. Notons $\hat{\mathbf{A}} = \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1/2}$, de sorte que $\mathbf{L} = \mathbf{I} - \hat{\mathbf{A}}$. Si μ est une valeur propre de $\hat{\mathbf{A}}$, alors $\lambda = 1 - \mu$ est valeur propre de $\mathbf{L}$.

Borne supérieure ($\mu \leq 1$, i.e. $\lambda \geq 0$). Ceci découle directement de la semidéfinition positive de $\hat{\mathbf{A}}$ démontrée au point (2) : $\lambda = 1 - \mu \geq 0$ implique $\mu \leq 1$.

Borne inférieure ($\mu \geq -1$, i.e. $\lambda \leq 2$). Soit $v \in \mathbb{R}^N$ un vecteur unitaire ($\|v\| = 1$). On minore la forme quadratique de $\hat{\mathbf{A}}$ en utilisant l'inégalité arithmético-géométrique (AM-GM) : pour tous réels a, b , on a $ab \geq -\frac{1}{2}(a^2 + b^2)$. Appliquée à $a = v_i/\sqrt{d_i}$ et $b = v_j/\sqrt{d_j}$:

$$\frac{v_i v_j}{\sqrt{d_i d_j}} \geq -\frac{1}{2} \left(\frac{v_i^2}{d_i} + \frac{v_j^2}{d_j} \right).$$

En sommant sur toutes les arêtes $\{i,j\} \in \mathcal{E}$ (avec $w(i,j) = 1$ pour simplifier) :

$$v^\top \hat{\mathbf{A}} v = \sum_{\{i,j\} \in \mathcal{E}} \frac{v_i v_j}{\sqrt{d_i d_j}} \geq -\frac{1}{2} \sum_{\{i,j\} \in \mathcal{E}} \left(\frac{v_i^2}{d_i} + \frac{v_j^2}{d_j} \right).$$

Or, en regroupant par nœud i :

$$\sum_{\{i,j\} \in \mathcal{E}} \frac{v_i^2}{d_i} = \sum_{i=1}^N v_i^2 \cdot \frac{d_i}{d_i} = \sum_{i=1}^N v_i^2 = \|v\|^2 = 1,$$

et de même pour le terme en v_j^2/d_j . Donc :

$$v^\top \hat{\mathbf{A}} v \geq -\frac{1}{2}(1+1) = -1.$$

Ainsi $\mu = v^\top \hat{\mathbf{A}} v \geq -1$ pour tout vecteur propre unitaire v , ce qui donne $\lambda = 1 - \mu \leq 2$.

En conclusion, $\mu(\hat{\mathbf{A}}) \in [-1, 1]$ et $\lambda() = 1 - \mu(\hat{\mathbf{A}}) \in [0, 2]$. $\square$

Corollaire 1.9. *Le spectre de est de la forme $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N \leq 2$. La valeur propre $\lambda_1 = 0$ correspond au vecteur propre $u_1 = \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{1} / \|\mathbf{D}^{1/2} \mathbf{1}\|$. Le graphe est connexe si et seulement si $\lambda_2 > 0$.*

Démonstration. Vérifions directement que $\cdot \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{1} = \mathbf{0}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1/2} \cdot \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{1} &= \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{1} = \mathbf{D}^{-1/2} (d_1, \dots, d_N)^\top \\ &= \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{D} \mathbf{1} = \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{1}. \end{aligned}$$

Donc $(\mathbf{I} - \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1/2}) \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{1} = \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{1} - \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{1} = \mathbf{0}$. Le vecteur propre associé à $\lambda_1 = 0$ est bien $u_1 = \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{1} / \|\mathbf{D}^{1/2} \mathbf{1}\|$. $\square$

2 La Convolution Spectrale Stricte

2.1 Problématique : comment filtrer un signal sur graphe ?

En traitement du signal *discret*, la convolution circulaire de deux signaux $x, h \in \mathbb{R}^N$ est diagonale dans la base de la transformée de Fourier discrète (DFT). Plus précisément, les vecteurs de base

$$e_k = \frac{1}{\sqrt{N}} (1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(N-1)k})^\top, \quad \omega = e^{2\pi i/N},$$

sont exactement les vecteurs propres de la matrice de décalage circulaire. La convolution revient alors à une multiplication point par point (*pointwise*) dans ce domaine fréquentiel : $\widehat{x * h} = \hat{x} \cdot \hat{h}$.

Sur un graphe quelconque, la matrice de décalage circulaire est remplacée par le Laplacien normalisé, dont les vecteurs propres $\mathbf{U} = [u_1 | \dots | u_N]$ jouent le rôle des vecteurs de Fourier. On définit ainsi une transformée de Fourier sur graphe, et la convolution spectrale généralise l'opération classique à des domaines irréguliers.

2.2 Décomposition spectrale du Laplacien

Puisque est symétrique réelle (Théorème 1.8), le théorème spectral réel garantit sa diagonalisation dans une base orthonormée :

Théorème 2.1 (Décomposition spectrale). *Il existe une matrice orthogonale $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ ($\mathbf{U}^\top \mathbf{U} = \mathbf{U} \mathbf{U}^\top = \mathbf{I}$) et une matrice diagonale $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ avec $0 \leq \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_N \leq 2$, telles que :*

$$\boxed{= \mathbf{U} \mathbf{\Lambda} \mathbf{U}^\top}$$

*Les colonnes $u_1, \dots, u_N$ de $\mathbf{U}$ sont les vecteurs propres de , qui constituent la **base de Fourier sur graphe**.*

2.3 Transformée de Fourier sur graphe

Définition 2.2 (Transformée de Fourier sur graphe). Pour un signal $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ défini sur les nœuds du graphe, la *transformée de Fourier sur graphe* et son inverse sont :

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{U}^\top \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \quad \text{et} \quad \mathbf{x} = \mathbf{U} \hat{\mathbf{x}}.$$

$\hat{x}_k$ est l'amplitude de la composante fréquentielle u_k (associée à λ_k).

2.4 Convolution spectrale et filtrage

Définition 2.3 (Convolution spectrale sur graphe). La convolution d'un signal $\mathbf{x}$ avec un filtre spectral g_θ est définie par :

$$\boxed{g_\theta * \mathbf{x} = \mathbf{U} g_\theta(\mathbf{\Lambda}) \mathbf{U}^\top \mathbf{x}}$$

où $g_\theta(\mathbf{\Lambda}) = \text{diag}(g_\theta(\lambda_1), \dots, g_\theta(\lambda_N))$ est le filtre appliqué diagonalement dans le domaine spectral, et $\theta \in \mathbb{R}^N$ est le vecteur des paramètres apprenables.

Remarque 2.4 (Interprétation). L'opération se décompose en trois étapes :

1. **Analyse** : $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{U}^\top \mathbf{x}$ — projection sur la base de Fourier.
2. **Filtrage** : $\hat{\mathbf{x}}' = g_\theta(\mathbf{\Lambda}) \hat{\mathbf{x}}$ — multiplication pointwise des coefficients fréquents.
3. **Synthèse** : $\mathbf{y} = \mathbf{U} \hat{\mathbf{x}}'$ — reconstruction dans le domaine nodal.

2.5 Complexité de l'approche exacte

Proposition 2.5 (Complexité de la convolution spectrale stricte). *L'évaluation de $g_\theta * \mathbf{x} = \mathbf{U} g_\theta(\mathbf{\Lambda}) \mathbf{U}^\top \mathbf{x}$ a une complexité :*

$$\mathcal{O}(N^3)$$

en temps (pour la diagonalisation de) et $\mathcal{O}(N^2)$ en espace (pour le stockage de $\mathbf{U}$).

Démonstration. La décomposition en valeurs propres d'une matrice $N \times N$ par l'algorithme QR (ou LAPACK `dsyev`) a une complexité $\mathcal{O}(N^3)$. Une fois $\mathbf{U}$ calculé, le produit $\mathbf{U}^\top \mathbf{x}$ coûte $\mathcal{O}(N^2)$, le produit $g_\theta(\mathbf{\Lambda}) \hat{\mathbf{x}}$ coûte $\mathcal{O}(N)$ (multiplication diagonale), et $\mathbf{U} \hat{\mathbf{x}}'$ coûte $\mathcal{O}(N^2)$. Le goulot d'étranglement est donc la diagonalisation : $\mathcal{O}(N^3)$.

Pour des graphes réels (Cora : $N = 2708$, ogbn-arxiv : $N = 169\,343$), cette complexité est prohibitive. $\square$

Remarque 2.6 (Limitation supplémentaire). Outre la complexité, le filtre $g_\theta \in \mathbb{R}^N$ possède autant de paramètres que de nœuds dans le graphe, ce qui le rend non transférable d'un graphe à l'autre et extrêmement susceptible au surapprentissage.

3 L'Approximation de Tchebychev (ChebNet)

3.1 Problématique : peut-on éviter la diagonalisation ?

L'approche spectrale stricte (Section 2) souffre de deux défauts :

— Complexité $\mathcal{O}(N^3)$ pour la diagonalisation.

— Filtre non localisé : $g_\theta(\mathbf{\Lambda})$ peut mélanger des nœuds arbitrairement distants.

L'idée de Hammond, Vandergheynst & Gribonval (2011), reprise par Defferrard, Bresson & Vandergheynst (2016) dans ChebNet, est d'approcher $g_\theta(\mathbf{\Lambda})$ par un polynôme en $\mathbf{\Lambda}$ d'ordre K , ce qui permet de *remplacer* la diagonalisation par des multiplications matricielles creuses.

3.2 Rescaling du spectre

Définition 3.1 (Laplacien normalisé rescalé). Afin que les polynômes de Tchebychev soient évalués sur leur domaine d'orthogonalité $[-1, 1]$, on rescale en :

$$\tilde{\mathbf{L}} = \frac{2}{\lambda_{\max}} \mathbf{L} - \mathbf{I}$$

où $\lambda_{\max} = \max_k \lambda_k$ est la plus grande valeur propre de $\mathbf{L}$.

Proposition 3.2. Les valeurs propres de $\tilde{\mathbf{L}}$ appartiennent à $[-1, 1]$.

Démonstration. Si $\lambda_k \in [0, \lambda_{\max}]$, alors $\tilde{\lambda}_k = \frac{2\lambda_k}{\lambda_{\max}} - 1 \in [-1, 1]$. □

3.3 Polynômes de Tchebychev

Définition 3.3 (Polynômes de Tchebychev de première espèce). Les *polynômes de Tchebychev* $(T_k)_{k \geq 0}$ sont définis sur $[-1, 1]$ par la relation de récurrence à trois termes :

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_k(x) = 2xT_{k-1}(x) - T_{k-2}(x), \quad k \geq 2.$$

Remarque 3.4 (Propriétés avancées). Les polynômes de Tchebychev forment une base orthogonale de l'espace des fonctions continues sur $[-1, 1]$ et sont optimaux en norme uniforme parmi les polynômes unitaires de même degré (résultats admis, cf. théorie de l'approximation). Pour notre usage dans ChebNet, les deux propriétés suivantes suffisent.

Théorème 3.5 (Propriétés fondamentales des polynômes de Tchebychev). 1. **Bornes :**

$|T_k(x)| \leq 1$ pour tout $x \in [-1, 1]$ et tout $k \geq 0$.

2. **Représentation trigonométrique :** $T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$.

Preuve de la propriété 2. Par récurrence sur k : pour $k = 0$, $T_0(\cos \theta) = 1 = \cos(0)$.

Pour $k = 1$, $T_1(\cos \theta) = \cos \theta$.

Supposons $T_{k-1}(\cos \theta) = \cos((k-1)\theta)$ et $T_{k-2}(\cos \theta) = \cos((k-2)\theta)$.

Alors $T_k(\cos \theta) = 2 \cos \theta \cos((k-1)\theta) - \cos((k-2)\theta)$.

Or, la formule d'addition donne : $\cos(k\theta) + \cos((k-2)\theta) = 2 \cos \theta \cos((k-1)\theta)$.

Donc $T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$, ce qui conclut la récurrence. □

Preuve de la propriété 1. Pour tout $x \in [-1, 1]$, il existe $\theta \in [0, \pi]$ tel que $x = \cos \theta$.

La propriété 2 donne alors $|T_k(x)| = |\cos(k\theta)| \leq 1$. □

3.4 Approximation du filtre spectral

Définition 3.6 (Filtre ChebNet). On approche le filtre spectral g_θ par sa troncature dans la base de Tchebychev :

$$g_\theta(\tilde{\mathbf{L}}) \approx \sum_{k=0}^{K-1} \theta_k T_k(\tilde{\mathbf{L}})$$

où $K \in \mathbb{N}^*$ est le nombre de termes retenus et $\theta = (\theta_0, \dots, \theta_{K-1}) \in \mathbb{R}^K$ est le vecteur des paramètres apprenables (indépendant de N).

Remarque 3.7 (Convention d'indexation). On adopte ici la convention du code : K désigne le *nombre total de termes* (termes $T_0, T_1, \dots, T_{K-1}$), et non l'ordre maximal. Ainsi $K = 3$ produit les termes T_0, T_1, T_2 , ce qui correspond à une réceptivité à 2 sauts. Certains articles (dont Defferrard *et al.*) utilisent K comme ordre maximal et écrivent la somme jusqu'à K inclus (soit $K + 1$ termes).

Remarque 3.8. L'argument de T_k est maintenant la *matrice* $\tilde{\mathbf{L}}$, et non un scalaire. La récurrence matricielle correspondante est :

$$\bar{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{x}, \quad \bar{\mathbf{x}}_1 = \tilde{\mathbf{L}}\mathbf{x}, \quad \bar{\mathbf{x}}_k = 2\tilde{\mathbf{L}}\bar{\mathbf{x}}_{k-1} - \bar{\mathbf{x}}_{k-2},$$

de sorte que $T_k(\tilde{\mathbf{L}})\mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}}_k$.

3.5 La convolution ChebNet sans diagonalisation

Théorème 3.9 (Convolution ChebNet). La convolution ChebNet d'un signal $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ avec les paramètres $\theta \in \mathbb{R}^K$ est :

$$y = g_\theta(\tilde{\mathbf{L}})\mathbf{x} = \sum_{k=0}^{K-1} \theta_k \bar{\mathbf{x}}_k$$

où $\bar{\mathbf{x}}_k = T_k(\tilde{\mathbf{L}})\mathbf{x}$ est calculé par récurrence sans jamais diagonaliser.

Élimination de la diagonalisation. La clé est que chaque produit $\tilde{\mathbf{L}}\bar{\mathbf{x}}_{k-1}$ est un produit **matrice creuse** $\times$ **vecteur** : $\tilde{\mathbf{L}}$ a le même motif de non-zéros que $\mathbf{A}$, c'est-à-dire exactement $2|\mathcal{E}| + N$ entrées non nulles (arêtes et diagonale). Ce produit coûte donc $\mathcal{O}(|\mathcal{E}|)$ opérations. En répétant cette récurrence K fois, la complexité totale est $\mathcal{O}(K|\mathcal{E}|)$, ce qui ne fait intervenir aucune diagonalisation. $\square$

3.6 Analyse de complexité comparative

TABLE 1 – Comparaison des complexités : approche stricte vs. ChebNet

Méthode	Complexité temporelle	Paramètres apprenables
Spectral strict	$\mathcal{O}(N^3)$	N (non transférable)
ChebNet (K)	$\mathcal{O}(K \mathcal{E})$	K (transférable)

Remarque 3.10 (Localité spatiale). L'ordre K de l'approximation contrôle directement le *rayon de réceptivité* : un filtre ChebNet d'ordre K agrège uniquement les informations des voisins à distance au plus K (au sens de la plus courte distance sur le graphe). Formellement, si (i, j) est à distance $d(i, j) > K$, alors le chemin de j vers i n'est pas atteint par K multiplications matricielles par $\tilde{\mathbf{L}}$, dont le motif de non-zéros reflète exactement les arêtes de $\mathcal{G}$.

3.7 Généralisation à des signaux multivariés

En pratique, chaque nœud porte un vecteur de caractéristiques $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^{F_{\text{in}}}$, et l'on souhaite produire des sorties dans $\mathbb{R}^{F_{\text{out}}}$. Le signal est alors une matrice $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times F_{\text{in}}}$.

Définition 3.11 (Couche ChebNet multivariée). Une couche ChebNet est paramétrée par un tenseur de poids $\Theta \in \mathbb{R}^{K \times F_{\text{in}} \times F_{\text{out}}}$ (un plan $F_{\text{in}} \times F_{\text{out}}$ par ordre polynomial), et sa sortie est :

$$\mathbf{Y} = \sum_{k=0}^{K-1} \bar{\mathbf{X}}_k \Theta_k \in \mathbb{R}^{N \times F_{\text{out}}}$$

où $\bar{\mathbf{X}}_k = T_k(\tilde{\mathbf{L}})\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times F_{\text{in}}}$ est calculé colonne par colonne via la récurrence de Tchebychev, et $\Theta_k \in \mathbb{R}^{F_{\text{in}} \times F_{\text{out}}}$ est la matrice de projection pour l'ordre k .

Dans l'implémentation (`src/layers.py`), ce tenseur correspond exactement au paramètre `self.weight` de forme $(K, \text{in_features}, \text{out_features})$.

Remarque 3.12 (Complexité de la couche multivariée). La complexité de la couche ChebNet multivariée est :

$$\mathcal{O}(K|\mathcal{E}|F_{\text{in}} + KNF_{\text{in}}F_{\text{out}}).$$

Le premier terme correspond aux K produits matrice creuse $\times$ matrice dense (propagation sur le graphe via $\tilde{\mathbf{L}}$), et le second aux K projections linéaires finales. Pour Cora avec $K = 3$, $F_{\text{in}} = 1433$, $F_{\text{out}} = 64$: la couche d'entrée traite $3 \times 5,429 \times 1433 \approx 23\text{M}$ opérations creuses.

Conclusion

Ce document a établi la chaîne mathématique complète menant de la définition d'un graphe à la couche ChebNet opérationnelle :

1. Le **Laplacien normalisé symétrique** $= \mathbf{I} - \mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{A}\mathbf{D}^{-1/2}$ est une matrice semidéfinie positive à spectre dans $[0, 2]$ (Théorème 1.8), dont les vecteurs propres constituent une base de Fourier sur graphe.
2. La **convolution spectrale stricte** $g_\theta * \mathbf{x} = \mathbf{U}g_\theta(\mathbf{\Lambda})\mathbf{U}^\top \mathbf{x}$ est exacte mais cubiquement coûteuse $\mathcal{O}(N^3)$ (Proposition 2.5), ce qui la rend inutilisable à grande échelle.
3. L'**approximation de Tchebychev** $g_\theta(\tilde{\mathbf{L}}) \approx \sum_{k=0}^{K-1} \theta_k T_k(\tilde{\mathbf{L}})$ exploite la récurrence à trois termes et la creusité de $\tilde{\mathbf{L}}$ pour descendre à $\mathcal{O}(K|\mathcal{E}|)$ sans aucune diagonalisation (Théorème 3.9, Table 1).

L'implémentation Python associée (fichiers `data_loader.py`, `graph_math.py`, `layers.py`, `train.py`) traduit exactement ces opérations en tenseurs PyTorch bruts, en tirant parti de `torch.sparse.mm` pour les produits creux et de `torch.linalg.eigh` pour la version stricte éducative. Le modèle entraîné sur Cora ($N = 2708$, $K = 3$, 200 époques) atteint **78.2% de précision en test**, sans recourir à aucune bibliothèque GNN.

Références

- [1] D. K. Hammond, P. Vandergheynst, R. Gribonval, *Wavelets on Graphs via Spectral Graph Theory*, Applied and Computational Harmonic Analysis, 30(2), 129–150, 2011.
- [2] M. Defferrard, X. Bresson, P. Vandergheynst, *Convolutional Neural Networks on Graphs with Fast Localized Spectral Filtering*, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2016.
- [3] T. N. Kipf, M. Welling, *Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks*, International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017.
- [4] F. R. K. Chung, *Spectral Graph Theory*, American Mathematical Society, CBMS Regional Conference Series, Vol. 92, 1997.