ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ УРАЛА

СОЛОВЬЁВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БИОЛОГИИ ГАПОУ СО «БМТ»
П. БЕЛОЯРСКИЙ
2019

Одной из основ безопасности жизнедеятельности является знание источников риска, одним из которых являются ядовитые растения, окружающие человека.

Ядовитые растения, вырабатывающие и накапливающие в процессе жизнедеятельности яды, вызывают отравления животных и человека, но многие растительные яды в небольших дозах являются ценными лечебными средствами.

Борщевик Сосновского - *(Heracleum sosnowskyi).*

Двулетнее или многолетнее монокарпическое растение. Стебель прямой, округлый, бороздчатый, негусто опушённый. Освоил места обитания Среднего и Южного Урала. *Цветёт с июня по август, плодоносит с июля по сентябрь.* ***Очень ядовит.***

При контакте кожи с соком борщевика и под воздействием ультрафиолетового излучения они вызывают глубокие ожоги. Захватил уже огромные территории. В наших районах можно встретить на дороге из Билимбая в Новоуральск, в районе Тарасково, вдоль трассы от Первоуральска до Екатеринбурга, за Решетинским мостом, есть и в Заречном.

Ландыш(*лат. Convallária majális*) .

Весенний красавец, ландыш, очень ядовит, но особенно красно-оранжевые ягоды, появляющиеся на его стеблях к концу лета. Съеденные ягоды вызывают тяжелое отравление, тошноту, головокружение, пульс становится редким, пострадавший жалуется на головную боль и шум в ушах, выступает холодный пот, судороги.

Но препараты из ландыша в определенных дозах лечат сердечно-сосудистую систему.

ДАФНА *(DAPHNE)* - ВОЛЧЬЯ ЯГОДА, ВОЛЧЬЕ ЛЫКО, ВОЛЧНИК.

Опасное растение. В его ягодах, листьях и коре содержатся сильные яды. Пять-шесть ягод могут быть смертельны для человека, а 30 граммов листьев отравляют лошадь.

Ягоды входят в состав лекарственных средств для поддержки иммунной системы, для лечения почек, печени, нервной системы. А настойка из ягод – прекрасный инсектицид. Кора волчьей ягоды выводит токсины, лечит суставы, сердце, сосуды.

В России волчье лыко относят к исчезающим растениям, поэтому оно занесено в Красную книгу.

Вороний глаз *(лат. Páris)* или четырехлистник.

Многолетнее травянистое растение из семейства линейных, с ползучим корневищем, прямостоячим стеблем.

Цветет в июне-июле. Растет в тенистых лиственных, смешаных и таежных лесах, на влажной почве.

Для лечебных целей берут свежее растение.

Спиртовую 10% настойку в виде капель применяют при головной боли, мигрени, сонливости, бронхите, психическом расстройстве, нервном подергивании лица.

Отвары растения принимают при болях, усиленном сердцебиении, расстройстве слуха, глазных болезнях.

Все растение **ядовито.**

Белена черная ***(лат. Hyoscýamus níger)*** – это сорняк, встречающийся преимущество вблизи жилья, на улицах, свалках и пустырях, а также на лугах.

Цветет с июня по август .

Произрастает на Среднем и Южном Урале, встречается часто как сорное растение.

Отличительные черты белены: листья крупные, с большими зубцами, серовато-зеленые. Крупные цветки собраны в виде грязновато-желтого оттенка. **Ядовито все растение**, но **особую опасность представляют семена**, похожие на маковые зерна, находящиеся в семенных коробочках. Если их пожевать, во рту появляется освежающий, сладко-горьковатый вкус. Употребление всего лишь 15-20 семян белены приводят к отравлению организма. Первые признаки отравления проявляются через 30-60 минут.

В медицине из листьев изготовляются различные масла, для наружного употребления, в качестве средства спазмолитического и болеутоляющего, при ревматизме, невралгии, подагре.

Лютики *(лат. Ranunculus sceleratus).*

Чаще встречаются лютик ядовитый, лютик едкий (куриная слепота), лютик жгучий и лютик ползучий (лютый цвет).

Лютик ядовитый – травянистое растение, сок этих лютиков едкий и жгучий.

Свежайшую траву лютик (Ranunculus acris), используют только для наружного применения, в основном из растения варят отвары для примочек, компрессов и обмывания.

ЧИСТОТЕ́Л, ИЛИ БОРОДА́ВНИК *(ЛАТ. CHELIDÓNIUM)* ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАНОК, ПОРЕЗОВ, БОРОДАВОК.

Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м. При надрезе выделяет желтый млечный сок. Цветет в июне — июле. Растет на каменистых склонах, лесных опушках и как сорное в огородах и мусорных местах вблизи жилья.

Это растение ядовито. Используют надземные части растения — траву, которую собирают во время цветения, срезая ножом. Если использовать чистотел неправильно или в больших дозах, им можно очень тяжело отравиться.

Препараты чистотела обладают спазмолитическими, желчегонными и противовоспалительными свойствами.

БУЗИНА КИСТИСТАЯ, ВОНЮЧАЯ, ИЛИ КРАСНАЯ *(S. RACEMOSA L.).*

Представляет собой кустарник, достигающий высоты 3,5 м, с прямостоячими стеблями. Цветет в середине весны. Чаще встречается в диком виде в оврагах и на лесных опушках, в парках.

Ядовиты ягоды, особенно незрелые.

В народной медицине красная бузина применяется достаточно широко. ***Препараты на ее основе обладают такими свойствами:***

- ***противовоспалительное;***
- ***слабительное;***
- ***потогонное;***
- ***обезболивающее;***
- ***мочегонное и др.***

Вех ядовитый, или болиголов пятнистый *(лат. Conium maculatum).*

Его *сок* может вызвать смерть, так как находящиеся в нем вещества *вызывают паралич двигательных нервов*. Особенно *ядовиты семена – мелкие, серые, шаровидные плоды.* Неосведомленные люди могут спутать болиголов с дягилем, лесным дудником, тмином и другими съедобными растениями, обладающими полым стеблем. *Цветение наступает на втором году, обычно в середине июля. Плоды завязываются не раньше августа.*

• У нас встречается на Среднем и Южном Урале у дорог, на свалках, по берегам рек, на опушках, пустырях, огородах и т.д.

Лечение ядовитым вехом чрезвычайно опасно.

В народной медицине экспериментально выявлено, что вех ядовитый в нетоксичных дозах способен понижать кровяное давление и незначительно увеличивать мочеотделение. **Препараты растения обладают болеутоляющим, успокаивающим, противосудорожным действием, болеутоляющее средство при хорее, эпилепсии, коклюше, мигрени, а наружно – при подагре, ревматизме и в качестве обволакивающего средства при роже, волчанке.**

БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ

Вечнозеленый кустарник из семейства вересковых, высотой 1 м. Распространен от Южного до Полярного Урала (исключая высокогорья),севернее Полярного круга произрастает в лесотундровых редколесьях и на болотах. Встречается на сфагновых болотах, торфяниках, в заболоченных хвойных лесах. **Вид внесен в Красную книгу Республики Башкортостан.** *Цветет с мая по июль.*

С лечебной целью применяю верхушки веток с листьями.

Применяют в виде отваров и настоя при туберкулезе легких, кашле, астме, коклюше, бронхите, а также при лечении экземы, подагры, золотухи, хронического ревматизма, неврастении.

Все растение ядовито.

АДОНИС ВЕСЕННИЙ

Многолетнее травянистое растение из семейства лютиковых с толстым коротким корневищем и несколькими стеблями, достигающими 30-50 см высоты. Растет адонис по сухим открытым склонам, лесным опушкам. Распространен в лесостепных районах Урала.

Настои травы применяются при сердечной недостаточности, повышенной нервной возбудимости, водянке в качестве мочегонного средства. Отвар корневищ пьют при воспалении легких. **Растение *ядовито*.**

АКОНИТ ВЫСОКИЙ (БОРЕЦ ВЫСОКИЙ)

Аконит высокий – многолетнее травянистое растение высотой 70–200 см. Листья крупные, плотные, кожистые, сердцевидные или почковидно-округлый. Растет во влажных тенистых (хвойных и смешанных) лесах Урала. Ядовиты все части растения – от корней до пыльцы, ядовит даже запах.

Настойки аконита в официальной медицине применяются только наружно, при радикулитах, невралгии, подагре и ревматизме как обезболивающее средство.

ВЬЮНОК ПОЛЕВОЙ

Многолетнее травянистое растение семейства вьюнковых, длиной 1—1,5 м. Стебли вьюнка многочисленные, тонкие, вьющиеся, скрученные спиралью, оплетают соседние растения, цветки белые или розовые, на длинных цветоносах, воронковидной формы.

***Цветет полевой вьюнок с апреля по октябрь*.**

На Урале Вьюнок встречается повсеместно на лугах, у дорог, как сорняк на огородах. Вьюнок это ядовитое растение.

Лекарственным сырьем во вьюнке, служат стебли и корни, реже цветки и семена.

В народной медицине траву с цветами, или одни цветы, употребляют как заживляющее средство. Корневище с корнями употребляют иногда как послабляющее средство. В выжатом из цветов и травы соке намачивают тряпочки и прикладывают на раны, используется при гипертонической болезни, бронхиальной астме, бронхите, бессоннице, простуде, заболеваниях печени, селезенки, легких, отеках различного происхождения, кровотечениях.

ПИЖМА ОБЫКНОВЕННАЯ

Многолетнее растение из семейства сложноцветных, высотой 50-150 см, с сильным запахом. Стебли крепкие, бородавчатые, слегка пушистые. *Цветет в июле-августе.*

Спиртовой экстракт пижмы является хорошим желчегонным, болеутоляющим, повышающим аппетит и улучшающим пищеварение препаратом.

В народной медицине Сибири пижма применяется при язве желудка, поносах, энтероколитах, ахилии, ревматизме, подагре, водянке, желтухе, трахоме, головной боли, пониженном кровяном давлении, эпилепсии и как средство, регулирующее менструальный цикл.

Однако применение пижмы требует осторожности, так как растение ядовито.

ПАПОРОТНИК МУЖСКОЙ

Щитовник мужской является многолетним травянистым споровым растением, не имеющим ни цветков, ни стебля и достигающим 1 метра в высоту. Корневище, являющееся лекарственным сырьем.

На Урале довольно обычен в пределах лесной зоны от Северного до Среднего Урала, на Южном Урале в лесостепной и степной зоне встречается редко.Произрастает в хвойных, смешанных лесах, по окраинам верховых болот, берегам лесных ручьев, в горных редколесьях. Вид внесен в Красные книги Республики Коми, Тюменской и Курганской областей, ХМАО.

Но с этим растением следует быть крайне осторожным, так как оно **ядовито.**

А полезными свойствами обладает лишь корневище, которое обычно выкапывают до появления листьев. Корень папоротника поможет при:

- ***судорогах; болях; ревматизме; венерических заболеваниях; ранах и язвах.***

Препараты на его основе эффективное средство от глистов.

ЧЕМЕРИЦА ЛОБЕЛЯ.

Все чемерицы – корневищные многолетники, обладающие облиственными стеблями, высокими и прямыми, порой имеющими в основании луковицеобразное утолщение.

Растение ядовито.

В современной медицине настойка чемерицы и чемеричная вода применяются только наружно, как противопаразитный препарат(способна справиться с педикулезом и чесоткой) , мазь с чемерицей и спиртовая настойка растения применяется для борьбы с болями невралгического, ревматического характера.

ВОРОНЕЦ КОЛОСИСТЫЙ

В самом начале лета, на рубеже мая – июня по осветленным елово-мелколиственным лесам, в березняках и осинниках, в смешанных лесах зацветает воронец колосистый.

Ядовитое растение.

У него ядовиты стебель, листья, корневище. Свежий сок может вызвать ожог кожи, даже язвочки на ней. Но наиболее ядовиты именно ягоды. Яды их действуют на нервную систему оглушающе, отравившийся находится в заторможенном состоянии.

Официально лекарственным растением воронец колосистый не признан.

КУБЫШКА ЖЕЛТАЯ

Многолетнее водное корневищное растение с глубоко сердцевидными плавающими кожистыми листьями и желтыми цветками на длинных цветоножках. Имеет лекарственное значение, обладает антисептическими, противовоспалительными, антибактериальными и другими лечебными качествами.

На Урале встречается от Южного до Северного Урала. Занесена в Красные книги Свердловской области и ЯНАО.

Ядовитое растение.

БАРАНЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ (HUPERZIA SELAGO L.)

Хамефит, вечнозеленый ползучий кустарничковидный плаун высотой 5–25 см сслаборазвитыми корнями; стебли прямостоячие, у основания восходящие, дихотомически разветвленные; листья многорядные, шириной около 1 мм.

Спороношение происходит в апреле-июне.

На Урале баранец распространен в пределах лесной зоны и в горных тундрах. На Южном Урале в пределах Челябинской области и Башкортостана баранец отме- чен в горно-тундровом поясе на вершинах гор. В лесной зоне произрастает в темнохвойных лесах и на окраинах болот.

Трава баранца обыкновенного обладает рвотным, мочегонным, слабительным, абортивным свойствами. Отвар травы применяют для лечения хронического алкоголизма, никотиновой зависимости и псориаза.

Очень токсичен.

ДУРМАН ВОНЮЧИЙ, ИЛИ ОБЫКНОВЕННЫ (DATURA STRAMONIUM L.)

Однолетнее растение с неприятным запахом. Стебель прямостоячий, голый, в верхней половине вильчато-ветвистый высотой 40–100 см.

На Урале встречается преимущественно в южных районах, в степной, лесостепной зонах и в южной части лесной зоны как редкое заносное растение. Сорное растение, поселяющееся на мусорных местах, пустырях, окраинах полей, в огородах, вдоль дорог.

Ядовитое растение, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности: не касаться руками глаз, губ, носа, тщательно мыть руки.

Обладает бронхорасширяющим , уменьшает или купирует спазмы гладкой мускулатуры кишечника, желче- и мочевыводящих путей, бронхов.

Дурманное масло используют наружно для растираний при ревматизме, невралгиях.