

Neutralização

Gabriel Braun

Colégio e Curso Pensi, Coordenação de Química



Sumário

[FALAR DE ÁCIDOS QUE SE DECOMPÕE EM GASES: H_2CO_3 , H_2SO_3 , $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$]


1 Os ácidos e as bases

Os primeiros químicos aplicavam o termo *ácido* a substâncias que tinham sabor azedo acentuado. O vinagre, por exemplo, contém ácido acético, CH_3COOH . As soluções em água das substâncias que eram chamadas de *bases* ou *álcalis* eram reconhecidas pelo gosto de sabão. Felizmente, existem maneiras menos perigosas de reconhecer ácidos e bases. Os ácidos e as bases, por exemplo, mudam a cor de certos corantes conhecidos como indicadores. Um dos indicadores mais conhecidos é o tornassol, um corante vegetal obtido de um líquen. Soluções de ácidos em água deixam o tornassol vermelho, e as soluções de bases em água o deixam azul. Um instrumento eletrônico conhecido como *medidor de pH* permite identificar rapidamente uma solução como ácida ou básica:

- Uma leitura de pH abaixo de 7 ($\text{pH} < 7$) é característica de uma **solução ácida**.
- Uma leitura acima de 7 ($\text{pH} > 7$) é característica de uma **solução básica**.

1.1 Os ácidos e as bases em solução em água

Os químicos debateram os conceitos de acidez e basicidade por muitos anos antes que definições precisas aparecessem. Dentre as primeiras definições úteis estava a que foi proposta pelo químico sueco Svante Arrhenius, por volta de 1884. Ele definiu um *ácido* como um composto que contém hidrogênio e reage com a água para formar íons hidrogênio. Uma base foi definida como um composto que gera íons hidróxido em água. Os compostos que atendem a estas definições são chamados de **ácidos e bases de Arrhenius**. O HCl , por exemplo, é um ácido de Arrhenius, porque libera um íon hidrogênio, H^+ (um próton), quando se dissolve em água. O CH_4 não é um ácido de Arrhenius, porque não libera íons hidrogênio em água. O hidróxido de sódio é uma base de Arrhenius, porque íons OH^- passam para a solução quando ele se dissolve. A amônia também é uma base de Arrhenius, porque produz íons OH^- por reação com a água:



O metal sódio produz íons OH^- quando reage com a água, mas não é considerado uma base de Arrhenius, porque é um elemento, e não um composto, como requer a definição.


O problema com as definições de Arrhenius é que se referem a um solvente particular, a água. Quando os químicos estudaram solventes diferentes da água, como a amônia líquida, encontraram algumas substâncias que mostraram o mesmo padrão de comportamento ácido-base. Um avanço importante no entendimento do conceito de ácidos e bases aconteceu em 1923, quando dois químicos trabalhando independentemente, Thomas Lowry, na

Inglaterra, e Johannes Brønsted, na Dinamarca, tiveram a mesma ideia. Sua contribuição foi compreender que o processo fundamental, responsável pelas propriedades de ácidos e bases, era a transferência de um próton (um íon hidrogênio) de uma substância para outra. A **definição de Brønsted-Lowry** para ácidos e bases é a seguinte:

- Um **ácido** é um doador de prótons.
- Uma **base** é um aceitador de prótons.

Essas substâncias são chamadas de *ácidos e bases de Brønsted* ou, simplesmente, *ácidos e bases*, porque a definição de Brønsted-Lowry é comumente aceita hoje em dia e é a que usaremos neste curso.

Quando uma molécula de um ácido se dissolve em água, ela transfere um íon hidrogênio, H^+ , para uma molécula de água e forma um íon hidrônio, H_3O^+ . Assim, quando o cloreto de hidrogênio, HCl , se dissolve em água, libera um íon hidrogênio, e a solução resultante contém íons hidrônio e íons cloreto:



Note que, como H_2O aceita o íon hidrogênio para formar H_3O^+ , a água está agindo como uma base de Brønsted.

Como identificar um ácido a partir de sua fórmula? Um ácido de Brønsted contém um átomo de hidrogênio ácido, que pode ser liberado como próton. Um átomo de hidrogênio ácido muitas vezes é escrito como o primeiro elemento na fórmula molecular dos ácidos

Atenção No sistema de Arrhenius, o hidróxido de sódio é uma base. Do ponto de vista de Brønsted, porém, ele apenas fornece uma base, OH^- . Os químicos muitas vezes voltam-se para a definição de Arrhenius, menos geral.

1.2 Os ácidos e bases fortes e fracos

1.3 A neutralização

2 A análise volumétrica

Uma das técnicas de laboratório mais comuns de determinação da concentração de um soluto é a **titulação**. As titulações normalmente são **titulações ácido-base**, nas quais um ácido reage com uma base. As titulações são muito usadas no controle da pureza da água, na determinação da composição do sangue e no controle de qualidade das indústrias de alimentos.

Em uma titulação, uma solução é adicionada gradativamente a outra, até a reação se completar. Um volume conhecido da solução a ser analisada, que é chamada de analito, é transferido para um frasco. Então, uma solução de concentração conhecida de reagente é vertida no frasco por uma bureta até que todo o analito tenha reagido. A solução contida na bureta é chamada


de titulante, e a diferença das leituras dos volumes inicial e final na bureta dá o volume de titulante utilizado. A determinação da concentração ou

Problemas

Nível I

3F01

O seguinte mecanismo foi proposto para a reação entre o óxido nítrico e o bromo:




Assinale a alternativa com a lei de velocidade para essa reação.

- ☐ $v = k[\text{NO}]$
- ☐ $v = k[\text{Br}_2]$
- ☐ $v = k[\text{NO}]^2$
- ☐ $v = k[\text{NO}][\text{Br}_2]$
- ☐ $v = k[\text{NO}][\text{NOBr}_2]$

3F02

O seguinte mecanismo foi proposto.



Assinale a alternativa *incorreta*.

- ☐ A reação global é $\text{C}^+ + 2\text{A}^{4+} \longrightarrow \text{C}^{3+} + 2\text{A}^{3+}$.
- ☐ O cátion B^{2+} é catalisador da reação.
- ☐ Os cátions B^{3+} e B^{4+} são intermediários da reação.
- ☐ A lei de velocidade é $v = k[\text{C}^+][\text{A}^{4+}]$.
- ☐ A reação possui cinética de segunda ordem.

3F03

Considere as proposições.

1. No equilíbrio, as constantes de velocidade das reações direta e inversa são iguais.
2. A constante de equilíbrio de uma reação é igual à constante de velocidade da reação direta dividida pela constante de velocidade da reação inversa.
3. Em uma reação que é uma série de etapas de equilíbrio, a constante de equilíbrio total é igual ao produto de todas as constantes de velocidade das reações diretas dividido pelo produto de todas as constantes de velocidade das reações inversas.


4. O aumento da concentração de um produto aumenta a velocidade da reação inversa e, por isso, a velocidade da reação direta também tem de aumentar.

Assinale a alternativa que relaciona as proposições *corretas*.

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 2 e 3
- ☐ 1, 2 e 3
- ☐ 2, 3 e 4

3F05

O seguinte mecanismo foi proposto para a reação entre o óxido nítrico e o oxigênio:




Assinale a alternativa com a lei de velocidade para essa reação.

- ☐ $v = k_1[\text{NO}]$
- ☐ $v = \frac{k_1}{k_2}[\text{O}_2]$
- ☐ $v = k_1[\text{NO}]^2$
- ☐ $v = \frac{k_1 k_2}{k'_1}[\text{O}_2][\text{NO}]$
- ☐ $v = \frac{k_1 k_2}{k'_1}[\text{O}_2][\text{NO}]^2$

3F06

O seguinte mecanismo foi proposto para a reação de decomposição do ozônio:




Assinale a alternativa com a lei de velocidade para essa reação.

- ☐ $v = k_1[\text{O}_3]$
- ☐ $v = \frac{k_1}{k_2}[\text{O}_2]$
- ☐ $v = k_1[\text{O}_3]^2$
- ☐ $v = \frac{k_1 k_2}{k'_1} \frac{[\text{O}_3]}{[\text{O}_2]}$
- ☐ $v = \frac{k_1 k_2}{k'_1} \frac{[\text{O}_3]^2}{[\text{O}_2]}$

3F07

O seguinte mecanismo foi proposto para a reação de decomposição do ozônio:




Assinale a alternativa com a lei de velocidade de formação do HIO.

- ☐ $v = k_1[\text{ClO}^-][\text{H}_2\text{O}]$
- ☐ $v = \frac{k_1}{k_2}[\text{ClO}^-][\text{I}^-]$
- ☐ $v = \frac{k_1 k_2}{k_1'}[\text{ClO}^-][\text{I}^-]$
- ☐ $v = \frac{k_1 k_2}{k_1'} \frac{[\text{I}^-][\text{ClO}^-]}{[\text{OH}^-]}$
- ☐ $v = \frac{k_1 k_2}{k_1'} \frac{[\text{I}^-][\text{ClO}^-][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{OH}^-]}$

3F08

O seguinte mecanismo foi proposto para a reação de decomposição do ozônio:




Assinale a alternativa com a lei de velocidade de formação do Fe^{3+} .

- ☐ $v = 2k_1[\text{Fe}^{2+}]^2[\text{Pb}^{4+}]$
- ☐ $v = \frac{2k_1 k_2}{k_1'} \frac{[\text{Fe}^{2+}]^2[\text{Pb}^{4+}]}{[\text{Fe}^{3+}]}$
- ☐ $v = \frac{2k_1 k_2 [\text{Fe}^{2+}]^2 [\text{Pb}^{4+}]}{k_1' [\text{Fe}^{3+}] + k_2 [\text{Fe}^{2+}]}$
- ☐ $v = \frac{2k_1 k_2 [\text{Fe}^{2+}] [\text{Pb}^{4+}]^2}{k_1' [\text{Fe}^{3+}] + k_2 [\text{Fe}^{2+}]}$
- ☐ $v = \frac{2k_1 k_2 [\text{Fe}^{2+}]^2 [\text{Pb}^{4+}]}{k_2 [\text{Fe}^{3+}] + k_1' [\text{Fe}^{2+}]}$

3F09

O seguinte mecanismo foi proposto para a reação de dicianometano com bromo molecular:




Assinale a alternativa com a lei de velocidade da reação.

- ☐ $v = k_1[\text{CH}_2(\text{CN})_2]$
- ☐ $v = \frac{k_1 k_2}{k_1'} \frac{[\text{CH}_2(\text{CN})_2][\text{Br}_2]}{[\text{H}^+]}$
- ☐ $v = \frac{k_1 k_2 [\text{CH}_2(\text{CN})_2][\text{Br}_2]}{k_2 [\text{Br}_2] + k_1' [\text{H}^+]}$
- ☐ $v = \frac{k_1 k_2 [\text{CH}_2(\text{CN})_2]^2 [\text{Br}_2]}{k_2 [\text{Br}_2] + k_1' [\text{H}^+]}$
- ☐ $v = \frac{k_1 k_2 [\text{CH}_2(\text{CN})_2][\text{Br}_2]}{k_1' [\text{Br}_2] + k_2 [\text{H}^+]}$

3F10

Considere a reação de decomposição da nitramida em solução aquosa:




Essa reação possui lei de velocidade:


$$v = k \frac{[\text{NH}_2\text{NO}_2]}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

Três mecanismos foram propostos para a reação de decomposição da nitramida em solução aquosa.


Mecanismo 1



Mecanismo 2



Mecanismo 3




Assinale a alternativa que relaciona os mecanismos compatíveis com a lei de velocidade experimental.

- ☐ 1, apenas.
- ☐ 2, apenas.
- ☐ 3, apenas.
- ☐ 1 e 2, apenas.
- ☐ 1 e 3, apenas.

3F11

Considere a reação de oxidação do óxido nítrico:




Essa reação possui lei de velocidade:


$v = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$

Três mecanismos foram propostos para a reação de decomposição da nitramida em solução aquosa.


Mecanismo 1



Mecanismo 2



Mecanismo 3



Assinale a alternativa que relaciona os mecanismos compatíveis com a lei de velocidade experimental.

- ☐ 1, apenas.
- ☐ 2, apenas.
- ☐ 3, apenas.
- ☐ 1 e 2, apenas.
- ☐ 1 e 3, apenas.

3F14

Computadores químicos são sistemas desenvolvidos para resolver diversos problemas de ciência e engenharia, por reações químicas. Um exemplo de aplicação desses computadores é o desenvolvimento de circuitos de controle molecular e procedimentos terapêuticos inteligentes utilizando um conjunto de velocidades de reações químicas como linguagem de programação para controlar a síntese de DNA.

Assinale a alternativa com o conceito que melhor descreve o princípio de funcionamento do computador químico exemplificado.

- ☐ Primeira lei da termodinâmica
- ☐ Mecanismos reacionais
- ☐ Entalpia de formação
- ☐ Princípio de Le Chatelier
- ☐ Energia de ativação





FIGURA 1 concentração por tempo

Nível II

3F15

Uma amostra contendo inicialmente apenas a espécie A sofre uma seqüência de reações,



A reação é realizada sob temperatura constante em um reator de volume fixo.

Assinale a alternativa *incorreta*.

- ☐ O tempo de meia-vida para o consumo de A é 30 min.
- ☐ A constante de velocidade para a transformação de A em B é 0,023min⁻¹.
- ☐ A velocidade de formação de C é a mesma que a de decomposição de B.
- ☐ A constante k₁ é menor que a constante k₂.
- ☐ O valor máximo para a fração molar de B é atingido quando sua velocidade de formação é igual à velocidade de formação de C.

3F17

Considere a reação de oxidação do óxido nítrico:





Os resultados a seguir foram obtidos no estudo da cinética dessa reação:




() #	P _{H₂} /Torr	P _{NO} /Torr	v _{N₂} /(Torr s ⁻¹)
() 1	289	400	1,60
2	147	400	0,77
3	400	300	1,03
4	400	152	0,25
()			

Dois mecanismos foram propostos para a reação de decomposição da nitramida em solução aquosa.

Mecanismo 1



Mecanismo 2






a. **Determine** a lei de velocidade experimental para a reação.

b. **Determine** qual dos mecanismos é mais plausível.

3F19




O seguinte mecanismo foi proposto para a reação de substituição entre 2-metilpropan-2-ol, ROH e cloreto formando 2-cloro-2-metilpropano RCl.



Determine a lei de velocidade para essa reação.

3F20




O seguinte mecanismo foi proposto para a reação entre gás cloro e ozônio.



Determine a lei de velocidade para essa reação.

3F21




O seguinte mecanismo foi proposto para a reação entre gás hidrogênio e bromo.



Determine a lei de velocidade para essa reação.

3F22

O mecanismo de Rice-Herzfeld para a decomposição térmica do acetaldeído é:






a. **Determine** a lei de velocidade para essa reação.

b. **Determine** a energia de ativação efetiva dessa reação.

3F26

Em fase gasosa uma reação ocorre conforme o seguinte mecanismo a 300 K:



A energia de ativação para a formação de **C** é 10 kJ mol^{-1} maior que a energia de ativação para a formação de **B** e que a energia de ativação para a formação de **A** é 10 kJ mol^{-1} menor que a energia de ativação para a formação de **B**. Em um experimento, as pressões de **A**, **B** e **C** são 50 kPa, 80 kPa e 8 kPa, respectivamente. Após o equilíbrio ser atingido o sistema é aquecido até 400 K.

a. **Determine** a composição do equilíbrio a 300 K.

b. **Determine** a composição do equilíbrio a 400 K.

3F27

A reação de isomerização do cis-but-2-eno formando trans-but-2-eno, mais estável por 4 kJ mol^{-1} , ocorre em fase gasosa em uma única etapa com energia de ativação de 264 kJ mol^{-1} . O mecanismo proposto para a reação catalisada é baseado em cinco etapas:

1. Dissociação do iodo molecular.
2. Um dos átomos de iodo é adicionado a um dos átomos de carbono com ligação dupla. O sistema molecular formado encontra-se a 118 kJ mol^{-1} acima dos reagentes.
3. Uma das extremidades da molécula sofre torção livre em relação à outra extremidade. A energia do sistema molecular após a torção continua a 118 kJ mol^{-1} acima dos reagentes.
4. O átomo de iodo ligado ao carbono dissocia-se do sistema molecular intermediário e a ligação dupla é formada novamente no isômero trans. Esse processo libera 47 kJ mol^{-1} de energia.
5. Formação do iodo molecular, liberando 75 kJ mol^{-1} de energia.

Baseado nessas informações:

a. **Apresente** as reações químicas que ocorrem em cada etapa da reação catalisada para formar a reação global.

b. **Esboce** os perfis de energia para a reação de isomerização com e sem a presença de catalisador.

c. **Apresente** a lei de velocidade para a reação catalisada.

Gabarito

Nível I

1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐
6. ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9. ☐ 10. ☐
11. ☐

Nível II

1. ☐
2. a. $v = k[\text{H}_2]^2[\text{NO}]$
b. Percebe-se com base na molecularidade das etapas elementares que o mecanismo 2 é mais plausível, visto que todas as etapas desse mecanismo são bimoleculares. A primeira etapa do mecanismo 1 supõe uma colisão termolecular, tornando essa proposta menos provável.
3. $v = \frac{k_a[\text{ROH}][\text{H}_3\text{O}^+][\text{I}^-]}{k_b[\text{ROH}] + k_c[\text{I}^-]}$
4. $v = 2k_2[\text{O}_3]\sqrt{\frac{k_1[\text{Cl}_2]}{k_4}}$
5. $v = \frac{k_a[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2] + k_b[\text{HBr}]}$
6. a. $v = k_2\sqrt{\frac{k_1}{k_4}}[\text{CH}_3\text{CHO}]^{3/2}$
b. 200 kJ mol^{-1}
7. a. $P_A = 27 \text{ kPa}$, $P_B = 81 \text{ kPa}$, $P_C = 30 \text{ kPa}$
b. $P_A = 36 \text{ kPa}$, $P_B = 40 \text{ kPa}$, $P_C = 108 \text{ kPa}$
8. -