

Teoria Quântica

Gabriel Braun

Colégio e Curso Pensi, Coordenação de Química



Nível I

PROBLEMA 1

1A01

Assinale a alternativa que mais se aproxima da energia liberada por 5 g de sódio em uma lâmpada que produz luz amarela com comprimento de onda 590 nm.

- A** 100 kJ **B** 200 kJ **C** 300 kJ
D 400 kJ **E** 500 kJ

PROBLEMA 2

1A02

Assinale a alternativa que mais se aproxima do número de fótons emitidos por uma lâmpada de 40 W que produz luz azul com comprimento de onda 470 nm.

- A** 7×10^{15} **B** 7×10^{16} **C** 7×10^{17}
D 7×10^{18} **E** 7×10^{19}

PROBLEMA 3

1A03

A exposição de uma amostra de iodo gasoso à luz com comprimentos de onda inferiores a 500 nm leva a formação de iodo atômico.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da entalpia de ligação I—I.

- A** 120 kJ mol^{-1} **B** 160 kJ mol^{-1} **C** 200 kJ mol^{-1}
D 240 kJ mol^{-1} **E** 280 kJ mol^{-1}

PROBLEMA 4

1A04

A mensuração da eficiência quântica da fotossíntese em plantas revelou que 8 quanta de luz vermelha a 685 nm são necessários para liberar uma molécula de oxigênio. A quantidade média de energia armazenada no processo fotoquímico é 469 kJ por mol de oxigênio liberado.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da eficiência da fotossíntese.

- A** 10% **B** 30% **C** 50%
D 70% **E** 90%

PROBLEMA 5

1A05

Assinale a alternativa correta.

- A** A intensidade total da radiação emitida por um corpo negro é diretamente proporcional à temperatura.
B O comprimento de onda emitido com maior intensidade por um corpo negro aumenta com o aumento da temperatura.
C Fótons de ondas de rádio são mais energéticos que fótons de radiação ultravioleta.
D Fótons radiação infravermelha são menos energéticos que fótons de radiação ultravioleta.
E A energia de um fóton é diretamente proporcional ao comprimento de onda da radiação.

PROBLEMA 6

1A06

Cinco amostras idênticas de um mesmo metal são aquecidas a diferentes temperaturas até a incandescência.

Assinale a alternativa com a cor da amostra submetida a uma maior temperatura.

- A** Vermelho **B** Laranja **C** Amarelo
D Verde **E** Branco

PROBLEMA 7
1A07

Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda correspondente à emissão de maior intensidade de uma amostra de ferro em fusão, λ/nm .


- A** 130 **B** 260 **C** 390
D 520 **E** 650

Dados

- $T_{\text{fus}}(\text{Fe}) = 1540^\circ\text{C}$

PROBLEMA 8
1A08

Considere o espectro de emissão da radiação solar, a seguir.




Assinale a alternativa que mais se aproxima da temperatura do sol, T_{sol}/kK .

- A** 3 **B** 4 **C** 5
D 6 **E** 7

PROBLEMA 9
1A09

Considere o espectro de emissão da radiação de três estrelas, A, B e C, a seguir.



Assinale a alternativa que relaciona as estrelas em ordem crescente de temperatura.

- A** A, B, C **B** A, C, B **C** B, A, C
D C, A, B **E** C, B, A

PROBLEMA 10
1A10

Uma placa é feita de um metal, cuja função trabalho é menor que a energia dos fótons da luz visível, é exposta ao sol.

Assinale a alternativa *correta*.

- A** Os elétrons não são ejetados instantaneamente, já que precisam de um tempo mínimo para acúmulo de energia.
B Os elétrons podem ser ejetados instantaneamente com uma mesma energia cinética para qualquer elétron.
C Os elétrons não podem ser ejetados já que a placa metálica apenas reflete a radiação.
D Os elétrons podem ser ejetados instantaneamente, com energia que depende da frequência da radiação absorvida e da energia do elétron no metal.
E Os elétrons não podem ser ejetados instantaneamente e a energia cinética após a ejeção depende da frequência da radiação absorvida e da energia do elétron no metal.

PROBLEMA 11

1A11

A superfície de uma amostra de potássio é irradiada, emitindo elétrons a 668 km s^{-1} . **Assinale** a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda da radiação incidente, nm.

- A 300 B 350 C 400
D 450 E 500

Dados

- $\Phi(\text{K}) = 2,20 \text{ eV}$

PROBLEMA 12

1A12

Assinale a alternativa que mais se aproxima da energia cinética máxima para os elétrons emitidos quando luz de comprimento de onda 140 nm atinge a superfície do zinco, J.

- A $1,40 \times 10^{-19}$ B $8,40 \times 10^{-19}$ C $1,40 \times 10^{-18}$
D $8,40 \times 10^{-18}$ E $1,40 \times 10^{-17}$

PROBLEMA 13

1A13

A superfície de um metal é irradiada com luz de dois comprimentos de onda, λ_1 e λ_2 . As velocidades máximas dos fotoelétrons emitidos são, respectivamente, v_1 e v_2 , sendo $v_1 = 2v_2$. Seja h a constante de Planck e c a velocidade da luz.

Assinale a alternativa com a função trabalho desse metal.

- A $\frac{(2\lambda_1 - \lambda_2)hc}{\lambda_1\lambda_2}$
B $\frac{(\lambda_2 - 2\lambda_1)hc}{\lambda_1\lambda_2}$
C $\frac{(\lambda_2 - 4\lambda_1)hc}{3\lambda_1\lambda_2}$
D $\frac{(4\lambda_1 - \lambda_2)hc}{3\lambda_1\lambda_2}$
E $\frac{(2\lambda_1 - \lambda_2)hc}{3\lambda_1\lambda_2}$

PROBLEMA 14

1A14

O comprimento de onda crítico para a verificação do efeito fotoelétrico no tungstênio é 260 nm .

Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda necessário para produzir fotoelétrons do tungstênio com o dobro da energia cinética daqueles produzidos a 220 nm .

- A 110 B 130 C 150
D 170 E 190

PROBLEMA 15

1A15

Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda de uma partícula de 1 g viajando a 1 m/s .

- A 7×10^{-34} B 7×10^{-33} C 7×10^{-32}
D 7×10^{-31} E 7×10^{-30}

PROBLEMA 16

1A16

Assinale a alternativa com a identidade do átomo que possui comprimento de onda $3,30 \text{ fm}$ quando viaja a 1% da velocidade da luz.

- A Be B Mg C Ca
D Sr E Ba

PROBLEMA 17

1A17

Assinale a alternativa com o momento angular do elétron na quinta órbita do átomo de hidrogênio, considerando o modelo atômico de Bohr.

- A $1 \times 10^{-34} \text{ Js}$ B $2 \times 10^{-34} \text{ Js}$ C $5 \times 10^{-34} \text{ Js}$
D $7 \times 10^{-34} \text{ Js}$ E $1 \times 10^{-33} \text{ Js}$

PROBLEMA 18

1A18

Considere a excitação de um átomo de hidrogênio do estado fundamental até o segundo estado excitado.

Assinale a alternativa *correta*.

- A** Esse estado excitado é o primeiro permitido para o átomo de hidrogênio.
- B** A distância média do elétron ao núcleo será menor no estado excitado do que no estado fundamental.
- C** Será necessário fornecer mais energia para ionizar o átomo a partir desse estado excitado do que do estado fundamental.
- D** A energia de excitação é a mesma do que a necessária para excitar um elétron do segundo para o quarto estado excitado.
- E** O comprimento de onda da radiação emitida quando o elétron retornar para o estado fundamental será igual ao comprimento de onda da radiação absorvida para a excitação.

PROBLEMA 19

1A19

Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda da radiação emitida quando um átomo de hidrogênio decai do segundo para o primeiro estado excitado, nm.

- A** 460 **B** 560 **C** 660
- D** 760 **E** 860

PROBLEMA 20

1A20

Assinale a alternativa com o decaimento para o átomo de hidrogênio que leva à emissão de um fóton com maior comprimento de onda.

- A** $n = 2 \rightarrow n = 1$ **B** $n = 3 \rightarrow n = 2$ **C** $n = 4 \rightarrow n = 3$
- D** $n = 5 \rightarrow n = 4$ **E** $n = 6 \rightarrow n = 5$

PROBLEMA 21

1A21

Um elétron em um estado excitado do átomo de hidrogênio decai para o estado fundamental emitindo dois fótons cujos comprimentos de onda são λ_1 e λ_2 .

Assinale a alternativa com o comprimento de onda do fóton emitido caso o decaimento ocorresse em uma única etapa.

- A** $\lambda_1 + \lambda_2$ **B** $\lambda_1 - \lambda_2$ **C** $\frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$
- D** $\frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}$ **E** $\frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$

PROBLEMA 22

1A22

Assinale a alternativa que mais se aproxima da energia de ionização do hidrogênio, MJ/mol.

- A** 1,30 **B** 2,60 **C** 3,90
- D** 4,20 **E** 6,50

PROBLEMA 23

1A23

A energia de ionização um átomo hidrogenoide é 412 kJ/mol. Quando os átomos desse elemento estão no primeiro estado excitado, a energia de ionização é 126 kJ/mol.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda emitido por esse átomo em uma transição do primeiro estado excitado para o estado fundamental, nm.

- A** 210 **B** 420 **C** 340
- D** 450 **E** 560

PROBLEMA 24

1A24

Assinale a alternativa com o átomo cuja última energia de ionização é 122 eV.

- A** He **B** Li **C** Be
- D** B **E** C

PROBLEMA 25

1A25

Lasers funcionam pela colisão de átomos excitados com espécies no estado fundamental. A transferência de energia é mais eficiente quando as diferenças energéticas dos níveis são próximas.

Assinale a alternativa com a transição do cátion He^+ que pode ser excitada por colisão com átomos de hidrogênio no primeiro estado excitado.

- A** $n = 1 \rightarrow n = 2$ **B** $n = 1 \rightarrow n = 4$ **C** $n = 2 \rightarrow n = 3$
D $n = 2 \rightarrow n = 4$ **E** $n = 2 \rightarrow n = 5$

Nível II

PROBLEMA 26

1A26

Determine a identidade de um átomo que, movendo-se com sua velocidade média quadrática a 100C, possui comprimento de onda 23 pm.

PROBLEMA 27

1A27

Quando átomos colidem, parte de sua energia cinética pode ser convertida em energia eletrônica. O processo é mais eficiente quando a energia cinética é próxima da energia necessária para a excitação.

Determine a temperatura onde a excitação de átomos de hidrogênio ao primeiro estado excitado é mais eficiente

PROBLEMA 28

1A28

Uma amostra com 586 g de água, inicialmente a 25C, é colocada em um forno de micro-ondas que emite radiação eletromagnética com frequência de 2,45 GHz e aquecida até 91C.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do número de fótons absorvidos pela água.

- A** 3×10^{27} **B** 4×10^{28} **C** 1×10^{29}
D 5×10^{30} **E** 2×10^{31}

Dados

$$\bullet C_p(\text{H}_2\text{O}, l) = 75,3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

PROBLEMA 29

1A29

Radiação de comprimento de onda 427 nm é utilizada no processo de fotossíntese para a produção de glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) a partir do CO_2 .

- a. **Determine** a entalpia da reação de fotossíntese.
b. **Determine** o número de fótons necessários para produzir uma molécula de glicose.


Dados

$$\bullet \Delta H_c(\text{glicose}, s) = -2810 \text{ kJ mol}^{-1}$$

PROBLEMA 30

1A30

Cristais de cloreto de prata podem ser incorporados em lentes. Quando expostos à luz a reação a seguir ocorre:



- a. **Determine** a entalpia de decomposição do cloreto de prata.
b. **Determine** o comprimento de onda máximo para esse processo.

Dados

$$\bullet \Delta H_f(\text{AgCl}, s) = -127 \text{ kJ mol}^{-1} \bullet \Delta H_L(\text{Cl}_2) = 242 \text{ kJ mol}^{-1}$$

PROBLEMA 31

1A31

A superfície de um metal é irradiada com luz proveniente de uma amostra de gás de hidrogênio cujos átomos sofrem transições do estado n para o estado fundamental. A função trabalho do metal é metade da energia de ionização do átomo de hidrogênio.

- A** A energia cinética máxima dos elétrons emitidos pelo metal é $E_k = \frac{E_1}{n^2} - \frac{E_1}{2}$
B A função trabalho do metal é $\Phi = \frac{E_1}{2}$
C A energia cinética máxima dos elétrons emitidos aumenta com o aumento da frequência da luz incidente no metal a partir da frequência mínima de emissão.
D A energia cinética máxima dos elétrons emitidos aumenta com o aumento da pressão da amostra de hidrogênio.

PROBLEMA 32
1A32

Uma linha violeta é observada em 434 nm no espectro de emissão do átomo de hidrogênio.

- Determine a energia do fóton dessa emissão.
- Determine a transição eletrônica correspondente a essa emissão.

PROBLEMA 33
1A33

Um feixe de luz solar passa atravessar um filtro de radiação ultravioleta, o qual não permite passar fótons de comprimento de onda menor que 300 nm, sendo direcionado para uma amostra de hidrogênio atômico gasoso. A amostra é mantida em um recipiente transparente à luz visível e opaco ao infravermelho (com comprimento de onda superior a 663 nm). Após passarem pela amostra, os fótons são detectados por sensores posicionados ortogonalmente ao feixe de luz.

Assinale a alternativa que mais se aproxima das energias dos fótons detectados.

- 0,700 eV, 1,90 eV, 3,30 eV, 10,2 eV
- 0,900 eV, 1,40 eV, 1,90 eV, 3,30 eV
- 1 eV, 1,50 eV, 3,40 eV, 13,6 eV
- 1,90 eV, 2,60 eV, 2,90 eV, 3 eV
- 2,10 eV, 2,40 eV, 3,40 eV, 3,80 eV

PROBLEMA 34
1A34

Considere o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. O raio da órbita do estado fundamental é 53 pm, sendo $2200kms^{-1}$ a velocidade do elétron nessa órbita. O tempo de vida médio de um elétron no primeiro estado excitado é de 10 ns.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do número médio de revoluções efetuadas por um elétron no primeiro estado excitado do átomo de hidrogênio.

- 1×10^6
- 8×10^6
- 9×10^6
- 4×10^7
- 5×10^7

PROBLEMA 35
1A35

Considere o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. Seja a_0 o raio da órbita do estado fundamental, m a massa do elétron, e a carga do elétron e ϵ_0 a permissividade do vácuo.

Assinale a alternativa com o período orbital para do n .

- $\frac{e}{4\pi a_0 n^3 \sqrt{(\epsilon_0 m a_0)}}$
- $\frac{4\pi a_0 n^3 \sqrt{(\epsilon_0 m a_0)}}{e}$
- $\frac{\pi a_0 n^3 \sqrt{(\pi \epsilon_0 m a_0)}}{e}$
- $\frac{4\pi a_0 n^3 \sqrt{(\pi \epsilon_0 m a_0)}}{e}$
- $\frac{e}{4\pi a_0 n^3 \sqrt{(\pi \epsilon_0 m a_0)}}$

PROBLEMA 36
1A36

Um átomo de hidrogênio emite um fóton de energia 2,55 eV na transição entre dois estados estacionários. A razão entre as velocidades do elétron nesses estados é $1/2$.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da energia potencial do elétron no estado final.

- 13,6 eV
- 6,80 eV
- 4,50 eV
- 3,40 eV
- 1,50 eV

PROBLEMA 37
1A37

Considere um semiconductor com uma impureza de carga +1 atraindo um elétron. Devido a interações com os átomos da rede cristalina, o elétron no semiconductor possui massa igual a $m_r m_e$ sendo m_e é a massa de repouso do elétron e m_r uma constante adimensional. A permissividade relativa no meio semiconductor é ϵ_r .

Assinale a alternativa com a razão entre a energia de ionização da impureza e a energia de ionização do átomo de hidrogênio.

- 1
- $\frac{m_r}{\epsilon_r}$
- $\frac{\epsilon_r}{m_r}$
- $\frac{m_r}{\epsilon_r^2}$
- $\frac{m \epsilon_r^2}{m_r}$

Gabarito

Nível I

- | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. B | 2. B | 3. D | 4. B | 5. D |
| 6. E | 7. A | 8. D | 9. E | 10. D |
| 11. B | 12. B | 13. D | 14. E | 15. D |
| 16. C | 17. C | 18. E | 19. C | 20. E |
| 21. C | 22. A | 23. B | 24. B | 25. D |

Nível II

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Enxofre | 2. 79 kK |
| 3. C | 4. 2080 kJ mol^{-1} 10 fótons |
| 5. ? 480 nm | 6. C |
| 7. 2,85 eV $n = 5 \rightarrow n = 2$ | 8. D |
| 9. B | 10. E |
| 11. B | 12. D |