

Solubilidade

Gabriel Braun

Colégio e Curso Pensí, Coordenação de Química



Nível I

PROBLEMA 1.1

2E01

Assinale a alternativa que mais se aproxima da solubilidade do dióxido de carbono em uma solução sob 500 torr desse gás a 20 °C.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| A 5 mmol L ⁻¹ | B 10 mmol L ⁻¹ |
| C 15 mmol L ⁻¹ | D 20 mmol L ⁻¹ |
| E 25 mmol L ⁻¹ | |

Dados

- $k_H(\text{CO}_2) = 23,0 \text{ mmol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$

PROBLEMA 1.2

2E02

A concentração mínima em massa de oxigênio necessária para a vida dos peixes é 4 ppm.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da pressão atmosférica mínima que forneceria a concentração mínima em massa de oxigênio na água para permitir a vida dos peixes a 20 °C.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A 160 torr | B 360 torr |
| C 560 torr | D 760 torr |
| E 960 torr | |

Dados

- $k_H(\text{O}_2) = 1,30 \text{ mmol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$

PROBLEMA 1.3

2E03

Compressas frias contendo nitrato de amônio, podem ser utilizadas para amenizar a dor. Essas compressas consistem em cristais de nitrato de amônio e água, e esfriam à medida que o nitrato de amônio se dissolve na água.

Assinale a alternativa que explica porque dissolução do nitrato de amônio em água é espontânea.

- A** A variação de entalpia reticular é maior que a de solvatação dos íons.
- B** A reação é exergônica, já que é exotérmica e possui variação positiva de entropia.
- C** A reação é endotérmica, e isso faz com que o calor das vizinhanças seja disperso nas compressas.
- D** As partículas de nitrato de amônio dissolvidas estão mais randomicamente organizadas que as do retículo cristalino, favorecendo a espontaneidade do processo endotérmico.
- E** A reação é endotérmica e a solução mais fria apresenta menor energia, o que é favorável.

PROBLEMA 1.4

2E04

Considere as proposições.

1. O valor absoluto da entalpia de hidratação do Na⁺ é maior que o do K⁺.
2. O valor absoluto da entalpia de hidratação do Br⁻ é maior que o do Cl⁻.
3. O valor absoluto da entalpia de hidratação do Ca²⁺ é maior que o do Al³⁺.
4. O valor absoluto da entalpia de hidratação do Ga³⁺ é maior que o do Al³⁺.

Assinale a alternativa que relaciona as proposições *corretas*.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A 1 | B 4 |
| C 1 e 4 | D 1, 2 e 4 |
| E 1, 3 e 4 | |

PROBLEMA 1.5

2E05

O gás dióxido de carbono dissolvido em uma amostra de água em um recipiente parcialmente cheio e lacrado entrou em equilíbrio com sua pressão parcial no ar que está acima da solução. Considere as operações.

1. A pressão parcial do gás CO_2 dobra por adição de mais CO_2 .
2. A pressão total do gás sobre o líquido dobra por adição de nitrogênio.
3. A pressão parcial de CO_2 é aumentada por compressão do gás até um terço do volume original.
4. A temperatura é aumentada mantendo a pressão total constante.


Assinale a alternativa que relaciona as operações que levam ao aumento da concentração de CO_2 em solução.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A 1 | B 3 |
| C 1 e 3 | D 1, 2 e 3 |
| E 1, 3 e 4 | |

PROBLEMA 1.6

2E06


Considere as curvas de solubilidade de duas substâncias **A** e **B**.



Assinale a alternativa *correta*.

- No ponto P as soluções apresentam a mesma temperatura mas as solubilidades de **A** e **B** são diferentes.
- A solução da substância **A** está supersaturada no ponto Q.
- Soluções preparadas com 40 g de **A** ou **B** em 100 g de água são instáveis.
- As curvas de solubilidade não indicam mudanças na estrutura dos solutos.
- A solubilidade da substância **B** segue o perfil esperado para a solubilidade de gases em água.


Considere as curvas de solubilidade.



Assinale a alternativa *incorreta*.

- A** A 25 °C, a solubilidade em água do NaNO₃ é maior que a do Na₂SO₄ · 10 H₂O.
- B** A 25 °C, uma mistura de 120 g de NaNO₃ com 100 g água é bifásica, sendo uma das fases o nitrato de amônio sólida e a outra a água líquida.
- C** A 0 °C, uma mistura de 20 g de NaCl com 100 g de água é monofásica, sendo esta fase uma solução aquosa não saturada em NaCl.
- D** A 25 °C, a concentração de íons de sódio existentes na fase líquida de uma mistura preparada pela adição de 6 g de NaCl à 100 g de água é 1 mol L⁻¹.
- E** A 25 °C, a quantidade de íons de sódio presentes em uma solução preparada pela dissolução de 1 g de Na₂SO₄ em 10 g de água é maior do que a existente em outra solução preparada pela dissolução de 1 g de Na₂SO₄ em 10 g de água é maior do que a existente em outra solução preparada pela dissolução de 1 g de Na₂SO₄ · 10 H₂O na mesma quantidade de água.

Considere as curvas de solubilidade.



Considere as proposições.

1. Ao dissolver 130 g de KNO₃ em 200 g de água, a 40 °C, a solução obtida é saturada e possui 70 g de corpo de fundo.
2. Ao dissolver 20 g de Ce₂(SO₄)₃ em 300 g de água a 10 °C e, posteriormente, aquecer a solução até 90 °C haverá gradativa precipitação da substância.
3. A menor quantidade de água necessária para dissolver completamente 140 g de K₂Cr₂O₇ a 90 °C é cerca de 150 g.
4. O nitrato de sódio é a substância mais solúvel a 100 °C.


Assinale a alternativa que relaciona as proposições *corretas*.

- | | |
|----------------|----------------|
| A 1 | B 2 |
| C 1 e 2 | D 2 e 3 |
| E 2 e 4 | |

PROBLEMA 1.9

2E11

Considere as curvas de solubilidade do brometo de potássio em água.



Assinale a alternativa *incorreta*.

- A** A dissolução do KBr em água é um processo endotérmico.
- B** A 30 °C, a concentração de uma solução aquosa saturada em KBr é de aproximadamente 6 mol kg⁻¹.
- C** Misturas correspondentes a pontos situados na região I da figura são bifásicas.
- D** Misturas correspondentes a pontos situados na região II da figura são monofásicas.
- E** Misturas correspondentes a pontos situados sobre a curva são saturadas em KBr.

PROBLEMA 1.10

2E12

A dissolução do sulfato de lítio ocorre com aumento de temperatura da solução, já a dissolução do nitrato de amônio ocorre com o resfriamento da solução.

1. A entalpia de rede do sulfato de lítio é menor que sua entalpia de hidratação.
2. A entalpia de rede do nitrato de amônio é maior que sua entalpia de hidratação.
3. A dissolução do sulfato de lítio aumenta a entropia do sistema.
4. A dissolução do nitrato de amônio diminui a entropia do sistema.

Assinale a alternativa que relaciona as proposições *corretas*.

- A** 1 e 2
- B** 1 e 3
- C** 2 e 3
- D** 1, 2 e 3
- E** 1, 2, 3 e 4

PROBLEMA 1.11

2E13

Assinale a alternativa que mais se aproxima da entalpia de solução do cloreto de sódio.

- A** 1 kJ mol⁻¹
- B** 2 kJ mol⁻¹
- C** 3 kJ mol⁻¹
- D** 4 kJ mol⁻¹
- E** 5 kJ mol⁻¹

Dados

- $\Delta H_R(\text{NaCl}) = 787 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_{\text{hid}}(\text{NaCl}) = 784 \text{ kJ mol}^{-1}$

PROBLEMA 1.12

2E14

Assinale a alternativa que mais se aproxima da entalpia de rede do brometo de cálcio.

- A** -983 kJ mol⁻¹
- B** -1125 kJ mol⁻¹
- C** -1928 kJ mol⁻¹
- D** -2254 kJ mol⁻¹
- E** -2414 kJ mol⁻¹

Dados

- $\Delta H_{\text{hid}}(\text{Ca}^{2+}) = -1579 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_{\text{hid}}(\text{Cl}^-) = -336 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_{\text{sol}}(\text{CaCl}_2) = -103 \text{ kJ mol}^{-1}$

PROBLEMA 1.13

2E15

Uma amostra de 4 g de MgBr_2 é dissolvida em 100 g de água a 25°C .

Assinale a alternativa que mais se aproxima da temperatura final da solução.

- A** 15°C **B** 25°C **C** 35°C
D 45°C **E** 55°C

Dados

- $\Delta H_R(\text{MgBr}_2) = -2406 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_{\text{hid}}(\text{MgBr}_2) = -2591,6 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $C_P(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = 75,3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

PROBLEMA 1.14

2E16

Uma amostra de 10 g de NH_4NO_3 é dissolvida em 100 g de água a 25°C .

Assinale a alternativa que mais se aproxima da temperatura final da solução.

- A** 21°C **B** 23°C **C** 25°C
D 27°C **E** 29°C

Dados

- $\Delta H_R(\text{NH}_4\text{NO}_3) = -628 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_{\text{hid}}(\text{NH}_4^+) = -307 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_{\text{hid}}(\text{NO}_3^-) = -314 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $C_P(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = 75,3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

PROBLEMA 1.15

2E17

Assinale a alternativa que mais se aproxima da entalpia de formação do cloreto de potássio.

- A** -238 kJ mol^{-1} **B** -347 kJ mol^{-1}
C -411 kJ mol^{-1} **D** -513 kJ mol^{-1}
E -673 kJ mol^{-1}

Dados

- $\Delta E(\text{Cl}) = -349 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta E(\text{K}) = 419 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_R(\text{KCl}) = -690 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_{\text{sub}}(\text{K}) = 90 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_L^\circ(\text{Cl}_2) = 242 \text{ kJ mol}^{-1}$

PROBLEMA 1.16

2E18

Assinale a alternativa que mais se aproxima da entalpia de rede do cloreto de cálcio.

- A** -790 kJ mol^{-1} **B** $-1029 \text{ kJ mol}^{-1}$
C $-2070 \text{ kJ mol}^{-1}$ **D** $-2260 \text{ kJ mol}^{-1}$
E $-2609 \text{ kJ mol}^{-1}$

Dados

- $\Delta E(\text{Cl}) = -349 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta E_1(\text{Ca}) = 590 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta E_2(\text{Ca}) = 1146 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_{\text{sub}}(\text{Ca}) = 190 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_L^\circ(\text{Cl}_2) = 242 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_f^\circ(\text{CaCl}_2, \text{s}) = -796 \text{ kJ mol}^{-1}$

PROBLEMA 1.17

2E19

Assinale a alternativa que mais se aproxima da entalpia de sublimação do lítio.

- A** 80 kJ mol^{-1} **B** 161 kJ mol^{-1}
C 242 kJ mol^{-1} **D** 324 kJ mol^{-1}
E 405 kJ mol^{-1}

Dados

- $\Delta E_1(\text{I}) = -295 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta E(\text{Li}) = 520 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_R(\text{LiI}) = -753 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_f(\text{LiI}) = -292 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_L^\circ(\text{I}_2) = 151 \text{ kJ mol}^{-1}$

PROBLEMA 1.18

2E20

Assinale a alternativa que mais se aproxima da segunda afinidade eletrônica do enxofre.

- A** 2 eV **B** 3 eV **C** 4 eV
D 5 eV **E** 6 eV

Dados

- $A E_1(S) = 2,1 \text{ eV}$
- $E I(K) = 4,4 \text{ eV}$
- $\Delta H_R(K_2S) = 2052 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_{\text{sub}}(K) = 90 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_{\text{sub}}(S) = 277 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta H_f^\circ(K_2S, s) = -381 \text{ kJ mol}^{-1}$

PROBLEMA 1.19

2E21

Os mingaus contêm grandes moléculas de amido que fazem a mistura engrossar por um mecanismo semelhante ao da gelatina.

Assinale a alternativa com a descrição para o mecanismo de endurecimento dos mingaus.

- A** As moléculas de amido dos mingaus são insolúveis em água e precipitam quando misturadas com água.
- B** As moléculas de amido dos mingaus são solubilizadas em água, aumentando a densidade da solução.
- C** Os fios das moléculas de amido se ligam uns aos outros por ligações covalentes.
- D** As moléculas de amido formam ligações hidrogênio com as moléculas de água e encapsulam a água em uma rede.
- E** As moléculas de água hidratam as moléculas de amido do pudim, e o calor de hidratação decompõe as moléculas de amido.

Nível II

PROBLEMA 2.1

2E22

Quando submersos em águas profundas, os mergulhadores necessitam voltar lentamente à superfície para evitar a formação de bolhas de gás no sangue.

- a. **Explique** o motivo da não formação de bolhas de gás no sangue quando o mergulhador desloca-se de regiões próximas à superfície para as regiões de águas profundas.
- b. **Explique** o motivo da não formação de bolhas de gás no sangue quando o mergulhador desloca-se muito lentamente de regiões de águas profundas para as regiões próximas da superfície.
- c. **Explique** o motivo da formação de bolhas de gás no sangue quando o mergulhador desloca-se muito rapidamente de regiões de águas profundas para as regiões próximas da superfície.

PROBLEMA 2.2

2E23

O volume de sangue no corpo de um mergulhador de mar profundo é cerca de 6 L. As células sanguíneas compõem cerca de 55% do volume do sangue. Os restantes 45% formam a solução em água conhecida como plasma. A solubilidade do N_2 no sangue a uma pressão parcial de 1 atm é $5,8 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$. **Assinale** a alternativa que mais se aproxima do volume de nitrogênio, medido sob 1 atm e 37°C , eliminado por um mergulhador em profundidade de 90 m em seu retorno à superfície.

- A** 100 mL **B** 200 mL
C 300 mL **D** 400 mL
E 500 mL

PROBLEMA 2.3

2E24

Um recipiente **A**, dotado de uma válvula na parte superior, está totalmente preenchido por uma solução de n mols de CO_2 em 1800 g de água. O recipiente **A** foi, então, conectado ao recipiente **B** previamente evacuado, fechado por válvula e com volume de 1,64 L. Em um dado momento, as válvulas foram abertas deixando o sistema nesta condição durante tempo suficiente para atingir o equilíbrio. Após o equilíbrio, as válvulas foram fechadas e os recipientes foram desconectados. Todo o processo ocorreu à temperatura constante de 300 K. A constante de Henry para a solubilidade do CO_2 na água, $k_H = 33,3 \text{ atm}^{-1}$.

Determine o número de mols de CO_2 que migraram para o recipiente **B** em função de n .

PROBLEMA 2.4

2E28

Considere as propriedades dos sólidos iônicos.

- Explique** porque o valor absoluto da entalpia de rede cresce na ordem $\text{Na}_2\text{Te} < \text{Na}_2\text{Se} < \text{CaTe} < \text{CaSe}$.
- Ordene** os compostos FeCl_3 , FeCl_2 e Fe_2O_3 em função do valor absoluto de entalpia de rede.

PROBLEMA 2.5

2E29

Considere as propriedades dos sólidos iônicos.

- Explique** porque, mesmo sendo a primeira afinidade eletrônica do oxigênio exotérmica e a segunda é endotérmica, na maioria dos compostos iônicos o oxigênio está na forma de óxido.
- Explique** porque o composto NaCl_2 é improvável, supondo que sua entalpia de rede seja igual à do MgCl_2 .

Gabarito
Nível I

- | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. C | 2. B | 3. D | 4. C | 5. C |
| 6. E | 7. B | 8. B | 9. B | 10. D |
| 11. C | 12. C | 13. C | 14. B | 15. C |
| 16. D | 17. B | 18. E | 19. D | |

Nível II

- O aumento da solubilidade do gás no sangue devido ao aumento da pressão é o motivo de não haver a formação de bolhas de gás no sangue quando o mergulhador se desloca de regiões próximas à superfície para as regiões de águas profundas.
 - O motivo de não se formarem bolhas de gás no sangue quando o mergulhador se desloca muito lentamente de regiões de águas profundas para as regiões próximas da superfície é o fato da variação de pressão ocorrer lentamente e, portanto, a liberação de gás ser pequena.
 - A formação de bolhas de gás no sangue quando o mergulhador se desloca muito rapidamente de regiões de águas profundas para águas superficiais é a repentina variação de pressão, diminuindo a solubilidade do gás no sangue. Ocorre intensa liberação do gás, com formação de bolhas.
- D**
- $$\frac{102 + n + \sqrt{(102 + n)^2 - 8n}}{2}$$
-
-