

Propriedades Coligativas

Gabriel Braun

Colégio e Curso Pensí, Coordenação de Química



Nível I

PROBLEMA 1.1

2F01

Em uma amostra de água do mar dissolve-se um pouco de sacarose. Considere as proposições.

1. A pressão de vapor da água diminui.
2. A pressão osmótica da solução aumenta.
3. A condutividade elétrica da solução permanece praticamente inalterada.
4. A temperatura de congelamento diminui.

Assinale a alternativa que relaciona as proposições *corretas*.

- | | |
|----------------------|-------------------|
| A 1, 2 e 3 | B 1, 2 e 4 |
| C 1, 3 e 4 | D 2, 3 e 4 |
| E 1, 2, 3 e 4 | |

PROBLEMA 1.2

2F02

Considere as seguintes afirmações sobre equilíbrio de fases e propriedades coligativas.

1. A adição de um soluto não volátil a um solvente puro, em uma dada temperatura constante, sempre provoca uma diminuição na pressão de vapor.
2. O valor absoluto do abaixamento no ponto de congelamento de uma solução é menor se o soluto dimeriza parcialmente no solvente, comparado ao sistema nas mesmas condições em que não há a dimerização do soluto.
3. A pressão osmótica é a pressão exercida pelas moléculas de soluto sob uma membrana semipermeável.
4. Uma mistura formada por duas substâncias nunca solidifica inteiramente em uma única temperatura.

Assinale a alternativa que relaciona as proposições *corretas*.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A 1 | B 2 |
| C 1 e 2 | D 1, 2 e 3 |
| E 1, 2 e 4 | |

PROBLEMA 1.3

2F03

Assinale a alternativa que mais se aproxima da temperatura de ebulição de uma solução 2 mol kg^{-1} de sacarose, $\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| A 99°C | B 99°C |
| C 100°C | D 101°C |
| E 102°C | |

Dados

- $k_b(\text{H}_2\text{O}) = 0,51 \text{ K kg mol}^{-1}$

PROBLEMA 1.4

2F04

Assinale a alternativa que mais se aproxima da temperatura de congelamento de uma solução $0,2 \text{ mol kg}^{-1}$ do analgésico codeína, $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{NO}_3$, em benzeno.

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A $4,0^\circ\text{C}$ | B $4,5^\circ\text{C}$ | C $5,0^\circ\text{C}$ |
| D $6,0^\circ\text{C}$ | E $6,5^\circ\text{C}$ | |

Dados

- $k_b(\text{C}_6\text{H}_6) = 5,12 \text{ K kg mol}^{-1}$
- $T_{\text{fus}}(\text{C}_6\text{H}_6) = 5,5^\circ\text{C}$

PROBLEMA 1.5

2F05

A adição de $0,24 \text{ g}$ de enxofre a 100 g de tetracloreto de carbono abaixa o ponto de congelamento do solvente em $0,28^\circ\text{C}$. **Assinale** a alternativa com a fórmula molecular das moléculas de enxofre.

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| A S_2 | B S_4 | C S_6 |
| D S_8 | E S_{12} | |

Dados

- $k_b(\text{CCl}_4) = 29,8 \text{ K kg mol}^{-1}$

PROBLEMA 1.6

2F06

A adição de 250 mg de eugenol, o composto responsável pelo odor do óleo de cravo-da-índia, a 100 g de cânfora, abaixa o ponto de congelamento do solvente em $0,62^{\circ}\text{C}$.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da massa molar do eugenol.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| A 120 g mol^{-1} | B 140 g mol^{-1} |
| C 160 g mol^{-1} | D 180 g mol^{-1} |
| E 200 g mol^{-1} | |

Dados

- $k_b(\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}) = 39,7\text{ K kg mol}^{-1}$

PROBLEMA 1.7

2F07

Assinale a alternativa que mais se aproxima da temperatura de ebulição de uma solução 2 mol kg^{-1} de cloreto de cálcio.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| A 102°C | B 104°C |
| C 106°C | D 108°C |
| E 110°C | |

Dados

- $k_b(\text{H}_2\text{O}) = 0,51\text{ K kg mol}^{-1}$

PROBLEMA 1.8

2F08

Uma solução de sacarose foi dividida em duas amostras. A primeira amostra foi imediatamente resfriada, sendo -1°C a temperatura de início de solidificação. Algumas gotas de ácido clorídrico foram adicionadas à segunda amostra e essa foi aquecida a 90°C por um período de 24 horas, hidrolisando integralmente a sacarose em glicose e frutose. A segunda solução possui temperatura de congelamento -2°C .

Assinale a alternativa que mais se aproxima da temperatura de fusão do solvente.

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A 0°C | B 1°C | C 2°C |
| D 3°C | E 4°C | |

PROBLEMA 1.9

2F09

Considere as soluções aquosas.

- $0,1\text{ mol L}^{-1}$ de KCl
- $0,3\text{ mol L}^{-1}$ de K_2SO_4
- $0,3\text{ mol L}^{-1}$ de $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_{11}$
- $0,6\text{ mol L}^{-1}$ de $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$

Assinale a alternativa com a ordem de pressão osmótica a 20°C .

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| A $1 < 3 < 4 < 2$ | B $3 < 1 < 4 < 2$ |
| C $1 < 4 < 3 < 2$ | D $1 < 3 < 2 < 4$ |
| E $1 < 2 \approx 3 < 4$ | |

PROBLEMA 1.10

2F10

A pressão osmótica devido a 2,2 g de polietileno (PE) dissolvido no benzeno necessário para produzir 100 mL de solução foi 1,1 kPa a 25°C .

Assinale a alternativa que mais se aproxima da massa molar média de polietileno.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| A 29 kg mol^{-1} | B 39 kg mol^{-1} |
| C 49 kg mol^{-1} | D 59 kg mol^{-1} |
| E 69 kg mol^{-1} | |

PROBLEMA 1.11

2F11

A catalase, uma enzima do fígado, é solúvel em água. A pressão osmótica de 10 mL de uma solução que contém 166 mg de catalase é 1,2 Torr em 20°C .

Assinale a alternativa que mais se aproxima da massa molar da catalase.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A $2,0\text{ kg mol}^{-1}$ | B $2,5\text{ kg mol}^{-1}$ |
| C $3,0\text{ kg mol}^{-1}$ | D $3,5\text{ kg mol}^{-1}$ |
| E $4,0\text{ kg mol}^{-1}$ | |

Nível II

PROBLEMA 2.1

2F13

Considere as soluções aquosas.

1. 10 mmol L^{-1} de HF
2. 10 mmol L^{-1} de HCl
3. 10 mmol L^{-1} de HBr
4. 10 mmol L^{-1} de HI

Assinale a alternativa com a ordem de pressão osmótica a 20°C .

- | | |
|--|--|
| A 1 < 2 < 3 < 4 | B 1 < 2 < 3 \approx 4 |
| C 1 < 2 \approx 3 \approx 4 | D 1 \approx 2 \approx 3 \approx 4 |
| E 4 < 3 < 2 < 1 | |

PROBLEMA 2.2

2F14

Em um experimento de determinação da massa molar usando o abaixamento do ponto de congelamento, é possível cometer os seguintes erros.

1. Havia poeira na balança, o que fez a massa do soluto parecer maior do que é de fato.
2. A água foi medida em volume, pressupondo que sua densidade fosse 1 g cm^{-3} , mas a água estava mais quente e menos densa do que o considerado.
3. O termômetro não foi calibrado com precisão e, por essa razão, o ponto de congelamento real é $0,5^\circ\text{C}$ superior ao registrado.
4. A solução não foi agitada o suficiente, e o soluto não dissolveu totalmente.

Assinale a alternativa que relaciona os erros que resultariam em uma massa molar calculada *superior* ao valor real.

- | | |
|----------------------|-------------------|
| A 1 e 2 | B 1 e 4 |
| C 2 e 4 | D 1, 2 e 4 |
| E 1, 2, 3 e 4 | |

PROBLEMA 2.3

2F15

Uma amostra de 10 g de um composto orgânico é dissolvida em 80 g de benzeno. O ponto de congelamento da solução é $1,2^\circ\text{C}$. Em outro experimento, a queima do mesmo composto orgânico com excesso de oxigênio formou 528 mg de dióxido de carbono, 36 mg de água e 146 mg de ácido clorídrico.

- a. **Determine** a massa molar do composto.
- b. **Determine** a fórmula molecular do composto.

Dados

- $k_b(\text{C}_6\text{H}_6) = 5,12 \text{ K kg mol}^{-1}$
- $T_{\text{fus}}(\text{C}_6\text{H}_6) = 5,5^\circ\text{C}$

PROBLEMA 2.4

2F16

Uma amostra de 20 g de uma mistura de sacarose, $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$, e cloreto de sódio é dissolvida em água até formar 1 L de solução. O ponto de congelamento da solução é $-0,0426^\circ\text{C}$.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da fração mássica de sacarose na amostra.

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| A 7,5% | B 27,5% | C 50,0% |
| D 72,5% | E 92,5% | |

Dados

- $k_b(\text{H}_2\text{O}) = 1,86 \text{ K kg mol}^{-1}$

PROBLEMA 2.5

2F17

Uma amostra de 500 mg de uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de magnésio é dissolvida água até formar 1 L de solução. A pressão osmótica da solução a 25°C é 0,395 atm.


Assinale a alternativa que mais se aproxima da fração mássica de cloreto de magnésio na amostra.

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| A 12% | B 32% | C 52% |
| D 72% | E 92% | |

PROBLEMA 2.6

2F18

A quitosana tem sido utilizada em cicatrização de ferimentos, remoção de proteínas alergênicas de alimentos e liberação controlada de fármacos. Um experimento de laboratório envolveu a síntese da quitosana através tratamento da quitina com excesso de hidróxido de sódio:



O produto da reação foi isolado e uma amostra de 10,2 g foi adicionada em 100 mL de água destilada. O ponto de congelamento desta solução é $-0,000\,38\text{ }^\circ\text{C}$. A solução foi aquecida, mantendo o sistema sob agitação e em refluxo, por um longo tempo, garantindo a quebra completa das unidades poliméricas formando os monômeros. O ponto de congelamento da solução resultante é $-1,14\text{ }^\circ\text{C}$.

- Determine o número médio de unidades monoméricas na estrutura da quitosana.
- Determine a eficiência da síntese da quitosana utilizando hidróxido de sódio.

Dados

$$k_b(\text{H}_2\text{O}) = 1,86\text{ K kg mol}^{-1}$$

PROBLEMA 2.7

2F19

Uma solução 1% de sulfato de magnésio em massa tem ponto de congelamento igual a $-0,192\text{ }^\circ\text{C}$.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do grau de dissociação do sal nessa solução.

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| A 13% | B 23% | C 33% |
| D 43% | E 53% | |

Dados

$$k_b(\text{H}_2\text{O}) = 1,86\text{ K kg mol}^{-1}$$

PROBLEMA 2.8

2F20

Uma solução $0,124\text{ mol L}^{-1}$ em ácido tricloroacético tem ponto de congelamento igual a $-0,423\text{ }^\circ\text{C}$.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do grau de ionização do ácido nessa solução.

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| A 50% | B 60% | C 70% |
| D 80% | E 90% | |


Dados

$$k_b(\text{H}_2\text{O}) = 1,86\text{ K kg mol}^{-1}$$

PROBLEMA 2.9

2F21

Em solução de tetracloreto de carbono, o tetracloreto de vanádio sofre dimerização formando V_2Cl_8 . Em um experimento, 6,76 g de VCl_4 foram dissolvidos em 100 g de tetracloreto de carbono a $0\text{ }^\circ\text{C}$. Após certo tempo a mistura alcançou o equilíbrio, sendo a densidade $1,78\text{ g cm}^{-3}$. A mistura foi resfriada com nitrogênio líquido, sendo registrada a variação da temperatura com o tempo.



- Determine o grau de dimerização do tetracloreto de vanádio.
- Determine a concentração de VCl_4 e V_2Cl_8 no equilíbrio.

Dados

- $\text{Pf}(\text{CCl}_4)$
- $k_b(\text{CCl}_4) = 29,8\text{ K kg mol}^{-1}$

PROBLEMA 2.10

2F22

O ácido acético comporta-se diferentemente em dois solventes distintos. O ponto de congelamento de uma solução 5%, em massa, de ácido acético em água é $21,72\text{ }^\circ\text{C}$. Em benzeno, o abaixamento do ponto de congelamento associado a uma solução 5%, em massa, de ácido acético é $2,47\text{ }^\circ\text{C}$.

- Explique a diferença no comportamento do ácido acético em solução.
- Determine o grau de reação do ácido acético em água.
- Determine o grau de reação do ácido acético em benzeno.

Dados

- $k_b(\text{H}_2\text{O}) = 1,86\text{ K kg mol}^{-1}$
- $k_b(\text{C}_6\text{H}_6) = 5,12\text{ K kg mol}^{-1}$

PROBLEMA 2.11

2F23

Uma amostra de água do mar possui densidade $1,05 \text{ g mL}^{-1}$, a concentração média de espécies dissolvidas é $0,8 \text{ mol L}^{-1}$ e a temperatura média 290 K. Com o objetivo de purificar a amostra de água, uma das extremidades abertas de um longo tubo contendo a solução é envolvido com uma membrana semipermeável, a qual será imersa na água do mar.

Assinale a alternativa que mais se aproxima profundidade mínima que o tubo deveria ser imerso.

- | | |
|-----------------|----------------|
| A 9 m | B 19 m |
| C 74 m | D 183 m |
| E 1930 m | |

PROBLEMA 2.12

2F24

A pressão osmótica de uma solução de poliisobutileno sintético em benzeno foi determinada a 25°C . Uma amostra contendo 0,2 g de soluto por 100 cm^3 de solução subiu até uma altura de 2,4 mm quando foi atingido o equilíbrio osmótico. A massa específica da solução no equilíbrio é $0,88 \text{ g mL}^{-1}$.

Determine a massa molecular do poliisobuteno.

PROBLEMA 2.13

2F26

Em uma região onde a água é muito dura, unidades de osmose reversa são utilizadas para purificação. Nessa região, a água apresenta $560 \mu\text{g mL}^{-1}$ de carbonato de magnésio. Uma unidade pode exercer uma pressão máxima de 8 atm operando a 27°C .

- Determine** o volume de água que deve entrar na unidade por minuto para produzir 45 L de água purificada por dia.
- Verifique** se a unidade de osmose reversa pode ser utilizada para purificar água do mar, $0,6 \text{ mol L}^{-1}$ em cloreto de sódio.

PROBLEMA 2.14

2F27

A entalpia de fusão de certa substância é $10,14 \text{ kJ mol}^{-1}$. Uma amostra desta substância está contaminada com uma quantidade desconhecida de impurezas. Quando esta amostra é aquecida a 181,85 K, 28% da amostra passa para a fase líquida; a 182,25 K, esta fração aumenta para 53%.

- Determine** a temperatura de fusão para a substância.
- Determine** a temperatura de fusão para a amostra.

Gabarito

Nível I

- | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. E | 2. C | 3. D | 4. B | 5. D |
| 6. D | 7. C | 8. A | 9. A | 10. C |
| 11. B | | | | |

Nível II

- C**
- D**
- 148 g mol^{-1}
 - $\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$
- D**
- D**
- 3000
 - 79%
- B**
- D**
- 85%
 - 84 mmol L^{-1} e 234 mmol L^{-1}
- O ácido acético sofre ionização em água e dimerização em ácido acético.
 - 5%
 - 96,5%
- D**
- 240 kg mol^{-1}
- 46 L
 - Não pode ser utilizada.
- 182,7 K
 - 182,2 K