

Cálculo de pH

Gabriel Braun

Colégio e Curso Pensi, Coordenação de Química



Sumário


1	O pH das soluções em água	1
1.1	As soluções de ácidos fracos	1
1.2	As soluções de bases fracas	2
1.3	O pH das soluções de sais	3
2	Os ácidos e bases polipróticos	5
2.1	O pH de uma solução de ácido polipróticos	5
2.2	As soluções de sais de ácidos polipróticos	6
2.3	As concentrações de solutos	6
2.4	A composição e o pH	7

1 O pH das soluções em água

A transferência de prótons é um processo muito rápido: assim que um ácido ou uma base entra em solução na água, um equilíbrio dinâmico é estabelecido. Portanto, a composição da solução e a concentração dos íons hidrônio expressa como pH podem ser calculadas usando-se as técnicas explicadas nos Tópicos 2F e 2G.

1.1 As soluções de ácidos fracos

A **concentração inicial** (ou *concentração analítica*) de um ácido é a concentração em que ele foi preparado, como se as moléculas ácidas não tivessem doado prótons. No caso de um ácido forte, HA, a concentração molar dos íons H_3O^+ em solução é igual à concentração inicial do ácido forte, porque quase todas as moléculas do ácido estão desprotonadas. Entretanto, para encontrar a concentração dos íons H_3O^+ nas soluções de um ácido fraco HA, o equilíbrio



entre o ácido HA, sua base conjugada A^- e a água, com

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

tem de ser levado em conta. O pH será um pouco mais alto (isto é, a concentração de H_3O^+ será menor) do que seria para um ácido forte na mesma concentração inicial. Para calcular o pH de uma solução de um ácido fraco, você pode usar uma tabela de equilíbrio como a apresentada no Tópico 2F. O cálculo também permite prever o **grau de desprotonação**, α , isto é, a fração de moléculas HA que estão desprotonadas em solução:

$$\alpha = \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]_{\text{inicial}}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]_{\text{inicial}}}$$

A igualdade $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{A}^-]$, que vem da relação estequiométrica para a reação de desprotonação. Uma fração pequena de moléculas desprotonadas indica que o ácido HA é muito fraco.

PONTO PARA PENSAR


Como a magnitude da desprotonação de um ácido fraco pode ser afetada por sua concentração?

EXEMPLO 1 Cálculo do pH de uma solução de ácido fraco

Considere uma solução $0,18 \text{ mol L}^{-1}$ de ácido acético, CH_3COOH , $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$.

Calcule o pH da solução.

Etapa 1. Escreva a expressão da constante de equilíbrio.



Etapa 2. Elabore uma tabela de equilíbrio.

$c/\text{mol L}^{-1}$	CH_3COOH	H_3O^+	CH_3CO_2^-
início	0,18	0	0
reação	$-0,18\alpha$	$+0,18\alpha$	$+0,18\alpha$
equilíbrio	$0,18(1 - \alpha)$	$0,18\alpha$	$0,18\alpha$

Etapa 3. Insira os valores da tabela na expressão do K_a .

$$K_a = \frac{(0,18\alpha)^2}{0,18(1 - \alpha)} = 0,18 \times \frac{\alpha^2}{1 - \alpha}$$

Etapa 4. Hipótese: $1 - \alpha \approx 1$.

Substituindo a hipótese na expressão da constante de equilíbrio:

$$K_a = 1,8 \times 10^{-5} = 0,18 \times \alpha^2$$

Resolvendo a equação para α obtemos

$$\alpha = 0,01$$

O valor de α é muito menor que 1 (menor que 0,05), e a aproximação é válida.

Etapa 5. Calcule a concentração de H_3O^+ .


$$\text{De } [\text{H}_3\text{O}^+] = 0,18 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \alpha$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,18 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times (0,01) = 1,8 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Etapla 6. Calcule o pH.De $\text{pH} = -\log \text{H}_3\text{O}^+$

$$\text{pH} = -\log(1,8 \times 10^{-3}) = \boxed{2,74}$$

Embora muitas tabelas mostrem os valores de pK_a de ácidos fracos, talvez você precise conhecer o valor da constante para um ácido desconhecido ou em uma temperatura diferente das consideradas. Nesses casos, você pode adotar um procedimento como o dado abaixo para calcular K_a e pK_a .

EXEMPLO 2 Cálculo da constante de um ácido fraco a partir do pHUma solução $0,01 \text{ mol L}^{-1}$ de um ácido carboxílico tem pH 3.**Calcule** o K_a do ácido.**Etapla 1.** Escreva a expressão da constante de equilíbrio.

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

Etapla 2. Elabore uma tabela de equilíbrio.

$c/\text{mol L}^{-1}$	HA	H_3O^+	A^-
início	0,01	0	0
reação	$-0,01\alpha$	$+0,01\alpha$	$+0,01\alpha$
equilíbrio	$0,01(1 - \alpha)$	$0,01\alpha$	$0,01\alpha$

Etapla 3. Calcule a concentração de H_3O^+ .De $\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Etapla 4. Calcule o grau de ionização do ácido.De $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,01\alpha$

$$\alpha = \frac{1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}}{0,01 \text{ mol L}^{-1}} = 0,1$$

Etapla 5. Calcule a concentração de ácido não desprotonado.De $[\text{HA}] = 0,01(1 - \alpha)$

$$\alpha = 0,01 \frac{\text{mol}}{\text{L}} (1 - 0,1) = 9 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$


Etapla 6. Insira os valores da tabela na expressão do K_a .

$$K_a = \frac{(1 \times 10^{-3})}{9 \times 10^{-3}} = \boxed{1,1 \times 10^{-4}}$$

Para calcular o pH e a percentagem de desprotonação de uma solução de ácido fraco, construa uma tabela de equilíbrio e determine a concentração de H_3O^+ usando a constante de acidez.

1.2 As soluções de bases fracas

Como nos ácidos fracos, quando uma base fraca, B, dissolve-se em água, o equilíbrio da transferência de prótons é estabelecido muito rapidamente:



com

$$K_b = \frac{[\text{HB}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]}$$


Muitas vezes, é importante conhecer o **o grau de protonação**, isto é, a fração de moléculas de base que foram protonadas:

$$\alpha = \frac{[\text{BH}^+]}{[\text{B}]_{\text{inicial}}} = \frac{[\text{OH}^-]}{[\text{B}]_{\text{inicial}}}$$

Aqui, $[\text{B}]_{\text{inicial}}$ é a concentração molar inicial (ou analítica) da base, isto é, sua concentração imaginando-se que não ocorreu protonação. O procedimento para determinar o pH de uma solução de uma base fraca e sua porcentagem de desprotonação é análogo ao usado para ácidos fracos.

EXEMPLO 3 Cálculo do pH de uma solução de base fraca

Considere uma solução $0,4 \text{ mol L}^{-1}$ de metilamina, CH_3NH_2 , $K_b = 3,6 \times 10^{-4}$.

Calcule o pH da solução.**Etapla 1.** Escreva a expressão da constante de equilíbrio.

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{NH}_2]}$$

Etapla 2. Elabore uma tabela de equilíbrio.

$c/\text{mol L}^{-1}$	CH_3NH_2	CH_3NH_3^+	OH^-
início	0,4	0	0
reação	$-0,4\alpha$	$+0,4\alpha$	$+0,4\alpha$
equilíbrio	$0,4(1 - \alpha)$	$0,4\alpha$	$0,4\alpha$

Etapla 3. Insira os valores da tabela na expressão do K_a .

$$K_a = \frac{(0,4\alpha)^2}{0,4(1 - \alpha)} = 0,4 \times \frac{\alpha^2}{1 - \alpha}$$

Etapla 4. Hipótese: $1 - \alpha \approx 1$.

Substituindo a hipótese na expressão da constante de equilíbrio:

$$K_a = 3,6 \times 10^{-4} = 0,4 \times \alpha^2$$

Resolvendo a equação para α obtemos

$$\alpha = 0,03$$

O valor de α é muito menor que 1 (menor que 0,05), e a aproximação é válida.

Etapa 5. Calcule a concentração de OH^- .

$$\text{De } [\text{OH}^-] = 0,4 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \alpha$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,4 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times (0,03) = 1,2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Etapa 6. Calcule o pOH.

$$\text{De } \text{pOH} = -\log \text{OH}^-$$

$$\text{pOH} = -\log(1,2 \times 10^{-2}) = \boxed{1,9}$$

Etapa 7. Calcule o pH.

$$\text{De } \text{pH} + \text{pOH} = \text{p}K_w = 14$$

$$\text{pH} = 14 - 1,92 = \boxed{12,1}$$

Para calcular o pH de uma solução de base fraca, construa a tabela de equilíbrio e calcule o pOH a partir do valor de K_b .

1.3 O pH das soluções de sais

Um sal é produzido pela neutralização de uma base por um ácido. Contudo, se o pH de uma solução de um sal é medido, nem sempre ele tem valor *neutro* (pH = 7). Por exemplo, se uma solução $0,3 \text{ mol L}^{-1}$ de NaOH for neutralizada com uma solução $0,3 \text{ mol L}^{-1}$ de CH_3COOH , a solução de acetato de sódio resultante terá pH = 9. Como isso pode ocorrer? A teoria de Brønsted-Lowry dá uma explicação. De acordo com essa teoria, um íon pode ser um ácido ou uma base. O íon acetato, por exemplo, é uma base e o íon amônio é um ácido. O pH de uma solução de um sal depende da acidez e da basicidade relativas de seus íons.

Alguns cátions são ácidos em água. Eles caem em quatro categorias gerais:

- Todos os cátions que são ácidos conjugados de bases fracas produzem soluções ácidas.

Os ácidos conjugados de bases fracas, como NH_4^+ , agem como doadores de prótons, logo espera-se que eles formem soluções ácidas.

- Cátions de metais, com carga elevada e raio pequeno que podem agir como ácidos de Lewis em água, como, por exemplo, Al^{3+} e Fe^{3+} , produzem soluções ácidas, mesmo que os cátions não tenham íons hidrogênio para doar.

Os prótons vêm das moléculas de água que hidratam esses cátions de metais em solução. As moléculas de água agem como bases de Lewis e compartilham elétrons com o cátion de metal em ligações covalentes coordenadas (Tópico 3F). Essa perda parcial de elétrons enfraquece as ligações O–H e permite que um ou mais prótons sejam eliminados das moléculas de água. Cátions pequenos e com carga elevada exercem maior atração sobre os elétrons, enfraquecendo ao máximo as ligações O–H, formando as soluções mais ácidas.

- Os cátions dos metais dos Grupos 1 e 2 e os de carga +1 de outros grupos são ácidos de Lewis tão fracos que os íons hidratados não agem como ácidos de Brønsted.

Esses cátions de metal são muito grandes e têm carga muito baixa para ter um efeito polarizante apreciável sobre as moléculas de água de hidratação que os rodeiam, logo as moléculas de água não perdem facilmente seus prótons. Esses cátions são, às vezes, chamados de *cátions neutros*, porque eles têm efeito muito pequeno sobre o pH.

- Nenhum cátion é básico.

Os cátions não aceitam um próton facilmente porque a carga positiva do cátion repele a carga positiva dos prótons que se aproximam.


EXEMPLO 4 Cálculo do pH de uma solução de um sal com cátion ácido

Considere uma solução $0,15 \text{ mol L}^{-1}$ de cloreto de amônio, NH_4Cl .

A constante de basicidade da amônia é $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$.

Calcule o pH da solução.

Etapa 1. Escreva a expressão da constante de equilíbrio.



Etapa 2. Calcule a constante de acidez a partir da constante de basicidade da base conjugada (NH_3).

$$\text{De } K_a = K_w/K_b$$

$$K_a = \frac{1 \times 10^{-14}}{1,8 \times 10^{-5}} = 5,5 \times 10^{-10}$$

Etapa 3. Elabore uma tabela de equilíbrio.

$c/\text{mol L}^{-1}$	NH_4^+	H_3O^+	NH_3
início	0,15	0	0
reação	$-0,15\alpha$	$+0,15\alpha$	$+0,15\alpha$
equilíbrio	$0,15(1 - \alpha)$	$0,15\alpha$	$0,15\alpha$

Etapa 4. Insira os valores da tabela na expressão do K_a .

$$K_a = \frac{(0,15\alpha)^2}{0,15(1 - \alpha)} = 0,15 \times \frac{\alpha^2}{1 - \alpha}$$

Etapa 5. Hipótese: $1 - \alpha \approx 1$.

Substituindo a hipótese na expressão da constante de equilíbrio:

$$K_a = 5,5 \times 10^{-10} = 0,15 \times \alpha^2$$

Resolvendo a equação para α obtemos

$$\alpha = 6 \times 10^{-5}$$

O valor de α é muito menor que 1 (menor que 0,05), e a aproximação é válida.

Etapa 6. Calcule a concentração de H_3O^+ .

$$\text{De } [\text{H}_3\text{O}^+] = 0,15 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \alpha$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,15 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times (6 \times 10^{-5}) = 9 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$$

Etapa 7. Calcule o pH.

$$\text{De } \text{pH} = -\log \text{H}_3\text{O}^+$$

$$\text{pH} = -\log(9 \times 10^{-6}) = \boxed{5,0}$$


Alguns ânions são básicos em água. Eles caem em três categorias gerais:

- Pouquíssimos ânions que têm hidrogênio produzem soluções ácidas.

É difícil para um próton, com sua carga positiva, deixar um ânion, com sua carga negativa. Os poucos ânions que atuam como ácidos fracos incluem H_2PO_4^- e HSO_4^- .

- Todos os ânions que são bases conjugadas de ácidos fracos produzem soluções básicas.

Por exemplo, o ácido fórmico, HCOOH , o ácido do veneno das formigas, é um ácido fraco, logo o íon formato age como uma base em água:



- Os ânions de ácidos fortes — que incluem Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- e ClO_4^- — são bases tão fracas que não têm efeito significativo sobre o pH de uma solução.

Esses ânions são considerados *neutros* em água.


Para determinar se uma solução de um sal é ácida, básica ou neutra, deve-se levar em conta o cátion e o ânion. Primeiramente, examine o ânion para ver se ele é a base conjugada de um ácido fraco. Se o ânion não é ácido ou básico, então examine o cátion para ver se ele é um íon de metal com caráter ácido ou se é o ácido conjugado de uma base fraca. Se um íon é um ácido e o outro é uma base, como em NH_4F , então o pH é afetado pelas reações dos dois íons com a água, e ambos os equilíbrios devem ser levados em conta.

EXEMPLO 5 Cálculo do pH de uma solução de um sal com cátion ácido

Considere uma solução $0,15 \text{ mol L}^{-1}$ de acetato de cálcio, $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_2$.

A constante de acidez do ácido acético é $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$.

Calcule o pH da solução.

Etapa 1. Escreva a expressão da constante de equilíbrio.

$$K_b = \frac{[\text{H}_2\text{O}][\text{CH}_3\text{CO}_2^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

Etapa 2. Calcule a constante de acidez a partir da constante de basicidade da base conjugada (NH_3).

$$\text{De } K_b = K_w/K_a$$

$$K_b = \frac{1 \times 10^{-14}}{1,8 \times 10^{-5}} = 5,5 \times 10^{-10}$$

Etapa 3. Elabore uma tabela de equilíbrio.

A concentração inicial de CH_3CO_2^- é $2 \times 0,15 \frac{\text{mol}}{\text{L}} = 0,30 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$, porque cada fórmula unitária do sal fornece dois íons CH_3CO_2^- .

$c/\text{mol L}^{-1}$	NH_4^+	H_3O^+	NH_3
início	0,30	0	0
reação	$-0,30\alpha$	$+0,30\alpha$	$+0,30\alpha$
equilíbrio	$0,30(1 - \alpha)$	$0,30\alpha$	$0,30\alpha$

Etapa 4. Insira os valores da tabela na expressão do K_a .

$$K_a = \frac{(0,30\alpha)^2}{0,30(1 - \alpha)} = 0,30 \times \frac{\alpha^2}{1 - \alpha}$$

Etapa 5. Hipótese: $1 - \alpha \approx 1$.

Substituindo a hipótese na expressão da constante de equilíbrio:

$$K_a = 5,5 \times 10^{-10} = 0,30 \times \alpha^2$$

Resolvendo a equação para α obtemos

$$\alpha = 4,3 \times 10^{-5}$$

O valor de α é muito menor que 1 (menor que 0,05), e a aproximação é válida.

Etapa 6. Calcule a concentração de OH^- .

$$\text{De } [\text{OH}^-] = 0,30 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \alpha$$

$$[\text{OH}^-] = 0,30 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times (4,3 \times 10^{-5}) = 1,3 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

Etapa 7. Calcule o pOH.

$$\text{De } \text{pOH} = -\log \text{OH}^-$$

$$\text{pOH} = -\log(1,3 \times 10^{-5}) = \boxed{4,9}$$

Etapa 8. Calcule o pH.

$$\text{De } \text{pH} + \text{pOH} = \text{p}K_w = 14$$

$$\text{pH} = 14 - 4,9 = \boxed{9,1}$$

Os sais que contêm ácidos conjugados de bases fracas produzem soluções ácidas em água. O mesmo fazem os sais que contêm cátions de metal pequenos e com carga elevada. Os sais que

contêm bases conjugadas de ácidos fracos produzem soluções básicas em água.

2 Os ácidos e bases polipróticos


Um ácido poliprótico é um composto que pode doar mais de um próton. Muitos ácidos comuns são polipróticos, dentre eles o ácido sulfúrico, H_2SO_4 , e o ácido carbônico, H_2CO_3 , que podem doar dois prótons, e o ácido fosfórico, H_3PO_4 , que pode doar três prótons. Os ácidos polipróticos têm papel importante em sistemas biológicos, já que muitas enzimas podem ser consideradas como ácidos polipróticos que desempenham suas funções vitais doando um próton após o outro. Uma base poliprótica é uma espécie que pode aceitar mais de um próton. Exemplos incluem os ânions CO_3^{2-} e SO_3^{2-} , que podem aceitar dois prótons, e o ânion PO_4^{3-} , que pode aceitar três prótons.

PONTO PARA PENSAR

As desprotonações sucessivas de um ácido poliprótico resultarão em ácidos mais fortes ou em ácidos mais fracos?

2.1 O pH de uma solução de ácido polipróticos

O ácido carbônico é um componente natural importante do ambiente que se forma toda vez que o dióxido de carbono se dissolve na água. Na verdade, os oceanos garantem um dos mecanismos críticos para a manutenção da concentração constante do dióxido de carbono na atmosfera. O ácido carbônico participa de dois equilíbrios sucessivos de transferência de prótons:



A base conjugada de H_2CO_3 no primeiro equilíbrio, o íon HCO_3^- , age como um ácido no segundo equilíbrio. Esse íon, por sua vez, produz sua própria base conjugada, CO_3^{2-} .

Os prótons são doados sucessivamente pelos ácidos polipróticos, e a constante de acidez decresce significativamente, em geral por um fator de cerca de 10^3 ou mais, em cada perda de próton. Essa diminuição está ligada à atração entre cargas opostas: é mais difícil para um íon de carga negativa (como HCO_3^-) perder um próton, que tem carga positiva, do que para a molécula neutra original (H_2CO_3). O ácido sulfúrico, por exemplo, é um ácido forte, mas sua base conjugada, HSO_4^- , é um ácido fraco.

O ácido sulfúrico é o único ácido poliprótico comum para o qual a primeira desprotonação pode ser considerada completa. A segunda desprotonação aumenta ligeiramente a concentração de H_3O^+ , logo o pH é ligeiramente menor do que o devido somente à primeira desprotonação.


EXEMPLO 6 Cálculo do pH de uma solução de ácido sulfúrico

Considere uma solução $0,01 \text{ mol L}^{-1}$ de ácido sulfúrico, H_2SO_4 .

A constante de acidez do ácido sulfúrico é $K_{a2} = 0,012$.

Calcule o pH da solução.


Etapa 1. Escreva a reação da primeira desprotonação.



Etapa 2. Elabore uma tabela de reação para a primeira desprotonação (completa).

$c/\text{mol L}^{-1}$	H_2SO_4	HSO_4^-	H_3O^+
início	0,01	0	0
reação	-0,01	+0,01	+0,01
final	0,01	0,01	0,01

Etapa 3. Escreva a expressão da constante de equilíbrio para a segunda desprotonação.



Etapa 4. Elabore uma tabela de equilíbrio para a segunda desprotonação.

$c/\text{mol L}^{-1}$	HSO_4^-	SO_4^{2-}	H_3O^+
início	0,01	0	0,01
reação	-x	+x	+x
equilíbrio	$0,01 - x$	x	$0,01 + x$

Etapa 5. Insira os valores da tabela na expressão do K_{a2} .

$$K_{a2} = \frac{(0,01 + x) \times x}{0,01 - x}$$

Resolvendo a equação para x obtemos:

$$x = 4,3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Etapa 6. Calcule a concentração de H_3O^+ .

$$\text{De } [\text{OH}^-] = 0,01 \frac{\text{mol}}{\text{L}} + x$$

$$[\text{OH}^-] = 0,01 \frac{\text{mol}}{\text{L}} + 4,3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = 0,014 \text{ mol L}^{-1}$$

Etapa 7. Calcule o pH.

$$\text{De } \text{pH} = -\log \text{H}_3\text{O}^+$$

$$\text{pH} = -\log(0,014) = \boxed{1,9}$$

À exceção do ácido sulfúrico (e alguns outros casos raros), para calcular o pH de um ácido poliprótico use K_{a1} e só leve em conta a primeira desprotonação. Em outras palavras, trate o ácido como se fosse um ácido monoprótico fraco. As desprotonações subsequentes ocorrem, mas, desde que K_{a2} seja inferior a $K_{a1}/1000$, não afetam significativamente o pH e podem ser ignoradas.

ATENÇÃO Se os valores de K_{a1} e K_{a2} de um ácido poliprótico forem muito próximos, os cálculos são mais complicados porque os

dois equilíbrios têm de ser considerados.



Estime o pH de um ácido poliprótico para o qual todas as desprotonações são fracas usando somente o primeiro equilíbrio de desprotonação e considere insignificantes as demais desprotonações. Uma exceção é o ácido sulfúrico, o único ácido poliprótico comum que é um ácido forte em sua primeira desprotonação.

2.2 As soluções de sais de ácidos polipróticos

A base conjugada de um ácido poliprótico é anfiprótica: ela pode agir como um ácido ou como uma base porque pode doar seu átomo de hidrogênio ácido ou aceitar um próton e voltar ao ácido original.

ATENÇÃO São exceções HSO_4^- , que é uma base muito fraca, e HPO_3^{2-} , que não atua como ácido porque o próton não é ácido

Por exemplo, um íon hidrogenossulfeto, HS^- , em água, age como um ácido ou como uma base:



Como HS^- é anfiprótico, não é imediatamente aparente se uma solução de NaHS em água é ácida ou básica. Entretanto, podemos usar os valores de K_a e K_b do íon HS^- para concluir que:

- O K_{a2} de H_2S (o K_a de HS^-) é pequeno ($7,1 \times 10^{-15}$), o que implica que HS^- é um ácido muito fraco; por isso, sua base conjugada, S^{2-} , é razoavelmente forte e o seu caráter básico provavelmente dominará. Como resultado, $\text{pH} > 7$.
- O K_{a1} de H_2S tem um valor intermediário, o que sugere que $K_b = K_w/K_{a2}$ do HS^- também tem um valor intermediário ($7,7 \times 10^{-8}$), indicando que esse íon é uma base razoavelmente fraca; logo $\text{pH} > 7$, novamente.

Esse raciocínio sugere que o pH será alto se $\text{p}K_{a1}$ e $\text{p}K_{a2}$ forem relativamente altos. Na verdade, se algumas hipóteses razoáveis forem feitas, então, em geral,

$$\text{pH} = \frac{\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}}{2} \quad (1)$$

em que, para um ânion de fórmula HA^- (como HS^-), K_{a1} é a primeira constante de acidez do ácido original H_2A (H_2S , neste exemplo) e K_{a2} é a segunda constante de acidez do H_2A , que é a constante de acidez do HA^- em si. Essa fórmula é confiável se $c_0 \gg K_w/K_{a2}$ e $c_0 \gg K_{a1}$ (como para outros sais), em que c_0 é a concentração inicial do sal (isto é, a concentração analítica). Se esses critérios não forem atendidos, uma expressão muito mais complexa precisa ser usada.

EXEMPLO 7 Cálculo do pH de uma solução de sal anfiprótico.

Considere uma solução $0,3 \text{ mol L}^{-1}$ de dihidrogenofosfato de sódio, NaH_2PO_4 .

As constantes de acidez do ácido fosfórico são $\text{p}K_{a1} = 2,1$, $\text{p}K_{a2} = 7,2$, $\text{p}K_{a3} = 12$.

Calcule o pH da solução.

Etapas 1. Solução de sal anfiprótico. Verifique se $c_0 \gg K_w/K_{a2}$ e $c_0 \gg K_{a1}$.

$$c_0 \gg K_w/K_{a2} = \frac{1 \times 10^{-14}}{6,2 \times 10^{-8}} = 1,6 \times 10^{-7}$$

$$c_0 \gg K_{a2} = 7,6 \times 10^{-3}$$

Portanto, o uso da Equação 1 é válido.

Etapas 2. Use a fórmula do pH de soluções de sal anfiprótico.

$$\text{De } \text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$$

$$\text{pH} = \frac{2,1 + 7,2}{2} = \boxed{4,65}$$

Suponha que você precise calcular o pH de uma solução em água do sal de um ácido poliprótico totalmente desprotonado. O ânion pode ser tratado como a base conjugada de um ácido monoprótico fraco, desde que K_{b2} seja menor do que $K_{b1}/1000$. Protonações sucessivas ocorrem, mas em extensão tão pequena que o impacto no pH pode ser desprezado. Um exemplo é uma solução de sulfeto de sódio, na qual íons sulfeto, S^{2-} , estão presentes. Outro exemplo é uma solução de fosfato de potássio, que contém íons PO_4^{3-} . Em soluções desse tipo, os ânions agem como bases, isto é, eles aceitam prótons da água. Para essas soluções, é preciso usar a técnica de cálculo do pH de um ânion básico ilustrada no Exemplo 5. Para encontrar o valor de K_b para usar no cálculo, use o K_a da desprotonação que produz o íon estudado. Para S^{2-} , use o $K_{b2} = K_w/K_{a2}$ de H_2S , e para PO_4^{3-} , o $K_{b3} = K_w/K_{a3}$ de H_3PO_4 .

O pH da solução de um sal anfiprótico em água é igual à média dos pKa do sal e de seu ácido conjugado. O pH de uma solução de um sal da base conjugada final de um ácido poliprótico é obtido a partir da reação do ânion com a água.

2.3 As concentrações de solutos

Os químicos ambientais, que estudam a poluição causada por fertilizantes arrastados pela água em plantações, ou os mineralogistas, que estudam a formação de rochas sedimentares pela percolação dos lençóis freáticos a partir de formações rochosas, precisam conhecer, além do pH, as concentrações de cada um dos íons presentes na solução. Por exemplo, eles podem precisar conhecer a concentração dos íons sulfito em uma solução de ácido sulfuroso ou as concentrações de íons fosfato e hidrogenofosfato em uma solução de ácido fosfórico. Os cálculos descritos no Exemplo 6 nos fornecem o pH — a concentração de íons hidrônio —, mas não nos dão as concentrações de todos os solutos em solução, que podem incluir H_3PO_4 , H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} e PO_4^{3-} . Para calculá-las, é preciso levar em conta todos os equilíbrios simultâneos de transferência de prótons na solução.

Para simplificar os cálculos, comece por julgar a concentração relativa de cada espécie em solução, identificando termos que possam ser desprezados. Neste caso, use a regra geral de que as concentrações das espécies presentes em grande quantidade não são significativamente afetadas pelas concentrações das espécies presentes em pequena quantidade, especialmente se as diferenças forem grandes. Contudo, todas as hipóteses devem ser avaliadas e confirmadas nos término dos cálculos.


EXEMPLO 8 Cálculo das concentrações de todas as espécies em uma solução de um ácido poliprótico

Considere uma solução $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ de ácido fosfórico, H_3PO_4 .

A constante de acidez do ácido fosfórico são $K_{a1} = 7,6 \times 10^{-3}$, $K_{a2} = 6,2 \times 10^{-8}$, $K_{a3} = 2,1 \times 10^{-13}$.

Calcule a concentração de todas as espécies em solução.

Etapa 1. Escreva a expressão da constante de equilíbrio para a primeira desprotonação.



Etapa 2. Elabore uma tabela de reação para a primeira desprotonação.

c/mol L ⁻¹	H ₂ SO ₄	HSO ₄ ⁻	H ₃ O ⁺
início	0,1	0	0
reação	-0,1α	+0,1α	+0,1α
final	0,1(1 - α)	0,1α	0,1α

Etapa 3. Insira os valores da tabela na expressão do K_{a1}.

$$K_{a1} = \frac{(0,1\alpha)^2}{0,1(1 - \alpha)} = 0,1 \times \frac{\alpha^2}{1 - \alpha}$$

Resolvendo a equação para α obtemos

$$\alpha = 0,24$$

Etapa 4. Calcule a concentração de H₃O⁺ e H₂PO₄⁻.

$$\text{De } [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0,1 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \alpha$$


$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0,1 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times (0,24) = \boxed{2,4 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}}$$

Etapa 5. Calcule a concentração de H₃PO₄.

$$\text{De } [\text{H}_3\text{PO}_4] = 0,1 \frac{\text{mol}}{\text{L}} (1 - \alpha)$$

$$[\text{H}_3\text{PO}_4] = 0,1 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times (1 - 0,24) = \boxed{7,6 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}}$$

Etapa 6. Escreva a expressão da constante de equilíbrio para a segunda desprotonação.



Etapa 7. Insira as concentrações de H₃O⁺ e H₂PO₄⁻ na expressão do K_{a2}.

Como K_{a2} ≪ K_{a1}, podemos seguramente considerar que as concentrações de H₃O⁺ e H₂PO₄⁻ calculadas não mudam na segunda desprotonação.


$$K_{a2} = \frac{(2,4 \times 10^{-2}) \times [\text{HPO}_4^{2-}]}{2,4 \times 10^{-2}}$$

logo,

$$[\text{HPO}_4^{2-}] = \boxed{6,2 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}}$$

A concentração de HPO₄²⁻ é muito menor que 2,4 × 10⁻² mol L⁻¹, e a aproximação é válida.

Etapa 8. Escreva a expressão da constante de equilíbrio para a terceira desprotonação.



Etapa 9. Insira as concentrações de H₃O⁺ e HPO₄²⁻ na expressão do K_{a3}.

Como K_{a3} ≪ K_{a2} ≪ K_{a1}, podemos supor que as concentrações de H₃O⁺ e HPO₄²⁻ calculadas não mudam na segunda desprotonação.

$$K_{a3} = \frac{(2,4 \times 10^{-2}) \times [\text{PO}_4^{3-}]}{6,2 \times 10^{-8}}$$

logo,

$$[\text{PO}_4^{3-}] = 5,4 \times 10^{-19} \text{ mol L}^{-1}$$

A concentração de PO₄³⁻ é muito menor que 6,2 × 10⁻⁸ mol L⁻¹, e a aproximação é válida.



As concentrações de todas as espécies de uma solução de um ácido poliprótico podem ser calculadas imaginando-se que as espécies presentes em pequenas quantidades não afetam as concentrações das espécies presentes em grandes quantidades.

2.4 A composição e o pH

Em alguns casos, é necessário saber como as concentrações dos íons de uma solução de um ácido poliprótico variam de acordo com o pH. Essa informação é particularmente importante no estudo das águas naturais, como as de rios e lagos. Por exemplo, se você estivesse examinando o ácido carbônico na água da chuva, deveria esperar que, em pH baixo (em que íons hidrônio são abundantes), a espécie totalmente protonada (H₂CO₃) predomine. Já em pH alto, podemos esperar que a espécie completamente desprotonada (CO₃²⁻) predomine e que, em pH intermediário, a espécie intermediária (HCO₃⁻, neste caso) predomine (Figura 1). Essas expectativas podem ser confirmadas quantitativamente.

COMO ISSO É FEITO?

Para mostrar como as concentrações das espécies presentes em uma solução variam de acordo com o pH, use, como exemplo, o sistema do ácido carbônico. Considere o seguinte equilíbrio de transferência de prótons:



Expresse a composição da solução em termos da fração, x_j, de cada espécie j presente, em que j pode ser H₂CO₃, HCO₃⁻ ou CO₃²⁻ e

$$x_j = \frac{[j]}{[\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}]}$$




FIGURA 1 A variação da composição fracionária das espécies do ácido carbônico em função do pH. Observe que as espécies totalmente protonadas predominam em pH baixo e que as mais desprotonadas predominam em pH alto.

Será útil expressar x_i em termos da razão entre cada espécie e a espécie intermediária $[\text{HCO}_3^-]$. Por isso, divida o numerador e o denominador por $[\text{HCO}_3^-]$ para obter

$$x_i = \frac{\frac{[i]}{[\text{HCO}_3^-]}}{\frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{HCO}_3^-]} + 1 + \frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]}}$$

As três razões de concentrações podem ser escritas em termos da concentração do íon hidrônio. Para isso, simplesmente rearranje a expressão para a primeira e a segunda constante de acidez:

$$\frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{HCO}_3^-]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_{a1}} \quad \frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]} = \frac{K_{a2}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

substituindo na expressão de x_i e rearranjando para obter:

$$\begin{aligned} x_{\text{H}_2\text{CO}_3} &= \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{[\text{H}_3\text{O}^+]^2 + [\text{H}_3\text{O}^+]K_{a1} + K_{a1}K_{a2}} \\ x_{\text{HCO}_3^-} &= \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]K_{a1}}{[\text{H}_3\text{O}^+]^2 + [\text{H}_3\text{O}^+]K_{a1} + K_{a1}K_{a2}} \\ x_{\text{CO}_3^{2-}} &= \frac{K_{a1}K_{a2}}{[\text{H}_3\text{O}^+]^2 + [\text{H}_3\text{O}^+]K_{a1} + K_{a1}K_{a2}} \end{aligned}$$

A expressão obtida fornece as frações, x , das espécies em uma solução de ácido carbônico. Elas podem ser generalizadas para qualquer ácido diprótico H_2A :

$$x_{\text{H}_2\text{A}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{H} \quad x_{\text{HA}^-} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]K_{a1}}{H} \quad x_{\text{A}^{2-}} = \frac{K_{a1}K_{a2}}{H} \quad (2a)$$

onde

$$H = [\text{H}_3\text{O}^+]^2 + [\text{H}_3\text{O}^+]K_{a1} + K_{a1}K_{a2} \quad (2b)$$

O QUE ESTA EQUAÇÃO REVELA? Em pH elevado, a concentração de íons hidrônio é muito baixa e, portanto, os numeradores em $x_{\text{H}_2\text{A}}$ e x_{HA^-} são muito pequenos, logo essas espécies estão em

abundância muito baixa, como esperado. Quando o pH é baixo, a concentração de íons hidrônio é alta e, portanto, o numerador em $x_{\text{H}_2\text{A}}$ é grande e essa espécie predomina.

A forma das curvas previstas pela Equação 2 são mostradas para H_2CO_3 na Figura 1. Você pode perceber que $x_{\text{HCO}_3^-} \approx 1$ em pH intermediário. O valor máximo de $x_{\text{HCO}_3^-}$ ocorre em

$$\text{pH} = \frac{\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}}{2} \quad (3)$$

Observe que a forma totalmente protonada (H_2CO_3) predomina quando $\text{pH} < \text{p}K_{a1}$ e a forma totalmente desprotonada (CO_3^{2-}), quando $\text{pH} > \text{p}K_{a1}$. Cálculos semelhantes podem ser feitos para sais de ácidos tripróticos em água (Figura 2).




FIGURA 2 A variação da composição fracionária das espécies do ácido fosfórico em função do pH. Como na Figura 1, quanto mais totalmente protonada a espécie, menor o pH na qual ela é predominante.

PONTO PARA PENSAR

As expressões da Equação 2 têm simetria. Você pode identificá-la e usá-la para escrever as expressões correspondentes para um ácido triprótico?

A fração de espécies desprotonadas aumenta quando o pH aumenta.

Problemas

PROBLEMA 1

O pH de uma solução $0,2 \text{ mol L}^{-1}$ de ácido crotônico, $\text{C}_3\text{H}_5\text{COOH}$, em água é 2,7.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do $\text{p}K_a$ do ácido.

- A** 2,0 **B** 2,6 **C** 3,5 **D** 4,7 **E** 6,3

PROBLEMA 2

O pH de uma solução $0,12 \text{ mol L}^{-1}$ de ácido cloroso, HClO_2 , em água é 1,5.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pKa do ácido.

- A** 0,79 **B** 1,0 **C** 1,3 **D** 1,6 **E** 2,0

PROBLEMA 3

O pH de uma solução de ácido nitroso, HNO_2 , em água é 2,5.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da concentração inicial do ácido.

- A** $0,026 \text{ mol L}^{-1}$ **B** $0,039 \text{ mol L}^{-1}$ **C** $0,060 \text{ mol L}^{-1}$
D $0,091 \text{ mol L}^{-1}$ **E** $0,14 \text{ mol L}^{-1}$

Dados

- $K_a(\text{HNO}_2) = 4,3 \times 10^{-4}$

PROBLEMA 4

O pH de uma solução de metilamina, CH_3NH_2 , em água é 12.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da concentração inicial da base.

- A** $0,18 \text{ mol L}^{-1}$ **B** $0,23 \text{ mol L}^{-1}$ **C** $0,30 \text{ mol L}^{-1}$
D $0,39 \text{ mol L}^{-1}$ **E** $0,51 \text{ mol L}^{-1}$

Dados

- $K_b(\text{CH}_3\text{NH}_2) = 3,6 \times 10^{-4}$

PROBLEMA 5

Considere uma solução $0,2 \text{ mol L}^{-1}$ em ácido acético, CH_3COOH .

Assinale a alternativa que mais se aproxima da fração de ácido desprotonado em solução.

- A** 0,79 % **B** 0,95 % **C** 1,1 %
D 1,4 % **E** 1,7 %

Dados

- $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,8 \times 10^{-5}$

PROBLEMA 6

Considere uma solução $3,7 \text{ mmol L}^{-1}$ em ácido láctico, $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da fração de ácido desprotonado em solução.

- A** 11 % **B** 17 % **C** 25 % **D** 38 % **E** 58 %

Dados

- $K_a(\text{HC}_3\text{H}_5\text{O}_3) = 8,4 \times 10^{-4}$

PROBLEMA 7

Considere uma solução $0,08 \text{ mol L}^{-1}$ de ácido acético, CH_3COOH .

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH da solução.

- A** 3,2 **B** 4,2 **C** 5,4 **D** 7,0 **E** 9,2

Dados

- $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,8 \times 10^{-5}$

PROBLEMA 8

Considere uma solução $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ de ácido tricloroacético, CCl_3COOH .

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH da solução.

- A** 0,52 **B** 0,62 **C** 0,75 **D** 0,91 **E** 1,1

Dados

- $K_a(\text{CCl}_3\text{COOH}) = 0,3$

PROBLEMA 9

Considere uma solução $0,06 \text{ mol L}^{-1}$ em amônia, NH_3 .

Assinale a alternativa que mais se aproxima da fração de base protonada na solução.

- A** 1,4 % **B** 1,7 % **C** 2,1 % **D** 2,6 % **E** 3,3 %

Dados

- $K_b(\text{NH}_3) = 1,8 \times 10^{-5}$

PROBLEMA 10

Considere uma solução $0,012 \text{ mol L}^{-1}$ em nicotina, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2$.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da fração de base protonada na solução.

- A** 0,88 % **B** 1,1 % **C** 1,4 %
D 1,7 % **E** 2,1 %

Dados

- $K_b(\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2) = 1 \times 10^{-6}$

PROBLEMA 11

Considere uma solução $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ de metilamina, CH_3NH_2 .

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH da solução.

- A** 2,9 **B** 4,2 **C** 5,9 **D** 8,3 **E** 12

Dados

- $K_b(\text{CH}_3\text{NH}_2) = 3,6 \times 10^{-4}$

PROBLEMA 12

Considere uma solução $0,02 \text{ mol L}^{-1}$ de trietilamina, $(\text{CH}_3)_3\text{N}$

Assinale a alternativa que mais se aproxima da concentração de hidróxido na solução.

- A** $1,7 \text{ mmol L}^{-1}$ **B** $2,3 \text{ mmol L}^{-1}$ **C** $3,0 \text{ mmol L}^{-1}$
D $4,0 \text{ mmol L}^{-1}$ **E** $5,3 \text{ mmol L}^{-1}$

Dados

$$K_b((\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}) = 1 \times 10^{-3}$$

PROBLEMA 13

Considere as soluções.

1. $\text{HCl}(\text{aq}, 10 \mu\text{mol L}^{-1})$
2. $\text{CH}_3\text{NH}_2(\text{aq}, 0,2 \text{ mol L}^{-1})$
3. $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}, 0,2 \text{ mol L}^{-1})$
4. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2(\text{aq}, 0,2 \text{ mol L}^{-1})$

Assinale a alternativa que relaciona as soluções em ordem crescente de pH.

- A** 3; 1; 2; 4. **B** 1; 3; 2; 4. **C** 4; 2; 1; 3.
D 4; 3; 1; 2. **E** 2; 3; 1; 4.

PROBLEMA 14

Considere as soluções.

1. $\text{NaOH}(\text{aq}, 10 \mu\text{mol L}^{-1})$
2. $\text{NaNO}_2(\text{aq}, 0,2 \text{ mol L}^{-1})$
3. $\text{NH}_3(\text{aq}, 0,2 \text{ mol L}^{-1})$
4. $\text{NaCN}(\text{aq}, 0,2 \text{ mol L}^{-1})$

Assinale a alternativa que relaciona as soluções em ordem crescente de pH.

- A** 2; 4; 1; 3. **B** 3; 2; 1; 4. **C** 1; 4; 2; 3.
D 4; 2; 3; 1. **E** 2; 1; 3; 4.

PROBLEMA 15

O pH de 1 L de uma solução de ácido acético é 3. Deseja-se corrigir o pH da solução para 4 pela adição de água destilada.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do volume de água que deve ser adicionado à solução.

- A** 55 L **B** 87 L **C** 140 L **D** 220 L **E** 350 L

PROBLEMA 16

Considere uma solução $0,2 \text{ mol L}^{-1}$ de amônia. Deseja-se diminuir o pH da solução em uma unidade pela adição de água destilada.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do volume de água que deve ser adicionado à solução.

- A** 58 L **B** 93 L **C** 150 L **D** 240 L **E** 380 L

PROBLEMA 17

Considere soluções dos sais:

1. $\text{Ba}(\text{NO}_2)_2$
2. CrCl_3
3. NH_4NO_3
4. Na_2CO_3

Assinale a alternativa com a classificação correta das soluções, respectivamente.

- A** ácida; básica; ácida; básica.
B ácida; básica; básica; ácida.
C ácida; ácida; básica; básica.
D básica; ácida; básica; ácida.
E básica; ácida; ácida; básica.

PROBLEMA 18

Considere soluções dos sais:

1. AlCl_3
2. KNO_3
3. NH_4Br
4. KF

Assinale a alternativa com a classificação correta das soluções, respectivamente.

- A** neutro; básico; ácido; ácido.
B básico; ácido; ácido; neutro.
C neutro; ácido; ácido; básico.
D ácido; neutro; ácido; básico.
E ácido; ácido; neutro; básico.

PROBLEMA 19

Considere soluções dos sais:

1. KBr
2. AlCl_3
3. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$
4. $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$

Assinale a alternativa com a classificação correta das soluções, respectivamente.

- A** ácido; ácido; neutro; básico.
B básico; neutro; ácido; ácido.
C ácido; ácido; básico; neutro.
D ácido; básico; neutro; ácido.
E neutro; ácido; ácido; básico.

PROBLEMA 20

Considere soluções dos sais:

1. $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$
2. $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$
3. NaCH_3CO_2
4. FeCl_3

Assinale a alternativa com a classificação correta das soluções, respectivamente.

- A** ácido; ácido; neutro; básico.
B ácido; ácido; básico; neutro.
C neutro; ácido; básico; ácido.
D ácido; básico; neutro; ácido.
E neutro; básico; ácido; ácido.

PROBLEMA 21

Considere soluções dos sais:

1. K_3PO_4
2. K_2HPO_4
3. KHPO_3
4. KH_2PO_4

Assinale a alternativa que relaciona as soluções ácidas.

- A** 3 **B** 4 **C** 1 e 4 **D** 2 e 4 **E** 3 e 4

PROBLEMA 22

Considere soluções dos sais:

1. Na_2SO_3
2. NaHSO_3
3. Na_2SO_4
4. NaHSO_4

Assinale a alternativa que relaciona as soluções ácidas.

- A** 3 **B** 4 **C** 1 e 4 **D** 2 e 4 **E** 3 e 4

PROBLEMA 23

Considere soluções de mesma concentração dos nitratos de cátions metálicos.

Assinale a alternativa que relaciona as soluções em ordem crescente de pH.

- A** Al^{3+} ; Fe^{3+} ; K^+ ; Fe^{2+} ; Mg^{2+} .
B Al^{3+} ; K^+ ; Fe^{2+} ; Mg^{2+} ; Fe^{3+} .
C Al^{3+} ; Fe^{3+} ; Fe^{2+} ; Mg^{2+} ; K^+ .
D Fe^{3+} ; Fe^{2+} ; Al^{3+} ; K^+ ; Mg^{2+} .
E Mg^{2+} ; Al^{3+} ; Fe^{3+} ; Fe^{2+} ; K^+ .

PROBLEMA 24

Considere soluções de mesma concentração dos nitratos de cátions metálicos.

Assinale a alternativa que relaciona as soluções em ordem crescente de pH.

- A** Cr^{3+} ; K^+ ; Ni^{2+} ; Ca^{2+} ; Cu^{2+} .
B Cr^{3+} ; Cu^{2+} ; Ni^{2+} ; Ca^{2+} ; K^+ .
C Ni^{2+} ; Cr^{3+} ; Cu^{2+} ; K^+ ; Ca^{2+} .
D Cu^{2+} ; Ca^{2+} ; Cr^{3+} ; Ni^{2+} ; K^+ .
E Cu^{2+} ; Cr^{3+} ; Ni^{2+} ; K^+ ; Ca^{2+} .

PROBLEMA 25

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH de uma solução $0,2 \text{ mol L}^{-1}$ em nitrato de cobre (II).

- A** 1,8 **B** 2,3 **C** 3,1 **D** 4,1 **E** 5,4

Dados

$$\bullet K_a(\text{Cu}^{2+}) = 3,2 \times 10^{-8}$$

PROBLEMA 26

Assinale a alternativa que mais se aproxima da concentração de hidrônio em uma solução $0,07 \text{ mol L}^{-1}$ em cloreto de ferro (III).

- A** 14 mmol L^{-1} **B** 20 mmol L^{-1} **C** 29 mmol L^{-1}
D 41 mmol L^{-1} **E** 58 mmol L^{-1}

Dados

$$\bullet K_a(\text{Fe}^{3+}) = 0,0035$$

PROBLEMA 27

Considere uma solução $0,18 \text{ mol L}^{-1}$ de cloreto de amônio.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH da solução.

- A** 1,9 **B** 2,5 **C** 3,2 **D** 4,2 **E** 5,4

Dados

$$\bullet K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,8 \times 10^{-5}$$

PROBLEMA 28

Assinale a alternativa que mais se aproxima do grau de desprotonação de uma solução $0,01 \text{ mol L}^{-1}$ em cloreto de anilínio.

- A** 0,0036 % **B** 0,0055 % **C** 0,0084 %
D 0,013 % **E** 0,02 %

Dados

$$\bullet K_b(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2) = 4,3 \times 10^{-10}$$

PROBLEMA 29

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH de uma solução $0,09 \text{ mol L}^{-1}$ em acetato de cálcio.

- A 2,6 B 3,6 C 5,1 D 7,1 E 10

Dados

$$\bullet K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,8 \times 10^{-5}$$

PROBLEMA 30

Assinale a alternativa que mais se aproxima da concentração de ácido fluorídrico em uma solução $0,07 \text{ mol L}^{-1}$ em fluoreto de potássio.

- A $2,5 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ B $5,9 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$
C $1,4 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$ D $3,3 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$
E $7,9 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$

Dados

$$\bullet K_a(\text{HF}) = 3,5 \times 10^{-4}$$

PROBLEMA 31

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH de uma solução $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ em cianeto de amônio.

- A 3,4 B 4,7 C 6,6 D 9,2 E 13

Dados

$$\bullet K_a(\text{HCN}) = 4,9 \times 10^{-10} \quad \bullet K_b(\text{NH}_3) = 1,8 \times 10^{-5}$$

PROBLEMA 32

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH de uma solução $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ em acetato de piridínio.

- A 2,8 B 3,7 C 5,0 D 6,7 E 9,0

Dados

$$\bullet K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,8 \times 10^{-5} \quad \bullet K_b(\text{C}_5\text{H}_5\text{N}) = 1,8 \times 10^{-9}$$

PROBLEMA 33

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH de uma solução $0,05 \text{ mol L}^{-1}$ em ácido sulfúrico.

- A 0,56 B 0,68 C 0,83 D 1,0 E 1,2

Dados

$$\bullet K_{a2}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,012$$

PROBLEMA 34

Como o ácido sulfúrico, o ácido selênico é forte na primeira desprotonação e fraco na segunda. Uma solução $0,01 \text{ mol L}^{-1}$ em ácido selênico apresenta pH igual a 1,82.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da constante da segunda ionização do ácido selênico.

- A $7,6 \times 10^{-3}$ B $1,2 \times 10^{-2}$ C $1,9 \times 10^{-2}$
D $3,0 \times 10^{-2}$ E $4,8 \times 10^{-2}$

PROBLEMA 35

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH de uma solução $0,015 \text{ mol L}^{-1}$ em ácido fosfórico, H_3PO_4 .

- A 0,82 B 1,0 C 1,3 D 1,7 E 2,1

Dados

$$\bullet K_{a1}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 0,0076 \quad \bullet K_{a2}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6,2 \times 10^{-8}$$
$$\bullet K_a(\text{H}_3\text{PO}_4) = 2,1 \times 10^{-13}$$

PROBLEMA 36

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH de uma solução $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ em ácido sulfônico, H_2SO_3 .

- A 0,98 B 1,2 C 1,5 D 1,9 E 2,3

Dados

$$\bullet K_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 0,015 \quad \bullet K_{a2}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1,2 \times 10^{-7}$$

PROBLEMA 37

Considere uma solução $0,2 \text{ mol L}^{-1}$ de ácido sulfídrico, H_2S .

Assinale a alternativa que mais se aproxima da concentração de H_3O^+ , H_2S , HS^- e S^{2-} na solução, respectivamente.

- A $2,0 \times 10^{-1} \text{ M}$; $1,6 \times 10^{-4} \text{ M}$; $1,6 \times 10^{-4} \text{ M}$; $7,1 \times 10^{-15} \text{ M}$.
B $7,1 \times 10^{-15} \text{ M}$; $1,6 \times 10^{-4} \text{ M}$; $1,6 \times 10^{-4} \text{ M}$; $2,0 \times 10^{-1} \text{ M}$.
C $1,6 \times 10^{-4} \text{ M}$; $2,0 \times 10^{-1} \text{ M}$; $1,6 \times 10^{-4} \text{ M}$; $7,1 \times 10^{-15} \text{ M}$.
D $1,6 \times 10^{-4} \text{ M}$; $7,1 \times 10^{-15} \text{ M}$; $2,0 \times 10^{-1} \text{ M}$; $1,6 \times 10^{-4} \text{ M}$.
E $2,0 \times 10^{-1} \text{ M}$; $1,6 \times 10^{-4} \text{ M}$; $7,1 \times 10^{-15} \text{ M}$; $1,6 \times 10^{-4} \text{ M}$.

Dados

$$\bullet K_{a1}(\text{H}_2\text{S}) = 1,3 \times 10^{-7} \quad \bullet K_{a2}(\text{H}_2\text{S}) = 7,1 \times 10^{-15}$$

PROBLEMA 38

Considere uma solução $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ de glicina protonada, $^+\text{NH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da concentração de H_3O^+ , $^+\text{NH}_3\text{CH}_2\text{COO}^-$, $^+\text{NH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ e $\text{NH}_3\text{CH}_2\text{COOH}^-$ na solução, respectivamente.

- A** $2,2 \times 10^{-13} \text{ M}$; $0,045 \text{ M}$; $0,45 \text{ M}$; $0,045 \text{ M}$.
- B** $0,045 \text{ M}$; $0,045 \text{ M}$; $0,45 \text{ M}$; $2,2 \times 10^{-13} \text{ M}$.
- C** $0,045 \text{ M}$; $2,2 \times 10^{-13} \text{ M}$; $0,045 \text{ M}$; $0,45 \text{ M}$.
- D** $0,45 \text{ M}$; $2,2 \times 10^{-13} \text{ M}$; $0,045 \text{ M}$; $0,045 \text{ M}$.
- E** $0,045 \text{ M}$; $0,45 \text{ M}$; $0,045 \text{ M}$; $2,2 \times 10^{-13} \text{ M}$.

Dados

- $K_a(\text{C}_2\text{H}_6\text{NO}_2) = 0,0045$
- $K_b(\text{C}_2\text{H}_6\text{NO}_2) = 6 \times 10^{-5}$

PROBLEMA 39

Considere uma solução $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ de fosfato de sódio, Na_3PO_4 .

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH da solução.

- A** 5,1
- B** 7,1
- C** 10
- D** 14
- E** 20

Dados

- $K_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 0,015$
- $K_{a2}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1,2 \times 10^{-7}$

PROBLEMA 40

Considere uma solução $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ de fosfato de sódio, Na_3PO_4 .

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH da solução.

- A** 9,1
- B** 13
- C** 18
- D** 26
- E** 37

Dados

- $K_{a1}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 0,0076$
- $K_{a2}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6,2 \times 10^{-8}$
- $K_a(\text{H}_3\text{PO}_4) = 2,1 \times 10^{-13}$

PROBLEMA 41

Considere uma solução $0,15 \text{ mol L}^{-1}$ de ácido sulfuroso, H_2SO_3 . Um grande volume da solução foi tratado com base para ajustar o pH até 5,5.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da concentração de H_2SO_3 , HSO_3^- e SO_3^{2-} na solução, respectivamente.

- A** $3,2 \times 10^{-5} \text{ M}$; $0,14 \text{ M}$; $0,0054 \text{ M}$.
- B** $0,0054 \text{ M}$; $3,2 \times 10^{-5} \text{ M}$; $0,14 \text{ M}$.
- C** $3,2 \times 10^{-5} \text{ M}$; $0,0054 \text{ M}$; $0,14 \text{ M}$.
- D** $0,14 \text{ M}$; $0,0054 \text{ M}$; $3,2 \times 10^{-5} \text{ M}$.
- E** $0,14 \text{ M}$; $3,2 \times 10^{-5} \text{ M}$; $0,0054 \text{ M}$.

Dados

- $K_{a1}(\text{H}_2\text{S}) = 1,3 \times 10^{-7}$
- $K_{a2}(\text{H}_2\text{S}) = 7,1 \times 10^{-15}$

PROBLEMA 42

Considere uma solução 15 mmol L^{-1} de ácido fosfórico, H_3PO_4 . Um grande volume da solução foi tratado com base para ajustar o pH até 2,3.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da concentração de H_3PO_4 , H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} e PO_4^{3-} na solução, respectivamente.

- A** $9,5 \times 10^{-8} \text{ M}$; $6,4 \times 10^{-3} \text{ M}$; $3,5 \times 10^{-18} \text{ M}$; $8,6 \times 10^{-3} \text{ M}$.
- B** $6,4 \times 10^{-3} \text{ M}$; $8,6 \times 10^{-3} \text{ M}$; $9,5 \times 10^{-8} \text{ M}$; $3,5 \times 10^{-18} \text{ M}$.
- C** $3,5 \times 10^{-18} \text{ M}$; $6,4 \times 10^{-3} \text{ M}$; $8,6 \times 10^{-3} \text{ M}$; $9,5 \times 10^{-8} \text{ M}$.
- D** $3,5 \times 10^{-18} \text{ M}$; $9,5 \times 10^{-8} \text{ M}$; $6,4 \times 10^{-3} \text{ M}$; $8,6 \times 10^{-3} \text{ M}$.
- E** $6,4 \times 10^{-3} \text{ M}$; $3,5 \times 10^{-18} \text{ M}$; $8,6 \times 10^{-3} \text{ M}$; $9,5 \times 10^{-8} \text{ M}$.

Dados

- $K_{a1}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 0,0076$
- $K_{a2}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6,2 \times 10^{-8}$
- $K_{a3}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6,2 \times 10^{-13}$

PROBLEMA 43

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH de uma solução $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ em bicarbonato de sódio.

- A** 2,3
- B** 3,1
- C** 4,3
- D** 6,0
- E** 8,3

Dados

- $pK_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 6,4$
- $pK_{a2}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 10$

PROBLEMA 44

Assinale a alternativa que mais se aproxima do pH de uma solução $0,2 \text{ mol L}^{-1}$ em dihidrogenofosfato de sódio, NaH_2PO_4 .

- A** 2,0
- B** 2,6
- C** 3,5
- D** 4,7
- E** 6,2

Dados

- $pK_{a1}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 2,1$
- $pK_{a2}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 7,2$
- $pK_{a3}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 13$

Gabarito**Problemas**

- | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. D | 2. E | 3. A | 4. C | 5. B | 6. D |
| 7. A | 8. E | 9. B | 10. D | 11. E | 12. D |
| 13. A | 14. E | 15. B | 16. B | 17. E | 18. D |
| 19. E | 20. C | 21. B | 22. B | 23. C | 24. B |
| 25. D | 26. A | 27. C | 28. E | 29. E | 30. C |
| 31. D | 32. C | 33. E | 34. B | 35. E | 36. C |
| 37. C | 38. B | 39. C | 40. B | 41. A | 42. B |
| 43. E | 44. D | | | | |