

## CICLO DIAGNÓSTICO - FÍSICA

### **TURMA IME-ITA**




2022

### **GABARITO**

- 1. -
- 2. -
- 3. -
- 4. -
- 5. -

1ª QUESTÃO Valor: 2,00

A figura ilustra um experimento numa plataforma que, no referencial de um observador externo, se move com velocidade  $\vec{v}$  constante de módulo  $1.80 \times 10^8 \, \mathrm{m/s}$ . No instante inicial, uma fonte F emite um pulso de comprimento de onda  $\lambda = 500 \, \mathrm{nm}$  que incide sobre a placa metálica A, sendo por ela absorvido e, consequentemente, emitindo elétrons. De acordo com o observador externo, o tempo em que um elétron leva para chegar de A até B, que dista  $1 \, \mathrm{cm}$  de A, vale  $18.8 \, \mathrm{ns}$ .



# Observador

Determine o potencial de corte e a função trabalho da placa A, sabendo que o capacitor estava inicialmente descarregado.

Cabarita


2ª QUESTÃO Valor: 2,00

Um recipiente cilíndrico, isolado, localizado a nível do mar possui uma certa quantidade de um gás diatômico ocupando um volume de  $0,700\,\mathrm{m}^3$ . Inicialmente o cilindro se encontra deitado em equilíbrio estático, com seu êmbolo livre para se deslocar horizontalmente. O êmbolo, de massa  $m=5\,\mathrm{kg}$  e raio  $r=10\,\mathrm{cm}$ , é então levemente deslocado levemente, passando a realizar um movimento oscilatório. Determine o período de oscilação deste movimento.

#### Cabarita

3ª QUESTÃO Valor: 2,00

Um tubo em U contendo um líquido gira em torno do eixo z, indicado na figura, com velocidade angular de  $10 \, \mathrm{rad/s}$ . A distância d entre os dois ramos do tubo é de  $12 \, \mathrm{cm}$ , e ambos são abertos na parte superior.




Calcule a diferença de altura h entre os níveis atingidos pelo líquido nos dois ramos do tubo

#### Cabanita

4ª QUESTÃO Valor: 2,00


Uma lente biconvexa de raios iguais a R é posicionada na transição entre o vácuo e um meio de índice n=2.



Determine a posição da imagem final em relação à lente de um objeto posicionado a uma distância R desta. O material da lente possui um índice de refração igual a  $1,\!50$ .

Valor: 2,00

Quatro corpos pontuais de mesma massa m e carregados eletricamente formam um quadrado de lado L. Os corpos giram em torno do centro do quadrado com velocidade angular constante. Sendo k a constante eletrostática do meio, determine o período de rotação.



## Gabarito