

# Entropia

Gabriel Braun

Colégio e Curso Pensí, Coordenação de Química



## Nível I

### PROBLEMA 1.1

2B01

Um sistema **A** transfere, naturalmente, uma determinada quantidade de energia, na forma de calor, para um sistema **B**, que envolve totalmente **A**.

**Assinale** a alternativa *correta*.

- A** A entropia do Universo decrescerá.
- B** A entropia do sistema **A** crescerá.
- C** O aumento da entropia do sistema **B** será maior que o decréscimo da entropia do sistema **A**.
- D** O aumento da entropia do sistema **B** será menor que o decréscimo da entropia do sistema **A**.
- E** O aumento da entropia do sistema **B** será necessariamente igual ao decréscimo da entropia do sistema **A**.

### PROBLEMA 1.2

2B02

O termo *seta do tempo* é usado para distinguir uma direção no tempo nos fenômenos naturais, ou seja, que o estado 2 de um sistema macroscópico ocorre após o estado 1.

**Assinale** a alternativa *correta* a respeito de um processo que ocorre em sistema fechado.

- A**  $S_2$  é igual a  $S_1$ .
- B**  $S_2$  é maior que  $S_1$ .
- C**  $S_2$  é menor que  $S_1$ .
- D**  $S_2$  independe de  $S_1$ .
- E** A relação entre  $S_2$  e  $S_1$  depende do caminho percorrido entre os estados.

### PROBLEMA 1.3

2B03

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia da água quando 100 J são transferidos de forma reversível à água a 25 °C.

- A**  $-0,340 \text{ J K}^{-1}$
- B**  $-0,170 \text{ J K}^{-1}$
- C**  $0,0800 \text{ J K}^{-1}$
- D**  $0,170 \text{ J K}^{-1}$
- E**  $0,340 \text{ J K}^{-1}$

### PROBLEMA 1.4

2B04

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação na entropia da vizinhança no congelamento do mercúrio.

- A**  $-44 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- B**  $-22 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- C**  $-11 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- D**  $22 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- E**  $44 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

**Dados**

- $T_{\text{fus}}(\text{Hg}) = 249^\circ\text{C}$
- $\Delta H_{\text{fus}}(\text{Hg}) = 2,30 \text{ kJ mol}^{-1}$

### PROBLEMA 1.5

2B05

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia do gás quando 1 mol de um gás ideal monoatômico é aquecido reversivelmente de 300 K a 400 K sob pressão constante.

- A**  $-6 \text{ J K}^{-1}$
- B**  $-4 \text{ J K}^{-1}$
- C**  $-2 \text{ J K}^{-1}$
- D**  $4 \text{ J K}^{-1}$
- E**  $6 \text{ J K}^{-1}$

### PROBLEMA 1.6

2B06

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia do gás quando um cilindro de 20 L de gás nitrogênio sob 5 kPa é aquecido reversivelmente de 20 °C a 400 °C.

- A**  $-0,700 \text{ J K}^{-1}$
- B**  $-0,500 \text{ J K}^{-1}$
- C**  $0,500 \text{ J K}^{-1}$
- D**  $0,700 \text{ J K}^{-1}$
- E**  $0,900 \text{ J K}^{-1}$

**Dados**

- $C_p(\text{N}_2, \text{g}) = 29,1 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

## PROBLEMA 1.7

2B07

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia do gás quando 1 mol de nitrogênio se expande reversível e isotermicamente de 22 L a 44 L.

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b> $-6,70 \text{ J K}^{-1}$ | <b>B</b> $-4,70 \text{ J K}^{-1}$ |
| <b>C</b> $-2,70 \text{ J K}^{-1}$ | <b>D</b> $4,70 \text{ J K}^{-1}$  |
| <b>E</b> $5,70 \text{ J K}^{-1}$  |                                   |

## PROBLEMA 1.8

2B08

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia do gás quando um mol de oxigênio é rapidamente comprimido de 5 L a 1 L por um pistão e, no processo, sua temperatura aumentou de  $20^\circ\text{C}$  para  $25^\circ\text{C}$ .

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> $-13,4 \text{ J K}^{-1}$ | <b>B</b> $-13 \text{ J K}^{-1}$ |
| <b>C</b> $0,400 \text{ J K}^{-1}$ | <b>D</b> $13 \text{ J K}^{-1}$  |
| <b>E</b> $13,4 \text{ J K}^{-1}$  |                                 |

## Dados

- $C_p(\text{O}_2, \text{g}) = 29,4 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

## PROBLEMA 1.9

2B09

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia do gás quando a pressão de 1,50 mol de neônio diminui isotermicamente de 15 atm até 0,500 atm.

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b> $12 \text{ J K}^{-1}$ | <b>B</b> $22 \text{ J K}^{-1}$ |
| <b>C</b> $32 \text{ J K}^{-1}$ | <b>D</b> $42 \text{ J K}^{-1}$ |
| <b>E</b> $52 \text{ J K}^{-1}$ |                                |

## PROBLEMA 1.10

2B10

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia do gás quando a pressão de 70,9 g de gás metano aumenta isotermicamente de 7 kPa até 350 kPa.

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b> $-288 \text{ J K}^{-1}$ | <b>B</b> $-144 \text{ J K}^{-1}$ |
| <b>C</b> $-72 \text{ J K}^{-1}$  | <b>D</b> $144 \text{ J K}^{-1}$  |
| <b>E</b> $288 \text{ J K}^{-1}$  |                                  |

## PROBLEMA 1.11

2B11

A entalpia de fusão de uma determinada substância é  $200 \text{ kJ kg}^{-1}$ , e seu ponto de fusão normal é  $27^\circ\text{C}$ .

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia do sistema na fusão de 3 kg dessa substância.

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b> $-600 \text{ J K}^{-1}$ | <b>B</b> $-2 \text{ J K}^{-1}$ |
| <b>C</b> 0                       | <b>D</b> $2 \text{ J K}^{-1}$  |
| <b>E</b> $600 \text{ J K}^{-1}$  |                                |

## PROBLEMA 1.12

2B12

A entalpia de fusão de uma determinada substância é  $6 \text{ kJ mol}^{-1}$ , e seu ponto de fusão normal é  $-183^\circ\text{C}$ .

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia do sistema na fusão de 1 mol dessa substância.

- |  |  |
|--|--|
| <b>A</b> $-20 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ | <b>B</b> $-33 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ |
| <b>C</b> $50 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$  | <b>D</b> $67 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$  |
| <b>E</b> $100 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ |  |

## PROBLEMA 1.13

2B13

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima do ponto de ebulição do mercúrio.

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>A</b> $-272^\circ\text{C}$ | <b>B</b> $100^\circ\text{C}$ |
| <b>C</b> $395^\circ\text{C}$  | <b>D</b> $670^\circ\text{C}$ |
| <b>E</b> $1500^\circ\text{C}$ |                              |

## Dados

- $\Delta H_{\text{vap}}(\text{Hg}) = 60 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta S_{\text{vap}}(\text{Hg}) = 90 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

## PROBLEMA 1.14

2B14

A *Regra de Trouton* estabelece que a entropia molar de vaporização de líquidos em sua temperatura de ebulição é  $\Delta S_{\text{vap}} \approx 10,5 R = 87,2 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ .

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima do ponto de ebulição do éter metílico.

- |                |                |
|----------------|----------------|
| <b>A</b> 200 K | <b>B</b> 225 K |
| <b>C</b> 250 K | <b>D</b> 275 K |
| <b>E</b> 300 K |                |

## Dados

- $\Delta H_{\text{vap}}(\text{CH}_3\text{OCH}_3) = 21,5 \text{ kJ mol}^{-1}$

**PROBLEMA 1.15**

2B15

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da entropia residual do monóxido de carbono.

- |   |   |
|---|---|
| <b>A</b> 5,76 J K <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup> | <b>B</b> 11,5 J K <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup> |
| <b>C</b> 17,2 J K <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup> | <b>D</b> 23,1 J K <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup> |
| <b>E</b> 28,8 J K <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup> |   |

**PROBLEMA 1.16**

2B16

Considere as moléculas:

1. CO<sub>2</sub>
2. NO
3. N<sub>2</sub>O
4. Cl<sub>2</sub>

**Assinale** a alternativa que relaciona as moléculas com entropia residual não nula.

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>A</b> 2        | <b>B</b> 3        |
| <b>C</b> 2 e 3    | <b>D</b> 1, 2 e 3 |
| <b>E</b> 2, 3 e 4 |                   |

**PROBLEMA 1.17**

2B17

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia para a formação da amônia.

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> -400 J K <sup>-1</sup> | <b>B</b> -200 J K <sup>-1</sup> |
| <b>C</b> 100 J K <sup>-1</sup>  | <b>D</b> 200 J K <sup>-1</sup>  |
| <b>E</b> 400 J K <sup>-1</sup>  |                                 |

**Dados**

- $S^\circ(\text{H}_2, \text{g}) = 131 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- $S^\circ(\text{N}_2, \text{g}) = 192 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- $S^\circ(\text{NH}_3, \text{g}) = 192 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

**PROBLEMA 1.18**

2B18

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia para a decomposição do clorato de potássio formando perclorato e cloreto de potássio.

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b> -72,8 J K <sup>-1</sup> | <b>B</b> -36,4 J K <sup>-1</sup> |
| <b>C</b> -18,2 J K <sup>-1</sup> | <b>D</b> 18,2 J K <sup>-1</sup>  |
| <b>E</b> 36,4 J K <sup>-1</sup>  |                                  |

**Dados**

- $S^\circ(\text{KClO}_3, \text{s}) = 143 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- $S^\circ(\text{KClO}_4, \text{s}) = 151 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- $S^\circ(\text{KCl}, \text{s}) = 82,6 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

**PROBLEMA 1.19**

2B19

Considere os processos:

1. Cristalização de um sal.
2. Sublimação da naftalina.
3. Mistura de água e álcool.
4. Fusão do ferro.

**Assinale** a alternativa que relaciona os processos que ocorrem com aumento de entropia do sistema.

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>A</b> 2 e 3       | <b>B</b> 2 e 4    |
| <b>C</b> 3 e 4       | <b>D</b> 2, 3 e 4 |
| <b>E</b> 1, 2, 3 e 4 |                   |

**PROBLEMA 1.20**

2B20

Considere as reações:

1.  $\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{HCl}(\text{aq}) + \text{HClO}(\text{aq})$
2.  $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s}) \longrightarrow 3 \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$
3.  $\text{SO}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2 \text{HBr}(\text{aq})$
4.  $4 \text{NH}_3(\text{g}) + 5 \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 4 \text{NO}(\text{g}) + 6 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

**Assinale** a alternativa que relaciona as reações com variação positiva de entropia.

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>A</b> 2        | <b>B</b> 4        |
| <b>C</b> 2 e 4    | <b>D</b> 1, 2 e 4 |
| <b>E</b> 2, 3 e 4 |                   |

## Nível II

### PROBLEMA 2.1

2B21

Assinale a alternativa *incorreta*.

- A A variação de energia interna é nula na expansão de um gás ideal a temperatura constante.
- B A variação de energia interna positiva em um processo endotérmico a volume constante.
- C A variação de entalpia é nula em um processo cíclico.
- D A variação de entropia é positiva em um processo endotérmico a pressão constante.
- E A variação de entropia é nula quando um gás ideal sofre expansão livre.

### PROBLEMA 2.2

2B23

Considere as proposições:

1. A entropia do HBr é maior que a do HF a 298 K.
2. A entropia da amônia é maior que a do neônio a 298 K.
3. A entropia do ciclopentano é maior que a do pent-1-eno a 298 K.
4. A entropia do ciclobutano é maior que a do cicloexano a 298 K.

Assinale a alternativa que relaciona as proposições *corretas*.

- |               |            |
|---------------|------------|
| A 1 e 2       | B 1 e 4    |
| C 2 e 4       | D 1, 2 e 4 |
| E 1, 2, 3 e 4 |            |

### PROBLEMA 2.3

2B24

Considere os processos:

1. Conversão de grafite e diamante
2. Supersaturação de uma solução saturada.
3. Cristalização de um sólido amorfo.
4. Adsorção do nitrogênio em sílica.

Assinale a alternativa que relaciona os processos que ocorrem com diminuição de entropia do sistema.

- |               |            |
|---------------|------------|
| A 1 e 3       | B 1 e 4    |
| C 3 e 4       | D 1, 3 e 4 |
| E 1, 2, 3 e 4 |            |

### PROBLEMA 2.4

2B22

Um recipiente de paredes adiabáticas contém duas amostras de água pura separadas por uma parede também adiabática e de volume desprezível. Uma das amostras consiste em 54 g de água a 25 °C e, a outra, em 126 g a 75 °C. A parede que separa as amostras é retirada e que as amostras de água se misturam até atingir o equilíbrio.

Considere as proposições:

1. A temperatura da mistura no equilíbrio é de 323 K.
2. A variação de entalpia no processo é nula.
3. A variação de energia interna no processo é nula.
4. A variação de entropia no processo é nula.

Assinale a alternativa que relaciona as proposições *corretas*.

- |            |            |
|------------|------------|
| A 2        | B 3        |
| C 2 e 3    | D 1, 2 e 3 |
| E 2, 3 e 4 |            |

### PROBLEMA 2.5

2B25

Considere as proposições:

1. A variação da entropia independe da quantidade de gás presente no sistema.
2. Se a transformação é isotérmica, a variação da entropia é dada por:

$$\Delta S = -nR \ln \left( \frac{P_2}{P_1} \right)$$

3. Se a transformação é isobárica, a variação de entropia é dada por:

$$\Delta S = nC_p \ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right)$$

4. Se o sistema realiza um processo cíclico, a variação de entropia é positiva.

Assinale a alternativa que relaciona as proposições *corretas*.

- |         |         |
|---------|---------|
| A 2     | B 3     |
| C 1 e 3 | D 2 e 3 |
| E 3 e 4 |         |


### PROBLEMA 2.6

2B27

Um bloco de gelo a 0 °C é colocado em contato com um recipiente fechado que contém vapor de água a 100 °C e 1 atm. Após algum tempo, separa-se o bloco de gelo do recipiente fechado. Nesse instante 25 g de gelo foram convertidos em água líquida a 0 °C e que no recipiente fechado existe água líquida e vapor em equilíbrio.

Determine a variação de entropia do bloco de gelo.

Moléculas diatômicas idênticas, na forma de um sólido cristalino, podem ser modeladas como um conjunto de osciladores.



1. À temperatura de 0K a maioria dos osciladores estará no estado vibracional fundamental, cujo número quântico vibracional é zero.
2. À temperatura de 0K todos os osciladores estarão no estado vibracional fundamental, cujo número quântico vibracional é zero.
3. O movimento vibracional cessa a 0K.
4. O princípio da incerteza de Heisenberg será violado se o movimento vibracional cessar.

**Assinale** a alternativa que relaciona as proposições *corretas*.

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>A</b> 2        | <b>B</b> 4        |
| <b>C</b> 2 e 4    | <b>D</b> 1, 2 e 4 |
| <b>E</b> 2, 3 e 4 |                   |

Considere a vaporização de 1 mol de água a 85 °C e 1 bar.

- a. **Determine** a variação de entropia do sistema.
- b. **Determine** a variação de entropia da vizinhança.
- c. **Determine** a variação entropia do universo.

**Dados**

- $S_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = 40,6 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $C_p(\text{H}_2\text{O, g}) = 33,6 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- $C_p(\text{H}_2\text{O, l}) = 75,3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Um motor de 3 L contendo gás nitrogênio a 18,5 °C foi comprimido rapidamente até 500 mL por um pistão. A temperatura do gás aumentou para 28,1 °C.

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia do gás.

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b> $-14,3 \text{ J K}^{-1}$ | <b>B</b> $-7,10 \text{ J K}^{-1}$ |
| <b>C</b> 0                        | <b>D</b> $7,10 \text{ J K}^{-1}$  |
| <b>E</b> $14,3 \text{ J K}^{-1}$  |                                   |

Considere a vaporização de 1 mol de acetona a 296 K e 1 bar.

- a. **Determine** a variação de entropia do sistema.
- b. **Determine** a variação de entropia da vizinhança.
- c. **Determine** a variação entropia do universo.

**Dados**

- $C_p(\text{acetona, l}) = 127 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- $T_{\text{eb}}(\text{acetona}) = 329 \text{ K}$
- $\Delta H_{\text{vap}}(\text{acetona}) = 29,1 \text{ kJ mol}^{-1}$

Um dispositivo utiliza radiação solar para quantificar variações em propriedades termodinâmicas. Este dispositivo é composto por uma lente convergente e por um porta-amostras. A lente possui área útil de 80 cm<sup>2</sup>, absortividade,  $\alpha = 20\%$  e transmissividade,  $\tau = 80\%$ . O porta-amostras possui absortividade de 100% e volume variável, operando à pressão constante de 1 atm.

Em um procedimento experimental, injetou-se 0,100 mol de uma substância pura líquida no porta-amostras do dispositivo. Em seguida, mediu-se um tempo de 15 min. para a vaporização total da amostra, durante o qual a irradiação solar permaneceu constante e igual a 750 W m<sup>2</sup>. Nesse processo, a temperatura do porta-amostras estabilizou-se em 351 K.

**Assinale** a alternativa que mais se aproxima da variação de entropia molar de vaporização do líquido.

- |   |   |
|---|---|
| <b>A</b> $2,30 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ | <b>B</b> $15,4 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ |
| <b>C</b> $123 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$  | <b>D</b> $154 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$  |
| <b>E</b> $90 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$   |   |

# Gabarito

## Nível I

- |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. <b>C</b>  | 2. <b>D</b>  | 3. <b>E</b>  | 4. <b>E</b>  | 5. <b>E</b>  |
| 6. <b>D</b>  | 7. <b>E</b>  | 8. <b>B</b>  | 9. <b>D</b>  | 10. <b>D</b> |
| 11. <b>B</b> | 12. <b>D</b> | 13. <b>D</b> | 14. <b>C</b> | 15. <b>B</b> |
| 16. <b>C</b> | 17. <b>B</b> | 18. <b>B</b> | 19. <b>D</b> | 20. <b>C</b> |

## Nível II

1. **E**
2. **D**
3. **D**
4. **C**
5. **B**
6.  $8,10 \text{ J K}^{-1}$
7. **C**
8.
  - a.  $111 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
  - b.  $115 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
  - c.  $-4 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
9. **E**
10.
  - a.  $98,3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
  - b.  $108 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
  - c.  $-10,4 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
11. **C**