Atomic and AND retention

Model	Endpoint	Scope	R_all - reduced_LR	Loss boundary	Frozen decision
Qwen	atomic	Pooled	-0.000104 [-0.000284, -0.000007]	-0.005000	Supported
Qwen	AND	Pooled	0.030830 [0.020520, 0.042241]	-0.020000	Supported
Qwen	atomic	Five-topic macro	-0.000356 [-0.001213, -0.000002]	-0.005000	Supported
Qwen	AND	Five-topic macro	0.044505 [0.023995, 0.071964]	-0.020000	Supported
Llama	atomic	Pooled	0.000031 [-0.000040, 0.000151]	-0.005000	Supported
Llama	AND	Pooled	0.032782 [0.025637, 0.041342]	-0.020000	Supported
Llama	atomic	Five-topic macro	0.000197 [-0.000247, 0.001802]	-0.005000	Supported
Llama	AND	Five-topic macro	0.008153 [0.003337, 0.013167]	-0.020000	Supported

R_all minus frozen reduced-training canonical LR on E; sample-mean paired pointwise conditional 95% intervals.
Atomic retention requires the lower bound >= -0.005; AND requires >= -0.020, at both scopes.
Qwen atomic differences remain negative. Retention within a margin does not establish zero loss.