

# **Chap 4. 확률(probability)**

**Ho Sun Shon**

# 목 차

- 생활속에서 만나는 확률이야기
- 표본 공간
- 확률
- 확률의 법칙
- 조건부 확률
- 독립사건
- 베이즈 정리

# 생활속에서 만나는 확률이야기

- 로또에 당첨될 확률
- 야구 경기에서 특정팀이 승리 할 확률
- 흡연자가 폐암에 걸릴 확률
- 집값이 오를 확률
- 일기 예보(비 올 확률이 60%), 우산을 가지고 갔을 때 불편 때문에 생긴 손실  $m$ , 우산을 가지고 가지 않았을 때 손실을  $r$  이라 할 때

표 4.1 의사결정과 예상손실

의사결정	예상손실
우산을 가져간다	$m$
우산을 가져가지 않는다	$0.6 \times r + 0.4 \times 0 = 0.6r$

- ❖  $m < 0.6r$  이면 우산을 가져간다.
- ❖  $m > 0.6r$  이면 내일 우산을 가져가지 않는다
- ❖  $m = 0.6r$  이면 내일 우산을 가져가도 되고 가져가지 않아도 된다

# 표본 공간 (sample space)

## ➤ 통계적 시행(trial) 또는 통계적 실험(experiment)

- ❖ 어떠한 시행이 수행될 때 일어날 수 있는 가능한 결과들 중 한가지 결과가 나타나며 그 시행을 수행하기 전에는 어떤 결과가 나올 지 모름

## ➤ 표본공간(sample space)

- ❖ 통계적 실험을 통해 일어날 수 있는 모든 가능한 결과들의 집합
- ❖ 예제1: 동전을 두 번 던질 때 표본공간?
- ❖ 예제2: 동전의 앞면이 나올 때까지 던질 때 표본공간?
- ❖ 예제3: 암환자가 치료를 받은 후 생존시간을  $t$ 라 할 때, 생존시간에 대한 표본 공간?  $S = \{t | t > 0\}$

# 표본 공간 (sample space)

- 이산 표본공간(Discrete sample space)
  - ❖ 표본공간을 구성하는 원소들을 셀 수 있는 경우
- 연속 표본공간(Continuous sample space)
  - ❖ 표본공간을 구성하는 원소들을 셀 수 없는 경우
- 사건(event)
  - ❖ 표본공간의 부분집합
  - ❖ 단순사건: 표본공간 안에서 단하나만의 결과를 갖는 사건
- 배반(mutually exclusive)
  - ❖  $A \cap B = \emptyset$

# 문제 1

- 동전을 3번을 던질 때 표본공간은?
  - ❖  $S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, TTH, THT, TTT\}$
- 주사위를 2번 던지는 실험에서
  - ❖ 주사위를 2번 던질 때 표본공간을 구하면?
  - ❖ 두 주사위의 합이 5가 될 확률은?
  - ❖ 두 주사위의 합이 2이하가 될 확률은?

# 확률 (Probability)

➤ 여러 가지 가능한 결과 중 하나가 일어나는 실험에서, 그 중 일부가 일어날 가능성을 0과 1 사이의 값으로 나타낸 것

➤ 고전적 확률(수학적 확률)

❖ 표본공간 안의  $n$ 개의 원소들이 일어날 가능성은 모두 같고 그 가운데 반드시 한 개는 일어 날 때

$$P(A) = \frac{\text{사건 } A \text{에 속하는 모든 원소의 개수}}{\text{표본공간 안의 모든 원소의 개수}}$$

❖ 예제 4.4

- 사건  $A$ 를 주사위를 던졌을 때 짝수의 눈이 나올 확률
- 예제: 사건  $B$ 를 45개 숫자 가운데 임의의 6개의 숫자를 골라내는 것이라 할 때 사건  $B$ 의 확률은?

# 확률 (Probability)

## ➤ 상대도수의 극한적 개념의 확률(통계적 확률)

- ❖ 예: 임의로 선택한 학부생이 승용차를 소유하고 있을 확률
- ❖ 예: 한 공장에서 생산되는 컴퓨터의 특정 부품의 불량률
- ❖ 상대도수의 극한적 개념을 이용하여 확률을 정의
- ❖ 통계적 실험을 무한히 반복했을 때 사건 A가 n번 일어난 상대도수를 의미

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#(A)}{n}$$

- ❖ n= 시행횟수, #(A)=n번 시행 중 사건 A가 일어나는 횟수



# 확률 (Probability)

- 예제 4.5: 앞면과 뒷면이 있는 정상적인 동전 한 개를 던질 때, 동전의 앞면이 나타날 확률을 상대 도수의 극한 개념을 사용하여 구하여라.




그림 4.1 동전을 10,000번 던졌을 때 앞면이 나타날 확률

# 확률 (Probability)

## ➤ 주관적 확률

- ❖ 개인의 경험이나 지식에 근거한 추측 또는 간접경험에 의하여 의사결정자가 주관적으로 정의
- ❖ 예:
  - 어떤 유명 가수가 전국 투어 공연에서 일정액의 흥행수익을 올릴 확률
  - 주식에서 일정기간 투자하여 원하는 수익을 달성 할 확률

# 확률의 법칙

## ➤ 확률의 공리

- ❖ 모든 사건(표본공간)의 임의 사건  $A$ 에 대하여  $0 \leq P(A) \leq 1$
- ❖  $P(S) = 1$
- ❖ 사건  $A_1, A_2, \dots$  가 서로 배반일 때 (즉, 서로 다른  $i, j$ 에 대하여  $A_i \cap A_j = \emptyset$ )

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

- ❖ 여사건의 확률
  - $P(A^c) = 1 - P(A)$

# 여사건 (Complement Event)

## ➤ 예제 4.6

### ❖ 타이타닉호의 생존 여부

표 4.2 타이타닉호의 참사현황


생존 여부	계층				합계
	1등석	2등석	3등석	승무원	
생존	202	118	178	212	710
사망	123	167	528	673	1,491
합계	325	285	706	885	2,201

❖ 임의의 한 사람을 선택 했을 때 생존 할 확률:  $P(A)$

❖ 임의의 한 사람을 선택 했을 때 사망 할 확률:  $1-P(A)$

# 확률의 덧셈 정리

➤  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$



➤ 예제 4.7


❖ 총 2,201명의 사람들 중 임의로 선택한 사람이 생존하거나 승무원일 확률은?

❖  $P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C) = \frac{710}{2201} + \frac{885}{2201} - \frac{212}{2201} = 0.6284$

# 조건부 확률 (Conditional Probability)

- 사건 B가 발생했다는 정보가 주어졌을 때, 사건 A가 발생할 확률을 조건부확률이라고 하며  $P(A|B)$ 라고 나타냄
- 일반적으로 아무런 정보가 없는 상태에서 사건 A가 발생할 확률  $P(A)$ 와 사건 B가 발생했다는 조건 하에서 사건 A가 발생할 조건부확률인  $P(A|B)$ 은 같지 않음

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



# 조건부 확률 (Conditional Probability)

## ➤ 예제 4.8:

표 4.2 타이타닉호의 참사현황

생존 여부	계층				합계
	1등석	2등석	3등석	승무원	
생존	202	118	178	212	710
사망	123	167	528	673	1,491
합계	325	285	706	885	2,201

(1) 총 2,201명 가운데서 임의로 선택한 사람이 1등석 승객이면서 생존할 확률

$$❖ P(A \cap B) = \frac{202}{2201} \approx 0.0918$$

(2) 1등석 승객 중 임의로 선택한 사람이 생존할 확률(1등석 승객:  $A_1$ , 생존사건: B)

$$❖ P(B|A_1) = \frac{P(B \cap A_1)}{P(A_1)} = \frac{202/2201}{325/2201} = 0.6215$$

# 조건부 확률 (Conditional Probability)

## ➤ 예제 4.8:

(3) 생존 한 사람 중 임의로 선택한 사람이 1등석 승객일 확률

$$P(A_1|B) = \frac{\frac{202}{2201}}{\frac{710}{2201}} = 0.2845$$

(4) 총 2201명 가운데서 임의로 선택한 사람이 3등석 승객이면서 생존할 확률

$$P(A_3 \cap B) = \frac{178}{2201} = 0.0809$$

(5) 3등석 승객 중 임의로 선택한 사람이 생존 할 확률

$$P(B|A_3) = \frac{P(B \cap A_3)}{P(A_3)} = \frac{\frac{178}{2201}}{\frac{706}{2201}} = 0.2521$$

(6) 생존한 사람이 임의로 선택한 사람이 3등석 승객일 확률

$$P(A_3|B) = \frac{P(A_3 \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{178}{2201}}{\frac{710}{2201}} = 0.2507$$



# 조건부 확률 (Conditional Probability)

- (7) (1)번부터 (6)번 까지를 통하여 알 수 있는 사실은 무엇인가?
  - ❖ 모든 계층의 생존 비율(사망 비율)이 비슷한가?
  - ❖ 상류층의 생존비율(62.15%)과 하류층의 생존비율(25.07%)이 다른 것을  
확인 할 수 있음

# 문제 1

➤ 문제) 어느 회사의 직원 100명 중에서 성별과 흡연 여부에 따른 분할표

	흡연	비흡연	합계
남	30	30	60
녀	15	25	40
합계	45	55	100

- ❖ 임의로 한 명을 선택할 때, 선택된 사람이 흡연자일 확률은? 선택된 사람이 남성이라는 정보가 주어졌을 때, 이 사람이 흡연자일 확률은?
- ❖ A: 선택된 사람이 흡연자인 사건  
B: 선택된 사람이 남성인 사건

# 문제 2

➤ 예) 어느 회사 직원을 체중과 혈압에 따른 비율

	비만	정상	정상 이하	합계
고혈압	0.10	0.08	0.02	0.20
정상 혈압	0.15	0.45	0.20	0.80
합계	0.25	0.53	0.22	1.00

- ❖ 한 명을 임의 추출할 때, 이 사람이 고혈압일 확률은?
- ❖ 임의로 선택된 사람이 비만일 때, 이 사람이 고혈압일 확률은?
- ❖ A: 선택된 사람이 고혈압인 사건  
B: 선택된 사람이 비만인 사건

# 확률의 곱셈정리

➤ 조건부확률을 이용하면

$$\begin{aligned}P(A \cap B) &= P(B)P(A|B): \text{곱사건의 확률법칙} \\ &= P(A)P(B|A)\end{aligned}$$

➤ 표본공간  $S$ 에서 정의되는 사건을  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$

$$P(A_1 A_2 A_3 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 A_3 \cdots A_{n-1})$$

$$\text{where, } A_1 A_2 A_3 \cdots A_k = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \cdots \cap A_k$$

➤ 확률의 곱셈정리: 표본공간  $S$  안의 두 사건  $A$ 와  $B$ 가 일어난다면  
교사건의 확률  $P(A \cap B)$ 에 대해 다음이 성립

$$P(A \cap B) = \begin{cases} P(A)P(B|A): & P(A) > 0 \\ P(B)P(A|B): & P(B) > 0 \end{cases}$$

# 확률의 곱셈정리

## ➤ 예제 4.9

❖ 한 방에 모여 있는 사람의 수를  $N$ 이라 할 때 서로 같은 생일을 갖게 될 확률을 구하라.(1년을 365일로 가정)

❖  $P(N\text{명의 생일이 서로 다른 사건}) = \frac{365 \times 364 \times 363 \cdots \times (365 - N + 1)}{365^N}$

❖  $P(N\text{명 가운데 최소한 두 명이 같은 생일을 갖는다})$

❖  $= 1 - P(N\text{명의 생일이 서로 다르다}) = 1 - \frac{365 \times 364 \times 363 \cdots \times (365 - N + 1)}{365^N}$

표 4.3  $N$ 명이 있을 때 서로 같은 생일을 갖게 될 확률

N	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
P	0.027	0.117	0.253	0.411	0.569	0.706	0.814	0.891	0.941	0.970	0.986	0.994	0.998	0.9990	0.9997

# 확률의 곱셈정리




그림 4.3  $N$ 명이 있을 때 서로 같은 생일을 갖게 될 확률

# 확률의 곱셈정리

➤ 예제: 남학생 7명과 여학생 5명으로 이루어진 모임에서 임의로 2명을 선택할 때, 두 사람 모두 남학생일 확률은?

$$1. \frac{\binom{7}{2}}{\binom{12}{2}} = \frac{7 \times 6 / 2}{12 \times 11 / 2} = \frac{7 \times 6}{12 \times 11}$$

2. A: 두 번째로 선택된 학생이 남학생인 사건

B: 첫 번째로 선택된 학생이 남학생인 사건

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B) = \frac{7}{12} \times \frac{6}{11} = \frac{7 \times 6}{12 \times 11}$$

# 문제 3

- 한 학생이 동전을 던져 공부를 하러 학교에 갈 것인가( $S$ ) 아니면 영화를 보러 갈 것인가( $M$ )를 결정하고 공부하게 되면  $A, B, C$  과목 중 하나를 임의로 선택하여 공부하고, 영화는  $D, E$  프로 중 하나를 임의로 선택하여 보기로 하였다. 이 학생이  $C$  과목을 공부할 확률은?



# 독립사건 (Independent Event)

➤ 두 사건 A와 B에 대하여  $P(A|B) = P(A)$ 이 성립한다면, 이는 어떤 의미인가?

- ❖ 사건 A가 발생할 확률과 사건 B가 발생했다는 조건 하에서 사건 A가 발생할 조건부확률이 같다.
- ❖  $P(A|B) = P(A)$ 이 성립하면  $P(A|B^c) = P(A)$ 도 성립한다.
- ❖ 사건 A가 발생할 확률은 사건 B가 발생하든 발생하지 않든 상관없이 같은 값을 가진다.
- ❖ 사건 B가 발생했다는 정보가 사건 A의 확률을 구하는데 영향을 주지 않는다.
- ❖ 사건 A와 사건 B는 서로 영향을 주지 않는다.

# 독립사건 (Independent Event)

➤ 두 사건 A와 B에 대하여

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

가 성립할 때, 사건 A와 사건 B는 서로 독립(independent)

$$\text{➤ } P(A|B) = P(A) \Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

## 독립사건

표본공간  $S$  안의 두 사건  $A$ 와  $B$ 가  $P(A) > 0$ ,  $P(B) > 0$ 이며, 다음 식이 성립하면 두 사건  $A$ 와  $B$ 는 서로 독립이라고 한다.

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

# 독립사건 (Independent Event)

➤ 예) 성별과 길거리 금연에 대한 찬반 의견 조사

	금연 찬성	금연 반대	합계
남	24	16	40
녀	14	6	20
합계	38	22	60

➤ 이 중에서 임의로 한 명을 선택할 때,

M = 선택된 사람이 남성인 사건

A = 선택된 사람이 금연에 찬성할 사건

$$\text{➤ } P(M) = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}, P(A) = \frac{38}{60} = \frac{19}{30} \Rightarrow P(M \cap A) = \frac{24}{60} = \frac{2}{5}$$


→  $P(M \cap A) \neq P(M)P(A)$  이므로 A와 M은 독립이 아니다.

혹은  $P(A) = \frac{38}{60}, P(A|M) = \frac{24}{40}$ 로 서로 다르므로 A와 M은 독립이 아니다

# 베이즈 정리 [Bayes' theorem]

## ➤ 분할 (partition)

- ❖ 표본공간  $S$  안에서  $n$ 개의 사건  $B_1, B_2, \dots, B_n$  가 서로 배반이고,
- ❖  $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S$ 일 때, 즉  $B_1, B_2, \dots, B_n$ 이 표본공간을 분할



(1) 임의의  $i$ 와  $j$ 에 대하여  $P(B_i \cap B_j) = 0$


$$(2) \bigcup_{i=1}^n B_i = S$$

# 베이즈 정리 [Bayes' theorem]

## ➤ 전확률 (total probability)

❖ N개의 배반사건  $B_1, B_2, \dots, B_n$ 이 표본공간  $S$ 를 분할 할 때 임의의 사건  $A$ 의 전확률 (total probability)을 다음과 같이 표현

$$\begin{aligned}\diamond P(A) &= P((B_1 \cap A) \cup \dots \cup (B_n \cap A)) \\ &= P(B_1 \cap A) + \dots + P(B_n \cap A) \\ &= P(B_1)P(A|B_1) + \dots + P(B_n)P(A|B_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)\end{aligned}$$




# 베이즈 정리 [Bayes' theorem]

➤  $n$  개의 배반사건  $B_1, B_2, \dots, B_n$ 이 표본공간  $S$ 를 분할 할 때, 임의의 사건  $A$ 가 주어진다면, 특정한 사건  $B_j$ 로 부터 나왔을 확률  $P(B_j|A)$  ?

➤  $P(B_j|A) = ?$

$$\begin{aligned} P(B_j|A) &= \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{P(A)} \\ &= \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)} \end{aligned}$$



$$= \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + \dots + P(B_n)P(A|B_n)}$$

➤ 특정한 사건  $P(B_j)$ 를 사전확률(prior probability)

➤  $A$ 가 주어졌을 때  $B_j$ 로 부터 나왔을 확률  $P(B_j|A)$ 를 사후확률(posterior probability)

# 베이즈 정리 [Bayes' theorem]

- 예제 4.11: 세 개의 상자에 반도체들이 들어 있다. 첫 번째 상자에 있는 20개의 반도체 가운데 5개가 불량품이고, 두 번째 상자에 있는 30개의 반도체 가운데 3개가 불량품이며, 세 번째 상자에 있는 50개의 반도체 가운데에 12개가 불량품이다.
- 1) 상자 중 임의로 하나의 반도체를 선택 했을 때, 반도체 하나를 골라내어 검사한 결과 불량품일 확률을 계산하여라.
  - 2) 1)에서 검사한 반도체가 불량품 일 때 첫번째 상자에서 나왔을 확률을 계산하여라.

# 베이즈 정리 [Bayes' theorem]

## ➤ 각 상자를 B라 할 때

- 첫 번째 상자:  $P(B_1) = \frac{20}{100}$
- 두 번째 상자:  $P(B_2) = \frac{30}{100}$
- 세 번째 상자:  $P(B_3) = \frac{50}{100}$

## ➤ 불량품인 사건을 A라 하면

- 첫 번째 상자의 불량품 확률:  $P(A|B_1) = \frac{5}{20}$
- 두 번째 상자의 불량품 확률:  $P(A|B_2) = \frac{3}{30}$
- 세 번째 상자의 불량품 확률:  $P(A|B_3) = \frac{12}{50}$

$$\begin{aligned} \text{➤ } P(A) &= P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3) \\ &= \left(\frac{20}{100} \times \frac{5}{20}\right) + \left(\frac{30}{100} \times \frac{3}{30}\right) + \left(\frac{50}{100} \times \frac{12}{50}\right) = 0.2 \end{aligned}$$

$$\text{➤ } P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)} = 0.25$$



# 문제 4

## ➤ 문제 4

❖ 어느 회사의 공장  $A_1, A_2, A_3$ 에서 주기관(motherboard)의 30%, 50%, 20%를 생산한다. 공장  $A_1, A_2, A_3$ 의 불량률이 각각 2%, 1%, 5%이다.

1. 이 회사제품 중 임의로 하나를 선택하였을 때, 이 제품이 불량일 확률은?
2. 선택된 제품이 불량일 때, 이 제품이 공장  $A_2$ 에서 생산되었을 확률은?

# 요약

- 표본공간
- 확률, 확률의 법칙
- 조건부 확률
- 독립사건
- 베이즈 정리