



IMPACTO DE LAS REACCIONES ADVERSAS EN LA FIDELIZACIÓN DE DONANTES DE SANGRE

Jorge Pérez-Piñeiro¹, Jorge Pagán Ortiz², Antonia María Gómez Simón²,
María José Candela García², Tzu Hua Chen Liang², María Luisa Lozano Almela², Josué Pagán¹

¹Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. ²Centro Regional de Hemodonación, Murcia.




FIDELIZACIÓN TRAS REACCIONES ADVERSAS



- 6.7% de los donantes nuevos no fidelizados encuestados aluden una reacción adversa como razón para no haber vuelto a donar (enc. 2024)
- 28566 nuevos donantes no vuelven → **hipotéticas 1914** reacciones
- **Solo se reportan 415** reacciones adversas de donantes nuevos

CONCIENCIACIÓN DE LOS PROFESIONALES

- Hay un infraregistro de reacciones adversas (RA)
- Se notifican más RA generales (RAG) e intensas que locales (RAL)



Análisis de cómo las Reacciones Adversas locales (RAL) o generales (RAG) afectan a la probabilidad de que un donante regrese según perfiles de riesgo

MATERIALES Y MÉTODOS

1 Descriptivo retrospectivo de RA notificadas

- ✓ 8 años: 2016-2023
- ✓ 1259 RA de 1246 donantes → 157 RA/ año

2 Reacciones adversas locales (RAL)

- ✓ Hematoma, lesión nerviosa, dolor brazo, irritación...

3 Reacciones adversas generales (RAG)


- ✓ Reacción vaso-vagal con/sin pérdida de consciencia inmediata o retardada

4 Tipos de colectas:

- ✓ Habituales, centros educativos, empresas,, maratones/colectivos y puntos fijos

5 Edades:

- ✓ 3 rangos de edad: <30, 30-55, >55





IMPACTO DE LAS REACCIONES ADVERSAS EN LA FIDELIZACIÓN DE DONANTES DE SANGRE

Jorge Pérez-Piñeiro¹, Jorge Pagán Ortiz², Antonia María Gómez Simón²,
María José Candela García², Tzu Hua Chen Liang², María Luisa Lozano Almela², Josué Pagán¹

¹Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. ²Centro Regional de Hemodonación, Murcia.


¿Cómo son las reacciones adversas, a qué grupo le afecta más y dónde se producen?



RA General: 76.5%



RA Local: 23.5%



Mujeres.

65.0% de las RA se dieron en mujeres (p=0.001)



Menores de 30 años.

50.2% de todas las RA en jóvenes (p<0.001)

Con más donaciones previas.

>55 años→0.25/año; <30 años→0.11/año (p=0,002)




RAG en jóvenes.

55.6% de las RAG en jóvenes (p<0.001)


Colectas habituales.

44.9% de las RA en colectas habituales (p=0.020)


Distribución de reacciones por tipo de donante




Distribución de reacciones por rango de edad



Distribución de reacciones por sexo



Distribución de reacciones por tipo de colecta






IMPACTO DE LAS REACCIONES ADVERSAS EN LA FIDELIZACIÓN DE DONANTES DE SANGRE

Jorge Pérez-Piñero¹, Jorge Pagán Ortiz², Antonia María Gómez Simón²,
María José Candela García², Tzu Hua Chen Liang², María Luisa Lozano Almela², Josué Pagán¹

¹Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. ²Centro Regional de Hemodonación, Murcia.

¿Cómo es el retorno del donante?




Por Sexo ($p=0.592$)

Hombres	(prob retorno a 5 años: 55.0%)	1254 días
Mujeres	(prob retorno a 5 años: 56.8%)	1141 días

Por Edad ($p=0.074$)

30-55 años	850 días (Retorno más rápido)
>55 años	(prob ret. 5 años: 54.8%) 920 días
<30 años	(prob retorno a 5 años: 56.5%) 1435 días (Demora crítica)

Retorno según tipo de reacción



Conclusiones

Se debe actuar sobre:

- ✓ Donantes previos
- ✓ Mujeres
- ✓ Menores de 30 años
- ✓ Registro más RA (RAL, seguramente)
- ✓ Búsqueda activa de RA (seguimiento)

