

1

Radiografia ecològica global

Pregunta de gestió

Si només tens cinc minuts, què has de saber d'Alinyà?

ParcialBaix

Índex de lectura

62,8

preliminar - no és nota global

Lectura integrada dels senyals disponibles. Serveix per orientar decisions prudents, no per certificar estat de conservació.

Mapa de comandament ecològic

Cobertes, accessibilitat i punts d'ús públic disponibles



Decisions immediates

- Conservar

HIC i hàbitats prioritaris com a primera capa de prudència.
- Validar

Espais oberts, accessos i buits de biodiversitat abans de regular.
- No concloure

Refugis, aigua, història ecològica i ús real sense evidència.
- Monitoritzar

Pressió potencial i grups taxonòmics poc representats.


Senyals interpretables	Incerteses que limiten decisions	Resposta de gestió
Hàbitats d'interès extensos i biodiversitat pública elevada.	Sense aigua, foc, clima, relleu ni intensitat real d'ús públic.	Conservar amb prudència i convertir els buits en camp dirigit.
Matriu natural dominant i espais oberts rellevants.	Continuïtat forestal i pressió potencial encara parcialment caracteritzades.	No sobreactuar: prioritzar decisions reversibles i verificables.

Què sabem de les espècies i on pot estar esbiaixada la informació?

Parcial

Mitjà

Registres públics normalitzats



516

Espècies citades
taxons


726

Registres recents
cites

731

Registres totals
cites

Com es reparteix el coneixement?



Risc d'interpretació

Les cites indiquen on hi ha coneixement, no necessàriament on hi ha més biodiversitat. Els buits poden ser manca d'esforç de mostreig.

Dades encara no creuades

Espècies protegides, amenaçades, indicadores i invasores: No disponible. Sense aquest creuament, la pàgina orienta camp i prudència, no prioritza espècies sensibles.

Decisió	Criteri
Monitoritzar	Grups infrarepresentats i zones sense mostreig
Validar	Cites sensibles o antigues
Conservar	Zones amb concentració de valors quan es validin

Fonts i actualització


GBIF; iNaturalist. Actualització: 2026-07-06.

Quins hàbitats condicionen qualsevol actuació de gestió?

Parcial

Mitjà

Hàbitats d'interès i prioritaris



47

Hàbitats
tipus

3.171

HIC
ha

1.229

HIC prioritaris
ha

Els hàbitats com a capa de prudència

Els HIC representen aproximadament 58,0% de l'àrea analitzada. No són un diagnòstic d'estat de conservació, sinó una alerta de responsabilitat: abans d'actuar cal saber quin hàbitat es pot afectar i amb quin grau de reversibilitat.

Codi	Hàbitat principal	ha
42.561	Bosc de pi roig (Pinus sylvestris), calcícoles i mesòfils, dels obacs	952
32.641+	Boixedes (matollars de Buxus sempervirens) de la muntanya mitjana (i d	564
42.425	Bosc de pi negre (Pinus uncinata), calcícoles i mesòfils, dels obacs	562
42.632	Bosc de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) dels Prepirineus, el	498
32.1134+	Màquies de carrasca (Quercus rotundifolia), calcícoles, de les contrad	292

Decisions

Conservar HIC prioritaris. Validar estat local. Evitar actuacions uniformes en hàbitats sensibles.

Fonts i actualització

Cartografia hàbitats terrestres v3; HIC. Actualització: 2026-07-06.

El mosaic actual ajuda o limita la gestió ecològica?

Parcial

Mitjà

88,4%

Forestal

9,3%

Prats

Història que explica el paisatge

La matriu forestal dominant no és bona o dolenta per si sola. La decisió clau és si deixa prou heterogeneïtat per mantenir prats, ecotons, fauna de medis oberts i discontinuïtats útils.

Mosaic de cobertes



No disponible

Barreres

No disponible

Xarxa de riberes

No disponible

Continuïtat forestal

No disponible

Infraestructures

No disponible

Corredors potencials

Gestió	Lectura
Mantenir	Espais oberts i prats amb funció de mosaic
Ampliar dades	Continuïtat espacial i barreres
Evitar	Actuacions homogènies sobre tot el bosc

Fonts i actualització


ICGC Cobertes del sòl; EcoRadar Core. Actualització: 2026-07-06.

On pot concentrar-se l'ús públic i quin risc de conflicte pot generar?

Parcial

Baix

Accessibilitat i punts d'ús públic



124,8

Xarxa
km

2,28

Densitat
km/km2

18

Punts
ús públic

Mapa de conflicte potencial

El mapa mostra estructura d'accés, no pressió real. El conflicte ecològic apareix quan accessibilitat, freqüentació i sensibilitat biològica coincideixen. Ara només es pot detectar on cal validar.

Risc	Lectura de gestió
Alt potencial	Camins o punts d'ús sobre hàbitats sensibles: cal validar
Baix coneixement	Zones amb accessos però sense dades de fauna: mostreig
No estimat	Nombre real de visitants

Regular?

Només si la intensitat real confirma pressió sobre zones sensibles.

Validar?

Aparcaments, accessos principals i camins sobre hàbitats d'interès.

No concloure

No estimar visitants només amb camins OSM.

Fonts i actualització

OpenStreetMap; Overpass API. Actualització: 2026-07-06.

Què no podem decidir encara sense conèixer l'aigua?

No disponible

Baix

No disponible

Cursos fluvials

No disponible

Fonts i basses


No disponible

Zones humides

No disponible

Funcionalitat hídrica

Context territorial per incorporar hidrologia



Decisió bloquejada

L'aigua estructura refugis, reproducció, connectivitat i resiliència. Sense hidrografia fina i punts verificats no és rigorós delimitar corredors de ribera, basses clau ni restauració associada a l'aigua.

Acció EcoRadar

Incorporar font oficial, validar punts d'aigua al camp i creuar-los amb fauna, ombra, hàbitats i sequera. Aquesta dada convertirà un buit crític en criteri de priorització.

Fonts i actualització

Font hidrològica oficial pendent d'incorporació.
Actualització: 2026-07-07.

On el bosc és valor, on és continuïtat i on caldria llegir mosaic?

Parcial

Baix

Estructura forestal i espais oberts



88,4%

Forestal

9,3%

Espais oberts

32,6

Resiliència
0-100

La pregunta no és 'tallar o no tallar'

La gestió forestal no hauria de començar reduint biomassa de manera homogènia. La decisió correcta és detectar on el mosaic pot augmentar resiliència sense degradar hàbitats d'interès ni eliminar refugis.

Criteri	Estat
Mosaic obert	Disponible parcial
Continuïtat crítica	No disponible
Pendent i orientació	No disponible
Humitat vegetal	No disponible

Fonts i actualització

ICGC Cobertes; EcoRadar Core.
Actualització: 2026-07-06.


Què ha passat al territori i com s'ha recuperat?

No disponible

Baix

Aquest mòdul ha de convertir-se en una peça central d'EcoRadar

La història ecològica diferencia estat i trajectòria. Ara no hi ha prou dades per reconstruir memòria del territori i no es dibuixa cap evolució fictícia. Quan s'incorporin incendis, NDVI, canvis d'ús i biodiversitat temporal, aquesta pàgina explicarà recuperació, recurrència i canvis de rumb.



Per què importa?

Sense història no sabem si l'estat actual és degradació, recuperació, estabilitat o canvi recent. La mateixa coberta pot exigir gestions oposades segons la trajectòria.

Què desbloquejarà decisions?

Incendis: recurrència. NDVI: recuperació de vigor. Usos del sòl: canvi de mosaic. Biodiversitat: retorn d'espècies indicadores.

Fonts i actualització

Perímetres d'incendi i sèries temporals pendents d'incorporació. Actualització: 2026-07-07.

9

Tranquil·litat ecològica

Pregunta de gestió

On podria existir baixa perturbació útil per a la fauna?

Parcial

Baix

2,28

Densitat d'accessos
km/km2

18

Punts d'ús públic
punts


No disponible

Intensitat real

Indicador propi EcoRadar

La tranquil·litat ecològica és probabilitat funcional de baixa perturbació per a la fauna. No és el contrari simple de camins: depèn d'ús real, sensibilitat, relleu, cobertes i refugis.

Accessibilitat com a pressió potencial



Factor	Estat
Accessibilitat	Parcial
Ús públic real	No disponible
Fauna sensible	No disponible
Hàbitats	Parcial
Relleu	No disponible

Fonts i actualització


OSM; biodiversitat pública; hàbitats. Actualització: 2026-07-06.

On hi pot haver estrès i on hi pot haver refugi climàtic?

Parcial

Baix

Base territorial per futures capes climàtiques



88,4%

Forestal

0,08%

Artificial

No disponible

NDMI

Encara no és un mapa climàtic

La cobertura forestal pot suggerir ombra i microclima, però no delimita refugis reals. Un refugi climàtic exigeix evidència convergent: temperatura superficial baixa, humitat, orientació, relleu i aigua.

Capa	Estat
NDVI	No disponible
NDMI	No disponible
NDWI	No disponible
LST	No disponible
DEM/orientació	No disponible

Fonts i actualització

ICGC Cobertes; Copernicus pendent de credencials. Actualització: 2026-07-06.

Quines decisions són robustes i quines encara depenen de dades?

Parcial

Mitjà

Àmbit	Dades actuals	Confiança	Decisió possible
Cobertes	Classes i superfícies	Mitjana	Llegir mosaic general
Hàbitats	HIC i prioritaris	Mitjana	Capa de prudència
Biodiversitat	Registres públics	Mitjana	Orientar camp
Pressió humana	OSM accessos	Baixa	Accessibilitat potencial
Aigua	No disponible	Baixa	No zonificar
Foc/història	No disponible	Baixa	No prioritzar actuacions finals
Clima	Coberta com a proxy	Baixa	No delimitar refugis

Capes disponibles sobre l'espai



Regla de decisió

La confiança és una variable de gestió. EcoRadar no busca omplir pàgines amb aparença de certesa: separa què ja permet decidir, què només orienta i què exigeix dades o camp abans d'actuar.

Quines accions tenen sentit amb el coneixement actual?

Parcial

Mitjà

Conservar

HIC i hàbitats prioritaris abans de qualsevol actuació.

Monitoritzar

Accessos i punts d'ús públic amb possible concentració.

Validar

Espais oberts, grups de biodiversitat i punts sensibles.

Ampliar dades

Aigua, clima, foc, relleu i ús públic real.

Mapa integrat per orientar accions



Fonts i actualització


EcoRadar Core; fonts públiques processades. Actualització: 2026-07-07.

Què es pot prioritzar ara sense sobreactuar?

Parcial

Baix

Valor ecològic com a primera capa de prioritat



Prioritat	Criteri	Confiança
1. Conservació	HIC i hàbitats prioritaris	Mitjana
2. Validació	Espais oberts i accessos	Mitjana/baixa
3. Monitoratge	Pressió potencial d'ús públic	Baixa
4. Ampliació	Aigua, foc, clima i camp	Baixa

Encara no hi ha top 10 de zones

Un top 10 seria una falsa precisió sense hidrologia, foc, clima, relleu i validació de camp. La decisió experta ara és prioritzar conservació prudent, camp dirigit i incorporació de dades que canviaran decisions.

Quin pla d'acció curt pot seguir el gestor després de llegir EcoRadar?

Parcial

Baix

Mapa preliminar d'orientació de prioritats



Conservació

Protegir i revisar HIC, HIC prioritaris i zones amb valor d'hàbitat.

Restauració

No zonificada encara; dependrà d'aigua, vegetació, relleu i camp.

Seguiment

Biodiversitat pública, grups infrarepresentats i accessos principals.

Conflictes

Creuament potencial entre ús públic i valors ecològics; cal intensitat real.

Refugis

Potencial només indirecte; cal NDMI, LST, orientació i punts d'aigua.

Pla d'acció curt

1. Confirmar hàbitats sensibles. 2. Fer camp dirigit als buits. 3. Incorporar aigua, clima i foc. 4. Mesurar ús públic real. 5. Regenerar EcoRadar i només llavors zonificar actuacions finals.

Alinyà és alt, baix o singular respecte altres espais?

No disponible

Baix

Indicador	Valor Alinyà	Referència EcoRadar	Mitjana regional	Lectura
Coberta forestal	88,4%	No disponible	No disponible	Context necessari per saber si el mosaic és excepcional o habitual.
Hàbitats detectats	47	No disponible	No disponible	El valor absolut és informatiu, però necessita comparació territorial.
HIC	3.171 ha	No disponible	No disponible	Cal normalitzar per superfície i regió biogeogràfica.
Espècies citades	516	No disponible	No disponible	Depèn molt de l'esforç d'observació.
Densitat de camins	2,28	No disponible	No disponible	Cal comparar amb espais similars i intensitat real.

Banc EcoRadar

Comparar amb altres espais processats amb la mateixa metodologia.

Context regional

Normalitzar per regió biogeogràfica, superfície i tipologia d'espai.

Percentils

Mostrar si Alinyà està per sobre o per sota d'espais similars.

Decisió

Saber si una pressió o valor és excepcional i requereix prioritat.

Per què encara no comparem?

No hi ha encara una base multi-espai EcoRadar ni valors regionals normalitzats incorporats. Mostrar comparació ara seria menys rigorós que indicar la manca.

Com s'ha d'implementar

Crear un banc de referència per regió, superfície i tipologia d'espai. Comparar percentils, no només valors bruts.

Valor per al gestor

La comparació permet saber si una pressió és excepcional, si un valor és singular i si una actuació és prioritària dins una xarxa d'espais.

Quina seqüència d'actuacions converteix la diagnosi en gestió?

Parcial

Mitjà

0-6 mesos

Curt termini

- Validar hàbitats sensibles i espais oberts.
- Revisar accessos, aparcaments i punts d'ús públic.
- Definir camp dirigit als buits de biodiversitat.

Decisió que desbloqueja

Decidir què conservar i què no tocar.

6-18 mesos

Mitjà termini

- Incorporar hidrologia, DEM, pendent i orientació.
- Activar teledetecció NDVI, NDMI, NDWI i LST.
- Mesurar ús públic real amb fonts autoritzades.

Decisió que desbloqueja

Passar de diagnosi preliminar a zonificació operativa.

18-36 mesos

Llarg termini

- Construir banc comparatiu EcoRadar.
- Afegir història ecològica i recurrència d'incendis.
- Monitoritzar efectes de les actuacions.

Decisió que desbloqueja

Prioritzar inversions i avaluar resultats.

Principi de qualitat

EcoRadar 3.0 ha de millorar per incorporació de dades reals, no per embellir buits. Cada nova font només entra quan està verificada i documentada.