

EcoRadar Alinyà

Preliminar

Informe executiu de diagnosi ecològica

Mapa de l'espai de treball



5.464

ha
Superfície

47

tipus
Hàbitats

516

taxons
Espècies citades

Alinyà apareix com un espai natural amb un valor ecològic alt, dominat per una matriu forestal extensa i amb una presència rellevant d'espais oberts. La combinació d'hàbitats d'interès, diversitat de cobertes i biodiversitat coneguda ofereix una base sòlida per orientar la gestió, però encara no justifica una priorització espacial definitiva.

Tema	Lectura de gestió	Confiança
Hàbitats	Valor de conservació molt rellevant; cal creuar actuacions amb hàbitats d'interès.	Mitjana
Paisatge	Matriu forestal dominant; els espais oberts són peces clau del mosaic.	Mitjana
Biodiversitat	Moltes cites i espècies, però amb biaix d'observació i grups poc representats.	Mitjana
Ús públic	Accessibilitat potencial identificada; falta intensitat real.	Baixa
Clima, aigua i foc	Encara insuficient per zonificar vulnerabilitat o resiliència.	Baixa

Què hauria de tenir en compte un gestor?

Implicacions principals

1. Els hàbitats d'interès han de ser la primera capa de prudència.
2. Els prats i espais oberts no són marginals: poden sostenir biodiversitat, mosaic i resiliència.
3. La pressió humana s'ha d'interpretar com accessibilitat potencial fins disposar d'intensitat real.
4. Les actuacions forestals no s'han de plantejar sense relleu, orientació, humitat i foc.
5. La prioritització final ha d'esperar clima, aigua, foc i validació de camp.

Indicadors clau

60,0

0-100
Mosaic

98,9

0-100
Hàbitats

99,7

0-100
Biodiversitat

39,3

0-100
Pressió humana

32,6

0-100
Resiliència al foc

Dades que falten i següent pas

Àmbit	Per què és important	Acció recomanada
Vegetació i humitat	Permet detectar vigor, estrès i refugis climàtics.	Afegir sèries recents i estivals.
Aigua	Condiciona fauna, refugis, connectivitat i restauració.	Integrar cursos, fonts, basses i estat.
Foc i estructura	Permet llegir continuïtat, mosaic i capacitat de resposta.	Afegir històric, relleu i punts d'aigua.
Ús públic real	Diferencia accessibilitat de pressió efectiva.	Validar accessos i incorporar comptatges.
Camp	Redueix biaixos i confirma hàbitats o espècies sensibles.	Camp dirigit als buits detectats.

La conclusió executiva és deliberadament prudent: EcoRadar ja identifica valors i preguntes de gestió, però evita convertir dades parcials en ordres d'actuació. La següent versió ha de transformar aquests buits en capes espacials verificades.

1

Biodiversitat

Coneixement d'espècies i qualitat de la informació biològica

516

taxons

Espècies citades

726

cites

Registres recents

731

cites


Registres totals

Plantae, Aves, Insecta

Grups principals

Grups principals

Cartografia interpretativa



Mapa sintètic per a decisió
No substitueix verificació de camp

Identificar què se sap de la biodiversitat i on cal reforçar inventari.

Interpretació ecològica

La informació pública apunta a una biodiversitat coneguda elevada, però la lectura depèn molt de l'esforç d'observació. El valor real s'ha de contrastar amb camp i amb grups menys visibles.

Implicacions per a la gestió

- Planificar camp per als grups menys representats abans de concloure absències.
- Protegir la informació d'espècies sensibles quan s'espacialitzin resultats.
- Separar cites recents, històriques i dubtoses en qualsevol decisió.

Nivell de confiança

Mitjà

Segons qualitat i completitud de dades.

Cal completar

Inventari dirigit, espècies protegides, espècies indicadores

2

Hàbitats

Valor de conservació i sensibilitat dels hàbitats presents

Localitzar els hàbitats que condicionen qualsevol actuació de gestió.

47

tipus

Hàbitats detectats

3.171

ha

Superfície d'interès

58,0%

sobre l'àrea


% d'interès

1.229

22,5% de l'àrea

Hàbitats prioritaris

Cartografia interpretativa



Mapa sintètic per a decisió
No substitueix verificació de camp

Interpretació ecològica

El senyal d'hàbitats és molt fort. Les zones amb hàbitats d'interès i prioritaris han d'actuar com a capa de prudència abans de definir treballs forestals, restauració o ús públic.

Implicacions per a la gestió

- Creuar qualsevol actuació amb hàbitats prioritaris i sensibles.
- Diferenciar conservació estricta, millora ecològica i zones amb marge de gestió.
- Validar sobre el terreny els hàbitats de més valor o més fràgils.

Nivell de confiança

Mitjà

Segons qualitat i completitud de dades.

Cal completar

hàbitats sensibles, estat de conservació local, pressions puntuals

3

Paisatge i connectivitat

Mosaic, cobertes i continuïtat ecològica

88,4%

Coberta forestal
Coberta forestal

9,3%

Prats i herbassars
Prats i herbassars

13

Classes de coberta
Classes de coberta

60,0

0-100
Mosaic Core

Cartografia interpretativa



Entendre si el paisatge ofereix diversitat estructural i connexió funcional.

Interpretació ecològica

Alinyà mostra una matriu natural molt forestal. Això pot afavorir continuïtat ecològica, però també fa especialment importants els espais oberts i les discontinuïtats que mantenen mosaic.

Implicacions per a la gestió

- Conservar prats, pastures i clarianes que aportin heterogeneïtat.
- Evitar simplificar el paisatge amb actuacions uniformes.
- Calcular continuïtat espacial abans de delimitar corredors o barreres.

Nivell de confiança

Mitjà

Segons qualitat i completitud de dades.

Cal completar

continuïtat forestal espacial, barreres, riberes

4

Pressió humana

Accessibilitat, ús públic i possibles concentracions d'activitat

124,8

km

Xarxa cartografiada

2,28km/km²

Densitat de camins

18

punts


Punts d'ús públic

39,3

0-100

Pressió Core

Cartografia interpretativa



Mapa sintètic per a decisió
No substitueix verificació de camp

Avaluar on la presència humana pot condicionar conservació, tranquil·litat o gestió.

Interpretació ecològica

La xarxa d'accés és una bona primera aproximació a la pressió potencial, però no mesura visitants. La lectura correcta és d'accessibilitat i concentració probable, no d'aflluència real.

Implicacions per a la gestió

- Validar aparcaments, accessos i camins principals al camp.
- Creuar ús públic amb zones sensibles abans de senyalitzar o promocionar itineraris.
- Incorporar comptatges o dades de gestors per passar de potencial a intensitat real.

Nivell de confiança

Baix

Segons qualitat i completitud de dades.

Cal completar

intensitat real, estacionalitat, conflicte ús públic-fauna

5

Bosc i estructura forestal

Continuïtat, espais oberts i resiliència estructural

Llegir la massa forestal no només com a cobertura, sinó com a estructura de gestió.

88,4%

Coberta forestal
Coberta forestal

9,3%

Matriu oberta
Matriu oberta

0,00%

Agrícola
Agrícola

32,6

0-100
Resiliència foc

Cartografia interpretativa



Mapa sintètic per a decisió
No substitueix verificació de camp

Interpretació ecològica

La forta dominància forestal obliga a mirar la continuïtat i el mosaic amb detall. El valor no és reduir bosc, sinó detectar on el mosaic pot millorar resiliència sense perdre biodiversitat.

Implicacions per a la gestió

- Evitar actuacions genèriques sense creuar hàbitats d'interès.
- Identificar espais oberts que funcionen com a discontinuïtats ecològiques.
- Completar relleu, orientació, humitat i accessos abans de prioritzar treballs.

Nivell de confiança

Baix

Segons qualitat i completitud de dades.

Cal completar

relleu, orientació, humitat de vegetació

6

Tranquil·litat ecològica

Àrees de baixa perturbació i potencial refugi de fauna

2,28km/km²

Densitat d'accessos

18

punts

Punts d'ús públic

124,8

km


Xarxa cartografiada

39,3

0-100

Pressió Core

Cartografia interpretativa



Mapa sintètic per a decisió
No substitueix verificació de camp

Distingir zones accessibles de zones potencialment tranquil·les.

Interpretació ecològica

La tranquil·litat no es pot derivar només de la xarxa de camins. Caldrà combinar distància a accessos, intensitat d'ús, estacionalitat i sensibilitat de fauna.

Implicacions per a la gestió

- No promocionar zones sensibles fins entendre l'ús real.
- Detectar àrees amb baixa accessibilitat com a candidates a tranquil·litat.
- Afegir observacions de camp i dades temporals d'ús públic.

Nivell de confiança

Baix

Segons qualitat i completitud de dades.

Cal completar

intensitat d'ús, fauna sensible, estacionalitat

7

Vulnerabilitat i canvi climàtic

Estrès tèrmic, humitat i capacitat de refugi

Detectar zones vulnerables i zones que poden actuar com a refugi climàtic.

88,4%

Coberta forestal
Coberta forestal

0,08%

Coberta artificial
Coberta artificial


88,4

0-100
Senyal de refugi

23,0

0-100
Senyal de vulnerabilitat

Cartografia interpretativa



Mapa sintètic per a decisió
No substitueix verificació de camp

Interpretació ecològica

La cobertura forestal suggereix potencial de refugi, però no n'hi ha prou. Cal temperatura, humitat, orientació i aigua per convertir la intuïció en zones prioritàries.

Implicacions per a la gestió

- No delimitar refugis climàtics només amb cobertura forestal.
- Prioritzar teledetecció i topografia derivada.
- Creuar futures zones vulnerables amb hàbitats i restauració.

Nivell de confiança

Baix

Segons qualitat i completitud de dades.

Cal completar

temperatura superficial, humitat, orientació

8

Prioritats de gestió

On actuar primer i amb quin criteri

3.171

ha
Hàbitats d'interès

99,7

0-100
Biodiversitat coneguda

39,3

0-100
Pressió potencial

32,6

0-100
Resiliència al foc

Cartografia interpretativa



Mapa sintètic per a decisió
No substitueix verificació de camp

Transformar la diagnosi en una agenda d'actuació prudent i verificable.

Interpretació ecològica

Encara no és correcte generar un rànquing espacial tancat. Sí que es poden establir línies de prioritat: protegir valor, completar dades crítiques i validar pressions.

Implicacions per a la gestió

- Primer: revisar HIC i hàbitats prioritaris abans d'actuar.
- Segon: validar espais oberts i accessos clau.
- Tercer: completar clima, aigua i foc abans de zonificar prioritats.

Nivell de confiança

Baix

Segons qualitat i completitud de dades.

Cal completar

zones d'actuació, cost i complexitat, benefici esperat

Fer explícita la qualitat de la diagnosi i evitar conclusions falsament precises.

13

classes

Cobertes processades

47

tipus

Hàbitats processats

516

taxons

Espècies citades

124,8

km

Xarxa d'accés

Cartografia interpretativa



Mapa sintètic per a decisió
No substitueix verificació de camp

Interpretació ecològica

La diagnosi és prou sòlida per entendre valors generals, però encara insuficient per definir actuacions espacials fines en clima, aigua, foc i tranquil·litat.

Implicacions per a la gestió

- Usar les dades fortes per orientar preguntes, no per tancar decisions.
- Convertir cada buit en una tasca de camp o una font a incorporar.
- Mantenir separat el resultat ecològic del nivell de confiança.

Nivell de confiança

Mitjà

Segons qualitat i completitud de dades.

Cal completar

teledetecció, hidrologia, foc

Proposar actuacions prudents, verificables i compatibles amb biodiversitat.

3.171

ha

Hàbitats d'interès

9,3%

Prats i herbassars

Prats i herbassars

124,8

km

Xarxa d'accés

516

taxons

Especies citades

Cartografia interpretativa



Mapa sintètic per a decisió
No substitueix verificació de camp

Interpretació ecològica

La recomanació principal no és actuar encara amb receptes generals, sinó preparar la diagnosi operativa: camp dirigit, capes crítiques i creuaments amb hàbitats.

Implicacions per a la gestió

- Validar hàbitats sensibles i espais oberts.
- Completar clima, aigua, foc i intensitat d'ús públic.
- Definir unitats de gestió només quan hi hagi prou confiança.

Nivell de confiança

Mitjà

Segons qualitat i completitud de dades.

Cal completar

priorització espacial, seguiment, cost-benefici ecològic