

Листок-вкладыш – информация для пациента

Лакосамид-СЗ, 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лакосамид-СЗ, 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лакосамид-СЗ, 150 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лакосамид-СЗ, 200 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: лакосамид

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Лакосамид-СЗ, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Лакосамид-СЗ.
3. Прием препарата Лакосамид-СЗ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Лакосамид-СЗ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Лакосамид-СЗ, и для чего его применяют

Лекарственный препарат Лакосамид-СЗ содержит действующее вещество лакосамид, относящееся к фармакотерапевтической группе: «противоэпилептические препараты; другие противоэпилептические препараты».

Показания к применению

В качестве монотерапии или дополнительной терапии парциальных судорожных приступов, сопровождающихся или не сопровождающихся вторичной генерализацией, у взрослых, подростков и детей 4 лет и старше с эпилепсией.

В качестве дополнительной терапии первично-генерализованных тонико-клонических приступов у взрослых, подростков и детей 4 лет и старше с идиопатической генерализованной эпилепсией.

Способ действия препарата Лакосамид-СЗ

Точный механизм противоэпилептического действия лакосамида не установлен. Лакосамид предотвращает развитие приступов парциальной и первично генерализованной эпилепсии, а также задерживает развитие повышенной судорожной готовности.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Лакосамид-СЗ

Противопоказания

Не принимайте препарат Лакосамид-СЗ:

- если у Вас аллергия на лакосамид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас атриовентрикулярная блокада (нарушение ритма сердца, проявляется медленным сердечным ритмом) II или III степени;
- если возраст ребенка младше 4 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Лакосамид-СЗ проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно сообщите Вашему лечащему врачу:

- если у Вас тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина 30 мл/мин и меньше);
- если у Вас было в прошлом нарушение проводимости или тяжелые заболевания сердца, такие как сердечная недостаточность и инфаркт миокарда;
- если Вы человек пожилого возраста с повышенным риском заболеваний сердца;
- если Вы принимаете препараты, которые влияют на работу сердца (вызывают удлинение интервала PR на электрокардиограмме (ЭКГ)).

Суицидальные мысли и поведение

У пациентов, получавших противоэпилептические препараты по нескольким показаниям, были отмечены суицидальные мысли и поведение. Механизм повышения риска возникновения суицидальных мыслей и суицидального поведения не ясен, существующие данные не позволяют отрицать существование такого риска при приеме лакосамида. Если у Вас возникнут мысли причинить себе вред, немедленно сообщите об этом лечащему врачу.

Сердечный ритм и проводимость

В исследованиях лакосамида описано увеличение интервала PR, которое зависело от принимаемой дозы. Лакосамид следует использовать с осторожностью:

- если у Вас проаритмические состояния, такие как известные проблемы сердечной проводимости или тяжелые заболевания сердца (например, ишемия/инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, структурные заболевания сердца или сердечные натриевые каналопатии);
- если Вы принимаете лекарственные препараты, влияющие на сердечную проводимость, включая антиаритмические средства и противоэпилептические лекарственные средства из группы блокаторов натриевых каналов;
- если Вы человек пожилого возраста.

Сообщите врачу, если что-то из вышеперечисленного относится к Вам. Ваш врач назначит Вам ЭКГ перед увеличением дозы лакосамида выше 400 мг/сут, а также после достижения стабильной концентрации.

В плацебо-контролируемых исследованиях лакосамида у пациентов с эпилепсией не было отмечено фибрилляции или трепетания предсердий, однако оба явления были выявлены у пациентов с эпилепсией в исследованиях, а также при пострегистрационном приеме препарата. Наблюдались случаи нарушения проводимости сердца – атриовентрикулярной блокады (включая атриовентрикулярные блокады 2-ой степени). У пациентов с проаритмическими состояниями наблюдалась вентрикулярная тахикардия (внезапное приступообразное увеличение ритма сердца свыше 100 ударов в минуту). В редких случаях данные явления приводили к асистолии, остановке сердца и смерти у пациентов с основными проаритмическими состояниями.

Сообщите врачу при появлении симптомов сердечной аритмии: редкий, учащенный или нерегулярный пульс, учащенное сердцебиение, прерывистое дыхание, головокружение, обморок.

Головокружение

Лечение лакосамидом может сопровождаться головокружением, что может приводить к увеличению риска получения травм или падений. Поэтому соблюдайте осторожность до тех пор, пока не выяснится, какие потенциальные нежелательные реакции у Вас могут развиваться.

Возможное возникновение или обострение миоклонических приступов

Дети и подростки

Препарат Лакосамид-СЗ противопоказан к применению у детей в возрасте до 4 лет.

Другие препараты и препарат Лакосамид-СЗ

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Соблюдайте осторожность при одновременном приеме со следующими препаратами:

- препараты, увеличивающие длину интервала PR – один из параметров ЭКГ, включая лекарственные средства – блокаторы натриевых каналов;
- антиаритмические препараты I класса (для лечения нарушений сердечного ритма);
- флуконазол, итраконазол, кетоконазол (для лечения при грибковой инфекции);
- ритонавир (для лечения ВИЧ-инфекции);
- кларитромицин (для лечения при бактериальной инфекции);
- рифампицин (для лечения при туберкулезе);
- растительные препараты на основе Зверобоя продырявленного (для лечения тревожности и депрессии).

Не выявлено значимого влияния на:

- противозачаточные препараты, содержащие этинилэстрадиол, левоноргестрел, прогестерон;
- дигоксин (для лечения при некоторых заболеваниях сердца);
- метформин (для лечения при сахарном диабете);
- варфарин (для разжижения крови).

Если Вы не уверены насчет того, какие препараты Вы принимаете, и можно ли принимать их одновременно с лакосамидом, посоветуйтесь с Вашим лечащим врачом.

Препарат Лакосамид-СЗ с алкоголем

Данные о взаимодействии лакосамида с алкоголем отсутствуют. Не принимайте препарат Лакосамид-СЗ одновременно с алкоголем.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Женщины с детородным потенциалом

Обсудите с врачом аспекты планирования семьи и контрацепции, если Вы принимаете лакосамид. Если Вы планируете беременность, Ваш врач повторно тщательно оценит применение лакосамида.

Беременность

Общий риск, связанный с эпилепсией и противоэпилептическими лекарственными препаратами – в отношении всех противоэпилептических препаратов было показано, что частота врожденных пороков развития у детей женщин с эпилепсией, получающих такую

терапию, в 2–3 раза выше по сравнению с общей популяцией. У пациентов, получающих лечение, было отмечено увеличение частоты врожденных пороков развития у детей на фоне политерапии, однако степень влияния лечения и/или заболевания на увеличение этого риска до настоящего времени неизвестна. Кроме того, эффективное противоэпилептическое лечение прекращать не следует, поскольку ухудшение течения заболевания оказывает отрицательное влияние на мать и на плод.

Риск, связанный с применением лакосамида – клинических данных о применении лакосамида у беременных нет. В исследованиях на животных не было зарегистрировано тератогенных эффектов, однако при применении доз, токсичных для материнского организма, была отмечена эмбриотоксичность у кроликов и крыс. Потенциальный риск для человека неизвестен.

Лакосамид не следует применять во время беременности, за исключением тех случаев, когда польза для матери явно перевешивает возможный риск для плода. Если женщина планирует беременность, то необходимо тщательно взвесить целесообразность приема этого препарата.

Грудное вскармливание

Лакосамид экскретируется с грудным молоком. Невозможно исключить риски для новорожденных и младенцев. Во время лечения лакосамидом рекомендуется прекратить грудное вскармливание.

Фертильность

Не было отмечено нежелательных реакций на фертильность или репродуктивность у крыс обоих полов в дозах, создающих концентрацию в крови приблизительно в 2 раза выше концентрации в крови у человека при приеме максимально рекомендуемой дозы для людей.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Лакосамид может влиять на способность управлять транспортными средствами или механизмами. Лечение лакосамидом может сопровождаться развитием головокружения или нечеткостью зрения. Воздержитесь от управления транспортными средствами и от занятий другими видами деятельности, требующими концентрации внимания.

3. Прием препарата Лакосамид-СЗ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Суточную дозу делят на 2 приема – обычно утром и вечером, независимо от приема пищи.

Подростки и дети с массой тела 50 кг и более, а также взрослые

В следующей таблице приведены рекомендуемые дозы для подростков и детей с массой тела 50 кг и более, а также для взрослых.

	Монотерапия	Дополнительная терапия
Начальная доза	100 мг/сут или 200 мг/сут	100 мг/сут
Разовая насыщающая доза (если применимо)	200 мг	200 мг
Титрование (поэтапное увеличение дозы)	50 мг 2 раза в день (100 мг/сут) с интервалами в неделю	50 мг 2 раза в день (100 мг/сут) с интервалами в неделю
Максимальная рекомендуемая доза	до 600 мг/сут	до 400 мг/сут

Монотерапия (при лечении парциальных судорожных приступов)

Рекомендуемая начальная доза составляет 50 мг 2 раза в день, которая должна быть увеличена до начальной лечебной дозы 100 мг 2 раза в день по истечении первой недели.

В зависимости от снижения судорожной активности по сравнению с риском нежелательных реакций Ваш врач может назначить Вам начальную дозу 100 мг 2 раза в день.

В зависимости от ответа и переносимости, поддерживающая доза может быть увеличена на 100 мг/сут (по 50 мг 2 раза в день) с интервалами в неделю, вплоть до максимальной суточной поддерживающей рекомендуемой дозы 600 мг/сут (по 300 мг 2 раза в день).

Если при достижении дозировки свыше 400 мг/сут у пациента сохраняется необходимость в приеме дополнительных противосудорожных препаратов, необходимо следовать режиму дозирования, предусмотренному для дополнительного лечения (см. ниже).

Дополнительное лечение (при лечении парциальных судорожных или первично-генерализованных тонико-клонических приступов)

Рекомендуемая начальная доза составляет 50 мг 2 раза в день, которая должна быть увеличена до начальной лечебной дозы 100 мг два раза в день по истечении первой недели.

В зависимости от ответа и переносимости, доза может быть увеличена на 100 мг/сут (по 50 мг 2 раза в день) с интервалами в неделю, вплоть до максимальной суточной поддерживающей рекомендуемой дозы 400 мг/сут (200 мг 2 раза в день).

Начало лечения лакосамидом с насыщающей дозы (начальная монотерапия или переход на монотерапию при лечении парциальных судорожных приступов или дополнительное лечение при лечении первично-генерализованных тонико-клонических приступов)

Лечение препаратом Лакосамид-СЗ как монотерапия, так и дополнительное лечение, может быть также начато с разовой насыщающей дозы 200 мг с последующим назначением 100 мг 2 раза в день (200 мг/сут) поддерживающего режима дозирования спустя приблизительно 12 ч после приема насыщающей дозы. Далее Ваш врач проведет последующую корректировку дозы в соответствии с Вашим ответом на лечение и переносимость, как описано выше. Ваш врач может назначить Вам насыщающую дозу под своим контролем, учитывая повышенную вероятность развития тяжелой сердечной аритмии и увеличение числа нежелательных реакций со стороны центральной нервной системы. Назначение насыщающей дозы не изучалось при острых состояниях, таких как эпилептический статус.

Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет)

Снижение дозы не требуется. У пациентов пожилого возраста необходимо учитывать возможность возрастного снижения функции почек и накопления лакосамида в крови. Данные о приеме лакосамида у пациентов пожилого возраста с эпилепсией, особенно в дозе более 400 мг/сут, ограничены.

Пациенты с нарушением функции почек

Взрослым пациентам и детям с легким и умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина более 30 мл/мин) коррекция дозы не требуется. Детям с массой тела 50 кг и более, а также взрослым пациентам с легким и умеренным нарушением функции почек рекомендуемая насыщающая доза – 200 мг, но дальнейшее увеличение дозы (более 200 мг/сут) врач подберет с осторожностью. У детей с массой тела 50 кг и более и взрослых пациентов с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина 30 мл/мин и меньше) и пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности рекомендуемая максимальная доза составляет 250 мг/сут. У этих пациентов увеличение дозы должно проводиться с осторожностью. Начальная доза составляет 100 мг, далее – 50 мг 2 раза в день в течение первой недели. У детей с массой тела менее 50 кг и тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина 30 мл/мин и меньше) рекомендуется снижение максимальной дозы на 25 %.

Всем пациентам, находящимся на гемодиализе (внепочечное очищение крови), рекомендуется дополнительно назначить до 50 % разовой дозы сразу после окончания процедуры. Лечение пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности следует проводить с осторожностью, так как клинический опыт применения препарата такими пациентами небольшой, и возможно накопление метаболита с неуточненной фармакологической активностью.

Пациенты с нарушением функции печени

У взрослых пациентов и детей с массой тела 50 кг и более с легким и умеренным нарушением функции печени максимальная доза составляет 300 мг/сут. Ваш врач с осторожностью подберет для Вас дозу, учитывая, что нарушению функции печени часто сопутствует нарушение функции почек. Подросткам и взрослым с массой тела 50 кг и более врач может назначить насыщающую дозу 200 мг, но дальнейшее увеличение дозы (более 200 мг/сут) подберет с осторожностью. У подростков и детей с легким и умеренным нарушением функции печени с массой тела менее 50 кг необходимо снижение максимальной дозы на 25 %. Нет данных о применении лакосамида у пациентов с тяжелым нарушением функции печени.

Препарат Лакосамид-СЗ следует назначать взрослым пациентам, а также подросткам и детям с тяжелыми нарушениями функции печени только тогда, когда ожидаемая лечебная польза препарата превышает вероятные риски при его приеме. Может потребоваться коррекция дозы с учетом активности заболевания и появления потенциальных нежелательных реакций у пациента.

Применение у детей и подростков

Врач назначит наиболее подходящую лекарственную форму и дозировку для Вашего ребенка в зависимости от массы тела ребенка и рекомендуемой дозы.

Подростки и дети с массой тела 50 кг и более

У подростков и детей с массой тела 50 кг и более применяется такой же режим дозирования, как у взрослых пациентов (см. выше).

Дети (старше 4 лет) и подростки с массой тела менее 50 кг

Доза определяется на основании массы тела. Поэтому рекомендуется начинать лечение с раствора для приема внутрь, а затем переходить на таблетки (по желанию).

Монотерапия (при лечении парциальных судорожных приступов)

Рекомендуемая начальная доза составляет 2 мг/кг/сут, которая должна быть увеличена до начальной лечебной дозы 4 мг/кг/сут по истечении первой недели.

В зависимости от ответа и переносимости лечения, поддерживающая доза может быть увеличена еще на 2 мг/кг/сут с интервалами в неделю. Врач может повышать дозу постепенно до получения оптимального ответа. У детей с массой тела менее 40 кг максимальная рекомендуемая доза составляет 12 мг/кг/сут. У детей с массой тела от 40 кг до менее 50 кг максимальная рекомендуемая доза составляет 10 мг/кг/сут.

В следующей таблице приведены рекомендуемые дозы при проведении монотерапии у детей и подростков с массой тела менее 50 кг.

Начальная доза	2 мг/кг/сут
Разовая насыщающая доза	не рекомендуется
Титрование (поэтапное повышение дозы)	2 мг/кг/сут с интервалами в неделю
Максимальная рекомендуемая доза у пациентов с массой тела менее 40 кг	до 12 мг/кг/сут
Максимальная рекомендуемая доза у пациентов с массой тела от 40 до менее 50 кг	до 10 мг/кг/сут

Дополнительное лечение (при лечении парциальных судорожных или первично-генерализованных тонико-клонических приступов)

Рекомендуемая начальная доза составляет 2 мг/кг/сут, с последующим увеличением до начальной лечебной дозы 4 мг/кг/сут по истечении первой недели.

В зависимости от ответа и переносимости лечения, поддерживающая доза препарата может быть увеличена еще на 2 мг/кг/сут с интервалами в неделю. Врач может повышать дозу постепенно до получения оптимального ответа. У детей с массой тела менее 20 кг более высокий клиренс по сравнению со взрослыми пациентами, поэтому максимальная рекомендуемая доза составляет до 12 мг/кг/сут. У детей с массой тела от 20 кг до менее 30 кг максимальная рекомендуемая доза составляет 10 мг/кг/сут, а у детей с массой тела от 30 кг до

менее 50 кг максимальная рекомендуемая доза составляет 8 мг/кг/сут (хотя в исследованиях доза в пределах 12 мг/кг/сут была назначена только небольшому числу детей).

В следующей таблице ниже приведены рекомендуемые дозы при проведении дополнительного лечения у детей и подростков с массой тела менее 50 кг.

Начальная доза	2 мг/кг/сут
Разовая насыщающая доза	не рекомендуется
Титрование (поэтапное повышение дозы)	2 мг/кг/сут с интервалами в неделю
Максимальная рекомендуемая доза у пациентов с массой тела менее 20 кг	до 12 мг/кг/сут
Максимальная рекомендуемая доза у пациентов с массой тела от 20 кг до менее 30 кг	до 10 мг/кг/сут
Максимальная рекомендуемая доза у пациентов с массой тела от 30 кг до менее 50 кг	до 8 мг/кг/сут

Насыщающая доза

Применение насыщающей дозы у детей не изучалось. Прием насыщающей дозы не рекомендуется у подростков и детей с массой тела до 50 кг.

Дети в возрасте до 4 лет

Безопасность и эффективность лакосамида у детей младше 4 лет не установлены. Данные отсутствуют. Применение препарата Лакосамид-СЗ у детей в возрасте до 4 лет противопоказано.

Путь и способ введения

Принимайте таблетки внутрь. Суточную дозу делят на 2 приема – обычно утром и вечером, вне зависимости от времени приема пищи.

Продолжительность терапии

Лечение препаратом зависит от потребности и определяется Вашим лечащим врачом.

Если Вы приняли препарата Лакосамид-СЗ больше, чем следовало

Вам может понадобиться помощь. Немедленно обратитесь к лечащему врачу или в отделение неотложной медицинской помощи, так как возможны серьезные последствия! По возможности возьмите с собой упаковку и листок-вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли.

Симптомы, возникающие после случайной или преднамеренной передозировки лакосамидом, были преимущественно обусловлены поражением центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

- Симптомы нежелательных реакций у пациентов, принимавших дозы от 400 мг до 800 мг и принимавших рекомендуемые дозы лакосамида, не отличались.
- Симптомы, отмеченные после приема свыше 800 мг: головокружение, тошнота, рвота, эпилептические приступы (генерализованные тонико-клонические судороги, эпилептический статус). Также отмечались нарушения сердечной проводимости, шок и кома. Сообщается о летальных исходах у пациентов после острой передозировки несколькими граммами лакосамида.

Антидота лакосамида не существует. При передозировке врач назначит необходимое лечение, в зависимости от симптомов. Может быть рассмотрена процедура гемодиализа (внепочечное очищение крови).

Если Вы забыли принять препарат Лакосамид-СЗ

При пропуске дозы примите пропущенную дозу как можно скорее, и затем со следующей дозы препарата возобновите обычный режим дозирования.

Если до приема следующей дозы осталось 6 часов или меньше, не принимайте пропущенную дозу, примите следующую дозу препарата согласно обычной схеме приема. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Лакосамид-СЗ

Если препарат должен быть отменен, отмену рекомендуется проводить постепенно, снижая дозу на 200 мг в неделю.

В случаях развития тяжелой сердечной аритмии Ваш врач проведет анализ соотношения «польза/риск» и при необходимости отменит прием препарата Лакосамид-СЗ.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Лакосамид-СЗ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Лакосамид-СЗ и немедленно обратитесь за медицинской помощью при возникновении любой из следующих серьезных нежелательных реакций, которые наблюдались:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- Кратковременные, серийные, мелкие, часто симметричные подергивания мышц конечностей, туловища, лица (миоклонические судороги).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- аллергическая реакция (гиперчувствительность);
- появление зудящих волдырей на коже (крапивница);
- мысли о том, чтобы навредить себе или убить себя (суицидальные мысли, суицидальные попытки);
- аллергическая реакция немедленного типа, включая отек лица, губ, языка и/или горла, затруднение дыхания или глотания (ангионевротический отек/отек Квинке);
- обморок.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышц (судороги);
- тяжелые кожные реакции, включая интенсивную кожную сыпь, крапивницу, покраснение кожи на всем теле, сильный зуд, образование пузырей, шелушение и отек кожи, повышение температуры тела (экссфолиативный дерматит) и отслоение верхних слоев кожи, воспаление слизистых оболочек (синдром Стивенса-Джонсона);
- острая системная аллергическая реакция (реакция гиперчувствительности) в виде сыпи с поражением различных органов и систем, включая лекарственную реакцию с эозинофилией и системными проявлениями – лихорадкой, общим недомоганием (DRESS-синдром);
- тяжелая аллергическая кожная реакция с обширной кожной сыпью, волдырями на коже, во рту, вокруг глаз и половых органах, высокой температурой тела, кожным зудом, образованием гнойной сыпи (токсический эпидермальный некролиз, который имеет схожие проявления с указанным выше синдромом Стивенса-Джонсона, но более тяжелое течение);
- внезапное ускорение ритма сердца (вентрикулярная тахикардия).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Лакосамид-СЗ

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- головокружение;
- головная боль;
- двоение в глазах (диплопия);
- тошнота.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- депрессия, раздражительность;
- бессонница;
- нарушение координации движений, нарушение равновесия;
- нарушение памяти, когнитивные нарушения, нарушение внимания, спутанность сознания;
- сонливость;
- дрожь (тремор);
- неконтролируемые ритмичные движения глаз (нистагм), нечеткость зрения;
- чувство онемения (гипестезия);
- нарушение речи (дизартрия);
- ощущение покалывания, «ползания мурашек» на коже (парестезии);
- ощущение мнимого вращения себя в пространстве или пространства вокруг себя (вертиго);
- шум в ушах;
- рвота;
- запор, вздутие живота (метеоризм), расстройство пищеварения (диспепсия), диарея;
- сухость во рту;
- кожный зуд, кожная сыпь;
- мышечный спазм;
- нарушение походки;
- слабость (астения), утомляемость;
- ощущение опьянения;
- повреждения кожи;
- падения, ушибы.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- агрессия;
- возбуждение;
- эйфория;
- психические расстройства;
- галлюцинации;
- нарушение координации движений;
- произвольные мышечные движения (дискинезия);
- нерегулярный, слишком медленный ритм сердца (атриовентрикулярная блокада);
- замедленный ритм сердца (брадикардия);
- нарушения электрической активности и сокращения предсердий сердца (фибрилляция предсердий, трепетание предсердий);
- изменение печеночных проб, повышение активности печеночных ферментов (более чем в 2 раза относительно верхней границы нормы).

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- снижение в крови количества лейкоцитов, что делает организм более восприимчивым к инфекциям (агранулоцитоз).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

5. Хранение препарата Лакосамид-СЗ

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.
Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на контурной ячейковой упаковке, этикетке флакона и пачке картонной после «Годен до».
Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
Храните препарат при температуре ниже 25 °С.
Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Лакосамид-СЗ содержит

Действующим веществом является лакосамид.

Лакосамид-СЗ, 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 50 мг лакосамида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: гипролоза низкозамещенная (гидроксипропилцеллюлоза), целлюлоза микрокристаллическая 102, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), целлюлоза микрокристаллическая силикатированная, кросповидон, магния стеарат. Состав оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилцеллюлоза), полисорбат-80 (твин-80), тальк, титана диоксид Е 171, алюминиевый лак на основе красителя кармуазин Е 122, краситель железа оксид красный Е 172.

Лакосамид-СЗ, 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 100 мг лакосамида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: гипролоза низкозамещенная (гидроксипропилцеллюлоза), целлюлоза микрокристаллическая 102, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), целлюлоза микрокристаллическая силикатированная, кросповидон, магния стеарат. Состав оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилцеллюлоза), полисорбат-80 (твин-80), тальк, титана диоксид Е 171, краситель железа оксид желтый Е 172, краситель железа оксид красный Е 172.

Лакосамид-СЗ, 150 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 150 мг лакосамида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: гипролоза низкозамещенная (гидроксипропилцеллюлоза), целлюлоза микрокристаллическая 102, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), целлюлоза микрокристаллическая силикатированная, кросповидон, магния стеарат. Состав оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилцеллюлоза), полисорбат-80 (твин-80), тальк, титана диоксид Е 171, краситель железа оксид желтый Е 172, краситель железа оксид красный Е 172.

Лакосамид-СЗ, 200 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 200 мг лакосамида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: гипролоза низкозамещенная (гидроксипропилцеллюлоза), целлюлоза микрокристаллическая 102, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), целлюлоза микрокристаллическая силикатированная,

кросповидон, магния стеарат. Состав оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилцеллюлоза), полисорбат-80 (твин-80), тальк, титана диоксид Е 171, краситель железа оксид красный Е 172, алюминиевый лак на основе красителя солнечный закат желтый Е 110.

Внешний вид препарата Лакосамид-С3 и содержимое упаковки

Лакосамид-С3, 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Препарат представляет собой круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой розового цвета. На поперечном разрезе ядра таблеток белого или почти белого цвета.

Лакосамид-С3, 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Препарат представляет собой круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой светло-желтого цвета. На поперечном разрезе ядра таблеток белого или почти белого цвета.

Лакосамид-С3, 150 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Препарат представляет собой круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета. На поперечном разрезе ядра таблеток белого или почти белого цвета.

Лакосамид-С3, 200 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Препарат представляет собой круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой оранжевого цвета. На поперечном разрезе ядра таблеток белого или почти белого цвета.

По 14 таблеток в контурные ячейковые упаковки из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 30 таблеток во флаконы полимерные из полиэтилена низкого давления с натяжными крышками из полиэтилена высокого давления с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон, 1, 2, 3, 4 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Не все размеры упаковок могут находиться в обороте.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

НАО «Северная звезда»

Юридический адрес: 111524, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, помещ. 47/2

тел/факс: +7 (495) 137-80-22

электронная почта: electro@ns03.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

НАО «Северная звезда»

Ленинградская обл., муниципальный район Всеволожский, г.п. Кузьмолдовское, гп. Кузьмолдовский, ул. Заводская, д. 4, к. 1

тел/факс: +7 (812) 309-21-77

телефон горячей линии: 8 (800) 333-24-14

электронная почта: safety@ns03.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза: <https://eec.eaeunion.org/>