

Листок-вкладыш – информация для пациента

Гадобутрол, 1 ммоль/мл, раствор для внутривенного введения

Действующее вещество: гадобутрол.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Гадобутрол, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Гадобутрол.
3. Применение препарата Гадобутрол.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Гадобутрол.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Гадобутрол, и для чего его применяют

Препарат Гадобутрол содержит действующее вещество гадобутрол, которое является соединением гадолиния и относится к группе препаратов под названием «Контрастные средства для магнитно-резонансной томографии (МРТ)». Этот препарат Вам введут внутривенно перед процедурой под названием магнитно-резонансная томография (МРТ) для получения более четкого изображения органов или сосудов. Препарат применяется только в диагностических целях – для выявления заболевания или установления его причин.

Показания к применению

Препарат Гадобутрол применяют у взрослых и детей любого возраста, включая доношенных новорожденных, для получения более четкого изображения при проведении МРТ всего тела, включая:

- МРТ головного и спинного мозга;

- МРТ головы и шеи;
- МРТ грудной клетки;
- МРТ молочных желез;
- МРТ области живота (в том числе поджелудочной железы, печени и селезенки);
- МРТ области малого таза (в том числе простаты, мочевого пузыря и матки);
- МРТ забрюшинного пространства (в том числе почек);
- МРТ костно-мышечной системы и конечностей;
- МРТ сердца;

а также для проведения магнитно-резонансной ангиографии.

Если после применения данного препарата Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Гадобутрол

Противопоказания

Не применяйте препарат Гадобутрол, если:

- у Вас аллергия на гадобутрол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно проинформируйте врача, если у Вас установлен кардиостимулятор или металлический (ферромагнитный) имплант, так как это обстоятельства, при которых нельзя проводить МРТ.

До введения препарата Гадобутрол обязательно сообщите лечащему врачу, если у Вас:

- ранее возникали реакции на любые контрастные средства;
- бронхиальная астма или аллергия;
- нарушена функция почек (в том числе, острая и хроническая почечная недостаточность)
Использование некоторых гадолинийсодержащих контрастных средств может спровоцировать развитие нефрогенного системного фиброза – заболевания, связанного с утолщением кожи и соединительных тканей. Нефрогенный системный фиброз может приводить к ограничению подвижности суставов, мышечной слабости или нарушению функции внутренних органов, что потенциально может угрожать жизни;
- тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;
- склонность к возникновению судорог;
- недавно была или планируется в скором времени пересадка печени.

Если Вам 65 лет и больше

Перед применением препарата Ваш лечащий врач может назначить Вам анализ крови, чтобы проверить состояние Ваших почек.

Аллергические реакции

После введения препарата Гадобутрол у Вас могут возникнуть аллергические реакции (см. раздел 4 «Возможные нежелательные реакции»). Их выраженность может быть от легкой (сыпь, зуд, отек) до тяжелой (удушье, обморок, шок). В большинстве случаев аллергия развивается в течение от получаса до часа после введения препарата, однако в редких случаях это может случиться позже – через несколько часов или дней. Если после введения препарата у Вас возникла аллергическая реакция, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Накопление в организме

Действие препарата Гадобутрол обусловлено содержанием в нем металла под названием гадолиний. Исследования показали, что после проведения обследования небольшое количество гадолиния может оставаться в организме, в том числе в головном мозге.

Нежелательных реакций из-за накопления гадолиния в головном мозге не наблюдалось.

Дети

Если Вашему ребенку менее 1 года, врач будет применять препарат Гадобутрол с применением дополнительных мер осторожности.

Другие препараты и препарат Гадобутрол

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

В особенности, сообщите врачу, если Вы принимаете препараты из группы бета-адреноблокаторов (применяются для лечения высокого артериального давления и других заболеваний сердца).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Препарат Гадобутрол не следует применять во время беременности, за исключением случаев, когда диагностическое исследование с данным препаратом назначил врач, зная о вашей беременности.

Грудное вскармливание

Перед проведением МРТ с применением препарата Гадобутрол обсудите с врачом необходимость прерывания грудного вскармливания на 24 часа после введения препарата.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата Гадобутрол может вызывать головокружения и обмороки, поэтому следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами в течение 24 часов после введения препарата. Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы планируете данные виды деятельности.

Препарат Гадобутрол содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на дозу (исходя из среднего количества, вводимого пациенту с массой тела 70 кг), т. е. практически не содержит натрия.

3. Применение препарата Гадобутрол

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. Препарат Гадобутрол Вам будет вводить врач или медицинская сестра.

Рекомендуемая доза

Врач подберет Вам дозу препарата индивидуально в зависимости от массы тела, вида диагностического исследования и других факторов.

Применение у детей и подростков

Врач подберет подходящую для Вашего ребенка дозу препарата в зависимости от его массы тела.

Путь и (или) способ введения

Препарат Гадобутрол вводится внутривенно.

Препарат Гадобутрол Вам будет вводить врач или медицинская сестра через небольшую иглу в вену. Введение препарата Гадобутрол осуществляется непосредственно перед проведением МРТ-исследования.

Если Вы получили препарата Гадобутрол больше, чем следовало

Подбор дозы и введение препарата Вам выполнит медицинский работник, поэтому маловероятно, что Вы получите слишком большую дозу препарата. Однако, если это произойдет, Ваш лечащий врач будет наблюдать за Вами, чтобы контролировать любые последующие симптомы.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к Вашему лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Гадобутрол может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Наиболее серьезными нежелательными реакциями при применении препарата Гадобутрол являются тяжелые аллергические реакции (анафилактоидные реакции) и остановка сердца.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если Вы испытываете какие-либо из следующих признаков:

- затрудненное дыхание;
- отек языка, горла или лица;
- насморк, чихание, кашель;
- покраснение, слезотечение, зуд в области глаз;
- сыпь;
- зуд.

Данные нежелательные реакции могут быть первыми проявлениями серьезной аллергической реакции.

В большинстве случаев аллергические реакции развиваются в течение от получаса до часа после введения препарата, однако в редких случаях это может случиться позже – через несколько часов или дней.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Гадобутрол в зависимости от частоты их возникновения:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;
- тошнота.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

Аллергические и алергоподобные реакции (гиперчувствительность/анафилактоидные реакции):

- анафилактоидный шок;
- сердечно-сосудистая недостаточность;
- остановка дыхания;
- отек легких;
- затрудненное дыхание вплоть до удушья (бронхоспазм);
- синюшность кожи (цианоз);
- ротоглоточный отек;
- отек гортани;

- снижение артериального давления (гипотензия);
- повышение артериального давления;
- боль в груди;
- крапивница;
- отек лица;
- быстро развивающийся отек кожи, слизистых оболочек и подкожной жировой клетчатки (отек Квинке);
- конъюнктивит;
- отек век;
- «приливы»;
- усиленная потливость;
- кашель;
- чихание;
- ощущение жара;
- бледность;

Другие нежелательные реакции:

- головокружение;
- нарушение восприятия вкуса (дисгевзия);
- онемение или покалывание кожи (парестезия);
- одышка;
- рвота;
- сыпь в виде мишеней на коже (эритема);
- сыпь (включая красную сыпь на коже (макулопапулезную сыпь) с зудом);
- реакции в месте введения, такие как жжение, ощущение холода или тепла, покраснение, сыпь, боль, синяк;
- ощущение жара.

Редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000:

- потеря сознания (обморок);
- судороги;
- искажение восприятия запахов (паросмия);
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- ощущение сердцебиения;
- сухость во рту;
- озноб;

- недомогание.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- остановка сердца;
- развитие нефрогенного системного фиброза — заболевания, связанного с утолщением кожи и соединительных тканей. Нефрогенный системный фиброз может приводить к ограничению подвижности суставов, мышечной слабости или нарушению функции внутренних органов, что потенциально может угрожать жизни.

В случае возникновения какой-либо нежелательной реакции обратитесь к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: + 7 (800) 550–99–03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

5. Хранение препарата Гадобутрол

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после слов «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

При температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке (флакон в пачке) для защиты от света и вдали от вторичного рентгеновского излучения месте.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Гадобутрол содержит

Действующим веществом является гадобутрол.

Каждый мл раствора содержит 1 ммоль (604,720 мг) гадобутрола (в виде моногидрата).

Каждый флакон с 5 мл препарата содержит 5 ммоль (3023,6 мг) гадобутрола (в виде моногидрата).

Каждый флакон с 7,5 мл препарата содержит 7,5 ммоль (4535,4 мг) гадобутрола (в виде моногидрата).

Каждый флакон с 10 мл препарата содержит 10 ммоль (6047,2 мг) гадобутрола (в виде моногидрата).

Каждый флакон с 15 мл препарата содержит 15 ммоль (9070,8 мг) гадобутрола (в виде моногидрата).

Каждый флакон с 20 мл препарата содержит 20 ммоль (12094,4 мг) гадобутрола (в виде моногидрата).

Каждый флакон с 25 мл препарата содержит 25 ммоль (15118 мг) гадобутрола (в виде моногидрата).

Каждый флакон с 30 мл препарата содержит 30 ммоль (18141,6 мг) гадобутрола (в виде моногидрата).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются трометамол, калькобутрол натрия, хлористоводородной кислоты раствор 1 М, вода для инъекций.

Препарат Гадобутрол содержит натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Гадобутрол и содержимое упаковки

Раствор для внутривенного введения.

Прозрачный бесцветный или слегка окрашенный раствор с оттенками от желтоватого или коричневатого до коричневатого- или зеленоватого-желтого цвета.

По 5 мл, 7,5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл или 30 мл во флаконы из бесцветного стекла 1-го гидролитического класса, герметично укупоренные пробками резиновыми из бромбутила, обжатые колпачками алюминиевыми или алюминиевыми колпачками с пластиковой крышечкой типа «flip-off».

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящуюся этикетку.

По 1 флакону вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона коробочного.

По 5 или 10 флаконов помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной.

По 1, 2 контурной ячейковой упаковке вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона коробочного.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «Авис Рус»

107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21

Производитель

Российская Федерация

ООО «МОСФАРМ»

Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный район, г.п. Богородское, рп. Богородское, д. 63

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «АльТро»

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21, эт. 1, пом. 14А.

Телефон: +7 (909) 906–28–04

Электронная почта: r.farmakonadzor@yandex.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <http://eec.eaeunion.org/>.

(линия отрыва или отреза)

Следующие сведения предназначены исключительно для медицинских работников:

Несовместимость

В связи с отсутствием исследований совместимости, данный лекарственный препарат не следует смешивать с другими лекарственными препаратами.

Хранение после первого вскрытия

Физико-химическая и микробиологическая стабильность сохраняется в течение 24 часов при температуре 20 – 25 °С.

С микробиологической точки зрения, препарат следует использовать немедленно. Если препарат не использован незамедлительно, ответственность за соблюдение сроков и условий хранения после вскрытия до применения несет медицинский персонал. Время до применения не должно превышать 24 часа при температуре 20 – 25 °С.

Инструкции по работе с препаратом

Перед введением следует внимательно осмотреть флакон. При значительном изменении цвета, обнаружении видимых частиц или нарушении целостности упаковки препарат нельзя применять.

Набирать препарат Гадобутрол в шприц следует только непосредственно перед введением. Резиновую пробку флакона не следует прокалывать более 1 раза.

Введение препарата должно проводиться с соблюдением общепринятых мер предосторожности при проведении магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением.

Неиспользованную в ходе одного исследования часть препарата следует уничтожить.

Утилизация

Весь оставшийся лекарственный препарат и отходы следует уничтожить в соответствии с установленными национальным законодательством требованиями.

Способ применения

Препарат используется только для внутривенного применения.

Необходимую дозу вводят внутривенно в виде болюса. Для проведения перфузионных исследований головного мозга при диагностике инсульта, распознавании очаговой ишемии головного мозга или оценки кровоснабжения опухоли рекомендуется использовать автоматический инъектор.

Получение изображения

Проведение магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением можно начинать сразу (вскоре после инъекции в зависимости от применяемой импульсной последовательности и протокола исследования).

Оптимальное увеличение сигнала наблюдается во время первого прохождения через артериальные сосуды при проведении МРА с контрастным усилением и в течение периода времени, измеряемого 15 минутами, после введения препарата Гадобутрол при проведении других исследований, в том числе исследований ЦНС (время зависит от типа повреждения/ткани).

Для исследований с контрастированием T₁-взвешенные импульсные последовательности

являются наиболее подходящими.

Режим дозирования

Взрослые

Рекомендовано однократное внутривенное введение гадобутрола в дозе 0,1 ммоль/кг (эквивалентно 0,1 мл препарата Гадобутрол на 1 кг массы тела). Максимальная доза гадобутрола для исследований центральной нервной системы (ЦНС) и магнитно-резонансной ангиографии с контрастным усилением составляет 0,3 ммоль на 1 кг массы тела (что эквивалентно 0,3 мл препарата Гадобутрол на 1 кг массы тела).

Доза 0,075 ммоль гадобутрола на 1 кг массы тела (эквивалентно 0,075 мл препарата Гадобутрол на 1 кг массы тела) может вводиться как минимальная для визуализации ЦНС.

MPT всего тела (кроме МРА)

Как правило, достаточным является внутривенное введение препарата Гадобутрол в дозе 0,1 мл на 1 кг массы тела (что эквивалентно 0,1 ммоль на 1 кг массы тела).

- *Дополнительные рекомендации для краниальной и спинальной МРТ*

Если остаются подозрения о наличии поражений или необходима более точная информация о числе, размере и распространенности поражений, то диагностическую эффективность исследования можно повысить, дополнительным введением раствора препарата Гадобутрол в дозе от 0,1 мл до 0,2 мл на 1 кг массы тела в течение 30 минут после предыдущей инъекции.

Чтобы исключить метастазы или рецидив опухоли, вводят раствор препарата Гадобутрол в дозе 0,3 мл на 1 кг массы тела, что часто способствует повышению диагностической эффективности исследования. Это относится к поражениям со слабой выраженностью сети кровеносных сосудов, с малым внеклеточным пространством или сочетанием этих факторов, а также к использованию при сканировании относительно менее интенсивных T₁-взвешенных импульсных последовательностей.

Для перфузионных исследований головного мозга рекомендуется использовать инъектор и раствор препарата Гадобутрол, который вводят в дозе 0,1 – 0,3 мл на 1 кг массы тела со скоростью 3 – 5 мл/сек.

Магнитно-резонансная ангиография

- *Одна область сканирования:*

7,5 мл для массы тела менее 75 кг;

10 мл для массы тела 75 кг и более

(соответствует 0,1 – 0,15 ммоль на 1 кг массы тела).

- *Более одной области сканирования:*

15 мл для массы тела менее 75 кг;

20 мл для массы тела 75 кг и более

(соответствует 0,2 – 0,3 ммоль на 1 кг массы тела).

У пациентов до года, пациентов в периоперационный период трансплантации печени, а также у пациентов с тяжелыми нарушениями почек ($\text{СКФ} < 30 \text{ мл/мин/1,73 м}^2$) применение препарата должно быть ограничено введением одной стандартной дозы (0,1 ммоль/кг массы тела) и повторное введение не должно проводиться ранее, чем через 7 дней.