

Sample demographics and characteristics

		Female N(% of total)	Male N(% of total)	Overall N(% of total)
Total		88(61.9)	60(42.2)	142
Clinical Frailty scale score	1	0(0)	1(0.6)	1(0.6)
	2	2(1.3)	1(0.6)	3(2)
	3	8(5.4)	3(2)	11(7.4)
	4	9(6)	9(6)	18(12.1)
	5	11(7.4)	10(6.7)	21(14.1)
	6	23(15.5)	18(12.1)	41(27.7)
	7	30(20.2)	11(7.4)	41(27.7)
	8	2(1.3)	2(1.3)	4(2.7)
	9	3(2)	5(3.3)	8(5.4)
	Median	6	6	6
Frailty level	Mild	30(20.2)	24(16.2)	54(36.4)
	Moderate	23(15.5)	18(12.1)	41(27.7)
	Severe	35(23.6)	18(12.1)	53(35.8)
Presenting complaint	Fall	35(23.6)	21(14.1)	56(37.8)
	Infection	25(16.8)	18(12.1)	43(29)
	Malignancy	2(1.3)	3(2)	5(3.3)
	Stroke	9(6)	9(6)	18(12.1)
	GI	3(2)	3(2)	6(4)
	MSK	5(3.3)	1(0.6)	6(4)
	Other neuro	5(3.3)	2(1.3)	7(4.7)
	CVS	1(0.6)	1(0.6)	2(1.3)
	Other	3(2)	2(1.3)	5(3.3)

		Female N(% of total)	Male N(% of total)	Overall N(% of total)
Age	<= 40	0(0)	1(0.6)	1(0.6)
	41 - 45	0(0)	1(0.6)	1(0.6)
	46 - 50	1(0.6)	0(0)	1(0.6)
	51 - 55	1(0.6)	0(0)	1(0.6)
	56 - 60	1(0.6)	1(0.6)	2(1.3)
	61 - 65	1(0.6)	2(1.3)	3(2)
	66 - 70	7(4.7)	5(3.3)	12(8.1)
	71 - 75	8(5.4)	7(4.7)	15(10.1)
	76 - 80	14(9.4)	10(6.7)	24(16.2)
	81 - 85	17(11.4)	14(9.4)	31(20.9)
	86 - 90	19(12.8)	14(9.4)	33(22.2)
	91 - 95	15(10.1)	3(2)	18(12.1)
	96+	4(2.7)	2(1.3)	6(4)
	Median	85.00	81.00	84.00
	Mean	82.47	79.30	81.18
	Std.	9.991	11.092	10.530
	Minimum	47	40	40
	Maximum	99	99	99

88	60	148
0	1	1
2	1	3
8	3	11
9	9	18
11	10	21
23	18	41
30	11	41
2	2	4
3	5	8

Grouped pr Fall	35	21	56
Infection	25	18	43
Malignancy	2	3	5
Stroke	9	9	18
GI	3	3	6
MSK	5	1	6
Other neuro	5	2	7
CVS	1	1	2
Other	3	2	5

Frailty level	mild	30
	moderate	23
	severe	35
Age group	<= 40	0
	41 - 45	0
	46 - 50	1
	51 - 55	1
	56 - 60	1
	61 - 65	1
	66 - 70	7
	71 - 75	8
	76 - 80	14
	81 - 85	17
	86 - 90	19
	91 - 95	15
	96+	4
	Median	85.00
	Mean	82.42

Std.	10.079
Minimum	47
Maximum	99

24	54
18	41
18	53
1	1
1	1
0	1
0	1
1	2
2	3
5	12
7	15
10	24
14	31
14	33
3	18
2	6
81.50	84.00
79.71	81.18

11.299	10.530
--------	--------

40	40
----	----

99	99
----	----

--	--