

Advance care planning			Advance care planning		
	No	Yes		No	Yes
	(n=124)	(n=18)		(n=124)	(n=18)
	Freq. (%)	Freq. (%)		Freq. (%)	Freq. (%)
CFS		$p=0.011^*$	Age		$p=0.016^*$
1	1(100)	0(0)	<= 40	1(100)	0(0)
2	3(100)	0(0)	41 - 45	1(100)	0(0)
3	10(90.9)	1(9)	46 - 50	1(100)	0(0)
4	17(94.4)	1(5.5)	51 - 55	1(100)	0(0)
5	18(90)	2(10)	56 - 60	2(100)	0(0)
6	39(95.1)	2(4.8)	61 - 65	3(100)	0(0)
7	33(82.5)	7(17.5)	66 - 70	10(90.9)	1(9)
8	1(25)	3(75)	71 - 75	14(100)	0(0)
9	2(50)	2(50)	76 - 80	20(95.2)	1(4.7)
Frailty level	chi-square	$p=0.007^\dagger$	81 - 85	27(87)	4(12.9)
Mild	49(92.4)	4(7.5)	86 - 90	30(93.7)	2(6.2)
Moderate	39(95.1)	2(4.8)	91 - 95	9(50)	9(50)
Severe	36(75)	12(25)	96+	5(83.3)	1(16.6)
Presenting complaint		$p=0.034^*$	Gender		$p=1.0^\dagger$
Fall	49(89)	6(10.9)	Female	75(87.2)	11(12.7)
Infection	36(85.7)	6(14.2)	Male	49(87.5)	7(12.5)
Malignancy	2(50)	2(50)			
Stroke	18(100)	0(0)			
GI	6(100)	0(0)			
MSK	6(100)	0(0)			
Other neuro	3(60)	2(40)			
CVS	1(50)	1(50)			
Other	3(75)	1(25)			

* Fisher's exact test

† Chi-squared test