

TD8

IPESUP - PC

11 Janvier 2024

1 Rappels de cours

1. Définitions :

- Ligne de courant : Courbe de l'espace qui possède en tout point une tangente parallèle à la vitesse du fluide.
- Tube de courant : Ensemble des lignes de courant qui passent par un contour fermé.
- Fluide parfait : Fluide sans viscosité.

2. Conservation de la masse :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$$

On a souvent $\rho = \text{cste}$, donc $\text{div}(\vec{v}) = 0$.

3. Accélération particulaire :

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}(f)$$

$\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}(f)$ est un opérateur :

$$\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}(f) = v_x \frac{\partial f}{\partial x} + v_y \frac{\partial f}{\partial y} + v_z \frac{\partial f}{\partial z}$$

Pour une variable vectorielle, on a :

$$\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}(\vec{f}) = \vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}(f_x) \vec{e}_x + \vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}(f_y) \vec{e}_y + \vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}(f_z) \vec{e}_z$$

4. Equations dynamiques :

$$\text{Equation d'Euler : } \rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\vec{\text{grad}}(P) + \rho \vec{g}$$

On obtient cette équation en appliquant le PFD à une particule de fluide.

5. Théorème de Bernoulli :

Pour un Fluide parfait, en Régime stationnaire, dans un écoulement Incompressible , dans un référentiel Galiléen, et si le fluide est homogène (FRIGO), alors on a (sur une ligne de courant) :

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z = \text{cste}$$

Si en plus le fluide est irrotationnel, cette formule est vraie partout ! (pas que sur une ligne de courant)

6. Formule utile :

$$\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}(v) = r \vec{\text{ot}}(\vec{v}) \times \vec{v} + \text{grad}(v^2/2)$$

2 Bulle de cavitation :

Au sein d'un fluide incompressible, une bulle de rayon a , sphérique et vide, est formée à l'instant $t=0$. Ce phénomène peut par exemple se produire à proximité de l'hélice d'un sous-marin. On cherche à déterminer l'évolution du rayon de la bulle en fonction du temps. On notera $a(t)$ le rayon de la bulle. On néglige les effets de la pesanteur et on note P_0 la pression du fluide loin de la bulle, ainsi que $\vec{v}(r, t)$ le champ de vitesse.

1. Montrer que $v(r, t) = a(t)^2 \frac{1}{r^2} \frac{da}{dt}$. En déduire que l'écoulement dérive d'un potentiel $\Phi(r, t)$ qu'on déterminera.
2. Trouver l'équation vérifiée par $a(t)$. *Indication : on pourra intégrer l'équation d'Euler entre a et l'infini.*
3. Estimer un temps caractéristique d'implosion.
4. Le Titan est un sous-marin civil perdu en mer le 18 juin 2023. D'après les enquêteurs, le sous-marin aurait subi une implosion à une profondeur de 3800m. En justifiant que le temps caractéristique calculé précédemment peut être utilisé pour déterminer un ordre de grandeur de la durée d'implosion du Titan, commenter la phrase suivante : " Les passagers ne se sont pas rendus compte de ce qui leur arrivait ".

Donnée : Les signaux nerveux se propagent dans le corps humain à une vitesse de l'ordre de 50m/s.

3 Profil de température