

Zestaw 5 — Relacje

Część A

1. Niech $X = \{0, 1, 2\}$. Zdefiniujmy relację R w X w ten sposób, że mRn wtedy i tylko wtedy, gdy

- a) $m \leq n$,
- b) $mn = 0$,
- c) $m^2 + n^2 = 2$,
- d) $m + n \in X$.

Zapisz relację R jako zbiór par uporządkowanych.

2. Czy relacja mniejszości $<$ w zbiorze \mathbb{R} jest relacją porządku?

3. Czy relacja podzielności $|$ w zbiorze $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ jest relacją porządku?

4. Niech X będzie zbiorem wszystkich ludzi. Które z poniższych relacji są relacjami równoważności?

- a) $xRy \equiv x$ i y mieszkają w tym samym kraju.
- b) $xRy \equiv x$ i y mieszkają w tym samym lub sąsiednim kraju.
- c) $xRy \equiv x$ i y mają wspólnego rodzica.
- d) $xRy \equiv x$ i y mają tę samą matkę.

Dla relacji równoważności opisać klasy abstrakcji względem tej relacji.

Część B

5. Sprawdź, czy następujące relacje R w zbiorze X są zwrotne, symetryczne, antysymetryczne, przechodnie i spójne:

- a) $X = \mathbb{Z}$, $xRy \Leftrightarrow 3 \mid x - y$,
- b) $X = \mathbb{N}$, $xRy \Leftrightarrow 2 \mid x + y$,
- c) $X = \mathbb{N}$, $xRy \Leftrightarrow 3 \mid x + y$,
- d) $X = \mathbb{Z}$, $xRy \Leftrightarrow 5 \mid x^3 - y^3$,
- e) $X = \mathbb{R}$, $xRy \Leftrightarrow x^2 = y^2$,
- f) $X = \mathbb{R}$, $xRy \Leftrightarrow x^2 \neq y^2$,
- g) $X = \mathbb{R}$, $xRy \Leftrightarrow x^3 = y^3$,
- h) $X = \mathbb{R}$, $xRy \Leftrightarrow |x| < |y|$,
- i) $X = \mathbb{R}$, $xRy \Leftrightarrow |x| + |y| = 3$,
- j) $X = \mathbb{N}$, $xRy \Leftrightarrow x > y \vee y > x$,
- k) $X = \mathbb{R}$, $xRy \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$,
- l) $X = 2^{\mathbb{N}}$, $xRy \Leftrightarrow |x \triangle y| < +\infty$.

6. Wykaż, że jeśli relacja R w X jest spójna i symetryczna, to $R = X \times X$.

7. Podaj przykład relacji, która jest

- a) zwrotna i antysymetryczna, ale nie przechodnia,
- b) zwrotna i przechodnia, ale nie jest antysymetryczna,
- c) przechodnia i antysymetryczna, ale nie jest zwrotna.

8. Niech zbiór $X = \{3, 5, 7, 9, \dots, 19, 21\}$ będzie uporządkowany przez relację podzielności. Znajdź elementy wyróżnione.

9. Niech

- a) $X = \mathbb{N}$, $A = \{18, 21, 36\}$,
- b) $X = \{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$, $A = \{3, 7, 9, 21, 27\}$,
- c) $X = \{2^n \cdot 3^k : n, k \in \mathbb{N}_0\}$, $A = X \cap \{20, 21, \dots, 119, 120\}$,

przy czym X jest zbiorem uporządkowanym przez relację podzielności. Wyznacz kresy zbioru A .

10. Niech

$$A = \{2^n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{5^n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{6, 7, 10\}.$$

Wyznacz elementy wyróżnione oraz kresy zbioru A jako podzbioru \mathbb{N} uporządkowanego przez relację podzielności.

11. W zbiorze \mathbb{N}^2 relacja R jest zdefiniowana wzorem

$$(x, y)R(s, t) \Leftrightarrow x \leq s \wedge y|t.$$

Wyznacz elementy wyróżnione oraz kresy zbiorów

$$A = \{(2, 1), (1, 3), (1, 4), (1, 6)\}, \quad B = \{(1, 2), (2, 1), (1, 4), (3, 2), (3, 8)\}.$$

12. Dla ustalonego $k \in \mathbb{N}$ podaj przykład zbioru uporządkowanego, w którym jest dokładnie

- $k + 1$ elementów, z czego jeden to element minimalny, a reszta to elementy maksymalne,
- k elementów, przy czym wszystkie są minimalne i maksymalne.

13. Uzasadnij, że w każdym uporządkowanym zbiorze skończonym istnieje co najmniej jeden element minimalny i co najmniej jeden element maksymalny.

14. Załóżmy, że w uporządkowanym zbiorze skończonym istnieje dokładnie jeden element maksymalny (minimalny). Wykaż, że jest to również element największy (najmniejszy).

15. Niech X będzie zbiorem skończonym liniowo uporządkowanym przez relację \prec . Udowodnij, że elementy zbioru X można ustawić w ciągu x_1, x_2, \dots, x_n w ten sposób, że

$$x_1 \prec x_2 \prec \dots \prec x_n.$$

16. Podaj przykład nieskończonego zbioru uporządkowanego, w którym jest

- nieskończenie wiele elementów minimalnych i k maksymalnych, dla ustalonego $k \in \mathbb{N}$,
- dokładnie jeden element minimalny, a pozostałe są maksymalne.

17. Które z następujących relacji R w zbiorze X są relacjami równoważności?

- $X = \mathbb{Z}$, $xRy \Leftrightarrow 3 \mid x - y$.
- $X = \mathbb{N}$, $xRy \Leftrightarrow xy$ jest liczbą nieparzystą.
- $X = \mathbb{N}$, $xRy \Leftrightarrow \bigvee_{t \in \mathbb{N}} xy = t^2$.
- $X = \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $(x, y)R(s, t) \Leftrightarrow x, s \neq 0 \wedge xs > 0$.
- $X = 2^Y$ dla pewnego zbioru Y , $xRy \Leftrightarrow x \subset y \vee y \subset x$.
- $X = \mathbb{N}_0^2 = \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$, $(m, n)R(a, b) \Leftrightarrow m + b = n + a$.
- $X = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$, $(m, n)R(a, b) \Leftrightarrow mb = na$.

Dla relacji równoważności opisz klasy abstrakcji względem tej relacji.

18. Niech R będzie relacją zwrotną i przechodnią. Wykaż, że relacja R' zdefiniowana wzorem $xR'y \equiv xRy \wedge yRx$ jest relacją równoważności.