

Many-Body Perturbation Theory

Sebastian G. Winther-Larsen

11. desember 2017

Motivasjon

Perturbasjonteori (PT)

Rayleigh-Schrödinger PT

Møller-Plesset PT

Konvergensproblemer

Hybridmodeller

Motivasjon

For nesten alle systemer av interesse i kjemi kan ikke Schrödinger-likningen løses nøyaktig. En trenger tilnærmede metoder, hvor en standard verktøykasse inneholder

- Hartree-Fock (HF),
- Konfigurasjonsinteraksjonsteori (CI),
- Koblet klynge-teori (CC),
- Perturbasjonsteori (PT) ←

Perturbasjonteori (PT)

Formell pertubasjonsteori

Del opp

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}, \quad (1)$$

slik at Schrödinger-likningen (SL) kan skrives

$$(\hat{H}_0 + \hat{V}) |\Psi\rangle = E |\Psi\rangle, \quad |\Psi\rangle = |\psi_0\rangle + |\chi\rangle, \quad (2)$$

hvor

$$\hat{H}_0 |\Phi_0\rangle = E_0^{(0)} |\Phi_0\rangle \quad (3)$$

har en kjent løsning.

Anvender $\langle \Phi_0 |$ på Schrödingerlikningen,

$$\langle \Phi_0 | \hat{H}_0 | \Psi \rangle + \langle \Phi_0 | \hat{V} | \Psi \rangle = E \langle \Phi_0 | \Psi \rangle \quad (4)$$

$$\rightarrow E - E_0^{(0)} = \Delta E = \langle \Phi_0 | \hat{V} | \Psi \rangle, \quad (5)$$

Hvor jeg har brukt at $\langle \Phi_0 | \Phi_0 \rangle = 1$, $\langle \Phi_0 | \chi \rangle = 0 \rightarrow \langle \Phi_0 | \Psi \rangle = 1$.

Introduserer projeksjonsoperatorer

$$\hat{P} = |\Phi_0\rangle \langle \Phi_0|, \quad \hat{Q} = \mathbb{1} - \hat{P} = \sum_{i=1}^{\infty} |\Phi_i\rangle \langle \Phi_i|. \quad (6)$$

Viktige egenskaper: $\hat{Q}^2 = \hat{Q}$, $\hat{P}^2 = \hat{P}$, $[\hat{P}, \hat{H}_0] = [\hat{Q}, \hat{H}_0] = 0$,
 $\hat{P}\hat{Q} = \hat{Q}\hat{P} = 0$.

Om bølgefunksjonen skrives om en lineær kombinasjon

$|\Psi\rangle = \sum_i a_i |\Phi_i\rangle$ så henter \hat{P} ut $|\Phi_0\rangle$,

$$\hat{P}|\Psi\rangle = a_0 |\Phi_0\rangle, \quad \hat{Q}|\Psi\rangle = \sum_{i \neq 0} a_i |\Phi_i\rangle \quad (7)$$

$$\rightarrow |\Psi\rangle = \hat{P}|\Psi\rangle + \hat{Q}|\Psi\rangle. \quad (8)$$

Skriver om Schrödingerlikningen

$$(\hat{H}_0 + \hat{V}) |\Psi\rangle = E |\Psi\rangle \quad (9)$$

$$-\hat{H}_0 |\Psi\rangle = (\hat{V} - E) |\Psi\rangle \quad (10)$$

$$(\zeta - \hat{H}_0) |\Psi\rangle = (\hat{V} - E + \zeta) |\Psi\rangle \quad (11)$$

$$\hat{Q}(\zeta - \hat{H}_0)\hat{Q} |\Psi\rangle = \hat{Q}(\hat{V} - E + \zeta) |\Psi\rangle. \quad (12)$$

Trenger den inverse (størrelsen) til $\hat{Q}(\zeta - \hat{H}_0)\hat{Q}$ i Q-rommet, også kjent som den resolvente (størrelsen) til H_0

$$\frac{\hat{Q}}{\zeta - \hat{H}_0} \hat{Q}(\zeta - \hat{H}_0)\hat{Q} = \hat{Q} \rightarrow \hat{R} \equiv \frac{\hat{Q}}{\zeta - \hat{H}_0} \quad (13)$$

Anvender \hat{R} på den omskrevne Schrödingerlikningen

$$\hat{R}\hat{Q}(\zeta - \hat{H}_0)\hat{Q}|\Psi\rangle = \hat{R}\hat{Q}(\hat{V} - e + \zeta)|\Psi\rangle \quad (14)$$

$$\hat{Q}|\Psi\rangle = \hat{R}(\hat{V} - e + \zeta)|\Psi\rangle \quad (15)$$

$$\rightarrow |\Psi\rangle = |\phi_0\rangle + \hat{R}(\hat{V} - e + \zeta)|\Psi\rangle, \quad (16)$$

Om en betrakter dette som en rekursjonsrelasjon så får en

$$|\Psi\rangle = \sum_{m=0}^{\infty} [\hat{R}(\hat{V} - E + \zeta)]^m |\Phi_0\rangle. \quad (17)$$

- Brillouin-Wigner PT: $\zeta = E$,
- Rayleigh-Schrödinger PT: $\zeta = E_0^{(0)} \rightarrow E + \zeta = -\Delta E$.

Rayleigh-Schrödinger PT

Møller-Plesset PT

Konvergenzprobleme

Hybridmodeller
