

Midterm "Take home"-exam FYS3110

Unable to see candidate no

October 7, 2016

1 Spin-1/2 systems

The following is given:

$$\begin{aligned}\hat{S}^2 &= \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2, \quad \hat{S}^\pm = \hat{S}_x \pm i\hat{S}_y \\ |\uparrow\rangle &\equiv \left| s = \frac{1}{2}, m_s = \frac{1}{2} \right\rangle, \quad |\downarrow\rangle \equiv \left| s = \frac{1}{2}, m_s = -\frac{1}{2} \right\rangle \\ \hat{S}^2 |\uparrow\rangle &= \hbar^2 \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) |\uparrow\rangle, \quad \hat{S}^2 |\downarrow\rangle = \hbar^2 \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) |\downarrow\rangle \\ \hat{S}_z |\uparrow\rangle &= \frac{\hbar}{2} |\uparrow\rangle, \quad \hat{S}_z |\downarrow\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle \\ [\hat{S}_x, \hat{S}_y] &= i\hbar \hat{S}_z, \quad [\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar \hat{S}_x, \quad [\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar \hat{S}_y\end{aligned}$$

1.1

$$\hat{S}_z \hat{S}^+ |\downarrow\rangle = \hat{S}_z \hat{S}_x |\downarrow\rangle + i\hat{S}_z \hat{S}_y |\downarrow\rangle$$

rewriting commutation relations

$$\begin{aligned}[\hat{S}_z, \hat{S}_x] &= \hat{S}_z \hat{S}_x - \hat{S}_x \hat{S}_z = i\hbar \hat{S}_y \rightarrow \hat{S}_z \hat{S}_x = i\hbar \hat{S}_y + \hat{S}_x \hat{S}_z \\ [\hat{S}_y, \hat{S}_z] &= \hat{S}_y \hat{S}_z - \hat{S}_z \hat{S}_y = i\hbar \hat{S}_x \rightarrow \hat{S}_z \hat{S}_y = \hat{S}_y \hat{S}_z - i\hbar \hat{S}_x,\end{aligned}$$

gives

$$\begin{aligned}\hat{S}_z \hat{S}^+ |\downarrow\rangle &= (i\hbar \hat{S}_y + \hat{S}_x \hat{S}_z + i\hat{S}_y \hat{S}_z + \hbar \hat{S}_x) |\downarrow\rangle \\ &= \left(i\hbar \hat{S}_y - \frac{\hbar}{2} \hat{S}_x - i\frac{\hbar}{2} \hat{S}_y + \hbar \hat{S}_x \right) |\downarrow\rangle \\ &= \left(\frac{\hbar}{2} \hat{S}_x + i\frac{\hbar}{2} \hat{S}_y \right) |\downarrow\rangle = \frac{\hbar}{2} \hat{S}^+ |\downarrow\rangle.\end{aligned}$$

This means that $\hat{S}^+ |\downarrow\rangle$ is an eigenstate of \hat{S}_z with eigenvalue $\hbar/2$.