LaTex Lab-1

OMRAN ABUDAHER

30 september 2021

1 Induktionsbevis

1.1 Strategi för induktionsbevis

Om man vill visa att ett påstående är sant för alla heltal $n \ge a$, så kan man göra på följande sätt:

- Induktionsbas: Visa att påståendet är sant för n = a.
- Induktionsantagande: Anta att påståendet är sant för ett visst värde på n, t.ex. n=p, dvs. anta att $VL_p=HL_p$
- Induktionssteg: Visa med hjälp av induktionsantagandet att påståendet där är sant även för n=p+1, dvs.att $VL_{p+1}=HL_{p+1}$
- Slutsats: Eftersom påståendet är sant för n=a och för två på varandra följande tal, så är påståendet sant för alla tal $n \ge a$.

1.2 Uppgiften:

Visa att:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Min lösning för denna upgift så här:

• För n = 1, får vi (induktionsbas):

$$VL =$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2}$$

HL =

$$\frac{n}{n+1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

 $\therefore VL = HL, \quad \forall n \in \mathbb{Z}_+$

• Nu antar vi att påståendet är sant för ett visst värde av n, vi kallar det värdet för p. Alltså antar vi att för n=p gäller $\frac{1}{p(p+1)}=\frac{p}{p+1}$. (induktionsantagande)

(1)

• Vi ska nu undersöka om detta medför att påståendet är sant även för nästa värde på n, dvs. för n=(p+1): Vi sätter in (n=p+1) i HL.

$$VL_{(p+1)} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{p(p+1)} + \frac{1}{(p+1)(p+2)} = (\frac{p+1}{p+2}) = \frac{HL_{(p+1)}}{p+2}$$

Från (1) (induktionsantagande):

 $VL_{(p+1)}$

$$= \frac{p}{p+1} + \frac{1}{(p+1)(p+2)}$$

$$= \frac{p(p+2)+1}{(p+1)(p+2)}$$

$$= \frac{p^2+2p+1}{(p+1)(p+2)}$$

$$= \frac{(p+1)(p+1)}{(p+1)(p+2)}$$

$$= \frac{(p+1)}{(p+2)} = HL_{(p+1)}$$

Alltså är $\overline{VL}_{(p+1)} = \overline{HL}_{(p+1)}$, dvs.VL = HLäven för p+1.

• Jag har nu visat att påståendet är sant för n = 1, så är det också sant för nästa tal p + 1. Detta gör att vi kan dra slutsatsen att påståendet också är sant för alla positiva heltal

$$\therefore \forall n \in \mathbb{Z}_+$$