

Вкладення Йонеди в сімпліціальній теорії типів

Данієль Гратцер, Джонатан Вайнбергер та Ульрік Бухгольц

17 травня 2026 р.

Анотація

Ріль і Шульман [46] ввели *симпліціальну теорію типів* (STT), варіант гомотопічної теорії типів, який мав на меті вивчати не лише теорію гомотопій, але і її злиття з теорією категорій: теорію $(\infty, 1)$ -категорій. Хоча це і є технічно складним, маніпулювання ∞ -категоріями в симпліціальній теорії типів часто є простішим, ніж робота зі звичайними категоріями, оскільки теорія типів обробляє нескінченні стеки когерентностей у фоновому режимі. Ми спираємося на нещодавню роботу [19], що визначає $(\infty, 1)$ -категорію ∞ -групоїдів у STT, щоб визначити категорії передпучків у межах STT та систематично розвинути їхню теорію. Зокрема, ми будемо вкладення Йонеди, доводимо універсальну властивість категорій передпучків, уточнюємо теорію спряженостей у STT, вводимо теорію розширень Кана та доводимо теорему А Квіллена. На додаток до великого обсягу теорії категорій у STT, ми пропонуємо вагомий докази того, що STT може бути використана для отримання складних результатів у теорії ∞ -категорій з набагато меншою складністю.

Присвячується світлій пам'яті Томаса Штрайхера (1958–2025)

1 Вступ

Расселл [48] відомим чином описав два стилі формалізації математики як різницю між *крадіжкою* та *чесною працею*. Обидва підходи можна побачити в сучасному використанні залежної теорії типів. Чесна праця передбачає *аналітичний* підхід: трактування типів як базових об'єктів, еквівалентних множинам, а також визначення і міркування про такі об'єкти, як дійсні числа, групи та топологічні простори, як це робиться зазвичай. Це те, що робиться, наприклад, у доведенні Coq Теорема про непарний порядок [14]. Більш швидкий шлях крадіжки передбачає розгляд теорії типів як спеціалізованої *синтетичної* мови для певного типу математичних об'єктів і постулювання їх базових властивостей. Це звужує сферу застосування теорії типів, але, водночас, робить доведення про ці конкретні об'єкти набагато лаконічнішими. Наприклад, *гомотопічна теорія типів* (HoTT) [53] постулює різні аксіоми, які гарантують, що типи поводяться як простори (з точністю до гомотопії), уможливорюючи доведення теорем з алгебраїчної топології без введення явного опису простору. Насправді, синтетичний підхід менше схожий на крадіжку, ніж на позику; ви розплачуєтеся за налаштовану теорію типів семантичною моделлю, яка інтерпретує типи як потрібні об'єкти і валідує додаткові аксіоми.

У цій роботі ми використовуємо синтетичну методологію для застосування теорії типів до вивчення теорії категорій. Зокрема, ми додаємо різні аксіоми до гомотопічної теорії типів, щоб побудувати систему, де гасло HoTT “всі типи є просторами, а всі функції неперервними” замінюється на “(деякі) типи є (∞) -категоріями, а всі функції є функторами”.¹ Це розширення теорії типів називається *симпліціальною* теорією типів (STT) і було введено [46].

Хоча знання ∞ -категорій не є обов'язковим для використання нашої теорії, груба інтуїція щодо них допомагає для розуміння STT. Тому ми нагадаємо наступне нечітке визначення. ∞ -категорія $\mathcal{C}$ – це сукупність об'єктів з *простором* стрілок між об'єктами c та d , $\text{hom}(c, d)$, а не множиною, оснащена неперервною операцією композиції та призначенням тотожних стрілок. Вирішальним є те, що операція композиції має бути асоціативною та унітальною лише з точністю до гомотопії, але з обмеженням, що ці гомотопії самі задовольняють закони *когерентності* у вигляді додаткових гомотопій, і так далі з когерентностями між когерентностями-

¹У цій статті під ∞ -категорією ми розуміємо $(\infty, 1)$ -категорію.

ми тощо. Як вільна аналогія, подібно до того, як моноїдальна категорія послаблює моноїди, дозволяючи $\otimes$ бути асоціативним з точністю до ізоморфізмів, що задовольняють певні рівняння когерентності, ∞ -категорії послаблюють звичайні категорії дозволяючи законам категорій виконуватися лише з точністю до (нескінченно когерентних) ізоморфізмів.

Прикметно, що практично кожна теорема, на яку можна сподіватися для звичайних категорій, виконується для ∞ -категорій.² Однак, доведення є набагато складнішими, оскільки вони працюють з *моделлями* ∞ -категорій (інструментами, що використовуються для організації та управління вежею когерентностей [5]). Метою STT є використання теорії типів, щоб приховати когерентності від користувача і дозволити доведення, які є не складнішими, ніж класичні міркування для 1-категорій.

У цій роботі ми надаємо вагомні докази цієї гіпотези, розвиваючи велику частину теорії категорій—кілька основних результатів *Категорій для працюючого математика* [28]—виключно в межах STT.

1.1 Симпліціальна теорія типів

Щоб побудувати теорію типів для синтетичної теорії категорій, можна було б сподіватися інтерпретувати теорію типів у категорію категорій (∞ або інакше), щоб гарантувати, що типи реалізують категорії. Однак, категорія CAT малих категорій поводить себе занадто погано, щоб утворити модель теорії типів Мартіна-Льофа (MLTT). Замість цього, [46] розширюють CAT і вкладають її як рефлексивну підкатегорію в категорію (∞) -передпучків на симплекс-категорії $\hat{\Delta}$, яка є достатньо багатою для моделювання HoTT. Тоді STT аксіоматизує частину $\hat{\Delta}$, щоб ізолювати CAT як рефлексивний підуніверсум у межах теорії типів [47].

Ми введемо повний набір доповнень у Розділі 2 (зібраних у Додатку B для зручності), але найважливішим серед них є постульований *інтервальний тип* $\mathbb{I} : \mathcal{U}_0$. Ми додатково припускаємо, що $\mathbb{I}$ є обмеженим лінійним порядком з кінцевими точками $0, 1 : \mathbb{I}$. Інтуїтивно, $\mathbb{I}$ має фіксувати категорію $\{0 \rightarrow 1\}$ —він так інтерпретується в $\hat{\Delta}$ —і ми можемо використовувати це для визначення та дослідження типу *синтетичних морфізмів* у довільному типі X : стрілка в X відповідає звичайній функції $\mathbb{I} \rightarrow X$, причому обчислення в $0, 1$ дає домен і кодомен. Наприклад,

²Принаймні, як зауважив один з наших рецензентів, за умови правильного калібрування своїх сподівань.

тотожна стрілка в $x : X$ задається як $\lambda_{-}.x$.

Однак, подібно до того, як цільова модель $\hat{\Delta}$ є строго більшою за CAT, не всі типи в STT достовірно моделюють категорії. Зокрема, хоча завжди можна побудувати тотожні морфізми, не всі типи мають оператор композиції. Дивовижно, проте, що оператори композиції є унікальними, коли вони існують, і їх існування для типу X фіксується відносно коротким твердженням (Визначення 11). Маючи під рукою операцію композиції для X , ми можемо визначити тип ізоморфізмів у X , і ми визначаємо категорію як тип, де (1) операція композиції існує унікально з точністю до гомотопії, і (2) тип ізоморфізмів у X еквівалентний типу ідентичності $=_X$.

Remark 1. Цей останній пункт принципово залежить від відмови від припущення унікальності доведень ідентичності, щоб ми випадково не заборонили будь-якій синтетичній категорії мати об'єкт з нетривіальним автоморфізмом. Однак, припускаючи, що ізоморфізми та доведення ідентичності збігаються, ми можемо використовувати підтримку теорією типів заміни рівного на рівне для безперешкодного перенесення доведень уздовж ізоморфізмів. Ось чому робота з HoTT/інтенціональною теорією типів при формулюванні синтетичної теорії категорій виявляється зручнішою, ніж екстенціональна теорія типів, навіть якщо хтось не цікавиться ∞ -категоріями.

1.2 Теорія категорій всередині STT

Хоча деякі нещодавні роботи досліджували STT для її застосувань у мовах програмування [60, 19, 56], більшість робіт із симпліціальної теорії типів були зосереджені на доведенні результатів з теорії категорій всередині теорії типів [46, 44, 4, 57, 10, 59, 58]. З цією метою теорія спряженостей, дискретних розшарувань та розшарувань Гротендіка, а також (ко)границь були введені та вивчені в межах симпліціальної теорії типів. Деякі з цих результатів, наприклад, лема Йонеди для розшарувань [46], були згодом механізовані [23].

Донедавна, однак, у STT не існувало замкнених типів, які б представляли нетривіальні категорії. Як наслідок, хоча [46] і наводить відмінне визначення спряженостей, жодних прикладів навести не можна. У попередній роботі ми змінили це, розширивши STT для побудови $\mathcal{S}$, категорії $\mathcal{S}$ просторів, яка є гомотопічним аналогом SET [19]. Об'єкти $\mathcal{S}$

– це елементи $\mathcal{U}_0$, які кодують ∞ -групоїди, а морфізми в $\mathcal{S}$ відповідають їх функціям. Там само $\mathcal{S}$ використовується як будівельний блок для відновлення алгебраїчних категорій (груп, кілець), а також інших прикладів (частково впорядкованих множин, симплекс-категорії тощо).

Наше розширення **STT** використовувало різні *модальності* поверх **HoTT** для побудови $\mathcal{S}$. Тут ми беремо $\mathcal{S}$ повністю, але деякі з використаних нами модальностей все ще є критично важливими для формулювання природних теорем у теорії категорій. Відповідно, у цій статті ми також працюємо в межах модального розширення **HoTT**, заснованого на **MTT** [15].

1.3 Внесок

Ми переглядаємо базову теорію категорій у світлі побудови $\mathcal{S}$ і показуємо, що більшість класичних результатів, з якими стикаються в теорії категорій, тепер знаходяться в межах досяжності симпліціальної теорії типів. Вперше ми показуємо, що **STT** може бути використана для доведення життєво важливих теорем у теорії ∞ -категорій без звернення до складних моделей. Багато з цих теорем (наприклад, цілком лояльні та суттєво сюр'єктивні функтори є еквівалентностями) прямо не згадують $\mathcal{S}$, але критично спираються на принципи міркування, які уможлиблює $\mathcal{S}$. Ми доводимо два робочі результати для категорій передпучків $\widehat{C}$:

- Ми будуємо цілком лояльну функцію $\Upsilon_0 : C \rightarrow \widehat{C}$.
- Ми доводимо, що $\widehat{C}$ є “вільним копоповненням C ”.

Ключовою технічною інновацією для цього є категорія *скручених стрілок* (twisted arrow), яку ми інтегруємо в **STT** як модальність. Після цього ми можемо вивести різні класичні результати, наприклад:

- що поточково оборотні відображення в $C \rightarrow D$ є оборотними;
- що поточково ліві спряжені є лівими спряженими;
- що (ко)границі обчислюються поточково в $C \rightarrow D$;
- теорію та існування поточкових розширень Кана;
- теорему А Квіллена;

- власніть кодекартових розшарувань.

Синтетичний підхід забезпечує стислі доведення для багатьох із цих теорем порівняно з класичним викладом у теорії 1-категорій, однак наші доведення застосовні також і до ∞ -категорій, де покращення є набагато більш радикальними: у [27] доведення того, що Y_0 є цілком лояльним, займає сотні сторінок, а доведення того, що поточково природні перетворення є ізоморфізмами, вимагає майже п'яти сторінок зусиль у [13]. Розподіляючи роботу між конструкцією всередині STT та вже існуючою моделлю STT , ми уникаємо багатьох із цих технічних складнощів та наводимо доведення, більш звичні для спеціалістів із теорії 1-категорій. Зокрема, ми показуємо, що подібно до того, як гомотопічна теорія типів дозволила теоретикам типів отримати нові результати в алгебраїчній топології, симпліціальна теорія типів дає їм змогу зробити те саме в теорії ∞ -категорій.

Remark 2. Оскільки STT розширює $HoTT$ низкою аксіом, природно запитати, чи є ці аксіоми в якомусь сенсі *повними*. Наш теперішній набір аксіом не є повним для запланованих моделей симпліціальних об'єктів в ∞ -топосі (хоча вони є несуперечливими), але це не є ні дивним, ні небажаним: сама $HoTT$ не є повною для своїх запланованих моделей (∞ -топосів), а її екзотичні моделі становлять значний інтерес. Аналогічно, ми очікуємо, що STT матиме цікаві екзотичні моделі, і не можемо обґрунтовано сподіватися на те, що скінченний набір аксіом буде повним для стандартних моделей. Набагато важливішим є те, чи достатньо цих аксіом для виведення стандартних результатів теорії категорій, що є емпіричним, а не суто математичним питанням. Дійсно, у споріднених синтетичних підходах до теорії доменів [20], диференціальної геометрії [22] та алгебраїчної геометрії [11] точні аксіоми формувалися протягом кількох років та багатьох ітерацій. З огляду на це, ми вважаємо, що наші результати дають вагомі свідчення на користь виражальної сили цього набору аксіом.

1.4 Структура статті

У Розділі 2 ми оглядаємо ключові аспекти, що становлять основу цієї роботи: гомотопічну теорію типів, базову симпліціальну теорію типів, модальну гомотопічну теорію типів та їхній синтез: STT . У Розділі 3 ми вивчаємо категорію *скручених стрілок* і використовуємо її для побудови

вкладення Йонеди. Ми доводимо кілька дедалі складніших версій леми Йонеди й завершуємо повністю функторіальною версією (Теорема 56). У Розділі 4 ми застосовуємо лему Йонеди для перегляду теорії спряженостей, запропонованої [46]. Ми розробляємо кілька інструментів для побудови спряженостей і використовуємо їх, щоб навести перші нетривіальні приклади спряженостей у STT. Ми також використовуємо цей апарат, щоб показати, що $\hat{C}$ є вільним копоповненням C (Теорема 77). У Розділі 5 ми розвиваємо теорію розширень Кана в STT і доводимо кілька важливих результатів: існування поточкових розширень Кана (Теорема 80), теорему А Квіллена (Теорема 89) та властивість власності кодекартових відображень (Теорема 102). Наше доведення останнього факту є особливо примітним, оскільки застосування теорії типів дозволило нам знайти набагато простіше доведення, ніж відомі нам з літератури.

Подяки

За цікаві й корисні обговорення та коментарі щодо матеріалу цієї роботи ми хотіли б висловити вдячність Мат'є Анелю, Карло Анджолі, Стіву Аводі, Дені-Шарлю Сізінському, Бастіану Кноссену, Ніколі Гамбіно, Андре Жоялю, Емілі Ріль, Майку Шульману, Сему Стейтону, Джонатану Стерлінгу, Томасу Штрайхеру та Домініку Веріті. Ми також дякуємо анонімним рецензентам за їхні відгуки та уважне читання.

Джонатан Вайнбергер висловлює вдячність Фонду Флетчера Джонса за щедрі фінансову підтримку та стипендію у Школі інженерії Фаулера університету Чепмена. Він також дякує Дослідницькому офісу армії США за підтримку окремих етапів цієї роботи в межах гранту MURI W911NF-20-1-0082, наданого через кафедру математики Університету Джонса Гопкінса.

2 Модальна та симпліціальна теорія типів

У цій статті ми сприймаємо STT значною мірою як належне і зосереджуємося на роботі всередині теорії. Однак, щоб зробити цю статтю більш самодостатньою, ми присвячуємо цей розділ ретельному поясненню нових конструкцій модальної гомотопічної теорії типів та аксіом, що її доповнюють і утворюють симпліціальну теорію типів.

2.1 Гомотопічна теорія типів

Ми починаємо з нагадування основних понять і позначень гомотопічної теорії типів, які ми використовуємо в цій статті. Канонічним джерелом є книга **HoTT** [53]. Ми працюємо в межах інтенціональної теорії типів Мартіна-Льофа і зауважимо, як **HoTT** розширює її.

Notation 3. Ми пишемо $a =_A b$ для типу ідентичності (часто опускаючи A). Дано $p : a =_A b$ та $B : A \rightarrow \mathcal{U}$, ми пишемо $p_!$ для відображення $B(a) \rightarrow B(b)$.

Definition 4. Ми кажемо, що функція $f : A \rightarrow B$ є еквівалентністю, якщо f допускає як лівий, так і правий обернений:

$$\text{isEquiv}(f) = \sum_{g,h:B \rightarrow A} (g \circ f = \text{id}) \times (f \circ h = \text{id})$$

Ми пишемо $AEquiv B$ для суми $\sum_{f:A \rightarrow B} \text{isEquiv}(f)$.

HoTT є розширенням інтенціональної теорії типів з ієрархією універсумів, що задовольняють аксіому унівалентності:

$$\text{univ}_i : \prod_{A,B:\mathcal{U}_i} \text{isEquiv}(\lambda p. (p_!, \dots)) : A =_{\mathcal{U}_i} B \rightarrow AEquiv B$$

Ми будемо опускати i в univ_i та $\mathcal{U}_i$ і ігнорувати питання розміру, якщо вони не є суттєвими. Унівалентність породжує велику кількість шляхів у $\mathcal{U}$, які відрізняються від **refl**. Нас часто цікавлять типи, які є тривіальними, мають лише тривіальні шляхи або тривіальні шляхи між шляхами і так далі. Ці умови організовані в сімейство предикатів, що називаються рівнем усічення $(-2, -1, 0, \dots)$ типу. Ми будемо використовувати лише перші три рівні, стверджуючи, що тип є стягуваним, (гомотопічною) пропозицією або множиною:

$$\text{isContr}(A) = \sum_{a:A} \prod_{b:A} a = b \quad \text{isProp}(A) = \prod_{a,b:A} \text{isContr}(a = b)$$

$$\text{isSet}(A) = \prod_{a,b:A} \text{isProp}(a = b)$$

Proposition 5 ([51], див. також [45]). *Усі теоретико-типові модельні топоси (i , отже, ∞ -топоси Гротендіка) моделюють **HoTT**.*

Ми також матимемо нагоду використовувати різні *вищі індуктивні типи* (ВІТ). Семантика ВІТ є складною і безпосередньо не розглядається наведеним вище результатом [26]. Зокрема, хоча [51] показує, що

вищезгадана модель підтримує всі вищі індуктивні типи, він не показує, що універсуми є строго замкненими щодо цих конструкцій. Хоча робота над отриманням цього результату триває, легко показати, що універсуми є *слабко* замкненими щодо цих конструкцій. Наприклад, існує тип $D : \mathcal{U}_0$, такий що $D \text{Equiv} A \Pi_C B$ щоразу, коли $A, B, C : \mathcal{U}_0$. Відповідно, ми будемо припускати, що наші універсуми замкнені щодо вищих індуктивних типів, хоча і лише з пропозиційними β -правилами.

2.2 Симпліціальна теорія типів

Маючи під рукою HoTT, ми переходимо до симпліціальної теорії типів. Це розширення HoTT кількома аксіомами, які дозволяють нам розглядати (певні) типи як $(\infty, 1)$ -категорії, що надалі будуть називатися просто категоріями. Ми, відповідно, опускатимемо префікс $(\infty, 1)$ - або ∞ -скрізь. По-перше і найфундаментальніше, ми додаємо наступне:

Axiom A. *Існує множина $\mathbb{I}$, що утворює обмежену дистрибутивну ґратку $(0, 1, \vee, \wedge)$ таку, що $\prod_{i,j:\mathbb{I}} i \leq j \vee j \leq i$ виконується.*

Ми розглядаємо $\mathbb{I}$ як *напрявлений інтервал*, і [46] використовують це, щоб надати кожному типу поняття синтетичного морфізму:

Definition 6. Синтетичний морфізм $f : \text{hom}_X(x, y)$ між $x, y : X$ - це функція $f : \mathbb{I} \rightarrow X$ разом з пропозиційними рівностями $f 0 =_X x$ та $f 1 =_X y$.

Remark 7. В [46], синтетичний інтервал визначається як більш примітивна судженнява структура і $\text{hom}(x, y)$ використовує строгі типи розширення. Це дає більше визначених рівностей: $f 0$ та x співпадатимуть за означенням, коли $f : \text{hom}(x, y)$ (і аналогічно для $f 1$ та y). Проте, підхід суджень не дозволяє прямо включити $\mathbb{I}$ як звичайний тип, і його взаємодії з модальностями (Розділ 2.4) є складними. З цих причин, ми працюємо з простішим, але менш строгим означенням $\text{hom}(x, y)$. В системі, де обидва доступні, ці два поняття еквівалентні[10].

Звісно, ми можемо визначити тотожний морфізм $\text{id}_x : x \rightarrow x$ як $\lambda_ . x$. Більше того, кожна функція $f : X \rightarrow Y$ автоматично має дію на синтетичні морфізми $\alpha : \mathbb{I} \rightarrow X$ шляхом пост-композиції $f \circ \alpha : \mathbb{I} \rightarrow Y$. В такому випадку ми часто пишемо $f(\alpha)$.

З $\mathbb{I}$ ми негайно отримуємо n -куби $\mathbb{I}^n$ і з них ми можемо виділити симплекси Δ^n , межі $\partial\Delta^n$ та роги Λ_k^n . Зокрема, $\Delta^2 \rightarrow X$ представляє




Рис. 1: Візуалізація $\mathbb{I}^2$, Δ^2 та Λ_1^2 .

2-комірку в X , що свідчить про композицію двох стрілок, і $\Lambda_1^2 \rightarrow X$ представляє пару композиційних стрілок (без композиції). Ми наводимо означення цих типів нижче:

$$\Delta^n = \{(i_1, \dots, i_n) : \mathbb{I}^n \mid i_1 \geq i_2 \geq \dots \geq i_n\}$$

$$\Lambda_1^2 = \{(i, j) : \mathbb{I}^2 \mid i = 1 \vee j = 0\}$$

Notation 8. Ми пишемо $i : \Delta^n$ ($0 \leq i \leq n$) як скорочений запис для послідовності з i копій 1, за якими слідує 0: $(1, 1, \dots, 0, \dots)$.

Відображення $f : \Delta^2 \rightarrow X$ називається свідченням того, що композиція $f(-, 0)$, за якою йде $f(1, -)$, дорівнює $\lambda i. f(i, i)$. Ми наголошуємо, що це — дані; може існувати багато різних відображень f , що свідчать про одну й ту саму композицію, оскільки X може мати багато нееквівалентних 2-клітин із тією ж границею. З цієї ж причини, однак, не завжди пара компонованих морфізмів $\Lambda_1^2 \rightarrow X$ поширюється до даних композиції $\Delta^2 \rightarrow X$. Це пояснюється саме тим, що не кожен тип у СТТ можна розглядати як категорію; хоча ми визначили $\text{hom}_X(x, y)$ для кожного X , не існує апіорного способу *компоновання* цих морфізмів. Прекатегорії — це типи, для яких існують усі композиції:

Definition 9. Прекатегорія — це тип X , що задовольняє умову Сегала: вкладення $\Lambda_1^2 \rightarrow \Delta^2$ індукує еквівалентність $\text{isEquiv}(X^{\Delta^2} \rightarrow X^{\Lambda_1^2})$.

Грубо кажучи, умова Сегала гарантує, що кожна пара компонованих морфізмів в X поширюється (унікально) до 2-клітини, що свідчить про їх композицію, і, зокрема, існує індукована функція композиції $\text{hom}(x, y) \times \text{hom}(y, z) \rightarrow \text{hom}(x, z)$. Унікальність автоматично гарантує, що ця операція є асоціативною та унітальною. Визначення категорії уточнює це дещо далі. У прекатегорії X ми можемо визначити тип ізоморфізмів $x \cong y$ між $x, y : X$, і тому існує два потенційно різних типи свідчень того, що x та y

є ідентичними: $x =_X y$ та $x \cong_X y$. Категорія — це прекаатегорія, для якої ці два типи є канонічно еквівалентними.

Definition 10. $\alpha : \text{hom}(x, y)$ є ізоморфізмом ($\text{isIso}(\alpha)$), якщо існують $\beta_0, \beta_1 : \text{hom}(y, x)$, такі що $\beta_0 \circ f = \text{id}$, $f \circ \beta_1 = \text{id}$.³ Ми пишемо $\text{Iso}(x, y)$ або $x \cong y$ для підтипу ізоморфізмів.

Definition 11. Прекаатегорія C є *категорією*, якщо вона задовольняє умову Резка:

$$\prod_{x,y:C} \text{isEquiv}(\text{idtoiso} : (x = y) \rightarrow \text{Iso}(x, y))$$

де $\text{idtoiso}(\text{refl}) := \text{id}$. Якщо кожен морфізм у C є ізоморфізмом, то C є *групоїдом*.

Example 12. $\mathbb{I}, \Delta^n, \mathbb{I}^n$ є категоріями [19].

Lemma 13. C є *групоїдом* тоді й лише тоді, коли $\text{isEquiv}(C^{\mathbb{I}} : C \rightarrow C^{\mathbb{I}})$ (C є $\mathbb{I}$ -нульовим [47]).

[46] розвивають базову теорію цих синтетичних категорій. Як зазначено вище, кожна функція має дію на морфізмах, і *op. cit.* показує, що ця дія зберігає композиції та тотожні морфізми, а отже, визначає функтор. Вони також показують, що $C \rightarrow D$ є категорією, якщо D є категорією, і що синтетичні морфізми $\text{hom}_{D^C}(f, g)$ є саме природними перетвореннями. Можна переформулювати різні класичні категорні поняття досить безпосередньо:

Definition 14 ([4]). Природне перетворення $\alpha : \text{hom}_{C^I}(\text{const}(c), F)$ свідчить про те, що c є границею для $F : C^I$, якщо α індукує еквівалентність $\text{hom}(c', c)\text{Equivhom}(\text{const}(c'), F)$ для всіх c' .

Definition 15. Спряженість між двома категоріями C, D складається з пари функцій $f : C \rightarrow D$ та $g : D \rightarrow C$ разом із природним ізоморфізмом $\iota : \prod_{c,d} \text{hom}(f(c), d)\text{Equivhom}(c, g(d))$.

Хоча вище ми навели кілька прикладів категорій, визначним типом, який *не* є категорією, є універсум $\mathcal{U}$. Відображення $A : \mathbb{I} \rightarrow \mathcal{U}$ є занадто неструктурованими для компонування і, зокрема, не відповідають ні функціям $A(0) \rightarrow A(1)$, ні функціям $A(1) \rightarrow A(0)$ (розгляньте $\lambda i. i = 0$ або $\lambda i. i = 1$). У Розділі 2.4 ми обговоримо підуніверсум $\mathcal{S}$, побудований раніше [19], який є категорією групоїдів, чий морфізми відповідають

³Це саме еквівалентність у сенсі НоТТ, але перенесена на синтетичні морфізми.

функціям. Щоб належним чином обґрунтувати це визначення, ми нагадаємо, що означає для $X : A \rightarrow \mathcal{U}$ бути коваріантним сімейством [46], що дає зіставлення морфізмам $\text{hom}(a_0, a_1)$ функцій $X(a_0) \rightarrow X(a_1)$.

Notation 16. Для сімейства $X : A \rightarrow \mathcal{U}$ ми пишемо $\tilde{X}$ для $\sum_{a:A} X(a)$.

Definition 17. Сімейство $X : A \rightarrow \mathcal{U}$ є коваріантним, якщо для кожного $a : \text{hom}(a_0, a_1)$ та $x_0 : X(a_0)$ наступний тип є стягуваним:

$$\text{Lift}(a, x_0) = \sum_{x_1 : X(a_1)} \sum_{x : \text{hom}((a_0, x_0), (a_1, x_1))} \pi_1(x) =_{\text{hom}(a_0, a_1)} a$$

Тут x — морфізм у $\tilde{X}$. Надалі вираз $\sum_{a:A} X(a) \rightarrow A$ є коваріантною проєкцією, коли X є коваріантним сімейством. Для довільного відображення $\pi : X \rightarrow A$ ми пишемо X_a для $\sum_{x:X} \pi(x) = a$ і кажемо, що π є коваріантним, коли коваріантним є $\lambda a. X_a$.

Оскільки $\text{Lift}(a, x_0)$ є стягуваним, він має мешканця x_1 . Це дає функцію $a, x_0 \mapsto x_1$, яка визначає відображення перенесення $a_! : X(a_0) \rightarrow X(a_1)$. Стягуваність $\text{Lift}(a, x_0)$ гарантує, що ці функції компонуються правильно, etc.

Lemma 18. Сімейство $X : A \rightarrow \mathcal{U}$ є коваріантним тоді й лише тоді, коли відображення $\tilde{\pi} := \lambda p. (p(0), \pi_1 \circ p) : \tilde{X}^{\mathbb{I}} \rightarrow \tilde{X} \times_A A^{\mathbb{I}}$ є еквівалентністю.

У Розділах 4.1 та 5.3 ми будемо коротко використовувати ослаблення коваріантності:

Definition 19. Сімейство $X : A \rightarrow \mathcal{U}$ є кодекартовим, якщо відображення $\tilde{X}^{\mathbb{I}} \rightarrow A^{\mathbb{I}} \times_{A^{\{1\}}} \tilde{X}^{\{1\}}$ має праве спряжене $\ell \dashv \tilde{\pi}$, таке що $\tilde{\pi} \circ \ell = \text{id}$.

Можна дати еквівалентне визначення через кодекартові морфізми та показати, наприклад, що кожен морфізм у D може бути розкладений у композицію кодекартового морфізму, за яким йде вертикальний морфізм:

Theorem 20 ([10]). Якщо відображення $\pi : D \rightarrow C$ є кодекартовим, то для кожного $c : \mathbb{I} \rightarrow C$ та $x_0 : C_{c(0)}$ категорія $\text{Lift}(c, x_0)$ має початковий об'єкт.

Двоїсто можна розглядати контраваріантні та декартові сімейства та розшарування.

Нарешті, ми зауважимо, що оскільки категорії та групоїди визначаються через певні умови *ортогональності*, за [47] вони визначають рефлексивні підуніверсуми.

Proposition 21. *Існують ідемпотентні монади $\mathcal{O}_{\text{cat}}, \mathcal{O}_{\text{grpd}}$, такі що, наприклад, $\mathcal{O}_{\text{cat}} X$ є категорією і $C^{\mathcal{O}_{\text{cat}} X} \text{Equiv} C^X$, коли C є категорією.*

Proposition 22 ([46]). *При спеціалізації Теорема 5 на симпліціальні простори $(\hat{\Delta})$, отримана модель задовольняє Аксиому A, і в цій моделі категорії реалізуються ∞ -категоріями (модельованими повними просторами Сегала), а групоїди — ∞ -групоїдами.*

2.3 Модальна гомотопічна теорія типів

Багато теорем у теорії категорій вимагають можливості квантифікації за об'єктами категорії, наприклад: «якщо $\alpha : F \rightarrow G$ є природним перетворенням функторів $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ і кожен α_c є оборотним, то α є оборотним». Версію цього твердження було доведено у [46]: $(\prod_{c:C} \text{islo}(\lambda i. \alpha i c)) \rightarrow \text{islo}(\alpha)$, проте воно є тонко відмінним, як ми обговоримо нижче. Насправді, у теперішньому вигляді ми не можемо безпосередньо виразити класичне твердження в STT.

Щоб зрозуміти розбіжність між результатами в STT та класичними результатами, зауважимо, що працюючи внутрішньо в теорії типів при доведенні $\prod_{c:C} \text{islo}(\lambda i. \alpha i c)$, ми не можемо припустити, що c є просто об'єктом у C : оскільки це довільний елемент, ми змушені припускати, що він побудований у довільному контексті, який може містити, наприклад, копію $\mathbb{I}$, так що c представляє синтетичний морфізм. Дійсно, якщо ми розгорнемо вищевказаний тип у моделі, то виявимо, що побудова $\prod_{c:C} \text{islo}(\lambda i. \alpha i c)$ вже передбачає доведення того, що обрані обернені є природними. Значна частина сили симпліціальної теорії типів впливає саме з цієї неявної природності, але це робить цей конкретний результат слабшим. Зрештою, його мета у стандартній теорії категорій полягала в тому, що в цій конкретній ситуації *a priori* неприродні вибори обернених автоматично стають природними. Крім того, ми зіткнемося з теоремами, які є просто хибними при такому наївному перекладі.

Відповідно, щоб зробити STT практичною, ми маємо розширити її *модальностями*: унарними конструкторами типів, що вирізняються тим, що вони не зберігають підстановку або не застосовуються в довільних контекстах. Наприклад, згодом ми оснастимо STT модальністю $\neg_b$, яка

відкидає всі необоротні синтетичні морфізми з типу, щоб отримати його *ядро* (core), яке ми потім використаємо для точного кодування поточної оборотності (див. Приклад 25).

Повний опис модальної теорії типів, яку ми використовуємо — МТТ [15] — наведено у [18], а формальні правила ми фіксуємо в Розділі А. На щастя, додавання модальностей не впливає на правила, наприклад, для Σ -типів. Відповідно, для стислості ми нагадаємо лише нові правила, які необхідно додати до MLTT, щоб розширити HoTT модальностями в стилі МТТ.

МТТ параметризується *теорією мод* (mode theory): строгою 2-категорією, що описує набір доступних модальностей (морфізмів) разом із природними перетвореннями між ними (2-клітинами). Ми використовуємо μ, ν, ξ для позначення модальностей. У випадку симпліціальної теорії типів наша теорія мод матиме лише один об'єкт разом із кількома твірними модальностями та 2-клітинами. Існує чотири твірні модальності $\flat, \sharp, \text{op}, \text{tw}$, що задовольняють такі рівняння:

$$\flat = \flat \circ \flat = \flat \circ \sharp = \flat \circ \text{op} = \text{tw} \circ \flat \quad \sharp = \sharp \circ \sharp = \sharp \circ \flat = \sharp \circ \text{op} \quad \text{op} \circ \text{op} = \text{id}$$

Ми також вимагаємо наявності таких твірних 2-клітин:

$$\epsilon : \flat \rightarrow \text{id} \quad \zeta : \text{id} \rightarrow \sharp \quad \tau : \text{tw} \cong \text{tw} \circ \text{op} \quad (\text{разом із } \tau^{-1})$$

$$\pi_0^{\text{tw}} : \text{tw} \rightarrow \text{op} \quad \pi_1^{\text{tw}} : \text{tw} \rightarrow \text{id}$$

Ці 2-клітини так само задовольняють низку рівнянь. Для ϵ та ζ ми вимагаємо $\zeta \cdot \sharp = \sharp \cdot \zeta = \text{id}$, розглядаючи всі ці перетворення як 2-клітини $\sharp \rightarrow \sharp$, та $\flat \cdot \zeta = \text{id} : \flat \rightarrow \flat$ (де $\cdot$ позначає віскірінг). Ми вимагаємо двоїстих рівнянь для ϵ . Для решти чотирьох 2-клітин ми вимагаємо, щоб такі діаграми були комутативними:

$$\begin{array}{ccccc} & \text{tw} & & & \\ & \swarrow \pi_0^{\text{tw}} & \downarrow \tau & \searrow \pi_1^{\text{tw}} & \\ \text{op} & \xleftarrow{\pi_1^{\text{tw}} \cdot \text{op}} & \text{tw} \circ \text{op} & \xrightarrow{\pi_0^{\text{tw}} \cdot \text{op}} & \text{id} \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} & \flat & & & \\ & \swarrow \epsilon \cdot \text{op} & \downarrow \text{tw} \cdot \epsilon & \searrow \epsilon & \\ \text{op} & \xleftarrow{\pi_1^{\text{tw}}} & \text{tw} & \xrightarrow{\pi_0^{\text{tw}}} & \text{id} \end{array}$$

Кожен морфізм μ у теорії мод індукує модальний тип $-\mu$. Правила для цих модальних типів ми опишемо за мить, але спочатку дамо уявлення про те, що вони покликані позначати. Наразі це лише інтуїція,

хоча аксіоми та модель, описані в Розділі 2.4, зроблять її строгою. Як уже зазначалося, $-_{\flat}$ видаляє всі нетотожні синтетичні морфізми з типу. $-_{\sharp}$ є правим спряженим до цієї операції, тому він відкидає всі нетотожні морфізми, але потім вільно додає всі морфізми, так що n -симплекс $\Delta^n \rightarrow X_{\sharp}$ є саме набором із n точок в X .⁴ Далі, $-_{\text{op}}$ переводить тип у його протилежний і, зокрема, змінює напрямки всіх синтетичних морфізмів. Нарешті, $-_{\text{tw}}$ переводить тип у відповідний йому тип *скручених стрілок*; ми детальніше проаналізуємо його в Розділі 3.

Правило утворення для $-_{\mu}$ є складним: весь сенс модальностей полягає в тому, що з $\Gamma \vdash A$ не випливає $\Gamma \vdash A$. Замість цього МТТ вводить новий вид операції над контекстом, яка діє як «лівий спряжений» до $-_{\mu}$:

$$\frac{\vdash \Gamma}{\vdash \Gamma, \{\mu\}} \quad \frac{\Gamma, \{\mu\} \vdash A}{\Gamma \vdash A} \quad \frac{\Gamma, \{\mu\} \vdash a : A}{\Gamma \vdash \text{mod}_{\mu}(a) : A}$$

Ми називаємо $\{\mu\}$ *модальним обмеженням* (modal restriction). Корисно порівняти A_{μ} з залежними добутками й, відповідно, розглядати $-_{\mu}$ як розширення контексту чимось схожим на субструктурну « μ -змінну» [6, 7]. Справжня сила модальностей виявляється в тому, як ці $\{\mu\}$ взаємодіють зі змінними. Зокрема, загалом не виконується $\Gamma, x : A, \{\mu\} \vdash x : A$; оскільки $-_{\mu}$ має моделювати лівий спряжений, ми не можемо в загальному випадку припустити існування підстановки ослаблення $\Gamma, \{\mu\} \rightarrow \Gamma$. Замість цього ми змінюємо правило розширення контексту змінною так, що кожна змінна анотується модальністю:

$$\frac{\vdash \Gamma \quad \Gamma, \{\mu\} \vdash A}{\vdash \Gamma, x :_{\mu} A} \quad \frac{\alpha : \mu \rightarrow \text{mods}(\Gamma_1)}{\Gamma_0, x :_{\mu} A, \Gamma_1 \vdash x^{\alpha} : A^{\alpha}}$$

У наведеному вище правилі x^{α} — це нова форма правила для змінних, тоді як A^{α} — допустима операція над синтаксисом, яка обходить терм A й належним чином оновлює всі вільні змінні y^{β} , що зустрічаються в A , модифікуючи β за допомогою α . Зокрема, якщо A є закритим, то $A^{\alpha} = A$. У формальному синтаксисі як x^{α} , так і A^{α} реалізуються за допомогою певної форми підстановки, детальніше див. [16].

Оригінальне розширення контексту виходить при $\mu = \text{id}$. У другому правилі $\text{mods}(\Gamma_1)$ — це композиція $\nu_0 \circ \nu_1 \circ \dots$ усіх $\{\nu_i\}$, що зустрічаються в

⁴Зауважте, що хоча $X_{\flat}$ завжди буде ∞ -категорією (насправді ∞ -групоїдом), це не так для $X_{\sharp}$. Зокрема, $X_{\sharp}$ майже ніколи не задовольнятиме умову Резка.

Γ_1 (і дорівнює id , якщо таких немає). Іншими словами, змінну з анотацією μ можна використовувати саме тоді, коли вона стоїть за послідовністю модальних обмежень, для яких існує 2-клітина, що веде від μ до цієї композиції. Отже, саме в правилі для змінних починають грати роль 2-клітини.

Lemma 23. *Якщо $\Gamma, x :_{\mu} A \vdash B$, $\Gamma, x :_{\mu} A \vdash b : B$ та $\Gamma, \{\mu\} \vdash a : A$, то виконується $\Gamma \vdash B[a/x]$ та $\Gamma \vdash b[a/x] : B[a/x]$.*

Останньою частиною мозаїки є правило елімінації для модальностей. Грубо кажучи, це правило стверджує, що модальні анотації еквівалентні модальним типам «з точки зору типу», тобто завдання елемента в контексті $\Gamma, x :_{\nu} A_{\mu}$ є тим самим, що й завдання елемента в $\Gamma, x :_{\nu \circ \mu} A$. Конкретно це зводиться до такого правила зіставлення зі зразком, яке дозволяє нам припустити, що $x :_{\nu} A_{\mu}$ має вигляд $\text{mod}_{\mu}(y)$, де $y :_{\nu \circ \mu} A$:

$$\frac{\Gamma, x :_{\nu} A \vdash B \quad \Gamma, y :_{\nu \circ \mu} A \vdash b : B[\text{mod}_{\mu}(y)/x] \quad \Gamma, \{\nu\} \vdash a : A}{\Gamma \vdash \text{let } \text{mod}_{\mu}(y) \leftarrow a \text{ in } b : B[a/x]}$$

$$\frac{\Gamma, x :_{\nu} A \vdash B \quad \Gamma, y :_{\nu \circ \mu} A \vdash b : B[\text{mod}_{\mu}(y)/x] \quad \Gamma, \{\nu \circ \mu\} \vdash a : A}{\Gamma \vdash (\text{let } \text{mod}_{\mu}(y) \leftarrow \text{mod}_{\mu}(a) \text{ in } b) = b[a/y] : B[\text{mod}_{\mu}(a)/x]}$$

Хоча ці правила покривають усі необхідні розширення для роботи з модальними типами, ми також користуємося додатковою зручною можливістю — модальними $\prod$ -типами:

$$\frac{\Gamma, x :_{\mu} A \vdash b : B}{\Gamma \vdash \lambda x. b : \prod_{x:\mu A} B} \quad \frac{\Gamma \vdash f : \prod_{x:\mu A} B \quad \Gamma, \{\mu\} \vdash a : A}{\Gamma \vdash f(a) : B[a/x]}$$

Notation 24. «Якщо $c :_{\flat} C$, то $\Phi(c)$ » означає $\prod_{c:\flat C} \Phi(c)$.

Example 25. Точний переклад твердження «поточкова оборотність тягне за собою оборотність», де $C, D :_{\flat} \mathcal{U}$ та $\alpha : C \times \mathbb{I} \rightarrow D$, має вигляд: $(\prod_{c:\flat C} \text{islo}(\lambda i. \alpha i c)) \rightarrow \text{islo}(\alpha)$

Безпосередньо з цих правил ми можемо довести таке твердження:

Proposition 26 ([15]).

- $-_{\mu}$ комутує з $\sum$ та 1
- $\text{comp} : -_{\nu \mu} \text{Equiv} -_{\mu \circ \nu} \text{ta} -_{\text{id}} \text{Equivid}$

- Якщо $\alpha : \mu \rightarrow \nu$, то існує відображення $\text{coe}^\alpha : -_\mu \rightarrow -_\nu^\alpha$.
- $\text{transp} : A_b \rightarrow B_b \text{Equiv} A \rightarrow B_{\#_b}$
- $\text{transp} : A_{\text{op}} \rightarrow B_b \text{Equiv} A \rightarrow B_{\text{op}_b}$

Перший пункт дає функцію $(*) : A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B$.

Коли це не викликає плутанини, ми опускаємо еквівалентності $A_{\nu_\mu} \text{Equiv} A_{\mu \circ \nu}$ та $A_{\text{id}} \text{Equiv} A$. Крім того, оскільки немає двозначності, ми опускаємо ϵ (та її віскірінги) і просто пишемо x замість x^ϵ , і аналогічно для $\zeta : \text{id} \rightarrow \#$. Як наслідок, якщо $A :_b \mathcal{U}$, то ми можемо просто писати A_{tw} замість $A^{\text{tw} \cdot \epsilon}_{\text{tw}}$. За домовленістю ми також уникаємо написання x^{id} .

Notation 27. Якщо $\Gamma, \{\mu\} \vdash f : A \rightarrow B$, ми пишемо $f^\dagger$ для функції $\text{mod}_\mu(f) \circ -$.

Remark 28. Оскільки ми будемо неодноразово цим користуватися, зауважимо, що coe^α завжди є належним чином природним. Наприклад, зафіксуємо $f :_b A \rightarrow B$. Тоді ми будемо шлях $\alpha : \text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}} \circ f^\dagger = f \circ \text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}}$ таким чином:

$$\alpha = \text{funext}(\lambda x. \text{let mod}_{\text{tw}}(x_0) \leftarrow x \text{ in refl})$$

Оскільки цей шлях по суті є комутуючим перетворенням (він задається індукцією, щоб дозволити $\text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}}$ та $f^\dagger$ редукуватися), він є повністю когерентним, а вищі шляхи аналогічно будуються за індукцією, а потім рефлексивністю.

У загальному випадку $-_\mu$ не обов'язково комутує з пропозиційною рівністю. Проте це так у наших запланованих моделях, тому ми вводимо це як аксіому:

Axiom Б. Відображення $\text{mod}_\mu(a) = \text{mod}_\mu(b) \rightarrow a = b$, що переводить refl в $\text{mod}_\mu(\text{refl})$, є еквівалентністю для всіх $a, b :_\mu A$.

Якщо бути дуже точними, це відображення визначається індукцією шляхів на сімействі типів $\lambda(x, y : A). \text{let mod}_\mu(a) \leftarrow x \text{ in let mod}_\mu(b) \leftarrow y \text{ in } a = b$. Згідно з [17], для цього принципу існує обчислювальне обґрунтування.

Corollary 29. Кожен конструктор $-_\mu$ комутує з волокнистими добутками (pullbacks) $A \times_C B = \sum_{a:A} \sum_{b:B} f(a) =_C g(b)$.

Remark 30. Для читачів, знайомих із *просторовою теорією типів* (spatial type theory) [50], ця модальна теорія типів є розширенням просторової теорії типів, що включає дві додаткові модальності (op , tw). Зокрема, результати [50], які стосуються $\flat$ та $\sharp$, можуть бути відтворені в цьому контексті.

2.4 Модальності та симпліціальна теорія типів

Щоб пов'язати модальну та симпліціальну структури, ми вводимо такі аксіоми, мотивовані запланованою моделлю, як описано в Теоремі 22 (і більш загально $\mathcal{E}^{\Delta^{\text{op}}}$ для ∞ -топосу $\mathcal{E}$); див. також роботу [33]. По-перше, протилежне відображення має бути антиеквівалентністю для $\mathbb{I}$:

Axiom B. Існує еквівалентність $\neg : \mathbb{I}_{\text{op}} \rightarrow \mathbb{I}$, яка міняє місцями 0 та 1, а також $\vee$ та $\wedge$.

Corollary 31. Ми можемо розширити $\neg$ до еквівалентності $\neg : \Delta^n_{\text{op}} \text{Equiv} \Delta^n$.

Далі, ми вимагаємо, щоб два можливі поняття дискретності (бути $\mathbb{I}$ -нульовим або $\flat$ -модальним) збігалися:

Axiom Г. Якщо $A :_{\flat} \mathcal{U}$, то $A_{\flat} \rightarrow A$ є еквівалентністю (A є дискретним) тоді й лише тоді, коли $A \rightarrow A^{\mathbb{I}}$ є еквівалентністю (A є $\mathbb{I}$ -нульовим).

Axiom Д. Канонічне відображення $\text{Bool} \rightarrow \mathbb{I}$ є ін'єктивним та індукуює еквівалентність $\text{BoolEquiv} \mathbb{I}_{\flat}$.

Мотивовані нашим запланованим класом моделей, ми наполягаємо на тому, що еквівалентності спільно детектуються за допомогою Δ^n :

Axiom E. $f :_{\flat} A \rightarrow B$ є еквівалентністю тоді й лише тоді, коли виконується:

$$\prod_{n : \text{Nat}} \text{isEquiv}((f_*)^{\dagger} : \Delta^n \rightarrow A_{\flat} \rightarrow \Delta^n \rightarrow B_{\flat})$$

Зауважимо, що оскільки існує пара переріз-ретракція $\Delta^n \rightarrow \mathbb{I}^n \rightarrow \Delta^n$, ми можемо замінити Δ^n на $\mathbb{I}^n$ у наведеному вище принципі.

Одним із корисних застосувань є таке твердження:

Lemma 32. Відображення $\pi :_{\flat} X \rightarrow A$ є коваріантним тоді й лише тоді, коли відображення $X^{\Delta^n}_{\flat} \rightarrow X_{\flat} \times_{A_{\flat}} A^{\Delta^n}_{\flat}$, індуковане $(0^*)^{\dagger}$ та $(\pi_*)^{\dagger}$, є еквівалентністю для всіх $n :_{\flat} \text{Nat}$.

Аксіома для $-_{\text{tw}}$

Нарешті, ми додаємо до STT нову аксіому, яка керує модальністю tw . Для мотивації ми нагадаємо деякі факти про зовнішнє визначення функтора скручених стрілок (twisted arrow functor) $\hat{\Delta} \rightarrow \hat{\Delta}$, який $-_{\text{tw}}$ покликаний інтерналізувати. Класично $\text{Tw} : \hat{\Delta} \rightarrow \hat{\Delta}$ визначається так:

$$\text{Tw}(X)([n]) = X([n]^{\text{op}} * [n])$$

Тут ми написали $[n]^{\text{op}} * [n]$ замість еквівалентного $[2n + 1]$, щоб прояснити дію цього функтора на морфізмах: $f \mapsto f^{\text{op}} * f$. (Тобто це відповідає операції з'єднання — join — на скінченних лінійних порядках.)

Оскільки цей функтор визначений через передкомпозицію, він є правим спряженим, чий лівий спряжений визначається за допомогою лівого розширення Кана. Зокрема, він переводить $\Delta^n : \hat{\Delta} \rightarrow \hat{\Delta}^{2n+1}$ (знову ж таки, з функторіальною дією, заданою скручуванням). Таким чином, існує універсальне відображення $\eta_n : \Delta^n \rightarrow \text{Tw}(\Delta^{2n+1})$, яке при розгортанні задається тотожним відображенням $[2n + 1] \rightarrow [2n + 1]$. Універсальність відображення η_n зводиться до вимоги, щоб кожен морфізм $f : \Delta^n \rightarrow \text{Tw}(C)$ розкладався як $\text{Tw}(\hat{f}) \circ \eta_n$ для деякого єдиного $\hat{f} : \Delta^{2n+1} \rightarrow C$. Наша аксіома, що керує $-_{\text{tw}}$, аксіоматизує це відображення η_n разом із тією властивістю, що $\text{Tw}(-) \circ \eta_n : \text{hom}(\Delta^{2n+1}, C) \rightarrow \text{hom}(\Delta^n, \text{Tw}(C))$ є еквівалентністю. Маючи під рукою цю зовнішню мотивацію, ми переходимо до фіксації деяких позначень та формулювання аксіоми, яка керує модальністю $-_{\text{tw}}$.

Notation 33. Якщо $n :_{\mathfrak{b}} \text{Nat}$, ми маємо канонічні відображення $i_l : \Delta^n \rightarrow \Delta^{2n+1}$, $i_r : \Delta^n \rightarrow \Delta^{2n+1}$ та $i_m : \Delta^1 \rightarrow \Delta^{2n+1}$, які виділяють підмножини $\{0, \dots, n\}$, $\{n + 1, \dots, 2n + 1\}$ та $\{n, n + 1\}$ відповідно. Для зручності ми пишемо $\bar{i}_l = i_l^\dagger \circ \neg : \Delta^n \rightarrow \Delta^{2n+1}_{\text{op}}$.

Нарешті, у формулюванні нової аксіоми нам потрібна процедура, яка розширює відображення $f : \Delta^n \rightarrow \Delta^m$ до відображення $\Delta^{2n+1} \rightarrow \Delta^{2m+1}$, що діє належним чином на образах двох вкладень $i_l, i_r : \Delta^n \rightarrow \Delta^{2n+1}$. Щоб обґрунтувати це формально, ми вводимо *притуплене з'єднання* (blunt join) $X \diamond Y$:

$$X \diamond Y = X \amalg_{X \times \{0\} \times Y} (X \times \mathbb{I} \times Y) \amalg_{X \times \{1\} \times Y} Y$$

Це орієнтована версія з'єднання $X \star Y$ [53, Розд. 6], така що $X \diamond Y$ є приблизно $X \amalg Y$ із доданими морфізмами, які з'єднують кожен $x : X$ з кожним $y : Y$.




Рис. 2: Закони для Аксіоми Ж.

Lemma 34. Якщо C є категорією, то $C^{\Delta^{m+1+n}} \text{Equiv} C^{\Delta^m \diamond \Delta^n}$.

Definition 35. Якщо $f : \Delta^n \rightarrow \Delta^m$, ми визначаємо $\text{twist}(f) : \Delta^{2n+1} \rightarrow \Delta^{2m+1}$ як відображення, отримане шляхом єдиного продовження відображення $f^\dagger \diamond f : \Delta^n_{\text{op}} \diamond \Delta^n \rightarrow \Delta^m_{\text{op}} \diamond \Delta^m$ уздовж категорних еквівалентностей $\Delta^i_{\text{op}} \diamond \Delta^i \rightarrow \Delta^{2i+1}$.

Axiom Ж. Для кожного $n : \mathbf{Nat}$ існує (обов'язково єдина) функція $\eta_n : \Delta^n \rightarrow \Delta^{2n+1}_{\text{tw}}$, така що наступне відображення є еквівалентністю для кожної категорії $C : \mathcal{U}$:

$$\iota := \lambda \text{mod}_b(f). \text{mod}_b(f^\dagger \circ \eta_n) : \Delta^{2n+1} \rightarrow C_b \rightarrow \Delta^n \rightarrow C_{\text{tw}b}$$

Крім того, ми вимагаємо, щоб $\tau = (\text{coe}^-)^\dagger : \Delta^n_{\text{tw}} \rightarrow \Delta^n_{\text{op} \text{tw}}$ і щоб діаграми на Рисунку 2 були комутативними (це просто властивості — всі об'єкти є множинами, оскільки $-_\mu$ зберігає h -рівень).

Можна візуалізувати відображення ι як таке, що гарантує ізоморфність $\Delta^n \rightarrow C_{\text{tw}b}$ симплексу розмірності $2n + 1$ у C :

$$\begin{array}{ccccccc} c_n & \longleftarrow & c_{n-1} & \longleftarrow & \cdots & \longleftarrow & c_0 \\ \downarrow & & & & & & \\ c_{n+1} & \longrightarrow & c_{n+2} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & c_{2n} \end{array}$$

За цієї відповідності η є єдиним відображенням $\Delta^n \rightarrow \Delta^{2n+1}_{\text{tw}}$, заданим тотожним відображенням $\text{id} : \Delta^{2n+1} \rightarrow \Delta^{2n+1}$, і, таким чином, є

універсальним n -симплексом. Відображення π_1^{tw} виділяє нижній рядок, а π_0^{tw} виділяє верхній рядок, проте *скручений* (twisted) так, що він потрапляє в $\mathbf{C}_{\text{op}}$ замість $\mathbf{C}$. Ця аксіома використовуватиметься лише при доведенні Теорема 48, де ми використовуємо $-\text{tw}$ для побудови біфункторіальної версії hom .

Proposition 36 ([19]). *Модель, побудована в Теоремі 22, розширюється до моделі модальної НоТТ, яка задовольняє наші аксіоми.*

Remark 37. Хоча наша попередня робота [19] не розглядала модальність $-\text{tw}$, методи, використані там, безпосередньо масштабуються на цю ситуацію. Зокрема, [32] дають явний опис необхідної операції скручених стрілок і показують, що вона є правим спряженням Квіллена, що й потрібно для розширення моделі.

Маючи під рукою модальності, можна безпосередньо довести низку результатів класичної теорії категорій. Наприклад, так звану основну теорему теорії ∞ -категорій:

Theorem 38. *Якщо $\mathbf{C}, \mathbf{D} :_{\flat} \mathcal{U}$ є категоріями, то $F :_{\flat} \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ є еквівалентністю, якщо (1) індуковане відображення $\mathbf{C}_{\flat} \rightarrow \mathbf{D}_{\flat}$ є сюр'єктивним, та (2) для будь-яких $c, c' :_{\flat} \mathbf{C}$ відображення $\text{hom}(c, c') \rightarrow \text{hom}(F(c), F(c'))$ є еквівалентністю.*

Доведення. Припустимо, що умови (1) та (2) виконуються. Ми доведемо, що F є еквівалентністю, використовуючи Аксіому E, для чого зафіксуємо $n :_{\flat} \mathbf{Nat}$ і покажемо, що відображення $F_*^{\dagger} : \Delta^n \rightarrow \mathbf{C}_{\flat} \rightarrow \Delta^n \rightarrow \mathbf{D}_{\flat}$ є еквівалентністю.

Якщо $n = 0$, то за умовою (1) відображення $F_*^{\dagger}$ є сюр'єктивним, а за умовою (2) у поєднанні з умовою Резка воно є вкладенням. Відповідно, $F_*^{\dagger}$ є еквівалентністю в цьому випадку. Випадок $n = 1$ є безпосереднім наслідком випадків для $n = 0$ разом з умовою (2). Загалом, оскільки $\mathbf{C}^{\Delta^n} \text{Equiv} \mathbf{C}^{\Delta^1} \times_{\mathbf{C}} \cdots \times_{\mathbf{C}} \mathbf{C}^{\Delta^1}$ за умовою Сегала (і аналогічно для $\mathbf{D}$), а $-\flat$ комутує з волокнистими добутками, випадок для $n \geq 2$ впливає з випадків $n = 0, 1$. $\square$

2.5 Basic building blocks for categories

Finally, we recall two results from our earlier work [19] that will be used repeatedly within this work to construct new categories. The first is a constructi-

on of full subcategories using $\sharp$:

Proposition 39. *If $C :_{\flat} \mathcal{U}$ is a category and $\phi :_{\flat} C_{\flat} \rightarrow \mathbf{HProp}$ is a predicate, then*

1. $C_{\phi} = \sum_{c:C} \phi(\mathbf{mod}_{\flat}(c))_{\sharp}$ is a category,
2. the projection map $C_{\phi} \rightarrow C$ induces an equivalence on hom-types,
3. $C_{\phi_{\flat}} \mathbf{Equiv} \sum_{c:C_{\flat}} \phi(c)$, and
4. a map $F :_{\flat} D \rightarrow C$ factors through C_{ϕ} if and only if $\phi(\mathbf{mod}_{\flat}(F(d)))$ holds for all $d :_{\flat} D$.

Corollary 40. *If $C, D :_{\flat} \mathcal{U}$ are categories and $F :_{\flat} C \rightarrow D$, then the canonical map $\mathbf{hom}(c, c') \rightarrow \mathbf{hom}(F(c), F(c'))$ is an equivalence for all $c, c' : C$ (notice the lack of $\flat$!) if and only if it is an equivalence when $c, c' :_{\flat} C$.*

Next, we recall the construction of the category of groupoids which plays the role of the category of sets in simplicial type theory, e.g., we shall use this category to define presheaves:

Proposition 41. *There is a category $\mathcal{S}_i :_{\flat} \mathcal{U}_{i+1}$ with an embedding $\mathcal{S}_i \rightarrow \mathcal{U}_i$ such that:*

- If $X : A \rightarrow \mathcal{S}_i$, then the composite $A \rightarrow \mathcal{U}_i$ is covariant.
- The converse holds for $A :_{\flat} \mathcal{U}_i$, $X :_{\flat} A \rightarrow \mathcal{U}_i$: if X is covariant, then X factors through $\mathcal{S}_i$.

Corollary 42 (Directed univalence). $\mathcal{S}^{\mathbb{I}} \mathbf{Equiv} \sum_{X_0, X_1 : \mathcal{S}} X_1^{X_0}$ and composition in $\mathcal{S}$ is the composition of functions.

Corollary 43. *If $X :_{\flat} \mathcal{U}$ is a groupoid, then $X : \mathcal{S}$.*

Remark 44. We proved [19] Proposition 41 in a richer variation of STT (triangulated type theory). Since we only require the result here, we take it as an “axiom” of sorts to work in a simpler type theory and note that one could extend STT to triangulated type theory to prove this theorem outright.

3 Вкладення Йонеди

У цьому розділі ми фіксуємо категорію $C :_{\flat} \mathcal{U}$. Нашою метою є вивчення типу $\widehat{C} = \mathcal{S}^{C_{\text{op}}}$ передпучків на C . Оскільки $\mathcal{S}$ є категорією, $\widehat{C}$ також є категорією, і за орієнтованою унівалентністю:

Lemma 45. *Якщо $F, G : \widehat{C}$, то $\text{hom}(F, G) \text{Equiv} \prod_{c : C_{\text{op}}} F c \rightarrow G c$*

Remark 46. Так само, як, наприклад, із повнотою, $\widehat{C}$ неявно фіксує рівень універсуму так, що $\widehat{C} = C_{\text{op}} \rightarrow \mathcal{S}_i$. Ми можемо розглядати i як параметр або просто покласти $i = 0$. Іноді нам доведеться вимагати, щоб $C \text{Equiv} C'$, де $C' : \mathcal{U}_i$, і в таких ситуаціях ми будемо говорити, що категорія C є *малою*. Ми припускаємо, що всі категорії є локально малими — тобто кожен тип $\text{hom}_C(c, c')$ є малим.

Можна переформулювати *розшаровану* (fibrational) лему Йонеди, доведену у [46], щоб скористатися перевагами $\widehat{C}$ замість квантифікації за контраваріантними сімействами, як у *op. cit.*:

Lemma 47. *Якщо $F : \widehat{C}$ та $c : C_{\text{op}}$, то $F(c) \cong \prod_{c' : C_{\text{op}}} \text{hom}_{C_{\text{op}}}(c, c') \rightarrow F(c')$*

3.1 Категорія скручених стрілок та вкладення Йонеди

У світлі цього останнього результату природним наступним кроком є визначення відображення $C \rightarrow \widehat{C}$, яке переводить $c : C$ у щось на зразок $\text{hom}(-, c)$.⁵ Однак потрібна обережність: $\text{hom}(-, c)$ має тип $C \rightarrow \mathcal{U}$, а не необхідний $C_{\text{op}} \rightarrow \mathcal{S}$. Поміркувавши, читач може виявити дивним те, що відображення $\text{hom}(-, -) : C \times C \rightarrow \mathcal{U}$ взагалі існує; якщо всі відображення є функторіальними в STT, як $\text{hom}(-, -)$ може бути коваріантним за обома аргументами? Насправді це є наслідком дивної поведінки синтетичних морфізмів у $\mathcal{U}$. Хоча $\text{hom}(-, -)$ є функторіальним за обома аргументами, відсутність орієнтованої унівалентності для $\mathcal{U}$ робить це марним. Ця дивність гарантує, що $\text{hom}(-, -)$ не звужується до функції зі значеннями в $\mathcal{S}$.

⁵Тут ми бачимо, чому C має бути плоським (flat): ми хочемо обговорювати як C , так і C_{op} . Корисно розуміти $C :_{\flat} \mathcal{U}$ як *закритий* тип, який не залежить ні від чого в контексті й, зокрема, не потребує функторіального розгляду.

Натомість потрібна функція $\Phi : \mathcal{C}_{\text{op}} \times C \rightarrow \mathcal{S}$, така що $\Phi(\text{mod}_{\text{op}}(c), -) = \text{hom}(c, -)$ завжди, коли $c :_b C$, тобто функція, яка збігається на об'єктах із $\text{hom}(-, -)$ і має таку саму функторіальність за другим аргументом, але приймає $\mathcal{C}_{\text{op}}$ як свій перший аргумент. Насправді зовсім не очевидно, звідки така функція має взятися; [49, с. xii] спеціально виділяють цю конструкцію як надзвичайно тонку в теорії ∞ -категорій. Саме з цієї причини ми ввели модальність $-_{\text{tw}}$. Згадаймо візуалізацію для $\Delta^n \rightarrow \mathcal{C}_{\text{tw}b}$:

$$\begin{array}{ccccccc} c_n & \longleftarrow & c_{n-1} & \longleftarrow & \cdots & \longleftarrow & c_0 \\ \downarrow & & & & & & \\ c_{n+1} & \longrightarrow & c_{n+2} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & c_{2n} \end{array} \quad (1)$$

Проекція на $\mathcal{C}_{\text{op}}$ дає верхній рядок, а відображення в C дає нижній. Ця візуалізація для n -симплексів є дуже схожою на візуалізацію для $C^{\mathbb{I}} = \sum_{c_0, c_1} \text{hom}(c_0, c_1)$, проте верхній рядок було скручено, щоб гарантувати, що одне обмеження потрапляє в $\mathcal{C}_{\text{op}}$, як це необхідно для біфункторіальної версії $\text{hom}(-, -)$:

Theorem 48. *Якщо $C :_b \mathcal{U}$ є категорією, то виконується таке:*

- Відображення $\langle \text{coe}^{\pi_0^{\text{tw}}}, \text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}} \rangle : \mathcal{C}_{\text{tw}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{op}} \times C$ випрямляється (*straightens*) до $\Phi : \mathcal{C}_{\text{tw}} \times C \rightarrow \mathcal{S}$.
- Для кожного $c :_b C$ відображення $\alpha_c : \text{hom}(\text{hom}(c, -), \Phi(\text{mod}_{\text{op}}(c), -))$, індуковане лемою Йонеді (Лема 47), застосованою до $\iota(\text{mod}_b(\text{id}_c)) : \Phi(\text{mod}_{\text{op}}(c), c)$, є еквівалентністю.

Lemma 49. *Нехай задано $f :_b \Delta^1 \rightarrow C$ і нехай $\bar{f} = \iota(\text{mod}_b(f)) : \mathcal{C}_{\text{tw}}$, тоді існують шляхи:*

$$\theta(f)_0 : (\text{coe}^{\pi_0^{\text{tw}}} \circ \text{extract}(\bar{f}))(*) = \text{mod}_{\text{op}}(f(0)) \quad \theta(f)_1 : (\text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}} \circ \text{extract}(\bar{f}))(*) = f(1)$$

. Ці шляхи є природними за C , так що, наприклад, два шляхи наступного вигляду, індуковані $\theta(g \circ f)_1$ та $\theta(f)_1$ разом із природністю $\text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}}$ у g , узгоджуються:

$$(\text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}} \circ \text{extract}(\iota(\text{mod}_b(g \circ f))))(*) = g(f(1))$$

Тут $*$: Δ^0 — єдиний елемент одиничного типу.

Доведення. Ми покажемо другий шлях, оскільки вони є симетричними. Ми визначаємо θ_1 , використовуючи природність $\text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}}$ та поведінку $\text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}}$ на відображенні η з Рисунок 2:

$$\begin{aligned}
& (\text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}} \circ \text{extract}(\iota(\text{mod}_b(f))))(*) \\
&= (\text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}} \circ f^\dagger \circ \eta_0)(*) \\
&= (f \circ \text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}} \circ \eta_0)(*) && \text{За природністю, Зауваження 28} \\
&= f(1) && \text{За першою діаграмою на Рисунку 2}
\end{aligned}$$

Щоб довести, що θ_1 є природним за C , ми зауважимо, що термі збігаються з точністю до комутуючого перетворення (commuting conversion) правил елімінації для модальних типів. Відповідно, ми можемо довести, що ці два шляхи узгоджуються за допомогою індукції за $\eta_0(*)$, а потім рефлексивності. $\square$

Доведення Теорему 48. Ми починаємо з доведення того, що відображення $\langle \text{coe}^{\pi_0^{\text{tw}}}, \text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}} \rangle : C_{\text{tw}} \rightarrow C_{\text{op}} \times C$ є коваріантним сімейством. За Лемою 32 наступне відображення, індуковане $\{0\} : \Delta^0 \rightarrow \Delta^n$, є еквівалентністю:

$$\epsilon : C_{\text{tw}_b}^{\Delta^n} \rightarrow (C_{\text{tw}_b} \times_{C_{\text{op}_b} \times C_b} (C_{\text{op}_b}^{\Delta^n} \times C_b^{\Delta^n}))$$

Для зручності ми почнемо із застосування кількох модальних перетворень (зокрема, використовуючи $\text{transp} : A \rightarrow B_{\text{op}_b} \text{Equiv} A_{\text{op}} \rightarrow B_b$) так, що достатньо показати, що таке відображення є еквівалентністю:

$$\epsilon' : C_{\text{tw}_b}^{\Delta^n} \rightarrow (C_{\text{tw}_b} \times_{C_b \times C_b} (C_{\text{op}_b}^{\Delta^n} \times C_b^{\Delta^n}))$$

Щоб довести це, ми побудуємо комутативну діаграму:

$$\begin{array}{ccc}
C_{\text{tw}_b}^{\Delta^{2n+1}} & \xrightarrow{l_{\text{join_ikz_diagram_n_orth}}} & \Delta^1 \rightarrow C_b \times_{C_b \times C_b} (C_{\text{op}_b}^{\Delta^n} \times C_b^{\Delta^n}) \\
\downarrow l_{\text{join_ikz_diagram_west}} & & \downarrow l_{\text{join_ikz_diagram_east}} \\
C_{\text{tw}_b}^{\Delta^n} & \xrightarrow{l_{\text{join_ikz_diagram_south}}} & C_{\text{tw}_b} \times_{C_b \times C_b} (C_{\text{op}_b}^{\Delta^n} \times C_b^{\Delta^n})
\end{array} \tag{2}$$

Ми визначимо ϕ за мить, але спочатку зауважимо, що пара (ι, id) є коректно визначеною завдяки Лемі 49, яка гарантує, що застосування ι , а потім обчислення належним чином комутує з проєкцією.

Зауважимо також, що два вертикальні відображення є еквівалентностями, оскільки ι є еквівалентністю. Відповідно, за правилом 3-із-2 (3-for-2), щоб показати, що ϵ' є еквівалентністю, достатньо переконатися, що ϕ є еквівалентністю, яка робить діаграму комутативною.⁶ Тепер ми визначимо ϕ так:

$$\phi(\text{mod}_b(f)) := (\text{mod}_b(f|_{n \leq n+1}), (\text{mod}_b(f|_{0 \leq \dots \leq n} \circ \neg), \text{mod}_b(f|_{n+1 \leq \dots \leq 2n+1})), \text{refl})$$

ϕ задається звуженням уздовж категорної еквівалентності $(\Delta^n_{\text{op}} \diamond \Delta^n \rightarrow \Delta^{2n+1})$, тому воно є еквівалентністю.

Далі зауважимо, що всі чотири відображення на цій діаграмі є слабко природними за C . Для нижнього та верхнього відображень це просте спостереження — верхнє задається звуженням, а нижнє використовує звуження разом із $\text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}}$, що також є природним за Зауваженням 28. Для лівого відображення це є наслідком природності ι . Для правого відображення єдиною складністю є шляхи, які свідчать про те, що відображення ι комутує з обчисленням на проєкціях. Це вимагає заповнення для певного шляху, але це є саме тією природною когерентністю, що забезпечується другою частиною Лемми 49.

Зрештою, ми доводимо, що діаграма комутує. Зафіксуємо $\text{mod}_b(f) : \Delta^{2n+1} \rightarrow C_b$. Ми хочемо показати, що $\epsilon'(\iota(\text{mod}_b(f))) = (\iota, \text{id})(\phi(\text{mod}_b(f)))$. Однак, за природністю, ми можемо звести задачу за допомогою f до випадку, коли $C = \Delta^{2n+1}$ та $f = \text{id}$. У цьому випадку все, що бере участь, є множинами, тому достатньо довести комутативність діаграми, замінивши кожен волокнистий добуток (pullback) на простий добуток. З урахуванням цього ми обчислюємо:

$$\begin{aligned} \epsilon'(\iota(\text{mod}_b(\text{id}))) &= \epsilon'(\text{mod}_b(\eta_n)) \\ &= (\text{mod}_b(\eta_n 0), (\text{transp}(\text{mod}_b(\text{coe}^{\pi_0^{\text{tw}}} \circ \eta_n)), \text{mod}_b(\text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}} \circ \eta_n))) \\ &= (\text{mod}_b(\eta_n 0), (\text{transp}(\text{mod}_b(\bar{i}_l)), \text{mod}_b(i_r))) \\ &= (\text{mod}_b(i_m(\eta_0 *)), (\text{mod}_b(i_l \circ \neg), \text{mod}_b(i_r))) \\ &= (\iota, \text{id})(\text{mod}_b(i_m), (\text{mod}_b(i_l \circ \neg), \text{mod}_b(i_r))) \\ &= (\iota, \text{id})(\phi(\text{mod}_b(\text{id}))) \end{aligned}$$

⁶Ми підкреслюємо, що заповнення (filler) для цього квадрата не має значення. Будь-яке заповнення є достатнім, щоб показати, що ϵ' є еквівалентністю, що, у свою чергу, означає, що ϵ є еквівалентністю, як і вимагалось.

Це завершує перший крок доведення. Другий крок полягає в тому, щоб показати, що для кожного $c :_b C$ відображення $\alpha_c : \text{hom}_{C \rightarrow \mathcal{S}}(\text{hom}(c, -), \Phi(\text{mod}_{\text{op}}(c), -))$ є ізоморфізмом. Переходячи до тотальних просторів, достатньо показати, що наступне відображення є еквівалентністю:

$$\tilde{\alpha}_c = \lambda(d, f). (d, f_*(\iota(\text{mod}_b(\text{id } c)))) : \sum_{d:C} \text{hom}(c, d) \rightarrow \sum_{d:C} \Phi(\text{mod}_{\text{op}}(c), d)$$

У наведеному вище виразі f_* — це операція коваріантного переносу (transport) на $\Phi(\text{mod}_{\text{op}}(c), -)$. Оскільки обидві сторони цього відображення є категоріями, достатньо показати, що це відображення є строго повним (fully faithful) та істотно сюр'єктивним (essentially surjective).

Дійсно, $\tilde{\alpha}_c$ є еквівалентністю на об'єктах. Для цього зауважимо, що якщо $f :_b \text{hom}(c, d)$ для деякого $d :_b C$, то ми можемо побудувати перенос f_* альтернативно наступним чином. Визначимо шлях $h : \Delta^1 \rightarrow \mathbb{C}_{\text{tw}}$ як $h := \iota(\text{mod}_b(\lambda_{_, _, k. f(k)}))$, тобто h відповідає такому подвійно виродженому (degenerate) 3-симплексу в C :

$$\begin{array}{ccc} c & \xleftarrow{\text{id } c} & c \\ \text{id } c \downarrow & & \\ c & \xrightarrow{f} & d \end{array}$$

Потім ми розглядаємо морфізм $\lambda i. (\pi_1^{\text{tw}}(h i), h i)$ в $\sum_{d:C} \Phi(\text{mod}_{\text{op}}(c), d)$. Використовуючи визначення ι та природність η , це відображення є морфізмом від $(c, \iota(\text{mod}_b(\text{id } c)))$ до $(d, \iota(\text{mod}_b(f)))$. Крім того, природність відображення $\text{coe}^{\pi_1^{\text{tw}}}$ гарантує, що воно лежить над f у C . Як наслідок, $\tilde{\alpha}_c(d, f) = (d, \iota(\text{mod}_b(f)))$ при обмеженні на $d :_b C$ та $f :_b \text{hom}(c, d)$, що є еквівалентністю, оскільки ι є оборотним.

Для повної унівалентності достатньо показати, що таке відображення є еквівалентністю:

$$\tilde{\alpha}_c : \mathbb{I} \rightarrow \sum_{d:C} \text{hom}(c, d)_b \rightarrow \mathbb{I} \rightarrow \sum_{d:C} \Phi(\text{mod}_{\text{op}}(c), d)_b$$

Однак, оскільки обидві сторони є тотальними просторами коваріантних сімейств, достатньо показати, що наступне відображення є еквівалентністю:

$$\tilde{\alpha}_c : \sum_{d:\mathbb{I} \rightarrow C} \text{hom}(c, d 0)_b \rightarrow \sum_{d:\mathbb{I} \rightarrow C} \Phi(\text{mod}_{\text{op}}(c), d 0)_b$$

Тепер висновок випливає з попереднього випадку. □

Notation 50. Ми пишемо $\Phi_D : D_{\text{op}} \times D \rightarrow \mathcal{S}$ для тієї ж конструкції, застосованої до деякої категорії D . У межах цього розділу ми продовжуємо писати Φ як скорочення для Φ_C .

Corollary 51. Якщо $c_0 : C_{\text{op}}$ та $c_1 : C$, то $\Phi(c_0, c_1) = \Phi_{C_{\text{op}}}(\text{mod}_{\text{op}}(\text{mod}_{\text{op}}(c_1)), c_0)$.

Доведення. Переходячи до тотальних просторів, достатньо знайти еквівалентність $C_{\text{tw}} \rightarrow C_{\text{optw}}$, яка вписується в таку діаграму:

$$\begin{array}{ccc} C_{\text{tw}} & \xrightarrow{\quad} & C_{\text{optw}} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & C_{\text{op}} \times C & \end{array}$$

Відображення coe^T точно задовольняє цю роль: воно є оборотним, оскільки 2-клітина τ є ізоморфізмом, і воно вписується в комутативну діаграму через відповідну діаграму в теорії мод. $\square$

3.2 Лема Йонеди

Маючи під рукою біфункторіальну версію $\text{hom}(-, -)$, ми тепер можемо безпосередньо визначити вкладення Йонеди Y_0 та використати Лему 47 для отримання результату про Y_0 :

Definition 52 (Йонеді). $Y_0 = \lambda c. \Phi(-, c) : C \rightarrow \hat{C}$.

Lemma 53. $\text{hom}(Y_0 c, X) \cong X(\text{mod}_{\text{op}}(c))$ для всіх $X : \hat{C}$ та $c :_b C$.

Доведення. Оскільки c анотовано модальністю b , використовуючи Теорему 48 та Наслідок 51, ми маємо таку ідентифікацію: $\text{hom}_{C_{\text{op}}}(\text{mod}_{\text{op}}(c), -) = \Phi(-, c)$. Крім того, за Лемою 45 ми додатково маємо:

$$\prod_{c' : C_{\text{op}}} \Phi(c', c) \rightarrow X(c') \cong \text{hom}(Y_0 c, X)$$

Тепер висновок випливає з Лемі 47. $\square$

Значна частина теорії категорій міститься в Лемі 53. Вона показує, що Y_0 є строго повним на b -анотованих елементах C і що C є повною підкатегорією в $\hat{C}$:

Lemma 54. $\Upsilon_0 : C \rightarrow \widehat{C}$ *індукує еквівалентність* $C\text{Equiv}\widehat{C}_{\text{isRepr}}$, *де* $\text{isRepr} = \lambda X. \sum_{c:C} X = \Upsilon_{0c}$.⁷

Хоча Лема 53 безпосередньо впливає з Лема 47, вищевказаний наслідок можна сформулювати лише тоді, коли існує *категорія* передпучків — те, що було відсутнє у [46]. Це відкриває нову стратегію доведення: щоб довести твердження для C , ми спочатку доводимо, що воно виконується для $\mathcal{S}$, потім для $\widehat{C}$, а потім показуємо, що воно звужується на повну підкатегорію. Наприклад, ми можемо довести згадану раніше характеристику природних ізоморфізмів:

Theorem 55. *Якщо $C, D :_{\flat} \mathcal{U}$ є категоріями, $F, G :_{\flat} C \rightarrow D$ та $\alpha :_{\flat} \text{hom}(F, G)$, то $\prod_{c:C} \text{islo}(\alpha c)$ виконується, якщо виконується $\prod_{c:_{\flat} C} \text{islo}(\alpha c)$.*

Доведення. Зауважимо, що ця теорема є тривіальною для $C = \Delta^0$, а для $C = \Delta^1, D = \mathcal{S}$ вона є наслідком Наслідку 42. Умова Сегала для $\mathcal{S}$ тоді тягне за собою теорему для $C = \Delta^n, D = \mathcal{S}$.

За Лемою 54 достатньо припустити, що $D = \widehat{D}_0$. За Аксіомою Γ та Теоремою 26 достатньо показати, що $(\sum_{c:C} \text{islo}(\alpha c)) \rightarrow (\sum_{c:C} \text{islo}(\alpha c)_{\sharp})$ є еквівалентністю. За Аксіомою $\mathbf{E}$ достатньо довести для всіх n , що наступне відображення є еквівалентністю:

$$\text{isEquiv}\left(\left(\sum_{c:C} \text{islo}(\alpha c)\right)^{\Delta^n}_{\flat} \rightarrow \left(\sum_{c:C} \text{islo}(\alpha c)_{\sharp}\right)^{\Delta^n}_{\flat}\right)$$

Розгортаючи та комутуючи $\flat$ із $\sum$, достатньо показати, що для кожного $c :_{\flat} \Delta^n \rightarrow C$ виконується:

$$\sum_{\sigma:\Delta^n} \text{islo}(\alpha(c\sigma)) \text{Equiv} \sum_{\sigma:_{\flat} \Delta^n} \text{islo}(\alpha(c\sigma))$$

Проте заміна α на $\alpha \circ c$ зводить нас до вже доведеного випадку $C = \Delta^n, D = \mathcal{S}$. $\square$

Лема 53 вже є потужною. Проте вона не фіксує того, що ця еквівалентність є *природною* за обома аргументами c та X — або, точніше, оскільки $c \in \flat$ -анотованим, а еквівалентність знаходиться в $\mathcal{U}$, природність, яку вона дає, є тривіальною. Ми можемо довести набагато сильнішу версію леми Йонеди, яка (1) не вимагає припущення, що $c :_{\flat} C$, і (2) дає бажану функторіальність як за c , так і за X . Для цього ми замінюємо $\text{hom}(-, -)$ на Φ :

⁷Зауважте, що $\text{isRepr}(X)$ є судженням (proposition) внаслідок Лема 53 та Наслідку 40.

Theorem 56 (Функторіальна лема Йонеди). *Існує природний ізоморфізм $\Phi_{\hat{C}}(\mathbf{Yo}^\dagger(-), -) \cong \text{eval} : \mathbf{C}_{\text{op}} \times \hat{C} \rightarrow \mathcal{S}$.*

Remark 57. Цей результат використовує кілька результатів із Розділу 4. Ці посилання вперед є виправданими: ми не використовуємо Теорему 56 до Розділу 4.3. Ми наводимо доведення тут задля концептуальної цілості.

Доведення. Основна складність у цьому доведенні полягає в тому, щоб знайти відображення $\Phi_{\hat{C}}(\mathbf{Yo}^\dagger(-), -) \rightarrow \text{eval}$, для якого потім можна перевірити, що воно є еквівалентністю. Для побудови цього відображення ми використовуємо представлення $\mathbf{C}_{\text{op}} \times \hat{C} \rightarrow \mathcal{S}$ як коваріантних сімейств над $\mathbf{C}_{\text{op}} \times \hat{C}$. Зокрема, ми розглядаємо такі діаграми волокнистих добутоків (pullback):

$$\begin{array}{ccccc}
 \tilde{\Phi}_C & \xrightarrow{v} & V & \xrightarrow{\quad} & \hat{C}_{\text{tw}} \\
 \downarrow \lrcorner & & \downarrow \lrcorner & & \downarrow \\
 \mathbf{C}_{\text{op}} \times C & \xrightarrow{\text{id} \times \mathbf{Yo}} & \mathbf{C}_{\text{op}} \times \hat{C} & \xrightarrow{\mathbf{Yo}^\dagger \times \text{id}} & \hat{C}_{\text{op}} \times \hat{C}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 \mathbf{C}_{\text{tw}} & \xrightarrow{w} & W & \xrightarrow{\quad} & \sum_{A:\mathcal{S}} A \\
 \downarrow \lrcorner & & \downarrow \lrcorner & & \downarrow \\
 \mathbf{C}_{\text{op}} \times C & \xrightarrow{\text{id} \times \mathbf{Yo}} & \mathbf{C}_{\text{op}} \times \hat{C} & \xrightarrow{\text{eval}} & \mathcal{S}
 \end{array}$$

Тоді стверджується, що $V \text{Equiv} W$. Щоб показати це, ми доводимо, що якщо ми замінимо композицію $\mathbf{C}_{\text{tw}} \rightarrow \mathbf{C}_{\text{op}} \times C \rightarrow \mathbf{C}_{\text{op}} \times \hat{C}$ вільним коваріантним сімейством, то відображення $\bar{v}, \bar{w}$, індуковані v та w , обидва будуть еквівалентностями. Тоді висновок показує, що $\bar{v} \circ \bar{w}^{-1}$ є шуканою еквівалентністю.

За відомим результатом [47, Теорема 2.41], існує вільне коваріантне розшарування (free covariant fibration) $Z : \mathbf{C}_{\text{op}} \times \hat{C} \rightarrow \mathcal{U}$, і якщо $c : \mathbf{C}$ та $X : \mathbf{C}$, то за Наслідком 67 ми маємо:

$$Z(c, X) =$$

$$\bigcirc_{\text{grpd}} \left(\sum_{c_0, c_1} \text{hom}(c_0, c) \times \text{hom}(\text{Yo}_{c_1}, X) \times \Phi(c_0, c_1) \right)$$

Щоб показати, наприклад, що v індукує еквівалентність, ми маємо показати, що таке відображення є еквівалентністю:

$$Z(c, X) \rightarrow \text{hom}(\text{Yo}^\dagger(c), X)$$

Ми можемо скористатися Теоремою 55 та припустити, що існує $c' :_b C$, такий що $c = \text{mod}_{\text{op}}(c')$, та що $X :_b \widehat{C}$. Крім того, оскільки права частина є групоїдом, це відображення однозначно індукується продовженням канонічного відображення такого типу:

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{c_0, c_1} \text{hom}(c_0, c) \times \text{hom}(\text{Yo}_{c_1}, X) \times \Phi(c_0, c_1) \right) \\ & \rightarrow \Phi(\text{Yo}^\dagger(c), X) \text{Equiv} X(c') \end{aligned}$$

Це відображення переводить (c_0, c_1, f, α, t) в $\alpha c(\Phi(f, \text{id}) t)$, і можна безпосередньо перевірити, що присвоєння $x \mapsto \eta(c, c', \text{id}, \text{id}, F_x)$ є квазіоберненням до цього відображення, де $F_x : \text{hom}(\text{Yo}(c'), X)$ відповідає $x : X(\text{mod}_{\text{op}}(c'))$ за Лемою 53. Випадок для w аналогічний. $\square$

4 Ще раз про спряженість

Маючи в розпорядженні передпучки та вкладення Йонеди, ми знову звертаємося до теорії спряжених функторів, введеної у [46] в СТТ. Вони визначають пару функцій $f : C \rightarrow D$ та $g : D \rightarrow C$ як спряжені, якщо вони забезпечені еквівалентністю $\iota : \prod_{c, d} \text{hom}(f(c), d) \text{Equiv} \text{hom}(c, g(d))$. Хоча вони пропонують кілька еквівалентних переформулювань з використанням природних перетворень одиниці та координиці, жодних нетривіальних прикладів спряженостей не наводиться — що не дивно, оскільки конкретні приклади категорій в СТТ з'явилися порівняно недавно. Навіть маючи в розпорядженні $\mathcal{S}$, досить складно побудувати приклади таких спряженостей.

Набагато реалістичніше побудувати лише відображення f , а потім показати, що передпучок $\Phi(f^\dagger(-), d) : \widehat{C}$ є представним для кожного $d :_b D$. Це можна порівняти з Теоремою 55: ми хочемо дати функторіальне визначення одного з відображень f або g і *нефункторіальне* визначення іншого, а потім показати, що це відображення можна покращити до повноцінної спряженості. У цьому розділі ми показуємо, що це дійсно можливо, і зауважуємо, що низка важливих спряженостей та результатів

тоді стають безпосередньо досяжними. Зокрема, ми використаємо цю техніку, щоб довести, що категорія $\widehat{C}$ є коповною і, більше того, є вільним копоповненням категорії C .

4.1 Поточкові спряженості та спряженості

Почнемо з формалізації поняття поточною спряжених (pointwise adjoints):

Definition 58. Ми говоримо, що відображення $f :_b C \rightarrow D$ є поточною лівим спряженим, якщо наступний тип є заселеним (inhabited):

$$\prod_{d :_b D} \text{isRepr}(\Phi(f^\dagger(-), d))$$

Дуально, f є поточною правим спряженим, якщо $f^\dagger : C_{\text{op}} \rightarrow D_{\text{op}}$ є поточною лівим спряженим.

Наша основна теорема спирається на два важливі попередні результати. Перший показує, що будь-який поточною лівий спряжений f породжує відображення в іншому напрямку, яке вибирає різні (обов'язково єдині) представні об'єкти для передпучка $\Phi(f^\dagger(-), d)$.

Lemma 59. Якщо $f :_b C \rightarrow D$ є поточною лівим спряженим, то тип морфізмів $g :_b D \rightarrow C$, забезпечених природним ізоморфізмом $\iota : \Phi(f^\dagger(-), -) \cong \mathbf{Yo} \circ g$, є стягуваним (contractible).

Доведення. Оскільки $\mathbf{Yo}$ є вкладенням, цей тип є судженням (proposition). Тому достатньо показати, що він є заселеним. За припущенням, $\bar{g} = \Phi(f^\dagger(-), d)$ є представним для всіх $d :_b D$, а отже, пропускається через $\widehat{C}_{\text{isRepr}}$. Посткомпозиція з еквівалентністю $\widehat{C}_{\text{isRepr}} \mathbf{Equiv} C$ дає бажане відображення $g : D \rightarrow C$. $\square$

Використовуючи це, ми доводимо універсальний випадок теореми, яка покращує поточною спряжений функтор до спряженого: кожне відображення $g :_b D \rightarrow C$, що є декартовим розшаруванням [10], таке що шар (fiber) над кожним $c :_b C$ має початковий (initial) об'єкт [4], допускає лівий спряжений.

Lemma 60. Якщо відображення $g :_b D \rightarrow C$ є декартовим і для кожного $c :_b C$ шар D_c має початковий об'єкт, то існує відображення $f : C \rightarrow D$, таке що $f(c)$ є початковим у D_c для всіх $c : C$.

Доведення. Зауважимо, що $\text{hasInitialObj}(D_c)$ є судженням, і тому за Аксіомою Γ ми можемо припустити, що $\text{hasInitialObj}(D_c)_b$ виконується для кожного $c :_b C$. Маючи це спостереження під рукою, ми можемо показати, що g є поточною правим спряженим: якщо $c :_b C$ та $d : D$, то:

$$\begin{aligned} \Phi_C(\text{mod}_{\text{op}}(c), g(d)) & \text{Equivhom}(c, g(d)) \\ & \text{Equivhom}(0_{D_c}, d) \quad g \text{ є декартовим} \\ & \text{Equiv}\Phi_D(\text{mod}_{\text{op}}(0_{D_c}), d) \end{aligned}$$

На цьому останньому кроці ми використовуємо наше спостереження, що виконується $\text{hasInitialObj}(D_c)_b$, і, що критично важливо, не лише те, що $\text{hasInitialObj}(D_c)$ виконується. Зокрема, ми спираємося на той факт, що $0_{D_c} :_b D_c$.

Відповідно, ми отримуємо функцію $f :_b C \rightarrow D$, яка переводить $c :_b C$ в 0_{D_c} . Залишається показати, що $f(c)$ є початковим у D_c для всіх $c : C$. Оскільки $D = \sum_{c:C} D_c$, це рівносильно тому, що наступне відображення є еквівалентністю: $(\sum_{d:D} \text{hom}_{D_{g(d)}}(f(g(d)), d)) \rightarrow D$.

Щоб довести це, ми використовуємо Теорему 38, яка дозволяє нам звести задачу до b -анотованого випадку, де висновок впливає з того факту, що $f(c)$ є тоді початковим у D_c . $\square$

Theorem 61. *Поточною праві спряжені відображення є правими спряженими.*

Доведення. Для заданого відображення $g :_b D \rightarrow C$ розглянемо декартове сімейство

$$\pi : C \downarrow g = (\sum_{c:C} \sum_{d:D} \text{hom}(c, g(d))) \rightarrow C$$

Оскільки g є поточною правим спряженим, кожен шар проєкції π над $c :_b C$ має початковий об'єкт. Тоді ми застосовуємо Лему 60, щоб отримати відображення $\bar{f} : C \rightarrow C \downarrow g$. Зрештою, композиція $\pi_2 \circ \bar{f}$ є шуканим лівим спряженим до g :

$$\begin{aligned} & \text{Hom}[C]cg(d) \\ & \text{Equiv} \sum_{\alpha:\text{hom}_C(c,g(d))} \text{hom}_{C \downarrow g_c}(\bar{f}(c), (c, d, \alpha)) \\ & \text{Equiv} \sum_{\alpha:\text{hom}_C(c,g(d))} \sum_{\beta:\text{hom}_D(f(c),d)} g(\beta) \circ \pi_3(\bar{f}(c)) = \alpha \\ & \text{Equivhom}_D(f(c), d) \end{aligned}$$

Перший крок використовує початковість $\bar{f}(c)$ у шарі над c , а другий розгортає визначення морфізму в $C \downarrow g$. $\square$

4.2 Приклади спряженостей

Ми скористаємося перевагами Теорема 61, щоб отримати важливі приклади спряжених відображень. Найбільш значущим є наступний результат:

Theorem 62. *Якщо $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ і категорія $\mathcal{D}$ є малою, то $\hat{f} := (f^\dagger)^* : \hat{\mathcal{C}} \rightarrow \hat{\mathcal{D}}$ є правим спряженням із лівим спряженням $f_!$.*

Доведення. Для простоти позначень ми замінімо $\mathcal{C}$ та $\mathcal{D}$ на $\mathcal{C}_{\text{op}}$ та $\mathcal{D}_{\text{op}}$. За Теоремою 61 достатньо припустити, що $X : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{S}$, і побудувати відображення $f_!(X) : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ разом із природною бієкцією $\prod_Y \text{hom}(f_!(X), Y) \text{Equivhom}(X, f^*(Y))$. Це є безпосереднім наслідком [47, Теорема 2.41] після локалізації композиції $\sum_{c:C} X(c) \rightarrow \mathcal{D}$ відносно відображення $\{0\} \rightarrow \mathbb{I}$. $\square$

Corollary 63. *Лівий спряжений $f_! \dashv \hat{f}$ задовольняє умову $f_! \circ Y_0 \cong Y_0 \circ f$.*

Corollary 64. *Простір $\mathcal{S}$ є мало-коповним: відображення $\text{const} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}^{\mathcal{C}}$ є правим спряженням із лівим спряженням colim_- для малих категорій $\mathcal{C} : \mathcal{U}$. Явно, якщо $X : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$, то $\text{colim}_- CX = \bigcirc_{\text{grpd}}(\sum_{c:C} X(c))$.*

Remark 65. Можна довести, що $\mathcal{S}$ є повним (тобто $\text{const} \dashv \lim_-$) за результатом [19]. Зокрема, вони показують, що $\prod_{c:C} X(c) : \mathcal{S}$ завжди, коли $X : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ та $\mathcal{C} : \mathcal{U}$. Наслідок 42 та Лема 45 тоді тягнуть за собою те, що $\text{hom}(A, \prod_{c:C} X(c)) \text{Equivhom}(\text{const } A, X)$.

Lemma 66. *Якщо $c : \mathcal{C}$, то відображення $\hat{c} : \hat{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{S}$ є лівим спряженням.*

Доведення. Для простоти ми знову замінімо $\mathcal{C}$ на $\mathcal{C}_{\text{op}}$ та застосуємо Теорему 61. Тоді ми припустимо, що нам задано $X : \mathcal{S}$, і визначимо c_*X як $\lambda c'. X^{\text{hom}(c', c)}$. Це відображення є коваріантним за c' [19]. Тоді достатньо показати, що відображення $X^{\text{hom}(c, c)} \rightarrow X$, задане обчисленням на тотальному морфізмі, індукує еквівалентність $\text{hom}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}}(Y, c_*X) \text{Equivhom}_{\mathcal{S}}(Y(c), X)$. Це, у свою чергу, є наслідком того факту, що відображення $Y(c) \rightarrow \bigcirc_{\text{grpd}}(\sum_{c':C} \text{hom}(c', c) \times Y(c'))$ є еквівалентністю, тому ми можемо розкласти відображення оцінки (evaluation map) наступним чином:

$$\begin{aligned} & \text{hom}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}}(Y, c_*X) \\ & \text{Equiv} \prod_{c':C} Y(c') \rightarrow X^{\text{hom}(c', c)} \\ & \text{Equiv} \prod_{c':C} \text{hom}(c', c) \times Y(c') \rightarrow X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Equiv } \bigcirc_{\text{grpd}} \left(\sum_{c': C} \text{hom}(c', c) \times Y(c') \right) &\rightarrow X \\ \text{Equiv } Y(c) &\rightarrow X \end{aligned} \quad \square$$

Поєднуючи Теорему 62 та Лему 66, ми отримуємо наступне описання для $f_! X$:

Corollary 67. *Якщо $X :_{\mathfrak{b}} \widehat{C}$, $f :_{\mathfrak{b}} C \rightarrow D$ та $d :_{\mathfrak{b}} D$, то ми можемо явно ототожнити $(f_! X) d$ із таким типом:*

$$\bigcirc_{\text{grpd}} \left(\sum_{c: C_{\text{op}}} X(c) \times \text{hom}(f^\dagger c, d) \right)$$

Доведення. Спочатку зауважимо, що $\widehat{d} f_! (X) = (f_! X) d$. Транспонуючи, маємо $\text{hom}(\widehat{d} f_! X, Z) \text{Equiv} \text{hom}(X, \widehat{f} d_* Z)$ для кожного $Z :_{\mathfrak{b}} \mathcal{S}$. Ми обчислюємо $\text{hom}(X, \widehat{f} d_* Z)$, використовуючи визначення d_* , наведене вище:

$$\begin{aligned} &\text{hom}_{\widehat{C}}(X, f^* d_* Z) \\ &\text{Equiv } \prod_{c: C_{\text{op}}} X(c) \rightarrow \text{hom}(f^\dagger c, d) \rightarrow Z \\ &\text{Equiv } \left(\sum_{c: C_{\text{op}}} X(c) \times \text{hom}(f^\dagger c, d) \right) \rightarrow Z \end{aligned}$$

Отже, $\widehat{d} f_! X$ задовольняє універсальну властивість типу $\bigcirc_{\text{grpd}} \left(\sum_{c: C_{\text{op}}} X(c) \times \text{hom}(f^\dagger c, d) \right)$. □

Наступна лема не вимагає застосування Теорема 61, а є просто наслідком маніпулювання природними перетвореннями:

Lemma 68. *Якщо відображення $f : C \rightarrow D$ є спряженим, то таким є і $f_* : C^A \rightarrow D^A$.*

Corollary 69. *Якщо категорія C є (ко)повною, то такою є і C^D , і (ко)границі обчислюються поточно. Зокрема, категорія передпучків $\widehat{C}$ є (ко)повною.*

Corollary 70. *Вкладення Йонеди зберігає всі границі.*

Доведення. Якщо $F :_{\mathfrak{b}} I \rightarrow C$ і границя $\lim_{_} F$ існує, то функторіальність Y_0 індукує відображення $Y_0 \lim_{_} F \rightarrow \lim_{_} (Y_0 \circ F)$, тож достатньо перевірити, що це відображення є оборотним на всіх $c :_{\mathfrak{b}} C$. Розгортаючи, ми маємо довести, що $\text{hom}(c, \lim_{_} F) \text{Equiv} \lim_{_} \text{hom}(c, F)$ є еквівалентністю, але це безпосередньо випливає з Лема 45. □

Зрештою, ми показуємо, що повні підкатегорії $\mathcal{S}_{\leq n}$ простору $\mathcal{S}$, визначені n -усіченими (truncated) типами, утворюють рефлексивні підкатегорії в $\mathcal{S}$. Ідея проста: використовувати НІТ-типи усічення (truncation HITs). Проте не є автоматичним те, що вони звужуються до відображення $\|-\|_n : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}_{\leq n}$. Ми доводимо це разом із рефлексивністю $\mathcal{S}_{\leq n}$, використовуючи Теорему 61:

Corollary 71. *Вкладення $\mathcal{S}_{\leq n} \rightarrow \mathcal{S}$ є правим спряженням.*

Corollary 72. *Простір $\mathcal{S}_{\leq n}$ є (ко)повним.*

Така ж методологія застосовується до підкатегорії модальних типів, пов'язаних з ідемпотентною монадою [47].

Example 73 (Спряження Ісбелла). Якщо $C :_b \mathcal{U}$, то відображення спряження Ісбелла (Isbell conjugation) ϕ є лівим спряженням:

$$\begin{aligned} \phi : \widehat{C} &\rightarrow \mathbf{C} \rightarrow \mathcal{S}_{\text{op}} \\ \phi(X) &= \text{mod}_{\text{op}}(\lambda c. \Phi(X, Yoc)) \end{aligned}$$

4.3 Універсальна властивість категорій передпучків

Далі ми узагальнюємо Теорему 62, щоб показати, що якщо $f :_b C \rightarrow E$, де C — мала категорія, а E — коповна категорія, то відображення $\Phi(f^\dagger(-), -) : E \rightarrow \widehat{C}$ є правим спряженням, загалом слідуючи аргументам, наведеним у [13]. Почнемо з кількох загальних лем. Далі ми фіксуємо C та E , як зазначено вище.

По-перше, як наслідок доведення Теорема 62:

Lemma 74. *Кограниця вкладення $Y_0 : C \rightarrow \widehat{C}$ дорівнює $1_{\widehat{C}} = \lambda_. 1$.*

З наведеного вище, а також за подальшого аналізу кограниць, ми можемо вивести результат, що становить незалежний інтерес: кожен передпучок є кограницею представних передпучків.

Lemma 75 (Щільність Y_0). *Якщо $X :_b \widehat{C}$, то $X \cong \text{colim}_- \widetilde{X}_{\text{op}} Y_0 \circ \pi_!^\dagger$, де $\widetilde{X} = \sum_{c:C_{\text{op}}} X(c)$.*

Доведення. Ми починаємо з наступного обчислення, де $\pi : \widetilde{X} \rightarrow C_{\text{op}}$ та $\pi_!^\dagger : \mathcal{S}^{\widetilde{X}} \rightarrow \widehat{C}$:

$$\pi_!^\dagger 1 \cong \pi_!^\dagger(\text{colim}_- \widetilde{X}_{\text{op}} Y_0) \cong \text{colim}_- \widetilde{X}_{\text{op}} \pi_!^\dagger \circ Y_0 \cong \text{colim}_- \widetilde{X}_{\text{op}} Y_0 \circ \pi^\dagger$$

Ми використали той факт, що лівий спряжений відображення $\pi_!^\dagger$ комутує з кограницями [4]. Щоб показати, що $\pi_!^\dagger 1 \cong X$, ми зауважимо, що для всіх $Z : \widehat{C}$:

$$\begin{aligned} \text{hom}(\pi_!^\dagger 1, Z) &\text{Equiv} \text{hom}_{\tilde{X} \rightarrow \mathcal{S}}(1, Z \circ \pi) \\ &\text{Equiv} \prod_{(c, x) : \sum_{c : C_{\text{op}}} X(c)} Z(c) \\ &\text{Equiv} \prod_{c : C_{\text{op}}} X(c) \rightarrow Z(c) \\ &\text{Equiv} \text{hom}(X, Z) \end{aligned}$$

Тепер висновок випливає з леми Йонеди. $\square$

Lemma 76. $N_f = \Phi(f^\dagger(-), -) : E \rightarrow \widehat{C}$ є правим спряженням.

Доведення. Ми доведемо, що відображення N_f є поточково правим спряженням. Відповідно, фіксуючи $X : \widehat{C}$, ми маємо побудувати $e : E_{\text{op}}$, таке що $\Phi(e, -) \cong \Phi(\text{mod}_{\text{op}}(X), N_f(-))$. Оскільки $X \cong \text{colim}_- \tilde{X}_{\text{op}} Y_{\text{op}} \circ \pi^\dagger$ і категорія E є коповною, за принципом дуальності до Наслідку 70 достатньо припустити, що $\text{mod}_{\text{op}}(X) = Y_{\text{op}}^\dagger(c)$, де $c : C_{\text{op}}$.⁸ Зрештою, покладемо $e = f^\dagger(c)$, тоді $\Phi(f^\dagger(c), -) \cong \Phi(Y_{\text{op}}^\dagger(c), N_f(-))$ за Теоремою 56. $\square$

Тепер ми можемо довести, як і обіцяли, універсальну властивість категорії $\widehat{C}$. Якщо ми запишемо $\text{CC}(\widehat{C}, E)$ для повної підкатегорії функторів $\widehat{C} \rightarrow E$, які зберігають усі кограниці, то відображення $Y_{\text{op}}^* : \text{CC}(\widehat{C}, E) \rightarrow (C \rightarrow E)$ є еквівалентністю. Щоб довести це, ми, по суті, доводимо, що існує відображення, яке переводить f у лівий спряжений до N_f , і що воно є оберненим до Y_{op}^* .

Theorem 77. $Y_{\text{op}}^* : \text{CC}(\widehat{C}, E) \rightarrow (C \rightarrow E)$ є еквівалентністю.

Доведення. Ми використовуємо Теорему 38. Якщо $f : C \rightarrow E$, то відображення $f_! : \widehat{C} \rightarrow E$ задовольняє рівність $f_! \circ Y_{\text{op}} = f$, а отже Y_{op}^* є істотно сюр'єктивним:

$$\Phi((f_! \circ Y_{\text{op}})^\dagger(-), -) \cong \Phi(Y_{\text{op}}^\dagger(-), N_f(-)) \cong N_f = \Phi(f^\dagger(-), -)$$

Більше того, якщо $F : \widehat{C} \rightarrow E$, то $(F \circ Y_{\text{op}})_! \cong F$, так що Y_{op}^* є бієкцією на $\flat$ -елементах. Запишемо $f = F \circ Y_{\text{op}}$. Ми спочатку побудуємо порівняльне відображення (comparison map) $\text{hom}(f_!, F)$, побудувавши

⁸Зауважте відсутність $\flat$ -анотації тут: ми повинні гарантувати, що ми є функторіальними за c , щоб отримати *діаграму* в E .

природне перетворення $\text{hom}(\text{id}, \mathbf{N}_f(F(-)))$. За карруванням (currying), це еквівалентно побудові природного перетворення між відображеннями $\mathbf{C}_{\text{op}} \times \widehat{C} \rightarrow \mathcal{S}$, і в такій формі тотожне відображення id задається оцінкою ϵ , а $\mathbf{N}_f(F(-))$ дорівнює $\Phi(f(-), F(-))$. Ми можемо замінити ϵ на $\Phi(\text{Yo}(-), -)$ за Теоремою 56, а $\Phi(f(-), F(-)) = \Phi(F(\text{Yo}(-)), F(-))$ за визначенням. Відповідно, потрібне відображення забезпечується природністю Φ_F . Досить легко перевірити, що воно є поточною еквівалентністю за Лемою 75.

Зрештою, тепер ми покажемо, що відображення Yo^* є строго повним. Для цього ми маємо показати, що якщо $f, g :_b C \rightarrow E$, то $\text{hom}(f!, g!) \cong \text{hom}(f, g)$. Обидві сторони є групоїдами, тому достатньо розглянути b -анотовані елементи. Якщо $\alpha :_b \text{hom}(f, g)$, то за допомогою транспонування ми можемо розглядати α як елемент типу $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{E}^{\mathbb{I}}_b$, і попереднє спостереження гарантує, що цей тип є еквівалентним $\text{CC}(\widehat{C}, \mathbf{E}^{\mathbb{I}})_b$, що й дає бажаний висновок після транспонування. $\square$

5 The theory of Kan extensions

A unifying concept in category theory are *Kan extensions*, which are universal extensions of functors along functors on the same domain. Mac Lane, one of the founders of category theory, famously stated: “The notion of Kan extensions subsumes all the other fundamental concepts of category theory,” such as (co)limits and adjunctions [28, 43].

Definition 78 (Kan extensions). Given a map $f : C \rightarrow D$ and a category E , the left (right) Kan extension $\text{Lan}f$ ($\text{Ran}f$) is the left (right) adjoint to $f^* : E^D \rightarrow E^C$.

While the definition makes sense in general, to use the results of the previous sections, we shall assume $f :_b C \rightarrow D$ and $E :_b \mathcal{U}$. In Section 5.1 we show that Kan extensions exist whenever E is (co)complete and in Sections 5.2 and 5.3 we put this to work by deducing two important results: Quillen’s theorem A and the properness of cocartesian fibrations. Our arguments for the existence of Kan extensions and Quillen’s theorem A adapt the (model-agnostic) ∞ -categorical arguments of [42].

5.1 Existence and characterization of Kan extensions

We can prove that Kan extensions can be computed in an expected way. For $d : D$, we write $C_{/d} := C \times_D D_{/d}$ and $C_{d/} := C \times_D D_{d/}$. We assume that C and D are both small so each $C_{/d}$ is also small. By Theorem 62 and Lemma 68:

Lemma 79. *If $E = \widehat{A}$ for some category $A :_{\flat} \mathcal{U}$, then $\mathbf{Lan} f$ exists. Moreover, if $X :_{\flat} C \rightarrow E$ and $d :_{\flat} D$, then $\mathbf{Lan} f X d = \operatorname{colim}_{-}(C_{/d} \rightarrow C \rightarrow E) = \bigcirc_{\text{grpd}}(\sum_{(c, -) : C_{/d}} X(c))$.*

This yields more generally:

Theorem 80. *If E is cocomplete, then $\mathbf{Lan} f$ exists, and if $X :_{\flat} C \rightarrow E$, $d :_{\flat} D$, then $\mathbf{Lan} f X d = \operatorname{colim}_{-}(C_{/d} \rightarrow C \rightarrow E)$.*

До́ведення. It suffices to argue that precomposition is pointwise a right adjoint and so we fix $X :_{\flat} C \rightarrow E$. By Theorem 77, we may view X as the composition $\bar{X} \circ \mathbf{Yo}$, where $\bar{X} : \widehat{C} \rightarrow E$ is the left adjoint to $\mathbf{N}_X$. Next, we observe by Lemma 79 that $\mathbf{Yo} : C \rightarrow \widehat{C}$ admits an extension to D along f , namely $\mathbf{Lan} f \mathbf{Yo} : D \rightarrow \widehat{C}$, and we claim that $\bar{X} \circ \mathbf{Lan} f \mathbf{Yo}$ is our desired extension of f . Fixing $Z : D \rightarrow E$, we calculate:

$$\begin{aligned} \operatorname{hom}_{D \rightarrow E}(\bar{X} \circ \mathbf{Lan} f \mathbf{Yo}, Z) &= \operatorname{Equivhom}_{D \rightarrow \widehat{C}}(\mathbf{Lan} f \mathbf{Yo}, \mathbf{N}_X \circ Z) \\ &= \operatorname{Equivhom}_{C \rightarrow \widehat{C}}(\mathbf{Yo}, \mathbf{N}_X \circ Z \circ f) \\ &= \operatorname{Equivhom}_{C \rightarrow E}(\bar{X} \circ \mathbf{Yo}, Z \circ f) \\ &= \operatorname{hom}_{C \rightarrow E}(X, Z \circ f) \end{aligned}$$

The expected colimit formula continues to hold as a consequence of Lemma 79 and the cocontinuity of $\bar{X}$. $\square$

By duality, we obtain the following variant:

Theorem 81. *If E is complete, then $\mathbf{Ran} f$ exists and is specified by the dual limit formula: $\mathbf{Ran} f X d = \operatorname{lim}_{-}(C_{d/} \rightarrow C \rightarrow E)$.*

5.2 Final and initial functors

It is frequently useful to show that the limit of a complex diagram D can be calculated by first restricting to a simpler diagram using $f : C \rightarrow D$ and calculating the limit there e.g., restricting from $\mathbb{Z}$ to $\mathbb{Z}_{\leq 0}$. When this approach is valid, f is said to be initial:

Definition 82. A functor $f : \mathfrak{b} C \rightarrow D$ is *initial* if for every $X : \mathfrak{b} D \rightarrow \mathcal{S}$ the map $\lim_{-} DX \rightarrow \lim_{-} CX \circ f$ is an equivalence. A map is *final* if its opposite is initial.

While this definition is asymmetrical in its treatment of initiality and finality, we shall restore the symmetry as a consequence of Quillen's Theorem A in the next section, see Corollary 93.

Recall that $\lim_{-} DX = \prod_{d:D} X(d)$ and so the definition of initiality equivalently states that the restriction map $(\prod_{d:D} X(d)) \rightarrow (\prod_{c:C} X(f(c)))$ is an equivalence.

Example 83. The $\{0\}/\{1\}$ inclusion $1 \rightarrow \mathbb{I}$ is initial/final.

Lemma 84. If $f : \mathfrak{b} C \rightarrow D$ is initial and $X : \mathfrak{b} D \rightarrow E$, then $\lim_{-} C(X \circ f)$ and $\lim_{-} DX$ both exist whenever either exists and are canonically isomorphic.

Доведения. By Corollary 70, we replace E with $\widehat{E}$ and by Corollary 69 we reduce to $\mathcal{S}$ where the result is immediate. $\square$

Lemma 85. If $C : \mathfrak{b} \mathcal{U}$, then $\bigcirc_{\text{grpd}} C \text{Equiv} \bigcirc_{\text{grpd}} C_{\text{op}}$.

Доведения. We observe that $\bigcirc_{\text{grpd}} C \text{Equiv} \bigcirc_{\text{grpd}} C_{\mathfrak{b}}$ and likewise for C_{op} . Accordingly, we note that:

$$\begin{aligned} C_{\text{op}} &\rightarrow X_{\mathfrak{b}\mathfrak{b}} \text{Equiv} \bigcirc_{\text{grpd}} C_{\text{op}} \rightarrow X_{\mathfrak{b}\mathfrak{b}} \\ C &\rightarrow X_{\mathfrak{b}\mathfrak{b}} \text{Equiv} \bigcirc_{\text{grpd}} C \rightarrow X_{\mathfrak{b}\mathfrak{b}} \\ C &\rightarrow X_{\mathfrak{b}\mathfrak{b}} \text{Equiv} C_{\text{op}} \rightarrow X_{\mathfrak{b}\mathfrak{b}} \end{aligned}$$

Finally, the result follows from a simple Yoneda argument. $\square$

Lemma 86. For every C , the canonical map $C \rightarrow \bigcirc_{\text{grpd}} C$ is both initial and final.

Доведения. By Lemma 85, it suffices to argue that this map is initial. To this end, we must show the following map to be an equivalence for every $X : \bigcirc_{\text{grpd}} C \rightarrow \mathcal{S}$:

$$(\prod_{d:\bigcirc_{\text{grpd}} C} X(d)) \rightarrow (\prod_{c:C} X(\eta(c)))$$

However, $X(d)$ is discrete for every $d : \bigcirc_{\text{grpd}} C$ and so this is simply the universal property of $\bigcirc_{\text{grpd}}$. $\square$

Corollary 87. If $\bigcirc_{\text{grpd}} C = 1$, then $\lim_{-} CA = A$ for $A : \mathcal{S}$.

5.3 Quillen's Theorem A

Our next goal is to prove the ∞ -categorical version of Quillen's theorem A. Unlike traditional proofs, we follow [42] and rely on having already established the basic apparatus of Kan extensions to simplify our argument.

Definition 88. A functor $f :_{\mathfrak{b}} C \rightarrow D$ is Quillen final if $\bigcirc_{\text{grpd}}(C_{d/})\text{Equiv}1$ for all $d :_{\mathfrak{b}} D$

Theorem 89. A functor $f :_{\mathfrak{b}} C \rightarrow D$ is final if and only if it is Quillen final.

Remark 90. This result shows that, in particular, finality doesn't depend on the particular universe $\mathcal{S}$ chosen.

Lemma 91. If $f :_{\mathfrak{b}} C \rightarrow D$ is Quillen final and $X :_{\mathfrak{b}} D \rightarrow \widehat{A}$, then $\text{colim_}DX\text{Equivcolim_}CX \circ f$.

Доведения. This statement is pointwise, so we quickly reduce to $\mathcal{S}$ instead of $\widehat{A}$. In this situation, we wish to show that the following commutes:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}^D & \xrightarrow{f^*} & \mathcal{S}^C \\ & \searrow \text{colim}_D & \swarrow \text{colim}_C \\ & \mathcal{S} & \end{array}$$

Note that all three morphisms are left adjoints, and so it suffices to compare their right adjoints: the constant functors Δ_C and Δ_D , along with the right Kan extension $\text{Ran}f$. We next note that there is at least a comparison map $\Delta_D \rightarrow \text{Ran}f \circ \Delta_C$ given by transposing the identity map $f^* \circ \Delta_D \rightarrow \Delta_C$. We must argue that this map is pointwise invertible, and so we reduce to considering $X :_{\mathfrak{b}} \mathcal{S}$ and $d :_{\mathfrak{b}} D$, and we must show the following, using Theorem 81: $X\text{Equivlim_}C_{d/}X$. This now follows from our assumption and Lemma 87. $\square$

Lemma 92. If $f :_{\mathfrak{b}} C \rightarrow D$ is Quillen final, E a cocomplete category, and $X :_{\mathfrak{b}} D \rightarrow E$, then $\text{colim_}DX\text{Equivcolim_}CX \circ f$.

Доведения. We reduce to the case where $E = \widehat{D}$ (and therefore Lemma 91) by factoring X as $\bar{X} \circ Y_0$ and noting that $\bar{X}$ preserves colimits by construction. $\square$

Proof of Theorem 89. To see that Quillen finality implies finality, we apply Lemma 92 to $\mathcal{S}_{\text{op}}$, and calculate:

$$\lim_D_{\text{op}}X\text{Equivcolim_}DX^\dagger\text{Equivcolim_}CX^\dagger \circ f\text{Equivlim_}C_{\text{op}}X \circ f^\dagger$$

For the reverse, suppose that f is final. We note that by the dual of Lemma 84 (again applied to $\mathcal{S}_{\text{op}}$), the canonical map $\text{colim}_- CX \circ f \rightarrow \text{colim}_- DX$ is an equivalence for any $X :_{\flat} D \rightarrow \mathcal{S}$. Fix $d :_{\flat} D$ and choose $X = \text{hom}(d, -) = \Phi(\text{mod}_{\text{op}}(d), -)$ such that the colimits in question are precisely $\bigcirc_{\text{grpd}} D_{d/}$ and $\bigcirc_{\text{grpd}} C_{d/}$, using Theorem 62. This completes the proof since $\bigcirc_{\text{grpd}} D_{d/} = 1$. $\square$

Corollary 93. *A functor $f :_{\flat} C \rightarrow D$ is final if and only if, for every $X :_{\flat} D \rightarrow \mathcal{S}$ the map $\text{colim}_- DX \rightarrow \text{colim}_- CX \circ f$ is an equivalence.*

This restores the symmetry between initial and final functors, as promised. We offer another symmetric definition of initiality and finality, informed by [12, Ch. 8].

Definition 94 (Covariant equivalences). Fix $p :_{\flat} C \rightarrow A$ and $q :_{\flat} D \rightarrow A$ between categories A, C, D . Let $f :_{\flat} C \rightarrow D$ be a fibered map as follows:

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & D \\ & \searrow p & \swarrow q \\ & A & \end{array}$$

We call f a *covariant equivalence* if for all families $X :_{\flat} A \rightarrow \mathcal{S}$ reindexing gives rise to an equivalence, i.e.,:

$$f^* : (\prod_{a:A} D_a \rightarrow X_a) \rightarrow (\prod_{a:A} C_a \rightarrow X_a)$$

Dually, f is called *contravariant equivalence* precomposition with respect to all contravariant families is an equivalence.

Lemma 95. *Let f as below be a covariant equivalence with respect to p and q . Then, for any functor $r :_{\flat} B \rightarrow A$ it is also a covariant equivalence with respect to rp and rq :*

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & D \\ & \searrow p & \swarrow q \\ & A & \\ & \downarrow r & \\ & B & \end{array}$$

Доведения. We get the following induced square:

$$\begin{array}{ccc} (\prod_{b:B} D_b \rightarrow X_b) & \xrightarrow[\simeq]{f^*} & (\prod_{b:B} C_b \rightarrow X_b) \\ \simeq \downarrow & & \downarrow \simeq \\ (\prod_{a:A} D_a \rightarrow X_{r(a)}) & \xrightarrow{f^*} & (\prod_{a:A} C_a \rightarrow X_{r(a)}) \end{array}$$

The upper horizontal map is an equivalence by the preconditions. The goal is to show that the lower horizontal map is an equivalence, too. But this follows from 3-for-2 for equivalences. $\square$

Lemma 96 (Characterizations of initiality). *Let $f :_{\mathfrak{b}} C \rightarrow D$ be a functor. Then the following are equivalent:*

- (1) f is initial.
- (2) Let $X :_{\mathfrak{b}} A \rightarrow \mathcal{S}$ be a family with associated left fibration $\pi :_{\mathfrak{b}} \tilde{X} \rightarrow A$. Then any square of the following form has a filler $\bar{\varphi}$, uniquely up to homotopy:

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\varphi} & \tilde{X} \\ f \downarrow & \nearrow \bar{\varphi} & \downarrow \pi \\ D & \xrightarrow{\alpha} & A \end{array}$$

- (3) For any family $X :_{\mathfrak{b}} A \rightarrow \mathcal{S}$ the following square is a pullback:

$$\begin{array}{ccc} \overset{l_{\text{on_tikz_diagram_north}}}{X^D} & \xrightarrow{\quad} & \overset{l_{\text{on_tikz_diagram_north}}}{X^C} \\ \overset{l_{\text{on_tikz_diagram_west}}}{\downarrow} \lrcorner & & \downarrow \overset{l_{\text{on_tikz_diagram_east}}}{\quad} \\ \overset{l_{\text{on_tikz_diagram_south}}}{A^D} & \xrightarrow{\quad} & \overset{l_{\text{on_tikz_diagram_south}}}{A^C} \end{array}$$

- (4) f is a covariant equivalence with respect to any $\alpha :_{\mathfrak{b}} D \rightarrow A$.

The analogous characterization holds for contravariant equivalences and final functors.

Доведения. Conditions (2) and (3) are readily seen to be equivalent by commuting $\prod$ and $\sum$. Condition (4) unfolds to the following: for any $X \vdash A \rightarrow \mathcal{S}$ reindexing along f is an equivalence, namely

$$f^* : (\prod_{a:A} D_a \rightarrow X_a) \xrightarrow{\sim} (\prod_{a:A} (\sum_{d:D_a} C_{a,d}) \rightarrow X_a)$$

This, again, is readily seen to be equivalent to (2).

We turn to the implication (4) $\implies$ (1). But this is clear, since (1) says that f is a covariant equivalence with respect to itself and $\text{id}D$.

For the converse direction (1) $\implies$ (4) we use the insight just made together with Lemma 95. $\square$

The following alternative characterization is also often useful:

Lemma 97. *$f \vdash C \rightarrow D$ is initial (resp. final) if and only if for every covariant (resp. contravariant) family $\pi \vdash X \rightarrow Y$, f is left orthogonal to π , i.e., $\text{isEquiv}(X^D \rightarrow X^C \times_{Y^C} Y^D)$.*

Доведения. Immediate by Proposition (4) for the initial case and by duality and Corollary 93 for the final case. $\square$

Corollary 98. *There is an orthogonal factorization system in the sense of [47] with the left class given by the initial functors and the right class by covariant fibrations.*

As another consequence we get the dual of Theorem 89:

Corollary 99. *A functor $f \vdash C \rightarrow D$ is initial if and only if $\bigcirc_{\text{grpd}}(C/d) \text{Equiv} 1$ for all $d \vdash D$ (Quillen initial).*

We demonstrate the utility of Theorem 89 by giving a new and far simpler proof that cocartesian fibrations are *proper*.

Definition 100. A functor $\pi \vdash E \rightarrow B$ between categories is *proper* if for all pullbacks (of $\flat$ -functors) of the following form, v is final if u is final:

$$\begin{array}{ccccc} E'' & \xrightarrow{l_{j\text{on}_t\text{ikz}_d\text{diagram}_n\text{orth}}} & E' & \xrightarrow{\quad} & E \\ l_{j\text{on}_t\text{ikz}_d\text{diagram}_w\text{est}} \downarrow & & \downarrow \lrcorner & & \downarrow l_{j\text{on}_t\text{ikz}_d\text{diagram}_e\text{ast}} \\ B'' & \xrightarrow{\quad} & B' & \xrightarrow{\quad} & B \\ & & \text{\scriptsize } u_{j\text{on}_t\text{ikz}_d\text{diagram}_s\text{outh}} & & \end{array}$$

We call π *smooth* if $\pi^\dagger : \mathbf{E}_{\text{op}} \rightarrow \mathbf{B}_{\text{op}}$ is proper.

Lemma 101. *Smooth and proper functors are closed under composition and pullback.*⁹

Theorem 102. *Cartesian fibrations are smooth and cocartesian fibrations are proper.*

Доказательство. It suffices to treat the proper case. Fix a cocartesian fibration $\pi :_b E \rightarrow B$ and note that since cocartesian fibrations are stable under pullbacks, it suffices show to that v is final in the following pullback diagram if u is final:

$$\begin{array}{ccc} A \times_B E & \xrightarrow{l_{jontikzdiagram_north}} & E \\ \downarrow l_{jontikzdiagram_west} \lrcorner & & \downarrow l_{jontikzdiagram_east} \\ A & \xrightarrow{l_{jontikzdiagram_south}} & B \end{array}$$

We now use Theorem 89. For $e :_b E$ we compute the fiber:

$$\begin{aligned} & (A \times_B E) \times_E E_{e/} \\ & \text{Equiv } A \times_B E_{e/} \\ & \text{Equiv } A \times_B \left(\sum_{b' : B, f : \text{hom}(\pi(e), b')} (E_{b'})^{\mathbb{I}} \right) \quad \pi \text{ is cocartesian} \\ & \text{Equiv } \sum_{(a, f) : A \times_B B_{\pi(e)/}} (E_{u(a)})_{f!e/} \end{aligned}$$

Applying $\bigcirc_{\text{grpd}}$ to each fiber yields $\bigcirc_{\text{grpd}} (E_{u(a)})_{f!e/} \mathbf{Equiv} 1$ (as coslices have initial elements) and $\bigcirc_{\text{grpd}} (A \times_B B_{\pi(e)/}) \mathbf{Equiv} 1$ since u is final by assumption. This implies that applying $\bigcirc_{\text{grpd}}$ to the entire $\sum$ -type produces **1** [47]. $\square$

Corollary 103. *If $\pi :_b E \rightarrow B$ is cocartesian and $X :_b E \rightarrow D$, then the left Kan extension $\text{Lan} \pi X$ sends $b :_b B$ to $\text{colim}_- (E_b \rightarrow E \rightarrow D)$.*

5.4 Smooth and proper base change

We want to show that smooth and proper functors satisfy the *Beck–Chevalley condition*. We follow [12, Section 8.4]; see also [3] for a general discussion.

First, using the initial-covariant factorization (see 98) of a functor with small fibers we can compute the action of precomposition for (co)presheaves:

⁹The definition of properness is formulated specifically to bake in the latter.

Proposition 104 ([12, Theorem 8.1.18]). *Let $u :_{\flat} A \rightarrow B$ be a functor with small fibers. Then the left adjoint $u_! \dashv u^* :_{\flat} \mathcal{S}^B \rightarrow \mathcal{S}^A$ acts as follows: for $F :_{\flat} A \rightarrow \mathcal{S}$, if*

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathcal{S}_* \\ \phi \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ A & \xrightarrow{F} & \mathcal{S} \end{array}$$

denote by $E \xrightarrow{j} X \xrightarrow{\psi} B$ the initial-covariant factorization of $u \circ \phi$. Then $u_!(F)$ is the straightening of ψ :

$$\begin{array}{ccccc} E & \xrightarrow{j} & X & \longrightarrow & \mathcal{S}_* \\ \phi \downarrow & & \downarrow \psi & \lrcorner & \downarrow \\ A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{u_!(F)} & \mathcal{S} \end{array}$$

In particular, the unit $\eta :_{\flat} F \rightarrow u^ u_! F$ corresponds under directed univalence to the map $\tilde{\eta}$:*

$$\begin{array}{ccccc} & & j & & \\ E & \overset{\tilde{\eta}}{\dashrightarrow} & Y & \longrightarrow & X \\ & \searrow \phi & \downarrow u^* \psi & \lrcorner & \downarrow \psi \\ & & A & \xrightarrow{u} & B \end{array}$$

До́ведення. We want to show that an equivalence is given by the map

$$\lambda \alpha . u^* \alpha \circ \eta :_{\flat} \text{hom}_{B \rightarrow \mathcal{S}}(u_! F, G) \rightarrow \text{hom}_{A \rightarrow \mathcal{S}}(F, u^* G).$$

We write the unstraightening of G as

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & \mathcal{S}_* \\ \gamma \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ B & \xrightarrow{G} & \mathcal{S} \end{array}$$

The above transposition map is equivalent to a map

$$\left(\prod_{b:B} \text{hom}_{\mathcal{S}}(X_b, Z_b) \right) \rightarrow \left(\prod_{a:A} \text{hom}_{\mathcal{S}}(E_a, (A \times_B Z)_a) \right) \simeq \left(\prod_{b:B} \text{hom}_{\mathcal{S}}(E_b, Z_b) \right).$$

By directed univalence, this map corresponds to the map

$$\left(\prod_{b:B} (X_b \rightarrow Z_b)\right) \rightarrow \left(\prod_{b:B} (E_b \rightarrow Z_b)\right)$$

which in turn acts as precomposition of fibered functors by j :

$$\begin{array}{ccccc} E & \xrightarrow{j} & X & \longrightarrow & Z \\ & \searrow u \circ \varphi & \downarrow \psi & \swarrow \gamma & \\ & & B & & \end{array}$$

Finally, due to Proposition 97(4) this map is an equivalence. $\square$

Let $f :_{\flat} A \rightarrow B$ be a functor with small fibers. Consider the induced pair of adjoints:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}^B & \xleftarrow{f_!} & \mathcal{S}^A \\ & \perp & \\ & \xrightarrow{f^*} & \end{array}$$

Thus, a square

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{u} & A \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ B' & \xrightarrow{v} & B \end{array}$$

induces the *Beck–Chevalley square*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}^{A'} & \xleftarrow{u^*} & \mathcal{S}^A \\ f'_! \downarrow & \beta & \downarrow f_! \\ \mathcal{S}^{B'} & \xleftarrow{v^*} & \mathcal{S}^B \end{array}$$

with the 2-cell β (a morphism in $\mathcal{S}^A \rightarrow \mathcal{S}^{B'}$) being the transpose of the map:

$$u^* \xrightarrow{u^* \eta} u^* f^* f_! \simeq f'^* v^* f_!$$

Analogously to 104, we give a description of the Beck–Chevalley map as in [12, Section 8.4].

Let $F :_{\flat} A \rightarrow \mathcal{S}$ and φ its unstraightening:

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathcal{S}_* \\ \varphi \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ A & \xrightarrow{F} & \mathcal{S} \end{array}$$

Recall, that $f_! F$ is given by

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{j} & Y & \longrightarrow & \mathcal{S}_* \\ \varphi \downarrow & & \psi \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{f_! F} & \mathcal{S} \end{array}$$

and that the unit $\eta :_{\flat} F \rightarrow f^* f_! F$ is given by the mediating map:

$$\begin{array}{ccccc} & & j & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ X & \xrightarrow{\tilde{\eta}} & Z & \longrightarrow & Y \\ & \searrow \varphi & \downarrow & \lrcorner & \downarrow \psi \\ & & A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

Pulling back along u and v , resp., and factoring the upper horizontal map yields the square

$$\begin{array}{ccccc} & & Y' & & \\ & \nearrow j' & & \searrow r & \\ A' \times_A X & \xrightarrow{j'' := f' \times f j} & B' \times_B Y & & \\ u^* \varphi \downarrow & & \downarrow v^* \psi & & \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' & & \end{array}$$

where j' is initial and r is a covariant fibration. We consider the composite $\psi' := v^* \psi \circ r :_{\flat} Y' \rightarrow B$ whence

$$\begin{array}{ccccc} Y' & \longrightarrow & \mathcal{S}_* & & B' \times_B Y \longrightarrow Y \longrightarrow \mathcal{S}_* \\ \psi' \downarrow \lrcorner \downarrow & & \downarrow & & v^* \psi \downarrow \lrcorner \psi \downarrow \lrcorner \downarrow \\ B & \xrightarrow{f'_! u^*(F)} & \mathcal{S}_* & & B' \xrightarrow{v} B \xrightarrow{f_! F} \mathcal{S} \\ & & & & \searrow v^* f_! F \end{array}$$

and the Beck–Chevalley transformation corresponds to the fibered map $r :_{\flat} Y' \rightarrow_B B' \times_B Y$ over B .

Theorem 105 (Smooth base change, [12, Theorem 8.4.1]). *Consider a pullback square*

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{u} & A \\ f' \downarrow & \lrcorner & \downarrow f \\ B' & \xrightarrow{v} & B \end{array}$$

of small categories where v is smooth. Then, the Beck–Chevalley transformation is an equivalence

$$f'_! u^* \simeq v^* f_!.$$

Доказательство. We will show that the map r from the preceding description is an equivalence by showing that it is also initial (and it is a covariant fibration by construction). We have the following commutative cube:

$$\begin{array}{ccccc} A' \times_A X & \xrightarrow{j''} & B' \times_B Y & & \\ \downarrow u^* \phi \lrcorner & \searrow & \downarrow v^* \psi \lrcorner & \searrow v' & \\ & X & \xrightarrow{j} & Y & \\ \downarrow & \downarrow \phi & \downarrow & \downarrow \psi & \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' & & \\ \downarrow u \lrcorner & & \downarrow v & & \\ & A & \xrightarrow{f} & B & \end{array}$$

By the pullback lemma, the top square is a pullback, too. Since v is smooth and j is initial, j'' is initial. But $j'' = r \circ j'$ so r is also initial due to cancelation. $\square$

One can also prove the analogous *proper* base change formula as in [12, Theorem 8.4.6].

6 Conclusions and future work

We have introduced and studied the impact of the ∞ -categorical Yoneda embedding in **STT**. This includes the development of classical concepts (Kan extensions, adjoints, (co)limits, etc.), all in the synthetic ∞ -categorical setting. While some of the basic theory had been investigated in **STT** already, we

were able to produce the first non-trivial concrete examples of, e.g., adjunctions (Theorem 62) and give several more refined versions of existing theorems (Theorem 55) which more closely match their standard counterparts.

6.1 Related work

There are several closely related type-theoretic approaches to synthetic (∞ -)category theory. We may roughly divide these into (1) directed type theory, where every type is a category but various operations ($\prod$) must be restricted, and (2) variations on simplicial type theory. For instance, many directed type theories have been proposed and studied over the years [25, 55, 39, 21, 9, 24, 60, 56, 2, 38, 40, 37, ?]. In general, while these type theories are a promising approach to formalize category theory in type theory, none of them have thus far received as much attention as STT and, consequently, none have developed category theory to the extent of this work. Furthermore, it is substantially harder to design a directed type theory in this style (as it is a more radical alteration of the basic rules of type theory) and most proposals handle only 1-category theory rather than $(\infty, 1)$ -categories. We note, however, that some of these type theories do include a version of Theorem 56 in the form of directed path induction [38, 40, 37]. Given, however, that few of our arguments rely on types which are not categories, we expect many of them to transfer to sufficiently rich future variants of directed type theory.

Other variations of simplicial type theory have been considered in the literature. For instance, several papers use additional judgmental structure (extension types) to get more definitional equalities around hom-types [46, 4, 57, 10, 59, 58] at the cost of making the interval a second-class type similar to two-level type theory [1, 54]. Other versions have favored a cubical interval [19] or even a cubical interval atop a cubical version of HoTT [60, 56]. Aside from the addition of modalities, our version of STT is deliberately minimalistic: we use only ordinary HoTT with a handful of postulates. Accordingly, our results can be interpreted into essentially any incarnation of modal STT and does not rely on extra definitional equalities.

Finally, there are many attempts to formulate more conceptual and synthetic foundations for ∞ -category theory which do not rely on type theory. For instance, the ∞ -cosmos program of [49] aims to give a systematic account of the formal category theory and model-independence using 2-category theory. On the other hand, most practitioners in the field attempt to give looser “model independent” arguments which avoid relying on explicit computations

as much as possible. We have successfully translated some of these arguments into our framework, proving that this informal discipline is effective (e.g., Section 5). More recently, [12] have begun to redevelop ∞ -category theory in a deliberately informal and high-level language, splitting the difference between a formal theory like STT and the usual “model-independent” discipline of practitioners. We expect that their arguments can be translated into STT and we have shown that some of their primitive axioms are *provable* in STT (e.g., Theorems 41 and 39 and Lemma 60).

6.2 Future work

Many promising avenues for future work remain to be explored. While we have focused on presheaf categories and immediate consequences of their theory, we plan to port other foundational results from category theory (presentable and accessible categories, Bousfield localizations, topos theory, etc.) into STT. It would also be desirable to adapt more parts of the internal ∞ -category theory and ∞ -topos theory of Martini and Wolf [29, 35, 31, 34, 36, 30, 61] to STT. Additionally, we hope to extend a proof assistant like Agda [52] with the necessary support for modalities to give machine-checked versions of the proofs in this paper. On the foundational side, STT presently relies on a handful of axioms (Appendix B) and therefore satisfies only normalization and not canonicity. In future work, we hope to examine which of these principles can be given computational interpretations and to what extent one can ‘compute’ with synthetic ∞ -categories.

A The formal rules of MTT

The formal syntax of MTT is comprised of four judgments: $\vdash \Gamma$, $\Gamma \vdash \delta : \Delta$, $\Gamma \vdash a : A$, and $\Gamma \vdash A$. We list the relevant novel rules for these judgments below:

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\vdash \Gamma} \\
 \\
 \frac{}{\vdash 1} \qquad \frac{\vdash \Gamma}{\vdash \Gamma.\{\mu\}} \qquad \frac{\vdash \Gamma \quad \Gamma.\{\mu\} \vdash A}{\vdash \Gamma.(\mu \mid A)} \\
 \\
 \frac{\vdash \Gamma}{\vdash \Gamma.\{\text{id}\} = \Gamma} \quad \frac{\vdash \Gamma}{\vdash \Gamma.\{\mu\}.\{\nu\} = \Gamma.\{\mu \circ \nu\}}
 \end{array}$$

$$\boxed{\Gamma \vdash \delta : \Delta}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash ! : 1} \quad \frac{\vdash \Gamma \quad \Gamma.\{\mu\} \vdash A}{\Gamma.(\mu \mid A) \vdash \uparrow : \Gamma} \quad \frac{\Gamma \vdash \delta : \Delta \quad \Gamma.\{\mu\} \vdash a : A}{\Gamma \vdash \delta.a : \Delta.(\mu \mid A)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \delta : \Delta}{\Gamma.\{\mu\} \vdash \delta.\{\mu\} : \Delta.\{\mu\}} \quad \frac{\vdash \Gamma \quad \alpha : \mu \longrightarrow \nu}{\Gamma.\{\nu\} \vdash \Gamma.\{\alpha\} : \Gamma.\{\mu\}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \gamma : 1}{\Gamma \vdash ! = \gamma : 1} \quad \frac{\Gamma \vdash \delta : \Delta \quad \Gamma.\{\mu\} \vdash a : A}{\Gamma \vdash \uparrow \circ (\delta.a) = \delta : \Delta}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \delta : \Delta.(\mu \mid A)}{\Gamma \vdash (\uparrow \circ \delta).\mathbf{v}[\delta] = \delta : \Delta.(\mu \mid A)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \delta : \Delta}{\Gamma \vdash \delta.\{\mathbf{id}\} = \delta : \Delta \quad \Gamma.\{\nu \circ \mu\} \vdash \delta.\{\nu \circ \mu\} = \delta.\{\nu\}.\{\mu\} : \Delta.\{\nu \circ \mu\}}$$

$$\frac{\vdash \Gamma}{\Gamma.\{\mu\} \vdash \Gamma.\{\mathbf{id}\} = \mathbf{id} : \Gamma.\{\mu\} \quad \Gamma.\{\xi\} \vdash \Gamma.\{\alpha\} \circ \Gamma.\{\beta\} = \Gamma.\{\alpha \circ \beta\} : \Gamma.\{\mu\}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \delta : \Delta \quad \mu \leq \nu}{\Gamma.\{\nu\} \vdash \Delta.\{\alpha\} \circ \delta.\{\mu\} = \delta.\{\mu\} \circ \Gamma.\{\alpha\} : \Delta.\{\mu\}}$$

$$\frac{\vdash \Gamma \quad \alpha : \mu_0 \longrightarrow \nu_0 \quad \beta : \mu_1 \longrightarrow \nu_1}{\Gamma.\{\nu_1 \circ \nu_0\} \vdash \frac{\Gamma.\{\beta\}.\{\mu_0\} \circ \Gamma.\{\alpha\}}{= \Gamma.\{\beta * \alpha\}} : \Gamma.\{\mu_1 \circ \mu_0\}}$$

$$\boxed{\Gamma \vdash A}$$

$$\frac{\Gamma.\{\mu\} \vdash A}{\Gamma \vdash A} \quad \frac{\Gamma \vdash \delta : \Delta \quad \Delta.\{\mu\} \vdash A}{\Gamma \vdash A[\delta] = A[\delta.\{\mu\}]}$$

$$\boxed{\Gamma \vdash a : A}$$

$$\frac{\Gamma.\{\mu\} \vdash A}{\Gamma.(\mu \mid A).\{\mu\} \vdash \mathbf{v} : A[\uparrow.\{\mu\}]} \quad \frac{\Gamma.\{\mu\} \vdash a : A}{\Gamma \vdash \mathbf{mod}_\mu(a) : A}$$

$$\frac{\Gamma.(\nu \mid A) \vdash B \quad \Gamma.(\nu \circ \mu \mid A) \vdash b : B[\uparrow.\mathbf{mod}_\mu(\mathbf{v})] \quad \Gamma.\{\nu\} \vdash a : A}{\Gamma \vdash \mathbf{let} \mathbf{mod}_\mu(-) \leftarrow a \text{ in } b : B[\mathbf{id}.a]}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{\Delta.(\nu \mid A) \vdash B \quad \Delta.\{\nu\} \vdash a : A \quad \Gamma \vdash \delta : \Delta}{\Gamma \vdash \text{let } \text{mod}_\mu(-) \leftarrow a[\delta.\{\nu\}] \text{ in } b[(\delta \circ \uparrow).\mathbf{v}] : B[\delta.a]} \\
\frac{\Gamma.\{\mu\} \vdash a : A \quad \Gamma \vdash \delta : \Delta}{\Gamma \vdash \text{mod}_\mu(a)[\delta] = \text{mod}_\mu(a[\delta.\{\mu\}]) : A[\delta.\{\mu\}]} \\
\frac{\Gamma \vdash \delta : \Delta \quad \Gamma.\{\mu\} \vdash a : A[\delta.\{\mu\}] \quad \Delta.\{\mu\} \vdash A}{\Gamma.\{\mu\} \vdash \mathbf{v}[\delta.a.\{\mu\}] = a : A[\delta.\{\mu\}]} \\
\frac{\Gamma.(\nu \mid A) \vdash B \quad \Gamma.(\nu \circ \mu \mid A) \vdash b : B[\uparrow.\text{mod}_\mu(\mathbf{v})] \quad \Gamma.\{\nu\} \vdash a : A}{\Gamma \vdash (\text{let } \text{mod}_\mu(-) \leftarrow \text{mod}_\mu(a) \text{ in } b) = b[\text{id}.a] : B[\text{id}.\text{mod}_\mu(a)]}
\end{array}$$

Б The complete list of axioms

Axiom А. Існує множина $\mathbb{I}$, що утворює обмежену дистрибутивну ґратку $(0, 1, \vee, \wedge)$ таку, що $\prod_{i,j:\mathbb{I}} i \leq j \vee j \leq i$ виконується.

Axiom Б. Відображення $\text{mod}_\mu(a) = \text{mod}_\mu(b) \rightarrow \mathbf{a} = \mathbf{b}$, що переводить refl в $\text{mod}_\mu(\text{refl})$, є еквівалентністю для всіх $a, b :_\mu A$.

Axiom В. Існує еквівалентність $\neg : \mathbb{I}_{\text{op}} \rightarrow \mathbb{I}$, яка міняє місцями 0 та 1, а також $\vee$ та $\wedge$.

Axiom Г. Якщо $A :_\flat \mathcal{U}$, то $A_\flat \rightarrow A$ є еквівалентністю (A є дискретним) тоді й лише тоді, коли $A \rightarrow A^\mathbb{I}$ є еквівалентністю (A є $\mathbb{I}$ -нульовим).

Axiom Д. Канонічне відображення $\text{Bool} \rightarrow \mathbb{I}$ є ін'єктивним та індукує еквівалентність $\text{BoolEquiv}\mathbb{I}_\flat$.

Axiom Е. $f :_\flat A \rightarrow B$ є еквівалентністю тоді й лише тоді, коли виконується:

$$\prod_{n:\text{Nat}} \text{isEquiv}((f_*)^\dagger : \Delta^n \rightarrow A_\flat \rightarrow \Delta^n \rightarrow B_\flat)$$

Axiom Ж. Для кожного $n :_\flat \text{Nat}$ існує (обов'язково єдина) функція $\eta_n :_\flat \Delta^n \rightarrow \Delta^{2n+1}_{\text{tw}}$, така що наступне відображення є еквівалентністю для кожної категорії $C :_\flat \mathcal{U}$:

$$\iota := \lambda \text{mod}_\flat(f). \text{mod}_\flat(f^\dagger \circ \eta_n) : \Delta^{2n+1} \rightarrow C_\flat \rightarrow \Delta^n \rightarrow C_{\text{tw}\flat}$$

Крім того, ми вимагаємо, щоб $\tau = (\text{coe}^-)^\dagger : \Delta_{\text{tw}}^n \rightarrow \Delta_{\text{optw}}^n$ і щоб діаграми на Рисунок 2 були комутативними (це просто властивості — всі об'єкти є множинами, оскільки $-_\mu$ зберігає h -рівень).

The following *duality axiom* was first studied by [8] and implies that, e.g., $\mathbb{I}$ is a category. Closely related axioms and consequences are considered by [41] and [11]. We did not introduce it in the main body of the paper as it was not explicitly invoked in any of our proofs.

Axiom II. *If A is a finitely presented $\mathbb{I}$ -algebra (i.e., A is a bounded distributive lattice equivalent to $\mathbb{I}[x_1, \dots, x_n]$ quotiented by finitely many relations) and $\text{hom}_{\mathbb{I}\text{Alg}}(A, \mathbb{I})$ is the type of $\mathbb{I}$ -algebra homomorphisms, then the map $\lambda a. f(a) : A \rightarrow (\text{hom}_{\mathbb{I}\text{Alg}}(A, \mathbb{I}) \rightarrow \mathbb{I})$ is an equivalence.*

Література

- [1] Danil Annenkov, Paolo Capriotti, Nicolai Kraus, and Christian Sattler. Two-level type theory and applications. *Mathematical Structures in Computer Science*, 33(8):688–743, 2023. DOI 10.1017/S0960129523000130.
- [2] Benedikt Ahrens, Paige Randall North, and Niels van der Weide. Bicategorical type theory: semantics and syntax. *Mathematical Structures in Computer Science*, 33(10):868–912, 2023. DOI 10.1017/s0960129523000312.
- [3] Mathieu Anel and Jonathan Weinberger. Smooth and proper maps with respect to a fibration. *Mathematical Structures in Computer Science*, 34(9):971–984, 2024.
- [4] César Bardomiano Martínez. Limits and colimits of synthetic ∞ -categories. arXiv:2202.12386, 2022.
- [5] Julia Bergner. *The Homotopy Theory of $(\infty, 1)$ -Categories*. Cambridge University Press, 2018. DOI 10.1017/9781316181874.
- [6] Patrick Bahr, Hans Bugge Grathwohl, and Rasmus Ejlers Møgelberg. The clocks are ticking: No more delays! In *2017 32nd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS)*, 2017. DOI 10.1109/LICS.2017.8005097.

- [7] Lars Birkedal, Ranald Clouston, Bassel Manna, Rasmus Ejlers Møgelberg, Andrew M. Pitts, and Bas Spitters. Modal dependent type theory and dependent right adjoints. *Mathematical Structures in Computer Science*, 30(2):118–138, 2020. DOI 10.1017/S0960129519000197.
- [8] Ingo Blechschmidt. A general Nullstellensatz for generalized spaces. Draft, 2023. <https://rawgit.com/iblech/internal-methods/master/paper-qcoh.pdf>.
- [9] Ulrik Buchholtz. Higher structures in homotopy type theory. In *Reflections on the Foundations of Mathematics*, pages 151–172. Springer, 2019. DOI 10.1007/978-3-030-15655-8_7.
- [10] Ulrik Buchholtz and Jonathan Weinberger. Synthetic fibered $(\infty, 1)$ -category theory. *Higher Structures*, 7(1):74–165, 2023. DOI 10.21136/HS.2023.04.
- [11] Felix Cherubini, Thierry Coquand, and Matthias Hutzler. A foundation for synthetic algebraic geometry. *Mathematical Structures in Computer Science*, 34(9):1008–1053, 2024. DOI 10.1017/S0960129524000239.
- [12] Denis-Charles Cisinski, Bastiaan Cnossen, Kim Nguyen, and Tashi Walde. Formalization of Higher Categories. Lecture notes, 2024.
- [13] Denis-Charles Cisinski. *Higher Categories and Homotopical Algebra*. Cambridge University Press, 2019. DOI 10.1017/9781108588737.
- [14] Georges Gonthier et al. A Machine-Checked Proof of the Odd Order Theorem. In *Interactive Theorem Proving*, pages 163–179. Springer, 2013. DOI 10.1007/978-3-642-39634-2_14.
- [15] Daniel Gratzer, G. A. Kavvos, Andreas Nuyts, and Lars Birkedal. Multi-modal Dependent Type Theory. In *Proceedings of the 35th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science*, 2020. DOI 10.1145/3373718.3394736.
- [16] Daniel Gratzer, G. A. Kavvos, Andreas Nuyts, and Lars Birkedal. Multi-modal Dependent Type Theory. *Logical Methods in Computer Science*, 17(3), 2021. DOI 10.46298/lmcs-17(3:11)2021.

- [17] Daniel Gratzer. Normalization for Multimodal Type Theory. In *Proceedings of the 37th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science*, 2022. DOI 10.1145/3531130.3532398.
- [18] Daniel Gratzer. Syntax and semantics of modal type theory. PhD thesis, Aarhus University, 2023.
- [19] Daniel Gratzer, Jonathan Weinberger, and Ulrik Buchholtz. Directed univalence in simplicial homotopy type theory. arXiv:2407.09146, 2024.
- [20] J. M. E. Hyland. First steps in synthetic domain theory. In *Category Theory*, pages 131–156. Springer, 1991. DOI 10.1007/bfb0084217.
- [21] G. A. Kavvos. A quantum of direction, 2019. <https://seis.bristol.ac.uk/~tz20861/papers/meio.pdf>.
- [22] Anders Kock. *Synthetic Differential Geometry*. Cambridge University Press, 2 edition, 2006.
- [23] Nikolai Kudasov, Emily Riehl, and Jonathan Weinberger. Formalizing the ∞ -Categorical Yoneda Lemma. In *Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs*, pages 274–290, 2024. DOI 10.1145/3636501.3636945.
- [24] Astra Kolomatskaia and Michael Shulman. Displayed Type Theory and Semi-Simplicial Types. arXiv:2311.18781, 2023.
- [25] Daniel R. Licata and Robert Harper. 2-Dimensional Directed Type Theory. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 276:263–289, 2011. DOI 10.1016/j.entcs.2011.09.026.
- [26] Peter LeFanu Lumsdaine and Michael Shulman. Semantics of higher inductive types. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 169(1):159–208, 2019. DOI 10.1017/s030500411900015x.
- [27] Jacob Lurie. *Higher Topos Theory*. Princeton University Press, 2009.
- [28] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 1978.
- [29] Louis Martini. Cocartesian fibrations and straightening internal to an ∞ -topos. arXiv:2204.00295, 2022.

- [30] Louis Martini. Yoneda’s lemma for internal higher categories. arXiv:2103.17141, 2022.
- [31] Louis Martini. Internal Higher Category Theory. PhD thesis, NTNU, 2024.
- [32] Chirantan Mukherjee and Nima Rasekh. Twisted Arrow Construction for Segal Spaces. arXiv:2203.01788, 2023.
- [33] David Jaz Myers and Mitchell Riley. Commuting Cohesions. arXiv:2301.13780, 2023.
- [34] Louis Martini and Sebastian Wolf. Presentability and topoi in internal higher category theory. arXiv:2209.05103, 2022.
- [35] Louis Martini and Sebastian Wolf. Colimits and cocompletions in internal higher category theory. *Higher Structures*, 8(1):97–192, 2024. DOI 10.21136/HS.2024.03.
- [36] Louis Martini and Sebastian Wolf. Proper morphisms of ∞ -topoi. arXiv:2311.08051, 2024.
- [37] Jacob Neumann and Thorsten Altenkirch. The Category Interpretation of Directed Type Theory, 2024. <https://jacobneu.github.io/research/preprints/catModel-2024.pdf>.
- [38] Paige Randall North. Towards a Directed Homotopy Type Theory. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 347:223–239, 2019. DOI 10.1016/j.entcs.2019.09.012.
- [39] Andreas Nuyts. Towards a Directed Homotopy Type Theory based on 4 Kinds of Variance. Master’s thesis, KU Leuven, 2015.
- [40] Andreas Nuyts. A Vision for Natural Type Theory, 2020. <https://anuyts.github.io/files/nattt-vision.pdf>.
- [41] Leoni Pugh and Jonathan Sterling. When is the partial map classifier a Sierpiński cone? arXiv:2504.06789, 2025. To appear at LICS 2025.
- [42] Maxime Ramzi. Deducing the Bousfield-Kan formula for homotopy (co)limits from first principles, 2021. <https://sites.google.com/view/maxime-ramzi-en/notes/bousfield-kan>.

- [43] Emily Riehl. *Categorical homotopy theory*. Cambridge University Press, 2014.
- [44] Emily Riehl. Could ∞ -Category Theory Be Taught to Undergraduates? *Notices of the American Mathematical Society*, 70(5), 2023. DOI 10.1090/noti2692.
- [45] Emily Riehl. On the ∞ -topos semantics of homotopy type theory. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 56(2):461–517, 2024. DOI 10.1112/blms.12997.
- [46] Emily Riehl and Michael Shulman. A type theory for synthetic ∞ -categories. *Higher Structures*, 1(1):147–224, 2017. DOI 10.21136/HS.2017.06.
- [47] Egbert Rijke, Michael Shulman, and Bas Spitters. Modalities in homotopy type theory. *Logical Methods in Computer Science*, 16(1), 2020. arXiv:1706.07526.
- [48] Bertrand Russell. *Introduction to Mathematical Logic*. George Allen & Unwin, 1919.
- [49] Emily Riehl and Dominic Verity. *Elements of ∞ -Category Theory*. Cambridge University Press, 2022. DOI 10.1017/9781108936880.
- [50] Michael Shulman. Brouwer’s fixed-point theorem in real-cohesive homotopy type theory. *Mathematical Structures in Computer Science*, 28(6):856–941, 2018. DOI 10.1017/S0960129517000147.
- [51] Michael Shulman. All $(\infty, 1)$ -toposes have strict univalent universes. arXiv:1904.07004, 2019.
- [52] Agda Development Team. Agda User Manual. <https://agda.readthedocs.io/en/v2.7.0.1/>.
- [53] The Univalent Foundations Program. *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*. Institute for Advanced Study, 2013. <https://homotopytypetheory.org/book>.
- [54] Vladimir Voevodsky. A simple type system with two identity types, 2012. <https://www.math.ias.edu/vladimir/sites/math.ias.edu.vladimir/files/HTS.pdf>.

- [55] Michael Warren. Directed type theory, 2013. Seminar talk. <https://www.ias.edu/video/univalent/1213/0410-MichaelWarren>.
- [56] Matthew Weaver. Bicubical Directed Type Theory. PhD thesis, Princeton University, 2024.
- [57] Jonathan Weinberger. A Synthetic Perspective on $(\infty, 1)$ -Category Theory: Fibrational and Semantic Aspects. PhD thesis, Technische Universität Darmstadt, 2022. DOI 10.26083/tuprints-00020716.
- [58] Jonathan Weinberger. Internal sums for synthetic fibered $(\infty, 1)$ -categories. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(9):107659, 2024. DOI 10.1016/j.jpaa.2024.107659.
- [59] Jonathan Weinberger. Two-sided cartesian fibrations of synthetic $(\infty, 1)$ -categories. *Journal of Homotopy and Related Structures*, 2024. DOI 10.1007/s40062-024-00348-3.
- [60] Matthew Z. Weaver and Daniel R. Licata. A Constructive Model of Directed Univalence in Bicubical Sets. In *Proceedings of the 35th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science*, 2020. DOI 10.1145/3373718.3394794.
- [61] Sebastian Wolf. Internal Higher Categories and Applications. PhD thesis, Universität Regensburg, 2025. <https://epub.uni-regensburg.de/76465/>.