수정체 초음파 유화술 동의서

본 동의서는「수의사법」제13조의2 및 같은 법 시행규칙 제13조의2에 따라 작성되었습니다.

보호자	성명		연락처	
	주소			
반려동물	이름		종 / 품종	
	성별 / 중성화	□ 암 □ 수 □ 중성화	연령 / 체중	
	특이사항			
수의사	동물병원명		수의사 성명	
	면허번호			

진 단 명	백내장 (Cataract)	**시행 방법**	수정체 초음파 유화술 (Phacoemulsification)

질환에 대한 설명	· 수정체가 혼탁해져 빛이 망막까지 닿지 못하는 상태로, 시력이 점차 떨어집니다. · 노령성 변화가 가장 흔하고 당뇨병, 유전, 외상, 안내 염증이 원인이 되기도 합니다. · 그대로 두면 수정체가 녹으면서 포도막염과 녹내장으로 이어져 통증이 생길 수 있습니다. · ·
진료의 필요성 · 방법 및 내용	· 수정체 혼탁으로 시력이 저하되어 있습니다. · 혼탁해진 수정체를 제거하고 인공수정체를 삽입하여 시력 회복을 시도합니다. · ·
전형적으로 발생이 예상되는 후유증 또는 부작용	· 수술 후 안압 상승, 포도막염이 발생할 수 있습니다. · 각막 부종, 각막 궤양이 발생할 수 있습니다. · 망막 박리, 수정체낭 혼탁으로 시력이 회복되지 않을 수 있습니다. · 당뇨 등 기저질환이 있는 경우 회복이 지연될 수 있습니다. · 인공수정체를 넣지 못해 무수정체 상태로 마무리될 수 있습니다. · 장기적으로 안내 염증이 반복되어 평생 점안이 필요할 수 있습니다. · ·
진료 전후에 보호자의 준수 및 숙지 사항	· 수술 후 정해진 기간 동안 안약을 규칙적으로 점안해야 합니다. · 넥카라를 착용하고 눈을 비비지 않도록 관리해야 합니다. · 정기적인 안압 검사와 경과 확인이 필요합니다. · ·

「수의사법」제13조의2 및 같은 법 시행규칙 제13조의2에 따라 위와 같이 수의사로부터 진료의 필요성 · 방법 · 내용과 전형적으로 예상되는 후유증 및 부작용에 관한 설명을 충분히 듣고 이해하였습니다. 이에 위 진료의 시행에 동의하며, 시행 과정에서 필요한 수의학적 판단과 처리를 담당 수의사에게 위임합니다.

20 ____ 년 ____ 월 ____ 일 **보호자** (서명 또는 인) **설명 수의사** (서명 또는 인)