固定有限半群型付けの下での多重文脈自由言語の特徴データ総長に関する多項式上界

Takayuki Kuriyama
独立研究者（東京）
growup.kuriyama@gmail.com

概要

固定した有限半群型付けの下でタプル代入可能な多重文脈自由言語を正例から学習する問題について，MCFG 表示に相対的な特徴標本の符号化総長を評価する．質的同定は Yoshinaka の分布的学習の枠組みに基づき，本稿の寄与は定量的な保証にある．アルファベット，ファンアウト，規則ランク，型付けを固定するとき，縮約済み良形文法 G の規則厚さを $\bar{\theta}_G$ として，接頭辞 – 接尾辞窓と任意の有限群（非可換群を含む）による型付けには $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$，正語像が局所群である型付けには $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ の特徴データ総長上界を示す．証明では，交錯するタプル成分を同時に短縮し，各成分の順序付き群積を保存する．加えて，完全生成語型精密化の規則厚さが多項式で抑えられる有限半群の代数的領域が，任意の固定ファンアウトにおいてちょうど局所群であることを特徴づける．これは特徴データ長の下界ではない．任意の標準 MCFG 入力に対しては，文法サイズについて指数的にもなり得る成分パターン厚さを用いたパラメータ付き上界を得る．保守的な別の学習器は Gold 同定を与える．また，交差依存言語族について，クラス全体で共有される有限素性バイアスと明示的な特徴標本を示す．ファンアウト 2 以上で局所群条件が特徴データ長の多項式性に必要かどうかは未解決である．

キーワード：文法推論；多重文脈自由文法；正例データ；有限半群型付け；多次元代入可能性；Gold の極限同定；規則ランク

1　序論

正例データからの文法推論は，正例の列挙のみから言語を同定できる条件を研究する [1,2]．分布的学習は語やタプルが共有する文脈から構成素を推定する．この考え方は代入可能 CFG [3,12] から，不連続構成素と交差依存を扱う MCFG へ拡張されてきた [13,14,29,30]．

■標本の個数ではなく符号化総長． 有界規則ランクの場合，Yoshinaka (2015) の有限 signature 理論は質的同定と多項式**個数**の特徴証拠をすでに与える [15]．しかし各証拠語の長さが指数的なら，個数だけを評価してもデータ量は制御できない．そこで本稿は $|K|$ ではなく $\|K\|_+ = \sum_{w\in K}(|w|+1)$ を評価する．文法サイズと成功導出に必要な語長を区別する thick-data の立場 [10, Section 2.5.2] に基づき，集合駆動型再構成器の特徴標本と，別個の保守的 Gold 学習器を扱う．

■元の文法の厚さと完全精密化の厚さ． 固定した 2 元半群型付け s_{c} について，規則ランク 2，サイズ $O(n)$，元の規則厚さ $\theta_{G_n} \le 2$ の CFG 表示であっても，刈り込んだ完全生成語型精密化の規則厚さが $\theta_{\widetilde{G}_{n,0}} \ge 2^n$ となり得る（命題 4.5）．この増大を精密化前に回避することが定量的問題の中心で

ある．さらに，系 4.21 は完全精密化の厚さに関する一様多項式境界を正確に特徴づけ，その境界が正語像の局所群性であることを示す．ただし，これだけで特徴データ総長に関する逆向きの下界は得られない．

■なぜ型付けを事前に与えるのか：クラス単位の学習バイアス． 型付けは未知の標的言語ごとに選び直すのではなく，標的を見る前に**一度だけ**固定する．例えば，同じ窓・群型付け $s = (s_{1,1}, g)|_{\Sigma^+_{\mathrm{feat}}}$ を，全ての関係 $R \subseteq \{0,1\}^2$ について共通に用い，

$$L_R = \{\mathtt{a}^m \mathtt{p}_i \mathtt{b}^n \mathtt{c}^m \mathtt{q}_j \mathtt{d}^n : m, n \geq 1,\ (i,j) \in R\}$$

とする．系 6.5 は全ての R について $L_R \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{2,s}$ を与える．既知の準同型 g が記録するのは二つの素性**値**であり，標的によって異なる適合関係 R ではない．R と無限の交差依存を正例から推定する必要があり，標的文法も R も学習器の入力ではない．非空 R については命題 6.6 が総長 $36|R| + 22$ 以下の明示的特徴標本を構成し，同一作用素が全ての R を扱う場合は各許可対を表す語が必要であることも示す．非直積の $R = \{(0,0),(0,1),(1,0)\}$ は，型なしおよび境界窓のみの代入可能性が破れることを示す（命題 6.3）．

■型の細分化：表現可能性と証拠コスト． $s \preceq t$，すなわち $\ker t \subseteq \ker s$ なら，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$ である．型の細分化は不正な置換を減らし，より多くの標的を許す一方，完全型付き文法の非終端記号は最大 $|V||\mathsf{T}^\sharp|^f$ 個，規則は最大 $|P||\mathsf{T}^\sharp|^{fr}$ 個となり，最短の型付き証拠が長くなる場合もある．しかしこれは最小特徴データ長の単調増大を意味しない．型を変えると再構成器自体も変わり，多項式上界が成立する代数的領域から外れる可能性もある．本稿は型付けの推定や最適化ではなく，**固定された**型付けの下でのクラス一様な上界を問う．

■固定型付けへの一様保証とアーベル型フィルタとの違い． 窓・群および局所群に関する主定理は，固定した $s, f, r_{\max}, \Sigma$ と所定の文法表示について，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ の**全標的**に一様に適用される．とくに，標的ごとの

$$L = \widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$$

というアーベル群剰余類表示を要求しない．これに対し定理 5.7 はその特殊な表示を持つ標的を扱う．細かい型付け s' によって個々の例をこの形式に入れられても，それは元の s に対する再構成器の保証とは別である．後の型付けクラス分離例は，個々の言語に特定の短縮手法が不可欠だと主張するものではない．

■設定と先行研究との関係． 本稿は正の語についての全射半群準同型 $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を事前に固定し，非空成分だけを s で比較する．空語を含む文法テンプレートは新単位元添加 $\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ で評価する．これは automata inference の typing bias [5] と整合する．正則 control set [6, 7]，局所代入可能性 [9, 11]，他形式の正例学習 [19]，所属質問による MCFG 学習 [16, 18, 20] とは情報モデルと条件を区別する．最近の MCFL 代入補題 [23] は学習判定ではなく所属の必要条件である．

Yoshinaka (2008) の固定窓型 CFG，Yoshinaka (2009, 2011) の多次元代入可能 MCFG，Yoshinaka (2015) の有限 signature における質的学習と証拠個数は既知の基礎である [12–15]．Const/Link/Comp による再構成を独立の新規性とはしない．関連する別投稿の CFG 論文 [25] は有限半群型付き CFG を扱うが，その下界構成と境界定理は本稿に再掲せず，証明の前提にも用いない．本稿の独自の寄与は非可換な交錯成分の所有者別同時短縮（命題 4.9），そこからの窓・群および

局所群上界（定理 4.15, 4.20），成分パターン厚さに制御された正規化（命題 4.24），および完全型細分化の厚さ境界（系 4.21）である．古典的な有限半群構造定理には適切な原典を引用する [36–38].

■寄与と二つの主要な厚さ尺度． ファンアウト，規則ランク，アルファベット，型付けを固定する．縮約済み良形文法 G の主尺度は $\bar{\theta}_G = \max\{1, \theta_G\}$（各規則を使用する最短受理語長の最大値）である．一般入力文法 H の正規化には $\bar{t}_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$（各実現可能な非空成分パターンの最短実現長）を使う．空成分を含む文法では両者を取り替えられない．非終端厚さ，精密化後の規則厚さ，分布同値代表元長は補助尺度であり，表 1 に整理する．縮約済み良形文法について窓および窓・任意有限群では $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$，局所群では $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ を得る．任意標準入力 H のサイズを n，成分パターン厚さを t とすればそれぞれ $O(n^3t)$，$O(n^4t)$ であり，これは文法サイズだけの多項式保証ではない．規則ランク 1 では任意の固定型付けで $O(n^3)$ となる．これらの定数は固定パラメータに依存し，特に非可換群の場合に大きくなり得る．さらに系 4.21 は，完全型細分化の厚さについてファンアウトによらない LG の必要十分境界を与える．これを特徴データ長の必要条件と混同してはならない．

■主張の適用範囲． 上界は指定した集合駆動型作用素と文法表示に対する特徴標本の総長の上界であり，Gold 学習器の多項式収束段階を主張しない．一般標準入力では t_{pat} が文法サイズに対して指数的にもなり得る．完全精密化厚さについては LG が必要十分だが，特徴**データ**総長について LG がファンアウト 2 以上で必要かどうかは未解決である（問題 7.1）．

2　準備

■主な記号． 次の表は頻用記号の標準的な意味を示す．局所的な再定義はその場で指定する．

記号	意味
K	有限正例標本，$\|K\|_+ = \sum_{w\in K}(\|w\|+1)$
G, H	縮約済み良形 MCFG，一般の標準入力 MCFG
B, C, X, Y	非終端記号（適宜，型付き非終端記号）
$\|G\|, \theta_G, t_G$	符号化サイズ，規則厚み，非終端記号厚み
$s, \widehat{s}, \mathsf{S}$	正語型付け，新単位元添加，正語像半群
$\preceq$	核の精密化関係（定義 2.4）
A, A	有限群，アーベル群
g, ν	群準同型，sliding-factor ラベル（群への写像）
λ, N	補助的な型付き準同型と有限モノイド値域
K	有限半群の最小イデアル
$\hat{k}$	$\max\{k, \ell, 1\}$ 以上の補助 padding 長（必要なら偶数）
T	導出木
$\ell_{\mathrm{in}}, \ell_{\mathrm{out}}$	最短内部生成語長と外部文脈長

Yoshinaka [14] の λ-自由という用語はテンプレートの各出力成分が空でないことを表し，生成文言語から空語を除外することとは区別する．

以下，Σ は有限の終端アルファベット，ε は空語，Σ^* は Σ 上の有限語全体，$\Sigma^+ := \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$ とする．

2.1 正例データからの学習

Gold の説明的学習モデルを採用し，MCFG に関する議論を自己完結にするため，必要な規約を再掲する．

定義 2.1 (テキストと TxtEx 同定)**.** Gold の説明的同定の基準を用いる [1]．空言語を扱うため，$\perp \notin \Sigma$ なる停止記号を固定する．したがって $\perp, \perp, \ldots$ は空言語のテキストである．$L \subseteq \Sigma^*$ の**テキスト**とは，$L \cup \{\perp\}$ 上の無限列で，L のすべての要素が少なくとも一度出現するものをいう．停止記号はいかなる位置にも出現してよく，$\perp$ はテキストの終了を示す記号ではない．

有限接頭部分の**内容**とは，そこに出現した Σ^* 上の正例からなる有限集合 $K \subseteq L$ である．したがって，停止記号の出現位置や個数，同じ正例の繰返し回数は内容に影響しない．学習器は各有限接頭部分から仮説文法への計算可能関数である．

学習器が L を正例データから *TxtEx* **同定**するとは，L の任意のテキストに対して，ある段階 n_0 と一つの仮説文法 H が存在し，n_0 以後のすべての段階で出力が文字どおり H に等しく，かつ $L(H) = L$ となることをいう．クラスのすべての言語をこの意味で同定するとき，そのクラスを TxtEx 同定するという．逐次学習器が**保守的**であるとは，新しく観測された正例が現在の仮説言語に既に含まれているなら仮説を維持し，生成されていないときに限って仮説を変更することをいう．

以下，$L(H_0) = \emptyset$ を満たす特別な仮説コード H_0 を固定する．

定義 2.2 (集合駆動型再構成作用素と特徴標本)**. 集合駆動型再構成作用素** $\mathcal{B}$ は，各有限正例標本 K を文法 $\mathcal{B}(K)$ に写し，標本の提示順序や重複度ではなく，集合 K だけに依存する．すべての有限 K に対して $K \subseteq L(\mathcal{B}(K))$ が成り立つとき，$\mathcal{B}$ は**標本整合的**であるという．

de la Higuera [4] の特徴集合の見方に従い，標的言語 L の有限集合 $\mathcal{F} \subseteq L$ が $\mathcal{B}$ の**特徴標本**であるとは，任意の有限集合 K に対し $\mathcal{F} \subseteq K \subseteq L$ ならば $L(\mathcal{B}(K)) = L$ が成立することをいう．$\mathcal{F} = \emptyset$ の場合も許す．**特徴データ**とは，このような標本の正例内容の略称として用いる．多項式上界を主張する際には，集合の要素数を抑えるのか，正例の総文字数を抑えるのかを明記する．

この有限標本の概念は TxtEx 学習と異なる．蓄積標本が増加するとき，$\mathcal{B}(K)$ が構文的に安定する必要はない．逐次学習器は，厳密な再構成を証明した後で別途定義する．

定義 2.3 (正例標本のサイズ)**.** 有限集合 $K \subseteq \Sigma^*$ に対し，$\|K\|_+ := \sum_{w \in K} (|w| + 1)$ と定義する．タプル $\vec{u} = (u_1, \ldots, u_d)$ の成分総長を $\|\vec{u}\|_1 := \sum_{i=1}^{d} |u_i|$ と書く．

2.2 固定有限半群型付けと新単位元添加

関連 CFG 論文の TCS 提出改訂稿（R1）[25] に合わせ，学習バイアスは全射な有限半群準同型 $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ とする．半群の乗法表と文字の像で表示し，正語の型は語長に線形な時間で計算できる．一般の有限型付けは正語像に値域を制限すればよい．$\Sigma = \emptyset$ なら標的は $\emptyset$ または $\{\varepsilon\}$ で，直接扱える．

定義 2.4 (正語型と空語の分離)**.** 有限半群 S に新しい単位元 $\mathbf{1}_\sharp$ を添加し，もともと単位元があっても $\mathsf{S}^\sharp = \mathsf{S} \uplus \{\mathbf{1}_\sharp\}$ とする．$s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ の標準延長

$$\widehat{s} : \Sigma^* \twoheadrightarrow \mathsf{S}^\sharp, \qquad \widehat{s}(w) = \begin{cases} \mathbf{1}_\sharp, & w = \varepsilon, \\ s(w), & w \in \Sigma^+ \end{cases}$$

はモノイド準同型である．非空成分の代入判定には s を用い，文法規則の空の終端ギャップや生成語型の評価には $\widehat{s}$ を用いる．タプル $\vec{w} = (w_1, \ldots, w_d)$ の型は $s^{(d)}(\vec{w})$（非空成分）と $\widehat{s}^{(d)}(\vec{w})$（空成分を許す評価）で区別する．$\mathbf{1}_\sharp$ は新たな正語の型ではない．

非終端記号の生成語型には $\mathsf{S}^\sharp$ を使用するが，局所群 $\mathbf{LG}$ 等の代数的条件は常に正語像 S に課す．別の有限モノイド準同型 $q : \Sigma^* \to N$ を使用する際も，学習バイアスは正語への制限 $q|_{\Sigma^+}$ であり，補題 付録 E.1 によって，その新単位元添加を用いた計算と一致する．

定義 2.5 (有限半群型付けの精密化)**.** 有限半群型付け s, t について，Σ^+ 上で $\ker t \subseteq \ker s$ ならば $s \preceq t$ と書く．積型付け (s, t) は正語像への制限をとる．

自明な正語型付けを s_{triv} と記す．正語の型の計算には，半群の乗法表と文字の像を用いる．次の接頭辞 – 接尾辞準同型の正語制限も固定半群型付けとなる．

定義 2.6 (接頭辞 – 接尾辞型付け)**.** $k, \ell \geq 0$ に対し $m_0 := \max\{1, k + \ell\}$ とおく．$|w| \geq m_0$ の語 w について，$\mathrm{pref}_k(w)$ と $\mathrm{suf}_\ell(w)$ は，それぞれ指定した長さの接頭辞と接尾辞であり，窓の長さが 0 なら ε とする．

$$\widehat{s}_{k,\ell}(w) = \begin{cases} w, & |w| < m_0, \\ \langle \mathrm{pref}_k(w), \mathrm{suf}_\ell(w) \rangle, & |w| \geq m_0 \end{cases}$$

と定義し，短い語と接頭辞 – 接尾辞の対は相異なるタグで区別する．$M_{k,\ell} := \widehat{s}_{k,\ell}(\Sigma^*)$ とおく．短い語 x, y と長い要素 $\langle u, v \rangle$ の積を

$$x \cdot y := \widehat{s}_{k,\ell}(xy), \qquad x \cdot \langle u, v \rangle := \langle \mathrm{pref}_k(xu), v \rangle,$$
$$\langle u, v \rangle \cdot y := \langle u, \mathrm{suf}_\ell(vy) \rangle, \quad \langle u, v \rangle \cdot \langle u', v' \rangle := \langle u, v' \rangle$$

によって定める．

この積により $\widehat{s}_{k,\ell}(xy) = \widehat{s}_{k,\ell}(x) \cdot \widehat{s}_{k,\ell}(y)$ が成り立つ．$\widehat{s}_{k,\ell}$ は全射なので，積の結合性は連接から従い，$\widehat{s}_{k,\ell}(\varepsilon)$ は単位元である．よって $\widehat{s}_{k,\ell} : \Sigma^* \to M_{k,\ell}$ は有限モノイド準同型である．正語への制限 $s_{k,\ell} = \widehat{s}_{k,\ell}|_{\Sigma^+}$ が対応する半群の境界型付けである．短語タグは空語を区別するため，その新単位元添加は元のモノイド型付けと同型である．

正語型付け s が (k, ℓ)-**境界決定的**であるとは，$\widehat{s} \preceq \widehat{s}_{k,\ell}$ が成り立つことをいう．同値な条件として，接頭辞 – 接尾辞型が等しければ $\widehat{s}$-型も等しく，接頭辞 – 接尾辞型付けの像上に因子写像が存在する．以下ではこれを単に**境界型付け**とも呼ぶ．

2.3 多重文脈自由文法

多重文脈自由文法の標準的なタプル生成による定義を用いる [29]．MCFG と関連する弱文脈依存形式体系の概説は [30] を参照されたい．以下の任意規則ランクに対応した記法を，再構成と証明の全体で用いる．

定義 2.7 (標準的な MCFG 表示)**. 多重文脈自由文法**は $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ という組である．ここで V は有限非終端記号集合，Σ は有限終端アルファベット，$S \in V$ は $\mathrm{fan}(S) = 1$ を満たす開始記号，$\mathrm{fan}(A) \geq 1$ は各 $A \in V$ のファンアウトである．ランク $r \geq 0$ の規則 R は $R\colon \quad A \to \rho(B_1, \ldots, B_r), \qquad \rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ という形をもつ．ここで ρ は出力テンプレート，$d_0 = \mathrm{fan}(A)$，$d_j = \mathrm{fan}(B_j)$ である．

$$\Xi_j := \{\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}\}, \qquad \Gamma_\rho := \Sigma \uplus \Xi_1 \uplus \cdots \uplus \Xi_r$$

とすると，各 $\alpha_i \in \Gamma_\rho^*$ であり，全タプル $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ において $\Xi_1 \uplus \cdots \uplus \Xi_r$ の変数はそれぞれ高々一度しか出現しない．この高々一度という条件を**線形性**という．子タプル $\vec{u}_j = (u_{j,1}, \ldots, u_{j,d_j}) \in (\Sigma^*)^{d_j}$ に対し，各 ξ_j^κ を $u_{j,\kappa}$ で同時に置き換えることで $\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r) \in (\Sigma^*)^{d_0}$ を定義する．$r = 0$ の場合, 規則は定数規則であり, タプル $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ を生成する. 各タプル言語 $L_A(G)$ は, すべての規則適用で閉じた，成分ごとの包含順序で最小の言語族である．$L(G) := \{w \in \Sigma^* : (w) \in L_S(G)\}$. 同値に，$A$ を根とする有限導出木を規則テンプレートによって葉から評価する．その生成結果が $\vec{u} \in (\Sigma^*)^{\mathrm{fan}(A)}$ となるとき $A \Rightarrow_G^* \vec{u}$ と書く．これを**終端導出**，$\vec{u}$ をその**終端タプル**という．開始記号からの終端導出 $S \Rightarrow_G^* (w)$ を**成功導出**と呼ぶ．すべての非終端記号について $\mathrm{fan}(A) \leq f$ のとき f-MCFG といい，その生成言語を f-MCFL という．すべての規則ランクが $r_{\max}$ 以下の文法は**規則ランク上界** $r_{\max}$ をもつ.

ファンアウト 1 の場合，この形式体系には通常の文脈自由文法が含まれる．**線形文脈自由文法**とは，各生成規則の右辺に高々一つの非終端記号しか出現しない CFG であり，その生成言語を**線形文脈自由言語**という．これは，上で述べた MCFG テンプレートの「線形性」とは異なる．MCFG の線形性は，各規則変数が高々一度しか出現しない条件である.

有限 MCFG の表示には，記号単位の明示的な標準符号化を固定し，その長さを $\|G\|$ と書く．符号化は，非終端記号・規則の記録と，各規則テンプレート中に出現するすべての終端記号・変数を数える．以下の文法サイズに関する多項式上界はすべてこの符号化に関するものである.

整数 $f \geq 1$，$r \geq 0$ に対し，

$$\mathsf{MCFL}(f, r) := \{L(G) : G \text{ はファンアウトが高々 } f \text{ の MCFG,} \\ \text{かつ規則ランクが高々 } r\}$$

と書く．任意の有限 MCFG は有限の規則ランクをもつため，f-MCFL $= \bigcup_{r<\infty} \mathsf{MCFL}(f, r)$ である．後で「ファンアウト f における最小規則ランク」と言うときは，与えられた特定の文法のランクではなく，ファンアウト f のすべての表示の間での言語レベルの最小値を意味する.

以下，f はファンアウト（次元）を，r は一般の規則ランクを，$r_{\max}$ は事前指定したランク上界を表す．規則テンプレートの変数は常に ξ_j^κ と書き，x, y, z（矢印付きも含む）は語や観測タプルに用いる．例に現れる数字や $\#$ を含む終端記号は等幅フォントで表す.

ファンアウト d が同じ非終端記号 A, B に対して，$A \to B$ は単項の恒等テンプレート規則 $A \to (\xi_1^1, \ldots, \xi_1^d)(B)$ の略記である．これは成分間の恒等対応だけを表す．例えばファンアウト 2 では $A \to (\xi_1^1, \xi_1^2)(B)$ を意味し，$A \to (\xi_1^2, \xi_1^1)(B)$ のような交換規則ではない．同様に，$A \to \vec{c}$ はランク 0 の定数規則を表す．これらの略記を，型付き開始リンクと，後述する再構成の Rule (Link) に用いる.

ファンアウトと規則ランクは異なる文法資源である．一般の MCFG/LCFRS 表示について，任意の固定ファンアウトを保存する普遍的な二分化定理はない．規則ランクの縮小には，ファンアウトの増加が必要となることがある [24,32]．したがって，以下の質的再構成は二分標準形も既知の規則ランク上界も課さずに定義する．

2.4 タプル文脈と代入可能性

■文をつくる文脈． アリティ d の文文脈とは，$E = v_0\Box_1 v_1 \cdots v_{d-1}\Box_d v_d$ という形の語で，各番号付き穴がちょうど一度ずつ出現し，$v_0, v_d \in \Sigma^*$ かつ内部の区切り語 $v_1, \ldots, v_{d-1}$ はすべて Σ^+ に属するものをいう．こうした文脈の集合を $\mathcal{E}_d$ と書く．これは Yoshinaka の多次元文脈の規約である [14, Section 3.1]．タプル $\vec{w} = (w_1, \ldots, w_d)$ に対し，$E[\vec{w}]$ は各 $\Box_i$ を w_i で埋めて得られる語とし，$|E|_{\mathrm{fix}} := \sum_{i=0}^{d} |v_i|$ とおく．$E[\vec{w}] \in L$ であるとき，文脈 E は言語 L において $\vec{w}$ を**受理する**という．

定義 2.8 (標本語におけるタプルの出現)**.** $K \subseteq \Sigma^*$，$w = a_1 \cdots a_n \in K$ とする．語 w の切断位置に $\textcircled{0}a_1\textcircled{1}\cdots a_n\textcircled{n}$ と番号を付ける．$0 \le i < i' \le n$ に対して $w[i : i'] := a_{i+1} \cdots a_{i'}$ と書く．

語 w における**アリティ d のタプル出現**とは，左から右に並ぶ非空区間の列 $0 \le i_1 < i'_1 < i_2 < i'_2 < \cdots < i_d < i'_d \le n$ である．これによりタプル $\vec{x} = (w[i_1 : i'_1], \ldots, w[i_d : i'_d]) \in (\Sigma^+)^d$ と，各区間を $\Box_1, \ldots, \Box_d$ に置き換えた文脈 $E \in \mathcal{E}_d$ が決まる．出現を $(E, \vec{x})$ と同一視する．例えば $\mathtt{abc}$ の中の $\mathtt{a}$ と $\mathtt{c}$ を選べば，タプル $(\mathtt{a}, \mathtt{c})$ と文脈 $\Box_1\mathtt{b}\Box_2$ が得られる．

$L \subseteq \Sigma^*$，$\vec{x} \in (\Sigma^*)^d$ に対して，d-**タプル分布**を $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) := \{E \in \mathcal{E}_d : E[\vec{x}] \in L\}$ と定義する．アリティが明白なら上付きの (d) を省略する．

定義 2.9 ((f,s)-タプル代入可能性)**.** $f \ge 1$ と有限半群準同型 $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を固定する．言語 $L \subseteq \Sigma^*$ が (f,s)-**タプル代入可能**であるとは，任意の $1 \le d \le f$ と $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ に対し，

$$s^{(d)}(\vec{x}) = s^{(d)}(\vec{y}), \qquad \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) \cap \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y}) \neq \emptyset$$

ならば $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$ が成り立つことをいう．したがって，タプルの成分として空語は比較しない．標的に ε が属するときは，開始記号で別途扱う．これは多次元代入可能性に関する Yoshinaka の非空成分の規約である [14, Section 3.1 and footnote 3]．CFG の場合は Clark [8] も参照されたい．この制約はファンアウト 1 ですでに重要である．空語を比較対象に許せば，通常の意味では代入可能な $\mathtt{a}^+$ でさえ，$\mathtt{a}$ と ε が文脈を共有する一方で分布が異なるため，条件を満たさなくなる．

ファンアウト 1 では文文脈がすべて $u\Box_1 v$ という形なので，$\mathcal{D}_L^{(1)}(x)$ は通常の両側分布 $\mathcal{D}_L(x) = \{(u,v) : uxv \in L\}$ と自然に同一視できる．よって定義 2.9 は，外部の規約を仮定することなく，非空因子に対する通常の固定 s の両側代入可能性条件に特殊化する．

■型付けと分布による同値関係． $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ に対し，

$$\vec{x} \equiv_{L,s}^{d} \vec{y} \iff \widehat{s}^{(d)}(\vec{x}) = \widehat{s}^{(d)}(\vec{y}) \text{ かつ } \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$$

と書く．$L, \widehat{s}, d$ を固定すると，これは同値関係である．アリティが明らかな場合は上付き d を省略する．

定義 2.10 (標的言語クラス)**.** $f \geq 1$ と有限半群準同型 s を固定する．$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ は (f,s)-タプル代入可能な f-MCFL 全体のクラスである．

$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ において，$\widehat{s}$ が境界型付けであるとき，L を**境界型付き**と呼ぶ．

$s \preceq t$ ならば $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$ である．細かい t-型が等しければ粗い s-型も等しいからである．ファンアウト 1 では，先述の正語型付け s による両側固定条件の文脈自由部分に一致する．

任意の $f \geq 1$ について $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f+1,s} \cap f\text{-MCFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ が成り立つ．ファンアウト f の条件で調べるのはアリティ $1,\ldots,f$ だけだからである．検査するアリティを増やすと代入可能性が失われる現象は，自明型付けでも既に現れる．例えば Yoshinaka は，1 次元では代入可能だが 2 次元では代入可能でない言語 $L_{\mathrm{reverse}} = \{w\#w^R\}$ を与えている [14, Section 3.1, Example 5]．したがって f は表現能力の上界というだけでなく，学習バイアスの一部である．学習対象クラスの f に関する単調性は主張しない．

任意の $\mathsf{Acc} \subseteq \mathsf{S}^\sharp$ について，$\widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である．実際，この言語は正則であり，対応する成分の $\widehat{s}$-型が等しければ，任意の文文脈に入れたときの全体の $\widehat{s}$-値も等しい．したがってタプル分布が等しくなる．

命題 2.11 (交差とアーベル群フィルタ)**.** f と $\widehat{s}$ を固定する．

(i) L_1, L_2 がともに (f,s)-タプル代入可能なら，$L_1 \cap L_2$ も (f,s)-タプル代入可能である．

(ii) L が (f,s)-タプル代入可能とする．A をアーベル群，$\varphi : \Sigma^* \to \mathsf{A}$ をモノイド準同型，$\mathsf{H} \leq \mathsf{A}$，$\gamma \in \mathsf{A}$ とすると，$L \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ は (f,s)-タプル代入可能である．

得られた交差言語が f-*MCFL* なら，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する．

証明. (i) について，同じ型の $\vec{x}, \vec{y}$ が $E[\vec{x}], E[\vec{y}] \in L_1 \cap L_2$ を満たす共通文脈 E をもつなら，各 L_i で両者のタプル分布は等しく，その交差でも等しい．

(ii) については，まず $\varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ が (f, s_{triv})-タプル代入可能であることを示す．共通文脈が $\vec{x}, \vec{y}$ を受理するなら，$\sum_i (\varphi(y_i) - \varphi(x_i)) \in \mathsf{H}$ である．可換性により，任意の別の文文脈 E' に対して，差 $\varphi(E'[\vec{y}]) - \varphi(E'[\vec{x}])$ は同じ H の元となる．したがって剰余類への所属は両方向で保存される．自明型付けは $\widehat{s}$ より粗いので，この剰余類言語は (f,s)-タプル代入可能でもある．(i) を適用すればよい． □

直ちに次が従う．$\mathsf{Acc} \subseteq \mathsf{S}^\sharp$，アーベル群 A，準同型 $\varphi : \Sigma^* \to \mathsf{A}$，部分群 $\mathsf{H} \leq \mathsf{A}$，$\gamma \in \mathsf{A}$ に対し，$\widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ という形の任意の f-MCFL は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する．したがって，一つの型付けの下でアーベル群の制約を変化させれば，標的言語族を得られる．これらの因子化は学習器には与えない．

3 再構成と質的学習

規則ランク有界の質的学習原理は Yoshinaka [15] から継承する．本節では具体的再構成器との対応を確かめ，第 4 節の**特徴データ総長**を評価するための有限証拠と，ランク無制限の場合に必要な補足だけを残す．

3.1 集合駆動型再構成

定義 2.8 に従い，標本 K に現れるアリティが高々 f のすべてのタプル出現を列挙する．再構成では，観測された各タプル値 $\vec{x} \in (\Sigma^+)^d$ に対して非終端記号 $[\vec{x}]$ を一つ設け，さらに新たな開始記号 $\widehat{S}$ を導入する．どの出現が標的の非終端記号や規則に対応するかは与えられず，許容されるすべての区間分割を列挙する．

■良形条件——誘導文脈のための補助条件． ここから導入する性質は，標準 MCFG の追加要件ではない．規則変数がすべてちょうど一度現れれば**非消去**，非消去規則で各子の成分変数が順序どおり現れれば**非置換**という．Yoshinaka [14, Section 2.3] に従い，出力テンプレートの各成分が空でない規則を λ-**自由**と呼び，同じ子の連続成分変数 $\xi_j^\kappa \xi_j^{\kappa+1}$ が一つの出力成分に隣接して現れない非置換規則を**非融合**と呼ぶ．これら四条件を満たす文法表示を**良形**と呼ぶ．非消去だけでは空成分を排除できないが，λ-自由な文法の生成タプルは全成分が非空である．これらの条件は，直後の補題で子タプルの置換が許容文脈を保つことを示すために使う．一般の MCFG から良形表示を得る正規化命題は，厳密再構成で必要になる箇所（命題 3.9）で述べる．

補題 3.1 (子に誘導される文脈)**.** ρ を良形規則のテンプレートとし，$E \in \mathcal{E}_e$ をその出力タプルの文文脈とする．子 j 以外のすべての子について，対応する非終端記号のアリティをもつ，全成分が非空のタプルを固定する．子 j の各変数を対応する番号付き穴で置き換え，他の子の変数を固定された成分で置き換えると，$E_j[\vec{u}_j] = E[\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)]$ を満たす $E_j \in \mathcal{E}_{d_j}$ が得られる．兄弟タプルを変えた場合も同じ構成でその選択に対応する誘導文脈 E_j が得られるが，文脈そのものが同一である必要はない．

証明. 線形性・非消去性・非置換性により，子の変数は添字順に一度ずつ現れる．非融合性から，隣接する子変数の間には終端記号，兄弟変数または出力成分の境界がある．それぞれ非空の終端列，固定された非空の兄弟成分，または E の非空内部区切り語となる．その子変数を順序付きの穴へ置き換えると $E_j \in \mathcal{E}_{d_j}$ が得られ，主張する充填恒等式が成立する． □

定義 3.2 (合成証拠)**.** $r \geq 1$ とする．K における**ランク r の合成証拠**は，アリティ $e \leq f$ の親タプル出現 $(E_{\mathrm{par}}, \vec{z})$ と，親の各成分を終端記号からなる隙間と非空の標識付き区間に分割する情報からなる．標識は $1 \leq j \leq r$，$1 \leq \kappa \leq d_j \leq f$ の変数 ξ_j^κ であり，各変数はちょうど一度現れる．固定した j について，親の成分を左から右に走査すると $\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}$ がこの順序で現れる．いかなる親の出力成分にも，同じ子の隣接変数 $\xi_j^\kappa \xi_j^{\kappa+1}$ がそのまま隣接して現れてはならない．標識付き区間は子タプル $\vec{u}_j = (u_{j,1}, \ldots, u_{j,d_j})$ を定め，$\vec{z} = \rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)$ を満たす一意の線形テンプレート ρ を決める．

親タプルの各成分における子タプルの区間は合成証拠の切断位置で一意に決まる．$E[\vec{z}] \in K$ なら補題 3.1 によって各 $\vec{u}_j$ は観測される．線形性と非消去性から，子成分は親 $\vec{z}$ 内で互いに重ならず，各子は少なくとも一文字を寄与する．従って

$$r \leq \sum_j \|\vec{u}_j\|_1 \leq \|\vec{z}\|_1 \leq \max_{w \in K} |w| \leq \|K\|_+. \tag{3.1}$$

定義 3.3 (ランク上界付き・上界なし再構成作用素)**.** f, s を固定する. $r_{\max} \geq 1$ について, $\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K)$ を次の文法 $\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ とする．非終端記号は新しい開始記号 $\widehat{S}$ と，K に現れた各非空タプル値 $\vec{x}$ に対する $[\vec{x}]$ であり，規則は次のとおりである.

(Start) 各 $w \in K \cap \Sigma^+$ に対して $\widehat{S} \to [(w)]$ を加え，$\varepsilon \in K$ なら $\widehat{S} \to \varepsilon$ も加える.

(Const) 観測された各タプルについて定数規則 $[\vec{u}] \to \vec{u}$ を加える.

(Comp) 親タプル $\vec{z}$，テンプレート ρ，子タプル $\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r$ をもつランク $1 \leq r \leq r_{\max}$ の各合成証拠に対して $[\vec{z}] \to \rho([\vec{u}_1], \ldots, [\vec{u}_r])$ を加える.

(Link) アリティ d が同じ観測済み非空タプル $\vec{x}, \vec{y}$ に対し，$\widehat{s}^{(d)}(\vec{x}) = \widehat{s}^{(d)}(\vec{y})$ かつある $E \in \mathcal{E}_d$ が $E[\vec{x}], E[\vec{y}] \in K$ を満たすとき，恒等テンプレート規則 $[\vec{x}] \to [\vec{y}]$ を加える.

$K \neq \emptyset$ なら $\mathcal{B}_{f,s}(K) := \widehat{G}(K) := \widehat{G}_{\leq \|K\|_+}(K)$ と定義し，$K = \emptyset$ なら $\mathcal{B}_{f,s}(\emptyset)$ を生産的な開始規則をもたない文法とする．符号化順序を固定すれば，両作用素は決定的かつ集合駆動型となる.

■標本整合性. Start–Const の直接導出（または ε の直接規則）により $K \subseteq L(\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K))$ および $K \subseteq L(\mathcal{B}_{f,s}(K))$ が成り立つ．ランク無制限版の列挙は補題 3.2 による.

3.2 生成語型付き標的精密化と有限証拠

精密化は有限個の非終端記号コピーへの分割であり，$\widehat{s}(uv) = \widehat{s}(u)\widehat{s}(v)$ によって型が保存される.

定義 3.4 (生成語型精密化)**.** 有限非消去 MCFG $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ の**完全生成語型精密化** $G^{\widehat{s}}$ は，新しい開始記号 $\widetilde{S}$ と各 $A \in V$，$\mathbf{t} \in (\mathsf{S}^\sharp)^{\mathrm{fan}(A)}$ の型付きコピー $A_{\mathbf{t}}$（元と同じファンアウト）をもつ．開始規則は $\widetilde{S} \to S_{(\eta)}$ ($\eta \in \mathsf{S}^\sharp$) である．各元規則 $A \to \rho(B_1, \ldots, B_q)$ および子の全ての型 $\mathbf{t}_j$ について，$A_{\mathrm{out}_\rho(\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_q)} \to \rho(B_{1,\mathbf{t}_1}, \ldots, B_{q,\mathbf{t}_q})$ を加える（$q = 0$ を含む）．成功導出に実際に現れる記号と規則だけを残した文法を**刈り込んだ精密化** $\widetilde{G}_0$ と呼ぶ．以下の「型付き記号」「型付き規則」は原則として $\widetilde{G}_0$ に属するものをいう.

命題 3.5 (生成語型の不変量)**.** $G^{\widehat{s}}$ と $\widetilde{G}_0$ について，次が成り立つ.

(i) $A_{\mathbf{t}} \Rightarrow^* \vec{u}$ ならば $\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ であり，型の添字を忘れれば，$\vec{u}$ に対する正しい G-導出が得られる.

(ii) 任意の終端導出 $A \Rightarrow_G^* \vec{u}$ は，一意に $A_{\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{u})} \Rightarrow_{G^{\widehat{s}}}^* \vec{u}$ へ持ち上がる．特に，任意の成功導出 $S \Rightarrow_G^* w$ は開始規則 $\widetilde{S} \to S_{(\widehat{s}(w))}$ を通じて一意に持ち上がる.

(iii) $L(\widetilde{G}_0) = L(G^{\widehat{s}}) = L(G)$ である.

証明は付録 付録 E に示す.

生成語型付けは非終端記号の標識だけを変えるので，型付き規則は元の型なし規則と同じテンプレートをもつ．したがって，λ-自由性，非消去性，非置換性，非融合性は，刈り込んだ精密化へすべて引き継がれる.

型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ に対し $L_X := \{\vec{u} : X \Rightarrow_{\widetilde{G}_0}^* \vec{u}\}$ とおく．刈り込みによって L_X は非空であり，標的文法が λ-自由なら，任意の $\vec{u} \in L_X$ の全成分は非空である.

付録の補題 付録 E.3 の分布的斉次性は，合同的 MCFG の全多重文脈に関する斉次性 [17] より弱い．本稿の許容文脈は内部区切り語が非空であり，合同的 MCFG クラスへの包含は主張しない．

定義 3.6 (正準タプルと正準文脈)**.** 開始記号以外の各型付き非終端記号 X に対し，**正準タプル** $\omega(X) \in L_X$ と，補題 付録 E.2 による**正準文脈** $\chi(X)$ を固定する．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ に含まれるなら，$\chi(X) = \Box_1$ とする．それ以外は補題による正準文脈を任意に選ぶ．λ-自由な標的文法では $\omega(X)$ の全成分が非空なので，$\|\omega(X)\|_1 \geq \mathrm{fan}(X) \geq 1$ である．質的な議論では，有限終端導出の実効的列挙で最初に得られたタプルを正準タプルとしてもよい．定量的な節では短い正準タプルを選ぶ．これらの正準対象は標的の証拠であり，再構成作用素へ与える入力ではない．

定義 3.7 (有限標的証拠集合)**.** $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ は，各型付き非終端記号 X に対する $\chi(X)[\omega(X)]$ と，各型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$（$q = 0$ を含む）に対する $\chi(X)[\rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_q))]$ からなる正例語集合である．

$\widetilde{G}_0$ は有限であり，そのすべての記号と規則は成功導出に出現するので，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ は $L(G)$ の有限部分集合である．$L(G) \neq \emptyset$ ならこの証拠集合は非空である．

■Yoshinaka の特徴証拠との対応． Yoshinaka の第 7 節の部分構造添字付き $\mathrm{SUBST}_{\mathrm{P}}$ では，開始以外の証拠を $c_X = \chi(X)$, $s_X = \omega(X)$ と選ぶと $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ の証拠パターンが得られ，ε は直接観測する．具体的再構成器の健全性と完全性は直接証明し，先行構成との同一性を前提としない．命題 4.2 は語の**個数**を，次節はその総文字数を評価する．

3.3 完全性と厳密な再構成

命題 3.8 (任意の型一致代表を用いる完全性)**.** G をファンアウト高々 f の有限良形 *MCFG*，$\widetilde{G}_0$ をその刈り込んだ生成語型精密化，r_G を非開始型付き規則の最大ランク（なければ *0*）とする．各非開始型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ について型が $\mathbf{t}$ で各成分が非空のタプル $\iota(X)$ と $\chi(X) \in \mathcal{E}_{\mathrm{fan}(A)}$ を選び，$\widetilde{S} \to X$ なら $\chi(X) = \Box_1$ とする．有限標本 K が各 X について $\chi(X)[\iota(X)]$，各型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ について $\chi(X)[\rho(\iota(Y_1), \ldots, \iota(Y_q))]$ を含むなら，$r_{\max} \geq \max\{1, r_G\}$ に対して

$$L(G) \subseteq L(\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K)), \qquad L(G) \subseteq L(\mathcal{B}_{f,s}(K)).$$

代入可能性も $\iota(X) \in L_X$ も仮定しない．正準選択 $\iota = \omega$ は $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \subseteq K$ の場合を与える．

証明は付録 付録 D に示す．

■厳密再構成のための良形正規化．

■縮約済み文法． MCFG の非終端記号依存グラフは，左辺 A の規則に子 B が現れるとき，辺 $A \to B$ をもつ．このグラフで開始記号から到達できる非終端記号を**到達可能**と呼び，生成するタプル言語が非空の記号を**生産的**と呼ぶ．すべての非終端記号が到達可能かつ生産的なら，文法は**縮約済み**である．

命題 3.9 (ランクを保存する良形標準化)**.** G_{in} を規則ランクが高々 $r_{\max}$ の有限標準 *f-MCFG* とする．このとき，規則ランクが高々 $r_{\max}$ の有限良形 *f-MCFG* G_{good} が存在して，$L(G_{\mathrm{good}}) =$

$L(G_{\mathrm{in}}) \setminus \{\varepsilon\}$ を満たす．$f, r_{\max}$ を固定すれば，$\|G_{\mathrm{good}}\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ である．$\varepsilon \notin L(G_{\mathrm{in}})$ なら両文法は同じ言語を生成する．

証明は付録 付録 F に示す．この命題はサイズ・ファンアウト・規則ランクを制御するが，任意の入力文法の規則厚みと，標準化後の厚みが一致するとは主張しない．そのため厚みに依存する結果はまず良形表示について証明する．消去規則を含む縮約済み λ-自由入力表示については，命題 付録 F.2 が，元文法のサイズと厚みの多項式尺度を後で用いる良形文法へ転移する．

定理 3.10 (固定型付けに関する厳密な再構成)**.** $f \geq 1$ と $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を固定し，$\widehat{s}$ とする．任意の $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ について有限特徴標本 $\mathcal{F}_L \subseteq L$ が存在し，$\mathcal{F}_L \subseteq K \subseteq L$ を満たす全ての有限 K に対して $L(\mathcal{B}_{f,s}(K)) = L$ となる．$L^+ := L \cap \Sigma^+$ が空なら $\mathcal{F}_L := L$，$r_G := 0$ とする．そうでなければ L^+ の良形表示 G とその刈り込んだ生成語型精密化 $\widetilde{G}_0$ について $\mathcal{F}_L := \mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ とし，r_G を非開始型付き規則の最大ランク（規則がなければ *0*）とする．すると $r_{\max} \geq \max\{1, r_G\}$ に対し $L(\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}(K)) = L$ も成立する．$L \in \mathsf{MCFL}(f, r)$ ならランク保存の良形表示を選べるため，$r_{\max} = \max\{1, r\}$ で十分である．

証明は付録 付録 D に示す．

3.4　質的同定と計算可能性

規則ランク有界の多項式時間仮説構成は定理 付録 D.4，Gold/TxtEx 同定は系 3.12 による．いずれも Yoshinaka の保守的更新原理に基づく．その計算量とランク無制限の場合の補足証明を付録 付録 D にまとめる．これは特徴データ**総長**の評価とは区別する．

定義 3.11 (保守的な逐次学習器)**.** Yoshinaka の Algorithm 1 [14, Section 4.1] と同じ保守的更新方針を用いる．H_0 を学習モデルで固定した空言語仮説とする．学習器 $\mathcal{A}_{f,s}$ は H_0 から始まる．停止記号を受け取ったときは現在の文法を維持する．正例 w を受け取ったとき，現在の文法が既に w を生成するなら維持する．生成しない場合に限り，それまでに見た正例内容を K として，仮説を $\mathcal{B}_{f,s}(K)$ に置き換える．

系 3.12 (Gold/TxtEx 同定)**.** $f \geq 1$ と有限型付け s を固定する．

(i) 保守的学習器 $\mathcal{A}_{f,s}$ は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ を *TxtEx* 同定する．
(ii) 規則ランク上限 $r_{\max}$ も固定すると，$\mathcal{A}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$ は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \cap \mathsf{MCFL}(f, r_{\max})$ を *TxtEx* 同定し，各データの処理時間はそれまでに読んだ正例内容のサイズに関して多項式である．

証明と規則ランク有界の場合の追加計算量評価は付録 付録 D に記す．

4　特徴データ長の上界

規則ランクを固定すれば，命題 3.8 の有限証拠から，多項式**個数**の特徴語が得られる．本節はそれらの**符号化総長**を元の文法表示に相対的に評価する．完全生成語型精密化では最短証拠が元の厚さに比べて指数的に長くなり得る（命題 4.5）ため，主な証明は元の表示の上で行う．窓型付けは導出木の有界な骨格の保持によって制御する（補題 4.6）．有限群値については多数の重い部分木を同時

に置換し，非可換の場合にも全成分の順序積を保存する（命題 4.9，補題 4.10 と 4.11）．局所群の場合には sliding-factor 座標によってこれら二層へ帰着し，任意標準入力には成分パターン厚さに制御された正規化を適用する．

4.1 主要な厚さ尺度と証拠語長の共通構成

定量的な主定理では，Yoshinaka の固定次元・固定規則ランクの良形表示 [14, Section 2.3, after Example 2] と同様に，縮約済み良形 MCFG を用いる．規則 R の**規則厚さ**を

$$\theta_G(R) = \min\{|w| : w \in L(G)\text{は } R \text{ を用いる成功導出を持つ}\}$$

とし，$\theta_G = \max_{R \in P} \theta_G(R)$，$\bar{\theta}_G = \max\{1, \theta_G\}$ とおく．また**非終端厚さ**を $t_G = \max_A \min\{\|\vec{u}\|_1 : \vec{u} \in L_A(G)\}$ と定める．Yoshinaka の τ_G は本稿の θ_G に対応する [14, Section 4.3]．本稿では θ_G に記号を統一する．

表 1　厚さの尺度：主定理の二つの入力尺度と三つの補助量

尺度	意味と役割	比較関係・増大例
θ_G	各規則を使う最短受理文長の最大値．縮約済み良形 G の**主尺度**.	$t_G \le \theta_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\}$（補題 4.1）.
t_G	各非終端の最短導出タプル長の最大値．良形文法の証明用.	良形では θ_G と多項式因子を除いて同等.
$t_{\mathrm{pat}}(H)$	実現可能な非空成分配置それぞれの最短タプル長の最大値．一般入力 H の**主尺度**.	$t_H \le t_{\mathrm{pat}}(H)$．$E_n$ では $\theta_{E_n} = O(n)$ でも $t_{\mathrm{pat}}(E_n) \ge 2^n$（命題 付録 F.3）.
θ_{typ}	刈り込んだ完全生成語型精密化 $\widetilde{G}_0$ の規則厚さ．一般基準上界のみに用いる.	$\theta_{\mathrm{typ}} \ge \theta_G$．$\theta_G \le 2$ でも $\theta_{\mathrm{typ}} \ge 2^n$ となり得る（命題 4.5）.
κ_G	型付き分布同値類の最短代表元の最大長. アーベル型フィルタ用の補助量.	$\kappa_G \le \theta_{\mathrm{typ}}$．代表元は型付き非終端から導出できるとは限らない（命題 5.5）.

ここで t_H は良形性を仮定しない非終端最短長である．t_{pat} の正式定義は節 4.6 に置く．良形文法では各成分が非空なので $t_{\mathrm{pat}}(G) = t_G$ となる．精密化厚さと分布代表元長の比較は，同じ元文法の刈り込んだ細分化についてのものである．θ_{typ} と κ_G は主定理の入力尺度ではない．空語を含む標的については非空部分に定理を適用し，必要なら ε を 1 語追加する．

■導出的な受理文脈． 型付き非終端記号 X の文脈が**導出的**であるとは，成功した型付き導出における一つの X 部分木を削除して得られることをいう．その文脈が許容されることは補題 3.1 から従う．

補題 4.1 (厚みと共通導出文脈の基本補題)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を縮約済み良形 *MCFG* とする．

(i) 各規則が明示的に書き込む終端記号数は θ_G 以下である．
(ii) $t_G \le \theta_G$ であり，任意の $A \in V$ には $\|\vec{u}\|_1 \le \theta_G$ を満たす $\vec{u} \in L_A(G)$ が存在する．
(iii) $\theta_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\}$ である．
(iv) 各 $A \in V$ のファンアウトを d とすると，$|E_A|_{\mathrm{fix}} \le \theta_G$ を満たす $E_A \in \mathcal{E}_d$ で，全ての $\vec{u} \in L_A(G)$ に対して $E_A[\vec{u}] \in L(G)$ となるものが存在する．$E_S = \square_1$ と選べる．さらに，任意の有限型付け $\widehat{s}$，刈り込んだ精密化 $\widetilde{G}_0$ の非開始記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ について $\chi(X) = E_A$ は定義 *3.6* を満たし，E_A は X の部分木を一つ除去した成功型付き導出から得られる．

証明. (i),(ii) は，任意の規則 R を用いた成功導出をその最短生成語長 $\theta_G(R)$ で選び，非消去性を使えば従う．その導出において R が書く終端記号と左辺非終端記号の全成分は，最終文にそれぞれ一度ずつ残るためである．(iii) は開始記号から R の左辺までの単純な依存経路を選び，兄弟と R の子

を長さ高々 t_G の終端タプルで埋める．この経路では規則を高々 $\|G\|$ 回用い，明示終端数と子出現数もそれぞれ高々 $\|G\|$ なので $\theta_G(R) \le \|G\| + \|G\| t_G$ を得る．

(iv) で $A \neq S$ なら, 上記成功導出の A-部分木を除去し, その成分に順序付き穴を設ける. 補題 3.1 を根まで反復すると許容文脈 E_A が得られ, 固定終端記号は成功文の部分なので $|E_A|_{\mathrm{fix}} \le \theta_G(R) \le \theta_G$ である．A からの任意のタプルを埋めても成功導出となる．命題 3.5(i),(ii) から，型付き X でも同じ文脈が許容的であり，その穴に X の型付き部分木を持つ成功導出へ持ち上がる．開始リンクのある $X = S_{\mathbf{t}}$ には $E_S = \square_1$ を用いる． □

良形文法では規則厚みと非終端記号厚みは多項式的に同値である．以下の証拠語長評価はこの共通導出文脈を利用する．

補題 4.2 (特徴証拠語長の共通テンプレート)**.** G をファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max} \ge 1$ の縮約済み良形 $MCFG$ とし，$\widetilde{G}_0$ を有限型付け $\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ による刈り込んだ生成語型精密化とする．全ての非開始型付き非終端記号 X の正準タプルについて $\|\omega(X)\|_1 \le b_{\mathrm{can}}$ とし，$\chi(X) = E_A$ を補題 *4.1* の導出的文脈から選ぶ．このとき特徴証拠集合 $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ の全ての語の長さは $2\bar{\theta}_G + r_{\max} b_{\mathrm{can}}$ 以下であり,

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}},$$

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le (|V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}})(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max} b_{\mathrm{can}}).$$

さらに $L(G) = L \cap \Sigma^+$ かつ $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ なら，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ の特徴標本となる．

証明. 補題 4.1 により文脈固定部は高々 $\bar{\theta}_G$，各規則の明示終端文字数も補題 4.1(i) により高々 $\bar{\theta}_G$ である．各規則は高々 $r_{\max}$ 個の子タプルを持つので，一証拠語の上界が従う．個数は型付き非終端と型付き規則をそれぞれ一度数えることから従い，特徴性は命題 3.8 と命題 付録 D.3 による．空語は開始規則の直接証拠で処理する． □

補題 4.3 (型を保存する置換)**.** G を縮約済み良形 $MCFG$，$s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を有限半群型付け，$\lambda : \Sigma^* \to N$ を有限モノイドへの補助準同型とし，$s \preceq \lambda|_{\Sigma^+}$ を仮定する．$\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ を s の新単位元添加とする．$\widetilde{G}_0$ を刈り込んだ $\widehat{s}$-精密化とし，$X = B_{\mathbf{t}}$ をその非開始型付き非終端記号とする．$\vec{u} \in L_X$，$\vec{u}' \in L_B(G)$ が $\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}') = \lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u})$ を満たすなら，$\vec{u}' \in L_X$ である．したがって $\vec{u}'$ を X の正準タプルとして選ぶこともできる．

証明. 良形性により両タプルの全成分は非空である．$s \preceq \lambda|_{\Sigma^+}$ からそれらの成分別 $\widehat{s}$-型は $\mathbf{t}$ に等しい．命題 3.5(ii) により $\vec{u}'$ の G-導出を根が X である型付き導出に持ち上げられる．X は刈り込んだ精密化に残るので，X を含む成功導出へこの導出を挿入でき，必要な型付き規則もすべて刈り込み後に残る． □

■補足：精密化後の文脈長． 次の補助上界はランク 1 の直接計数でも用いる．

4.2 精密化厚さの基本上界

ε を含まない標的の縮約済み良形表示 G に対して，刈り込んだ完全生成語型精密化を $\widetilde{G}_0$ とし，$\bar{\theta}_{\mathrm{typ}} := \max\{1, \theta_{\widetilde{G}_0}\}$ とおく．ここで $\theta_{\widetilde{G}_0}$ は精密化後の文法で計算した規則厚みである．元の型なし文法の厚みとの比較は仮定しない．

補題 4.4 (精密化後の厚みを用いた基準上界)**.** $f \geq 1$，$r_{\max} \geq 1$，有限アルファベット Σ と有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ の標準延長 $\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ を固定する．G を，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する ε-自由言語の縮約済み良形表示とし，そのファンアウトは高々 f，規則ランクは高々 $r_{\max}$ とする．$\widetilde{G}_0$ を刈り込んだ生成語型精密化とする．このとき標的証拠集合の個数は $\|G\|$ の多項式，正例総文字数は $\|G\|$ と $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}} = \max\{1, \theta_{\widetilde{G}_0}\}$ の多項式で抑えられる．

証明. 刈り込んだ精密化 $\widetilde{G}_0$ も縮約済み良形である．左辺が X の型付き規則を用いる生成語長最小の成功導出には，総文字数が高々 $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ である X-タプルが含まれる．これを正準タプルとして選ぶ．$\widetilde{S} \to X$ があれば $\chi(X) = \square_1$ とする．そうでなければ，同じ成功導出から選んだ X-部分木を除くと，固定終端部分が高々 $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ の正準文脈が得られる．各型付き規則が明示的に書く終端記号数も高々 $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ で，子の正準タプルは高々 $r_{\max}$ 個なので，各証拠語の長さは $(r_{\max}+2)\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ 以下である．したがって

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \leq |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}, \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \leq (|V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}})(1 + (r_{\max}+2)\bar{\theta}_{\mathrm{typ}})$$

となり，$f, r_{\max}, s$ を固定すれば多項式である． □

自明型付けの場合，生成語型によって非終端記号は分割されず，元の厚みの尺度が保たれる．これは Yoshinaka の型なし特徴データ上界 [14, Lemma 7] を回復する．型の一意性がなければ，次の命題が示すように精密化後の厚みが大幅に増加し得る．

命題 4.5 (完全生成語型精密化による指数的増大)**.** 固定二元型付け h_{c} と，サイズが $O(n)$，ファンアウト *1*，規則ランク *2* の縮約済み良形文法 G_n が存在して，$\theta_{G_n} \leq 2$ を満たす．しかも $L(G_n) = \{\mathsf{a}, \mathsf{c}\}^+$ である一方，刈り込んだ完全生成語型精密化 $\widetilde{G}_{n,0}$ では $\theta_{\widetilde{G}_{n,0}} \geq 2^n$ となる．

証明. $M_{\mathsf{c}} = \{1, \zeta\}$，$\zeta^2 = \zeta$ とし，$h_{\mathsf{c}}(\mathsf{a}) = 1$，$h_{\mathsf{c}}(\mathsf{c}) = \zeta$ とする．$n \geq 1$ に対し，

$$S \to SS \mid \mathsf{a} \mid \mathsf{c} \mid A_0 \mid \cdots \mid A_n,$$
$$A_0 \to \mathsf{a}, \qquad A_i \to A_{i-1}A_{i-1} \mid \mathsf{c} \quad (1 \leq i \leq n)$$

をファンアウト 1 の MCFG とみなす．これは縮約済み良形であり，サイズは $O(n)$，規則ランクは 2，生成言語は $\{\mathsf{a}, \mathsf{c}\}^+$ である．各規則は長さ高々 2 の成功導出に出現するため，$\theta_{G_n} \leq 2$ である．

完全精密化の残存コピー $(A_n)_1$ は，c を含まない語しか生成できない．帰納的に，そのような生成語は一意で，a^{2^n} となる．よって型付き規則 $S_{(1)} \to (A_n)_1$ を使用する成功導出の長さは少なくとも 2^n である． □

したがって任意の固定型付けについて，完全生成語型精密化は，すでにファンアウト 1・規則ランク 2 でも $\|G\| \max\{1, \theta_G\}$ の多項式による一様な上界を許さない．これは完全精密化という証明経路の制約であり，言語 $\{\mathsf{a}, \mathsf{c}\}^+$ 自体の下界ではない．

■ファンアウト 1 における既知の下界． 関連する改訂 CFG 論文は，固定二元半束型付けについて，すでにファンアウト 1・規則ランク 2 で作用素に依存しない指数的な特徴データ下界を証明する [25]．本稿ではその先行 CFG 結果の証明は繰り返さない．ファンアウトが高くなると代入可能性はより多くのタプルアリティについて検査されるため，この結果がそのまま高ファンアウトへ拡張されるわけではない．

■規則ランク 1：文法サイズに関する多項式特徴データ　一つの子しかもたない導出の鎖では，任意の固定成分別型付けの下でも，厚みに依存しない文法サイズ上界が得られる．

4.3　境界窓と補助不変量

補題 4.4 は，任意の $\widehat{s}$ に対する特徴データ上界を，型付き精密化文法の厚みによって与える．命題 4.5 によれば，この精密化後の厚みが元の良形表示のパラメータで多項式に抑えられるとは限らない．それでも，有限型付けが固定接頭辞 – 接尾辞窓によって決まる場合には，より強い転移結果が得られる．この境界型付けの場合を，Yoshinaka [14, Section 4.3] と同様の，厚みを考慮した文法表示の尺度で定式化する．

$G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を縮約済み良形 MCFG とし，$\bar{\theta}_G := \max\{1, \theta_G\}$ とおく．θ_G は既に定義した規則厚みである．以下の議論は λ-自由な良形の核心部分について述べる．標的が ε も含む場合，定理 3.10 と同様に，$L \setminus \{\varepsilon\}$ に議論を適用してから，開始記号に証拠 ε を一つ加えればよい．これは長さ 0 の例を一つ増やすだけで，どちらの多項式上界にも影響しない．

$k, \ell \geq 0$ を固定し，$\widehat{s} \preceq \widehat{s}_{k,\ell}$ を満たす任意の有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ の標準延長 $\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ を考える．すなわち $\widehat{s}$ は，全射な接頭辞 – 接尾辞型付け $\widehat{s}_{k,\ell}$ を通じて因子化する．G のファンアウトは高々 f，規則ランクは固定された $r_{\max} \geq 1$ 以下とする．$\widetilde{G}_0$ は G の完全 $\widehat{s}$-型付き精密化の刈り込み結果とし，残存する開始記号以外の $\widehat{s}$-型付き非終端記号の数を n_{typ} とする．

補題 4.6 (補助不変量付きの窓スケルトン)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ をファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max} \geq 1$ の縮約済み良形 *MCFG* とする．$k, \ell \geq 0$ を固定し，有限モノイド N への準同型 $\kappa : \Sigma^* \to N$ と有限型付け $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, \kappa)$ をとる．$\widetilde{G}_0$ を刈り込んだ $\widehat{s}$-精密化，n_{typ} をその非開始型付き非終端記号数とする．$\beta \geq 0$ が，任意の $C \in V$ と $\vec{x} \in L_C(G)$ について，

$$\vec{x}' \in L_C(G), \quad \kappa^{(\mathrm{fan}(C))}(\vec{x}') = \kappa^{(\mathrm{fan}(C))}(\vec{x}), \quad \|\vec{x}'\|_1 \leq \beta$$

となるタプル $\vec{x}'$ の存在を保証すると仮定する．このとき，任意の非開始型付き非終端記号 X には $\|\omega(X)\|_1 \leq f(k+\ell+1) n_{\mathrm{typ}} (\bar{\theta}_G + r_{\max}\beta)$ を満たす正準タプルを選べる．κ が自明な場合は，補題 *4.1(ii)* により $\beta = \bar{\theta}_G$ とでき，従来の窓型付けについて $\|\omega(X)\|_1 \leq f(k+\ell+1) n_{\mathrm{typ}} (r_{\max}+1) \bar{\theta}_G$ が得られる．

証明. $\widetilde{G}_0$ における X からの終端導出で，規則節点数が最小のものを D とする．同じ型付き非終端記号が一本の根から葉への経路上で二度現れれば，上位の部分木を同じ記号の下位の部分木で置き換えて節点数を真に減らせるため，最小性に矛盾する．従って各経路の規則節点数は高々 n_{typ} である．

根の各成分で窓型を決める終端位置を標識する．長さが $m_0 = \max\{1, k+\ell\}$ より短い成分では全位置を，長い成分では最初の k 個と最後の ℓ 個を標識する．$k = \ell = 0$ なら一位置を標識して非空性を保証する．標識総数は高々 $f(k+\ell+1)$ である．各標識位置へ至る根経路の合併を骨格 $\mathcal{K}$ とすると，その節点数は高々 $f(k+\ell+1) n_{\mathrm{typ}}$ となる．

骨格外にある子部分木は，線形性・非消去性・非置換性により，根の成分それぞれに連続した互いに素な区間を与え，標識位置を含まない．各子部分木の元の非終端記号を C，生成タプルを $\vec{x}$ とし，仮定による同じ成分別 κ-値を持つ長さ高々 β の $\vec{x}'$ の G-導出へ置き換える．根成分が短いときは全位置が標識されているので置換は起こらない．根成分が長いときは先頭・末尾の標識位置は保持さ

れ，良形性により置換後の全成分は非空であり，長短の境界も変わらない．従って根の $\widehat{s}_{k,\ell}$-ベクトルは保存される．

各根成分は規則の明示終端因子と子成分の順序付き連結である．各置換区間の κ-値が変わらないから，準同型性により根の成分別 κ-値も変わらない．κ の可換性は必要ない．よって根の $(\widehat{s}_{k,\ell},\kappa)$-ベクトルが保存され，補題 4.3 により置換後の根タプルは同じ X から導出できる．

骨格節点が明示する終端記号は補題 4.1(i) から高々 $\bar{\theta}_G$ 個，各節点から除外した子部分木は高々 $r_{\max}$ 個でそれぞれ総長が高々 β である．骨格の節点数を掛ければ所望の上界が従う． □

補題 4.1 を $b_{\mathrm{can}} = f(k+\ell+1)n_{\mathrm{typ}}(r_{\max}+1)\bar{\theta}_G$ として適用する．すると各証拠語の長さは高々 $2\bar{\theta}_G + r_{\max}b_{\mathrm{can}} = O_{f,r_{\max},k,\ell,s,\Sigma}(\|G\|\bar{\theta}_G)$ となる．ここで $n_{\mathrm{typ}} \le |V||\mathsf{S}^\sharp|^f$ を用いた．

定理 4.7 (接頭辞 – 接尾辞窓で決まる型付けの多項式特徴データ)**.** $f \ge 1$，$r_{\max} \ge 1$，k，ℓ，有限アルファベット Σ，および $s \preceq s_{k,\ell}$ を満たす有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を固定し，$\widehat{s}$ とおく．$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ とし，G を $L(G) = L \cap \Sigma^+$ を満たす縮約済み良形文法とする．そのファンアウトは高々 f，規則ランクは高々 $r_{\max}$ とする．このとき $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ は正例標本のサイズについて多項式時間で計算できる．さらに，L の特徴標本を $K = \mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ と選び，

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| = O_{f,r_{\max},s}(\|G\|), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},k,\ell,s,\Sigma}(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$$

を満たすように選べる．ここで $\bar{\theta}_G = \max\{1,\theta_G\}$ である．消去規則を許した縮約済み λ-自由入力表示 G_{in} に対しても，命題 付録 *F.2* の構造的良形変換を通せば，特徴データの総長はより具体的に

$$O_{f,r_{\max},k,\ell,s,\Sigma}\big(\|G_{\mathrm{in}}\|^3 \max\{1, t_{G_{\mathrm{in}}}\}\big)$$

で抑えられる．

証明. $\widehat{s}$-精密化文法の型付き非終端記号数は高々 $|V||\mathsf{S}^\sharp|^f$，型付き規則の個数は高々 $|P||\mathsf{S}^\sharp|^{fr_{\max}}$ である．より細かい $\widehat{s}_{k,\ell}$ の境界型を保存すればそれを通じて決まるより粗い $\widehat{s}$-型も保存されるため，補題 4.6 が適用できる．さらに補題 4.1 から，各証拠語の長さは $O_{f,r_{\max},k,\ell,s,\Sigma}(\|G\|\bar{\theta}_G)$ 以下となる．命題 4.2 により $|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le n_{\mathrm{typ}} + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{fr_{\max}}$, ただし $n_{\mathrm{typ}} \le |V||\mathsf{S}^\sharp|^f$ である．証拠語の多項式個数に上の各語の長さ上界を掛け，必要なら ε の証拠を高々一つ加えると，主張した正例総文字数の上界を得る．同じ成功導出に基づく証拠は型付き精密化文法の規則厚みにも多項式上界を与えるが，この中間パラメータは上界の証明には不要である．仮説文法の構成時間に関する主張は定理 付録 D.4 に従う． □

入力表示に関する主張は命題 付録 F.2 による．消去規則を含む入力文法では，良形変換に先立って終端記号が消えることがあり得るため，非終端記号の厚みを用いる．系 3.12 は，対応するランク制限付き保守的学習器の各データ処理における多項式時間上界を与える．

ファンアウト 1 で固定窓型付けからの正例同定と厚みを考慮した多項式特徴データが得られること自体は，Yoshinaka [12, Theorem 1] による既知結果である．一方，序論で比較したとおり，本稿は縮約済み良形表示の**元の規則厚み**を用い，窓長に依存しない文法サイズ次数 2 の総符号長上界を与える．補題 4.6 の MCFG 固有の寄与は，**複数の**タプル成分の境界情報を同時に保存し，任意の固定ファンアウト $f \ge 2$ にもこれを適用する点にある．また窓・群型付けに関するファンアウト 1 の既知の十分条件は関連 CFG 論文 [25] に帰属する．

上界は縮約済み良形の規則ランク有界な文法表示に相対的なものである．後述の定理 6.14 は，この高ランクの場合が言語レベルで必要であることを示す．すなわち，競合する文法が任意の有限ファンアウトを使ってよい場合でも，最小ファンアウトと最小規則ランクがともに 2 である，$(1,1)$-境界型付けされた非文脈自由標的を与える．後の例では，L_{intr} が窓型付けの定理の対象となり，ランク 1 の言語 L_{cd} と $L_{\star}$ は定理 5.1 の対象となる．したがって，いずれの分離結果も対応する定量的学習上界と両立している．

4.4　有限群不変量

次の計数原理は，有限群の値を指定した短いタプルと局所群型付けにおける短縮証明に共通する．群に関する非可換な置換操作そのものは，後続の群論付録で別途正当化する．

補題 4.8 (重い節点の計数)**.** $G=(V,\Sigma,P,S,\mathrm{fan})$ をファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max}\geq 1$ の縮約済み良形 $MCFG$ とし，$\lambda:\Sigma^{*}\to N$ を有限モノイド準同型，$b\geq\bar{\theta}_{G}$，$c\geq 0$ とする．ある $B\in V$ からの終端導出 T を，根の成分別 λ-値を固定したうえで，まず生成タプルの総長，次に節点数が最小になるように選ぶ．部分木の生成語総長が b を超える節点を「重い」と呼ぶ．T において比較不能な重い節点の任意の集合が高々 c 個の節点しか含まないならば，根タプルの総長は

$$(r_{\max}+1)b\max\{1,c|V||N|^{f}\}$$

以下である．

証明. 節点にその非終端記号と成分別 λ-値の組を標識する．一本の根から葉への経路でこの組が反復すると，上位の部分木を下位の部分木で置換して根の λ-値と生成語長の非増加性を保ちながら節点数を減らせるため，最小性に矛盾する．よって各経路の長さは高々 $|V||N|^{f}$ である．非消去性により重い節点は祖先について閉じ，その極大元は比較不能な重い節点からなる．したがって重い節点の総数は高々 $c|V||N|^{f}$ となる．根タプルの各終端記号は，重い節点が明示的に書いた高々 b 個の終端記号，または重い節点の軽い子部分木（各長さ高々 b，子は高々 $r_{\max}$ 個）のいずれかに由来する．根が軽ければ総長は高々 b であり，以上から表示した上界が従う． □

有限アーベル群 H について，非空の零和部分列を含まない H-上の列の最大長を $\mathsf{d}(H)$ と書く．従って Davenport 定数は $\mathsf{D}(H)=\mathsf{d}(H)+1$ である．任意の有限群 A と $f\geq 1$ に対し

$$N_{A,f}=\max\{3,|A|^{f}\},\quad U_{f}=f^{f+1}f!,\quad M_{A,f}=U_{f}N_{A,f}^{2^{f^{2}}},\qquad c_{A,f}=\begin{cases}\mathsf{d}(A^{f}), & A\text{が可換},\\ M_{A,f}-1, & \text{それ以外}.\end{cases}$$

とおく．

命題 4.9 (同時ブロック置換補題の本文用定式化)**.** A を有限群，$f\geq 1$ とする．高々 f 本の順序付き列 $c=1,\dots,d$（$1\leq d\leq f$）を考える．列 c は，変更しない群定数 $a_{c,0},\dots,a_{c,q_c}\in A$ と，左から右へ並ぶ q_c 個のブロック $\beta_{c,1},\dots,\beta_{c,q_c}$ からなる．各ブロック $\beta_{c,j}$ は，所有者 $o(c,j)\in[m]$，置換前後の値 $x_{c,j},x'_{c,j}\in A$ をもち，各所有者のブロック総数は，全列を通じて高々 f とする．（異な

る所有者のブロックは任意に交錯してよく，その間の変更しない材料は群定数に含める.）所有者の集合 $J \subseteq [m]$ を同時に置換したときの列の積を

$$\mathrm{val}_c(J) = a_{c,0} y_{c,1} a_{c,1} \cdots y_{c,q_c} a_{c,q_c}, \qquad y_{c,j} = \begin{cases} x'_{c,j}, & o(c,j) \in J, \\ x_{c,j}, & o(c,j) \notin J \end{cases}$$

と定義する．$c_{A,f}$ は直前に定義した定数とする．このとき $m > c_{A,f}$ なら，非空の $J \subseteq [m]$ が存在し，すべての列について同時に $\mathrm{val}_c(J) = \mathrm{val}_c(\varnothing) \quad (c = 1, \ldots, d)$ が成立する．A が可換なら $c_{A,f} = \mathsf{d}(A^f)$，一般の有限群なら $c_{A,f} = M_{A,f} - 1$ でよい．個々のブロックの値や個々の所有者の積は保存されなくてもよい.

証明. これは節 付録 A の補題 付録 A.2 を，本稿で使用する根成分と所有者の記法で書き直したものである．可換群では所有者 i の置換差分を A^d の元にまとめ，非空零和部分列を選べば同時保存が得られる．非可換群では群因子を交換してはいけないため，まず所有者のブロック配置パターンを揃え，補題 付録 A.5 で所有者間の順序比較を均質化する．補題 4.10 のランク別連続チャンク分解と補題 4.11 の接頭積の一致条件により，非空の所有者区間が全列の群積を保存する．この抽出に必要な所有者数は $M_{A,f}$ 以下であり，詳細な証明と定数評価は同付録に置く． □

補題 4.10 (均質なブロック配置の構造)**.** $e \geq 1, n \geq 3$ とする．各 $t \in [e]$ と $i \in [n]$ に対応する相異なる点 (t,i) が一直線上に全順序で並んでいるとする．*(i)* 同じ添字 i における (t,i) と (u,i) の順序は i に依存しない．*(ii)* 任意の順序付き型対 (t,u)（$t = u$ も許す）について，$i < j$ のときの (t,i) と (u,j) の順序は $i < j$ の取り方に依存しない．このとき型の集合は，それぞれ連続した領域を占めるいくつかのクラスに分割される．各クラスには添字に関する一つの向き（昇順または降順）があり，領域内はその向きに沿うランク別の連続した n 個のチャンクに分かれる．各チャンクはクラス内の各型の点をちょうど一つずつ含み，同じチャンク内の型の順序はランクによらない.

補題 4.11 (有限群における複数成分同時の区間短縮)**.** A を任意の有限群とする．n 個の添字が，高々 f 個の順序付き出力成分へ，添字一つにつき高々 f 個の重ならないブロックを寄与するとする．各ブロックには代替ブロックが固定され，添字を選択するとその添字のすべてのブロックを同時に置換する．その他の材料は変更しない．ブロックの出力先と同じ添字内の順序が一定であり，さらに $i < j$ の型対間の左右比較も添字対によらず一定とする．$n \geq \max\{3, |A|^f\}$ なら，非空の連続添字区間が存在し，その添字のブロックを同時置換しても，すべての出力成分の A-値を保存できる.

定理 4.12 (任意有限群の成分別値を指定した短いタプル)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ をファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max} \geq 1$ の縮約済み良形 $MCFG$ とする．$g : \Sigma^* \to A$ を任意の有限群への準同型とすると，各 $B \in V$ と実現可能な $\mathbf{s} \in A^{\mathrm{fan}(B)}$ に対して $g^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{s}$ を満たし

$$\|\vec{u}\|_1 \leq \beta_g := (r_{\max} + 1)\bar{\theta}_G \max\{1, c_{A,f}|V||A|^f\}$$

となる $\vec{u} \in L_B(G)$ が存在する．特に $\beta_g = O_{A,f,r_{\max}}(\|G\|\bar{\theta}_G)$ である．可換群なら反鎖定数は零和定数 $\mathsf{d}(A^f)$ でよい.

証明. $\lambda = g$，$b = \bar{\theta}_G$ として補題 4.8 の最小導出 T を選ぶ．互いに比較不能な重い節点 $v_1, \ldots, v_m$ を任意にとり，各節点の非終端記号 C_i から長さ高々 $\bar{\theta}_G$ の短い導出を補題 4.1(ii) により固定する．これらの各部分木は真に短縮可能である．線形性と非消去性により，異なる節点の全成分は根の高々

f 個の出力成分へ重なりのない連続ブロックとして現れる．根の群値は，各列の固定定数と置換前後のブロック群値の**順序付き**積となるから，定義 付録 A.1 のブロック置換族である．$m > c_{A,f}$ なら命題 4.9 で非空の部分集合を同時置換しても根の成分別 g-値を保存できる．しかし根の総長は真に短くなり最小性に矛盾する．従って重い反鎖は高々 $c_{A,f}$ 個であり，補題 4.8 を適用して上界を得る． □

補題 4.13 (印付き重い節点による窓・群の同時短縮)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ をファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max} \geq 1$ の縮約済み良形 $MCFG$ とする．$k, \ell \geq 0$，有限群 A および準同型 $g : \Sigma^* \to A$ を固定し，$\lambda = (\widehat{s}_{k,\ell}, g) : \Sigma^* \to N := M_{k,\ell} \times A$ とおく．$h := f(k + \ell + 1)$，$n_\lambda := |V||N|^f$ とすると，各 $B \in V$ と実現可能な $\mathbf{t} \in N^{\mathrm{fan}(B)}$ に対して，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ を満たす $\vec{u} \in L_B(G)$ で

$$\|\vec{u}\|_1 \leq b_{\mathrm{mark}} := (r_{\max} + 1)\bar{\theta}_G \max\{1, (c_{A,f} + h)n_\lambda\}$$

となるものが存在する．特に固定された $f, r_{\max}, k, \ell, A, g, \Sigma$ に対して $b_{\mathrm{mark}} = O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ である．A が可換なときは $c_{A,f} = \mathsf{d}(A^f)$ としてよい．

証明. 根の λ-ベクトルを $\mathbf{t}$ に固定し，生成タプルの総長，次に規則節点数を辞書式に最小化した B-導出 T を選ぶ．補題 4.8 と同じく，経路上で非終端記号とその成分別 λ-型の組は繰り返されず，各根葉経路の節点数は高々 n_λ である．

根の各出力成分で，長さが $m_0 := \max\{1, k + \ell\}$ 未満なら全ての終端位置，そうでなければ先頭 k 個と末尾 ℓ 個の位置を標識する．$k = \ell = 0$ の場合は各成分の一位置を標識し，非空性を明示的に保証する．標識位置の総数は高々 h である．

部分木の総生成長が $\bar{\theta}_G$ を超える節点を重いとする．比較不能な重い節点の任意の集合 Q をとる．各根成分における終端位置は一つの節点の生成成分に由来し，比較不能な部分木の出力位置は互いに重ならないので，Q 内で標識位置を含む節点は高々 h 個である．残りの節点の集合を Q_0 とし，各 $v \in Q_0$ の元の非終端記号 C_v に対し補題 4.1(ii) の総長高々 $\bar{\theta}_G$ の終端導出を代替として選ぶ．したがって各代替は元の重い部分木を真に短くする．

$|Q_0| > c_{A,f}$ と仮定する．MCFG の線形性・非消去性により，Q_0 の各節点の成分は根の高々 f 成分に現れる相互に重ならないブロックを与え，一節点の所有ブロック数も高々 f である．Q_0 の外側の材料は一切変更せず，各根成分の g-値を固定材料と元・代替ブロックの非可換な順序付き積として表す．命題 4.9 により，Q_0 の非空部分集合を同時に置換しても，全根成分の g-値を保存できる．

置換対象の節点は標識位置を一つも含まない．根の短い成分では全位置が標識済みなので置換は起こらない．長い成分では標識した先頭・末尾の文字が順序を保って残り，良形性は各代替成分の非空性を保証する．従って根の全成分の $\widehat{s}_{k,\ell}$-値も保存される．こうして根の λ-ベクトルを保ったまま総生成長が真に減るので，T の最小性に矛盾する．ゆえに任意の重い節点反鎖の濃度は $c_{A,f} + h$ 以下である．補題 4.8 を $b = \bar{\theta}_G$，$c = c_{A,f} + h$，$N = M_{k,\ell} \times A$ として適用すれば，表示した b_{mark} の上界を得る．可換群の定数は補題 付録 A.2(a) による． □

■非可換群での同時置換を支える不変量． 上の証明で使用する命題 4.9 の非可換群の場合，すなわち付録の補題 付録 A.2(b) の要点を，群積の順序が変わらない形で明示しておく．まず所有者ごとのブロック配置を揃え，補題 付録 A.5 によって所有者間の全順序比較を均質化する．その結果，補題 4.10 により，選ばれた $N = N_{A,f}$ 人の所有者のブロックは，根の出力成分全体で合計 $q \leq f$ 個

のクラス領域に分かれる．各領域には，所有者の添字に関して昇順または降順の N 個の連続チャンクがある．固定された文字列・選ばれなかったブロックの群値も，各チャンクの間に置かれる定数として元の位置に保持する．

一つのクラス領域 K について，チャンク p の終わりまでの元の積を P_p^K，最初の p チャンクだけを代替ブロックにした積を Q_p^K とし，$P_0^K = Q_0^K = 1_A$ と置く．以下の「差」は群の逆元を用いたものであり，可換性を用いない：$\kappa_p^K = P_p^K (Q_p^K)^{-1} \qquad (0 \le p \le N)$．チャンク $(a, b]$ のみを置換した後の領域全体の積は，順序を一切入れ替えずに $P_a^K (Q_a^K)^{-1} Q_b^K (P_b^K)^{-1} P_N^K$ と表せる．したがって $\kappa_a^K = \kappa_b^K$ ならこの積は P_N^K に等しい．降順領域については所有者の添字区間 $(a, b]$ がチャンク区間 $(N-b, N-a]$ に対応するので，κ_{N-j}^K を比較する．すべての領域についてこれらの値を集めた状態は A^q に属し，$N+1 > |A|^q$ である．ゆえに鳩の巣原理で $0 \le a < b \le N$ の同一状態を選べる．このとき所有者 $a+1, \ldots, b$ の全ブロックを同時に置換しても，各領域，従って根のすべての出力成分の群値が保存される．これは各部分木や各ブロックの群値が個別に保存される，という主張ではない．定数 $M_{A,f}$ が保証するのは，上記 N 人の均質な部分族を抽出できるだけの所有者数である．

例 4.14 (ファンアウト 2 での交錯と非可換性)．二つの所有者 $1, 2$ がそれぞれ二つのブロックをもち，根の二成分に $(\beta_{1,1}\beta_{2,1},\ \beta_{2,2}\beta_{1,2})$ の順序で現れる場合を考える．$A = S_3$ とし，所有者 1 の各ブロックの値を $\sigma = (12)$，所有者 2 の各ブロックの値を $\tau = (23)$ とすると，根の群値は $(\sigma\tau, \tau\sigma)$ となる．$\sigma\tau \neq \tau\sigma$ なので，二成分で所有者の出現順序が異なることを無視して可換な差分和へ帰着させることはできない．この配置はブロック置換族の一例であり，特定の標的言語について群型付けの必要性を証明する例ではない．命題 4.9 は，このような交錯を許したまま根の各成分の積を同時に保存する置換集合の存在を保証する．

定理 4.15 (窓と一般有限群型付けの多項式特徴データ)．$f, r_{\max}, k, \ell, \Sigma$，任意の有限群 A，準同型 $g : \Sigma^* \to A$，および正語上の固定有限半群型付け $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を固定する．s の新単位元添加 $\widehat{s}$ は $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ を満たすと仮定する．$L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ と，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ となる縮約済み良形のファンアウト高々 f・ランク高々 $r_{\max}$ の文法 G について，$\mathcal{B}_{f,s}^{\le r_{\max}}$ の特徴標本で

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| = O(\|G\|), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f, r_{\max}, k, \ell, \widehat{s}, g, \Sigma}(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$$

を満たすものが存在する．

証明．補題 4.13 を $\lambda = (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ に適用する．$\widehat{s} \preceq \lambda$ であるから，刈り込んだ $\widehat{s}$-精密化の各非開始記号 $X = B_{\mathbf{s}}$ とその実現可能な成分別 λ-型について，長さ高々

$$b_{\mathrm{mark}} = (r_{\max} + 1)\bar{\theta}_G \max\{1, (c_{A,f} + f(k + \ell + 1))|V||N|^f\}$$

の B-導出が存在する．根の $\widehat{s}$-型は一致するので，補題 4.3 により同じ X の正準タプルとして採用できる．従って $b_{\mathrm{can}} \le b_{\mathrm{mark}} = O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ である．補題 4.2 により，型付き規則証拠の個数が $O(\|G\|)$，各証拠語長が $O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ となるため，総符号化長は $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ に収まる．ε は直接開始規則で扱う． □

定理 4.16 (窓と有限アーベル群型付けの多項式特徴データ)．$f, r_{\max}, k, \ell, \Sigma$，有限アーベル群 A，準同型 $g : \Sigma^* \to A$，および正語上の固定有限半群型付け $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を固定する．s の新単位元添

加 $\widehat{s}$ は $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ を満たすと仮定する．任意の $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ と，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ を満たす縮約済み良形のファンアウト高々 f，ランク高々 $r_{\max}$ の文法 G について，上限付き作用素 $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ には，

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| = O(\|G\|), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},k,\ell,\widehat{s},g,\Sigma}(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$$

を満たす特徴標本が存在する．その定数は $\mathsf{d}(A^f)$ を用いた

$$b_{\mathrm{mark}} = (r_{\max}+1)\bar{\theta}_G \max\{1, (\mathsf{d}(A^f) + f(k+\ell+1))|V|(|M_{k,\ell}||A|)^f\}$$

によって評価でき，$\mathsf{d}(A^f) = O(\exp(A)\, f \log|A|)$ である（注意 付録 *A.3*）．

証明. 定理 4.15 の証明を可換群に適用する．印付き重い節点補題 4.13 では，零和部分列によって反鎖定数を $M_{A,f} - 1$ から $\mathsf{d}(A^f)$ へ改善できる． □

可換性を用いるのは零和部分列による短縮だけであり，非可換群の場合は節 付録 A の順序均質化によりブロックの交錯を処理する．

4.5 多項式特徴データの代数的条件

有限局所自明半群の擬多様体を **LI**，有限群の擬多様体を **Grp** と書く．その結び $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ は，$S \in \mathbf{LI}$ と有限群 A の直積 $S \times A$ の有限の除法因子（部分半群の準同型像）からなる [27,28]．次の判定条件は，窓・群の表示に依存した仮定を，固定型付けの正語像半群に対する内在的条件へ移す．用いる有限半群に関する事実は関連する CFG 論文 [25] にも現れる．

補題 4.17 (局所自明・群型付けの窓・群精密化)**.** Σ を空でない有限アルファベット，$s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を有限半群型付けとし，$\widehat{s}$ とおく．もし $\mathsf{S} \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ ならば，ある $k, \ell \ge 0$，有限群 A，および準同型 $g : \Sigma^* \to A$ が存在して $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ $(\Sigma^*$ 全体上) が成り立つ．さらに $\mathsf{S} \in \mathbf{LI}$ ならば，群因子を自明群としてよく，$\widehat{s} \preceq \widehat{s}_{k,\ell}$ となる．

証明. 有限局所自明半群 S，有限群 A，部分半群 $T \subseteq S \times A$，全射半群準同型 $\pi : T \to \mathsf{S}$ を取る．各 $a \in \Sigma$ について $s(a)$ の逆像 $(s_a, g_a) \in T$ を一つ選ぶ．これらの積により $\rho : \Sigma^+ \to T$ を定めると，$\pi\rho = s$ である．二つの座標準同型を $\sigma : \Sigma^+ \to S$，$g : \Sigma^* \to A$ と書き，$g(\varepsilon) = 1_A$ とする．

正語像 $S_0 = \sigma(\Sigma^+)$ は局所自明である．$q = |S_0| + 1$ とおく．有限局所自明半群に対する標準的な恒等式 $S_0^q = S_0 E(S_0) S_0$ および冪等元 e, f と任意の $u \in S_0$ に対する $euf = ef$ [26] より，長さ $2q$ 以上の語の σ-値は長さ q の接頭辞・接尾辞で決まる．実際，$w = pxz$，$|p| = |z| = q$ と書き，$\sigma(p) = aeb$，$\sigma(z) = cfd$ とすれば，x が空でないとき $\sigma(pxz) = ae\,(b\,\sigma(x)\,c)\,fd = aefd = \sigma(pz)$ となる．$x = \varepsilon$ の場合も中央の積を $bc \in S_0$ と解釈すれば同じ恒等式が使える．長さが $2q$ 未満の語は $\widehat{s}_{q,q}$ が個別に区別する．したがって非空語について窓型が一致すれば σ-値が一致し，さらに g-値も一致すれば ρ-値，よって $\widehat{s}$-値も一致する．

窓型は空語 ε と非空語を区別するので，核の包含は Σ^* 全体に拡張される．$k = \ell = q$ とすれば第一の主張が従う．S 自体が局所自明ならば，$S = \mathsf{S}$ とし，群因子を自明群に取ればよい． □

系 4.18 (多項式特徴データの代数的十分条件)**.** 空でない有限 Σ，ファンアウト上界 $f \ge 1$，規則ランク上界 $r_{\max} \ge 1$，有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を固定し，$\widehat{s}$ とおく．$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ の標的を生成する縮約

済み良形のファンアウト高々 f・ランク高々 $r_{\max}$ の文法 G に対し，$\bar{\theta}_G = \max\{1, \theta_G\}$ とする．ランク制限付き再構成作用素は個数 $O_{f,r_{\max},s}(\|G\|)$ の特徴標本を持ち，その総長は

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^2\bar{\theta}_G), \quad \mathsf{S} \in \mathbf{LI} \text{ の場合},$$
$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^2\bar{\theta}_G), \quad \mathsf{S} \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp} \text{ の場合}.$$

証明. **LI** の場合，補題 4.17 により群因子を自明群として窓型付けに帰着し，定理 4.7 を適用する．$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ の場合，同補題による窓・有限群への精密化と定理 4.15 を適用する．精密化の諸パラメータは固定した型付けとアルファベットだけに依存し，G には依存しない．特徴標本の個数についての上界も両方で成立する． □

次に，局所群への拡張を本文の主定理として明示する．この上界は $f = 1$ でも成立し，関連 CFG 論文の $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ という十分条件を真に広げる（命題 付録 B.5）．ただし局所群に関する代数的特徴づけ自体は既知であり，本稿の主張は MCFG の特徴データ長への適用である．有限半群 S が**局所群**（**LG**）に属するとは，各冪等元 $e \in S$ に対し eSe が群となることをいう．この条件は，新単位元を追加したモノイドではなく型付けの**正語像半群**に課す．

以下で Σ は非空，$k \geq 1$，A は有限群とする．長さ $k+1$ の連続因子を左から並べる列を $\sigma_k(w)$ と書く．

定義 4.19 (局所群型付け)**.** $\nu : \Sigma^{k+1} \to A$ を任意の写像とする．$|w| \geq 2k$ に対し，

$$\gamma_{k,\nu}(w) := \nu(F_1)\nu(F_2)\cdots\nu(F_{|w|-k}), \qquad \sigma_k(w) = (F_1, \ldots, F_{|w|-k})$$

を A における順序つき積とし，$|w| < 2k$ に対しては $\gamma_{k,\nu}(w) := 1_A$ とする．**局所群型付け**を $\lambda_{k,\nu}(w) := \big(\widehat{s}_{k,k}(w), \gamma_{k,\nu}(w)\big)$ で定める．ある k, A, ν について $\widehat{s} \preceq \lambda_{k,\nu}$ となる有限型付け $\widehat{s}$ を**局所群決定的**という．

定理 4.20 (局所群型付けに対する多項式特徴データ)**.** $f, r_{\max}, \Sigma$ と有限半群型付け $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を固定し，$\mathsf{S} \in \mathbf{LG}$ とする．空の終端ギャップはその新単位元添加 $\widehat{s}$ で評価する．任意の $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ と，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ を満たすファンアウト高々 f，ランク高々 $r_{\max}$ の縮約済み良形文法 G に対して，上限付き作用素 $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$ は

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| = O(\|G\|), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$$

を満たす特徴標本をもつ．

証明. 定理 付録 B.4 により，固定した s だけに依存する整数 k，有限群 A，sliding-factor ラベル ν を選び，正語の型を $\lambda_{k,\nu}$ で精密化できる．局所群の条件は $s(\Sigma^+)$ に課しており，空語を区別するための新単位元添加には課さない．

まず $\widehat{s}_{k,k}$ の窓型だけを保存して短縮する．対応する縮約済み窓精密化の非終端記号数を n_{w} とすると，補題 4.6 から，各実現可能な窓型をもつ代替タプルの長さは

$$b_{\mathrm{w}} = f(2k+1)n_{\mathrm{w}}(r_{\max}+1)\bar{\theta}_G = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|\bar{\theta}_G)$$

以下でよい．この段階では代替タプルの群値が元の部分木ごとに一致するとは仮定しない．

次に，根の全 $\lambda_{k,\nu}$-型を固定して総長最小の導出を取る．そのうち長さ b_{w} を超える節点の反鎖に，窓型を保つ短い代替導出を指定する．補題 付録 B.2 により，置換の際に根の窓型は変化せず，滑動

因子の群値の変化は順序付きブロック積として記述できる．補題 付録 A.2 に従い，各成分の**積全体**を同時に保存する非空の節点集合を選べるため，重い節点の反鎖の大きさは高々 $M_{A,f}-1$ である．これは代替部分木が個々に群値を保存するという仮定を必要としない．補題 付録 B.6 の表示を用い，$n_\lambda := |V||M_{k,g}|^f$ とおくと，実現可能な各精密化型をもつ短いタプルの長さは

$$\beta_\lambda = (r_{\max}+1)b_{\mathrm{w}} \max\{1,(M_{A,f}-1)n_\lambda\} = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$$

となる．ここで $n_{\mathrm{w}}, n_\lambda = O_{f,s,\Sigma}(\|G\|)$ であり，$k, A, M_{A,f}$ は G に依存しない定数である．

最後に，補題 4.1 により各規則証拠語の長さは $2\bar{\theta}_G + r_{\max}\beta_\lambda = O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ 以下である．命題 4.2 は必要な証拠語数を $O_{f,r_{\max},s}(\|G\|)$ に抑える．両上界を掛け合わせ，必要なら空語の証拠を一つ加えれば，総長 $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ を得る．群積保存と反鎖短縮の詳細は節 付録 B に示す． □

$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp} \subsetneq \mathbf{LG}$ は真の包含である（命題 付録 B.5）．擬多様体水準の下界側はファンアウト 1 における関連 CFG 論文 [25] の結果に依存する（系 4.21）．ここでの上界条件は**十分条件**であり，高ファンアウト下界は問題 7.1 として残る．空アルファベットの場合は自明である．

下界側は次の交わり補題によって正確に述べられる．

■完全生成語型精密化厚さの代数的境界． 全射型付け s と縮約済み良形文法 G に対し，刈り込んだ完全生成語型精密化 $\widetilde{G}_0$ の規則厚さを $\theta_{\mathrm{typ}}(G,s) := \max\{1, \theta_{\widetilde{G}_0}\}$ と書く．固定した $f \geq 1$ について，有限半群の擬多様体 $\mathbf{V}$ が**ファンアウト f で多項式精密化厚さを持つ**とは，全ての非空有限アルファベット Σ，規則ランク上限 $r_{\max} \geq 1$，$\mathsf{S} \in \mathbf{V}$ への全射型付け $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ について多項式 $q = q_{f,r_{\max},s,\Sigma}$ が存在し，Σ 上の全ての縮約済み良形，ファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max}$ の文法 G について

$$\theta_{\mathrm{typ}}(G,s) \leq q(\|G\|, \bar{\theta}_G)$$

となることをいう．q は固定された型付けに依存してよいが，文法や標的言語には依存しない．以下では $f, r_{\max}$ を固定したとき多項式の次数も一様に選べる．

系 4.21 (精密化厚さの二分法)**.** 任意の $f \geq 1$ と有限半群の擬多様体 $\mathbf{V}$ について，ファンアウト f で多項式精密化厚さを持つことと，$\mathbf{V} \subseteq \mathbf{LG}$ は同値である．$\mathbf{V} \subseteq \mathbf{LG}$ なら

$$\theta_{\mathrm{typ}}(G,s) = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$$

と取れる．この同値は，$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ について $L(G) = L \cap \Sigma^+$ を満たす表示だけに文法 G を制限しても成立する．実際，正語像が局所群でない各固定全射型付けに対し，すでにファンアウト *1*，規則ランク *2* で多項式上界は成立しない．

証明. まず $\mathsf{S} \in \mathbf{LG}$ とする．定理 付録 B.4 から，$\widehat{s} \preceq \lambda$ を満たす固定の sliding-factor 準同型 $\lambda = \lambda_{k,\nu}$ が存在する．刈り込んだ細分化の任意の非開始型付き非終端 $X = B_{\mathbf{t}}$ を取る．生産性から，$\mathbf{t}$ を実現する $\vec{u} \in L_X$ が存在する．その λ-ベクトルは B で実現可能なので，補題 付録 B.6 から同じ λ-ベクトルを持ち

$$\|\vec{u}'\|_1 \leq \beta_\lambda = O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$$

を満たす $\vec{u}' \in L_B(G)$ が存在する．$\widehat{s} \preceq \lambda$ だからその $\widehat{s}$-ベクトルも $\mathbf{t}$ であり，型付き導出の一意持ち上げ（命題 3.5(ii)）から $\vec{u}' \in L_X$ となる．元の開始記号を左辺に持つ非開始型付き非終端にも同じ議論が適用される．

任意の残存する非開始型付き規則 $\widetilde{R} : X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ を取る．元の規則を $R : B \to \rho(C_1, \ldots, C_q)$ とする．各子 Y_i に上の短い終端導出を選び，$\widetilde{R}$ へ代入して根の生成タプル $\vec{z}$ を持つ導出 D を作る．補題 4.1(i) によって

$$\|\vec{z}\|_1 \le \bar{\theta}_G + r_{\max}\beta_\lambda.$$

開始リンク $\widetilde{S} \to X$ が存在する場合，直ちに $\widetilde{R}$ を使う成功導出が得られる．存在しない場合は，補題 4.1(iv) の文脈 E_B を用いる．これは元の成功導出から一つの B 部分木を消去して得られ，$|E_B|_{\mathrm{fix}} \le \bar{\theta}_G$ を満たす．この穴に D の型を忘れた導出を埋め込むと G の成功導出となる．その一意な生成語型付き持ち上げは，部分木の型と規則がその終端生成語によって一意に定まることから，挿入した部分木で元の D と一致する（命題 3.5(ii)）．よって $\widetilde{R}$ を使う成功した型付き導出の語長は高々 $2\bar{\theta}_G + r_{\max}\beta_\lambda$ である．開始リンク規則にも β_λ 以下の成功導出がある．従って，刈り込んだ細分化の全規則厚さは主張の二次上界を満たす．この議論にはタプル代入可能性を仮定していない．

逆向きはさらに強く，$\mathsf{S} \notin \mathbf{LG}$ となる**任意の固定全射型付け** $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ について反例を与える．古典的な U_1 排除判定（定理 付録 B.4(i)–(ii)）によって，相異なる冪等元 $e, z \in \mathsf{S}$ で $e^2 = e$，$ez = ze = z$，$z^2 = z$ を満たすものが存在する．全射性から非空語 $u, v \in \Sigma^+$ を $s(u) = e$，$s(v) = z$ となるように固定する．各 $n \ge 1$ に対してファンアウト 1，規則ランク 2 の文法

$$S \to SS \mid a\ (a \in \Sigma) \mid A_0 \mid \cdots \mid A_n, \quad A_0 \to u, \quad A_i \to A_{i-1}A_{i-1} \mid v \quad (1 \le i \le n)$$

を考える．u, v は固定した終端文字列であり，追加のアルファベット文字ではない．この G_n は縮約済み良形で，$\|G_n\| = O_s(n)$，$L(G_n) = \Sigma^+$，$\bar{\theta}_{G_n} = O_s(1)$ を満たす．各規則は，A_i を v（A_0 は u）で終端させることで定数長の成功導出に使用できる．

一方，$L_{A_n}(G_n)$ の生成語 w が $s(w) = e$ であるには，全ての葉の定数規則で u を使わなければならない．v が一度でも現れると，$\{e, z\}$ 内の積は吸収元 z になるからである．ゆえに $(A_n)_{(e)}$ の生成語は u^{2^n} だけであり，残存する型付き規則 $S_{(e)} \to (A_n)_{(e)}$ を使う成功導出の語長は少なくとも $|u|2^n$ である．従って $\theta_{\mathrm{typ}}(G_n, s) \ge |u|2^n$ となり，規則ランク上限 2 で既に任意の多項式上界に反する．$\Sigma^+ \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ は全 $f \ge 1$ で成立するので，標的表示へ制限した場合も同様である．$\mathbf{V} \not\subseteq \mathbf{LG}$ なら $\mathbf{V}$ の非 LG 元を選べばよい．命題 4.5 の 2 元半束例は u, v が 1 文字の場合に対応する． □

備考 4.22 (精密化厚さと特徴データ長の違い)．この系が特徴づけるのは**特定の完全生成語型精密化**の規則厚さであって，特徴正例の最小符号化総長や任意の Gold 学習器の下界ではない．逆向きの反例では規則ランク 2 を使うので，規則ランク 1 での失敗を意味しない．多項式精密化厚さは補題 4.4 を介して多項式特徴データ上界を与えるが，逆は従わない．分布同値の短い代表が存在すれば，完全精密化が指数的に厚くてもよい（命題 5.5）．ファンアウト 2 以上で $\mathbf{LG}$ は短い特徴データの十分条件であり，必要性はなお未解決である（問題 7.1）．

4.6 一般の標準 MCFG 入力への拡張

従来の定量評価では良形の縮約済み文法を用いたが，**入力文法**には良形性，非消去性，非置換性，非融合性，λ-自由性を要求しなくてよい．空成分がある場合には，その非空成分パターンを実現する最短長を測る．

定義 4.23 (成分パターン厚み)**.** 標準 MCFG H の生産的な非終端記号 A について $\mathrm{supp}(\vec{u}) := \{i : u_i \neq \varepsilon\}$，$\mathsf{Pat}_H(A) := \{\mathrm{supp}(\vec{u}) : \vec{u} \in L_A(H)\}$ とおく．

$$t_{\mathrm{pat}}(H) := \max_{\substack{A \text{ は生産的} \\ I \in \mathsf{Pat}_H(A)}} \min_{\substack{\vec{u} \in L_A(H) \\ \mathrm{supp}(\vec{u}) = I}} \|\vec{u}\|_1, \qquad \bar{t}_{\mathrm{pat}}(H) := \max\{1, t_{\mathrm{pat}}(H)\}$$

を成分パターン厚みと呼ぶ．空集合の最大値は 0 とする．全成分が空のパターンの最短長も 0 である．

命題 4.24 (成分パターン厚みによる良形正規化)**.** $f, r \geq 1$ を固定し，H をファンアウト高々 f，ランク高々 r の任意の標準 *MCFG* とする．$L(H) \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ なら，その刈り込み済み文法を H_{red} として，同じファンアウトとランクの上界をもち，$L(H) \cap \Sigma^+$ を生成する縮約済み良形 *MCFG* G が存在して

$$\|G\| = O_{f,r}(\|H\|), \quad t_G \leq t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}}), \quad \bar{\theta}_G = O_{f,r}(\|H\| \bar{t}_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}}))$$

を満たす．

証明. 命題 3.9 で正規化し，補題 付録 F.1 のタプル言語の等式を用いる．保持記号の生成言語は，元の文法の成分パターン別の言語の和集合を，成分射影・置換・連結した像となる．これらは総長を増加させず，元の各非空ファイバーには長さ $t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ 以下の代表がある．よって t_G を抑え，補題 4.1(iii) で θ_G を抑えられる．詳細は付録 付録 C に示す. □

系 4.25 (任意の標準 MCFG 入力に対する定量保証)**.** $f, r \geq 1$，有限アルファベット Σ，有限半群型付け s を固定する．$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ を生成する任意の有限な標準 *MCFG* H がファンアウト高々 f，規則ランク高々 r なら，$n := \max\{1, \|H\|\}$ と $t := \bar{t}_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ に対し，再構成器 $\mathcal{B}^{\leq r}_{f,s}$ には $O_{f,r,s}(n)$ 語からなる特徴標本 $K \subseteq L$ が存在し，

$$\|K\|_+ = \begin{cases} O(n^3 t), & s \preceq s_{k,\ell}, \text{ または } \widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g) (\text{固定有限群準同型 } g), \\ O(n^4 t), & \mathsf{S} \in \mathbf{LG} \end{cases}$$

となる．定数は固定したアルファベット・型付け・ファンアウト・ランク・窓・群にのみ依存する．入力の消去，置換，融合，空成分はすべて許される．$\varepsilon \in L$ の場合は長さ *1* の追加証拠を加える．

証明. 正語部分が非空なら命題 4.24 と定理 4.7, 4.15, 4.20 を順に用いる．$\|G\| = O(n)$, $\bar{\theta}_G = O(nt)$ である．$L \subseteq \{\varepsilon\}$ は $K = L$ で足りる. □

5 補足的な定量結果

本節には，主要な代数的上界とは独立した三つの補助的結果をまとめる．すなわち任意の固定型付けに対する規則ランク 1 の厚さ非依存上界，短い特徴データの実効的構成，およびアーベル群の剰余類条件でフィルタされた特定の標的に対する上界である．

5.1 規則ランク 1

定理 5.1 (ランク 1 の特徴データの三次上界)**.** f, 有限アルファベット Σ, 有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を固定する．$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ を生成する任意の標準 *MCFG* 表示 G_{in} がファンアウト高々 f，規則ランク高々 *1* を満たすなら，作用素 $\mathcal{B}^{\leq 1}_{f,s}$ には次を満たす特徴標本 K が存在する：

$$\|K\|_+ = O_{f,s,\Sigma}(\|G_{\mathrm{in}}\|^3).$$

証明. 命題 3.9 によりランクを増やさずに正規化・刈り込みを行い，サイズ $\|G\| = O_f(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ の縮約済み良形ランク 1 文法 G を得て，さらにその型付き細分化を刈り込む. 非開始型付き非終端の個数を $n_{\mathrm{typ}} \leq |V||\mathsf{S}^\sharp|^f$，規則が明示的に書き込む終端記号数の最大値と 1 の最大を $b_G \leq \max\{1, \|G\|\}$ とおく．X からの終端導出は単項規則の鎖の末尾に定数規則を置いた形である．生成語長をまず最小化し，次に規則数を最小化すると，型付き非終端は繰り返し現れない．もし繰り返されれば後の鎖を前へ継ぎ替えても非消去性によって長さは増えず，規則数が減るからである．よって $\|\omega(X)\|_1 \leq n_{\mathrm{typ}} b_G$.

文脈については，開始リンク $\widetilde{S} \to X$ があれば $\square_1$ を取る．それ以外では型付き依存グラフの最短経路 $\widetilde{S} \to X_1 \to \cdots \to X_p = X$ を使う．$p \leq n_{\mathrm{typ}}$ であり，その単項テンプレートの合成から，補題 3.1 を繰り返して，各 X の全ての生成語タプルを受理する導出的文脈 $\chi(X) \in \mathcal{E}_{\mathrm{fan}(X)}$ で $|\chi(X)|_{\mathrm{fix}} \leq n_{\mathrm{typ}} b_G$ となるものが得られる．各証拠語の長さは高々 $(2n_{\mathrm{typ}} + 1)b_G$，型付き規則・非終端を数えると

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \leq (n_{\mathrm{typ}} + |P||\mathsf{S}^\sharp|^f)\big(1 + (2n_{\mathrm{typ}} + 1)b_G\big) = O_{f,s}(\|G_{\mathrm{in}}\|^3).$$

$\varepsilon \in L$ なら ε を追加した集合は，命題 3.8 と 付録 D.3 により $\mathcal{B}^{\leq 1}_{f,s}$ の特徴標本である． □

上限付き作用素の多項式時間構成と保守的学習器の Gold/TxtEx 同定は，それぞれ定理 付録 D.4 と系 3.12 から別途従う．上の三次上界はこれらとは異なる特徴データ総長の主張である．

この結果は，ランク 1 の型なしの尺度 [14, Lemma 7] および関連 CFG 論文のファンアウト 1 の議論 [25] を，任意の固定有限型付け・固定ファンアウトへ拡張する．規則ランク 2 では一般に，文法サイズのみの上界は得られない．実際，サイズが $O(n)$ の文法 $A_0 \to \mathsf{c}$，$A_i \to A_{i-1}A_{i-1}$，$S \to A_n$ は，単集合言語 $\{\mathsf{c}^{2^n}\}$ を生成する．これは任意の固定 f, s に関して (f, s)-タプル代入可能である．一文字アルファベット上では，文文脈を共有することからタプルの成分総長が等しくなり，すべての文脈は両タプルを同時に受理するか同時に拒否するかだからである．この単集合標的の任意の特徴標本には，長さ少なくとも 2^n の語が必要である．

5.2 短い特徴データの計算

ここまでの上界は存在型である．各証明は短いタプルや文脈を一つ示すだけである．しかし最短のものは直接計算できる．型付き非終端記号 X の文文脈が**導出的**であるとは，補題 付録 E.2 の証明のように，成功する型付き導出から X を根とする部分木の一つの出現を削除して得られることをいう．導出的文脈はすべて X に対して許容的である．補題 4.1 の文脈 E_A を $X = A_{\mathbf{t}}$ に持ち上げたもの，および補題 3.1 の文脈は導出的である．

命題 5.2 (短い特徴データの実効的計算)**.** $f, r_{\max}$ と有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ の標準延長 $\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ を固定する．ファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max}$ の縮約済み良形 *MCFG* G が与えられたとき，長さを二進表記して，次のものを $\|G\|$ の多項式時間で計算できる．

(i) 各規則 R の $\theta_G(R)$，したがって θ_G と t_G.

(ii) 縮約された精密化 $\widetilde{G}_0$．さらに，開始記号以外の各型付き非終端記号 X について，総長最小の正準タプル $\omega(X) \in L_X$ と，固定長最小の導出的文脈 $\chi(X)$．ただし $\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ に属するときは $\chi(X) = \square_1$ とする．

(iii) これらのタプルと文脈を表す，$\|G\|$ について多項式サイズの導出 *DAG*. したがって，それらから構成される定義 *3.7* の証拠集合 $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ の各語の *DAG*.

本節の前半（*4.1* 節から *4.5* 節まで）および節 付録 *A*, 付録 *A*, 付録 *B* で, 導出可能な正準タプルと導出的文脈に対して示した語長・総長の上界は，この計算された証拠集合について成立する．一方，*5.3* 節の緩和証拠集合 $K^\dagger$ に対する存在的上界は，一般にその非終端記号から導出できない分布同値代表元を用いるため，本命題の計算された証拠集合に適用してはならない．その語は $\|G\| + \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+$ の多項式時間で明示的に書き出せる．

証明. $f, r_{\max}, s$ が固定されているので，完全精密化 $G^{\widehat{s}}$ の型付き非終端記号は高々 $|V||\mathsf{S}^\sharp|^f$ 個，型付き規則は高々 $|P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ 個である．縮約は生成性と到達性の線形時間計算である．型付き規則を重み付き演繹の推論規則とみなす．規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_r)$ は子の長さ x_j を $c_\rho + \sum_j x_j$ に写す．ここで c_ρ は ρ が書く終端記号の数であり，この関数は superior である．長さ 0 の規則による循環する復元ポインタを避けるため，（終端総長，導出節点数）の辞書式順序で最小化し，各規則に重み $(c_\rho, 1)$ を加える．この組値の演算は終端文字を一つも書かない場合でも，各子の値より真に大きくなる．したがって，Knuth による Dijkstra 法の grammar problem への一般化を重み付き演繹系に適用した Nederhof [35] の方法（Ramalingam–Reps [34] も参照）により，各型付き非終端記号の最小長 $\lambda(X) = \min\{\|\vec{u}\|_1 : \vec{u} \in L_X\}$ とそれを達成する規則を循環しない形で選べる．これらの規則と共有された部分導出が $\omega(X)$ の導出 DAG をなす．二回目の Dijkstra 計算で外側長を求める．長さが等しい場合は通過する辺の数で決定する．$\widetilde{S} \to X$ があれば $\mu(X) = 0$ から始める．各型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_r)$ と各 j について，X から Y_j への重み $c_\rho + \sum_{i \neq j} \lambda(Y_i)$ の辺を加える．値 $\mu(X)$ は X の導出的文脈の最小固定長であり，最短路木がその DAG を与える．同じ二回の計算を G 自身に行えば，$t_G = \max_A \lambda(A)$ と，$R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$ に対する $\theta_G(R) = \mu(A) + c_\rho + \sum_j \lambda(B_j)$ が得られる．

上記の**導出的**証拠集合の上界を与える各証明は，証拠語の長さを，文脈，規則テンプレート，子の正準タプルの長さに分けてそれぞれ上から評価している．その際，L_X のあるタプルと，上界内の長さをもつある導出的文脈を示している．計算された最小値はそれより長くないので，その範囲の上界は保たれる．この議論は $K^\dagger$ のような非導出代表元に対しては適用しない．DAG の展開は，表す語の長さについて線形時間である． □

命題 5.3 (規則証拠のみからなる特徴標本と計算可能なデータ長予算)**.** 命題 *5.2* の設定で，全ての正準タプルを整合的な非循環最小重み導出から選び，$\mathcal{R}$ を非開始型付き規則の集合（ランク *0* を含む）とする．

(i) 開始記号以外の型付き非終端記号 X に対し，その最小導出の根の規則を $R_X : X \to \rho_X(Y_1, \dots, Y_q)$ とする（$q = 0$ の場合も含む）．このとき $\omega(X) = \rho_X(\omega(Y_1), \dots, \omega(Y_q))$ が成立する．したがって定義 *3.7* の特徴証拠集合は，規則証拠だけからなる次の集合に等しい：

$$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) = \big\{ \chi(\mathrm{lhs}\, R)[\rho_R(\omega(Y_1), \dots, \omega(Y_q))] : R \in \mathcal{R} \big\}.$$

ここで $\mathcal{R}$ は開始記号以外の型付き規則の集合で，ランク *0* の規則も含む．特に $|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le |\mathcal{R}| \le |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ である．標的が $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属するとき，この集合は $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ に対する特徴標本として引き続き機能する．

(ii) $\lambda(X)$ は X から導出できるタプルの最小総長，$\mu(X)$ は X の導出的文文脈の最小固定長とする（開始記号から直接リンクされる場合は $\mu(X) = 0$）．規則 $R : X \to \rho(Y_1, \dots, Y_q)$ に対して

$$b(R) := c_\rho + \sum_{j=1}^{q} \ell_{\mathrm{in}}(Y_j), \qquad \mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G, \widehat{s}) := \sum_{R \in \mathcal{R}} \big(1 + \mu(\mathrm{lhs}\, R) + b(R)\big)$$

と定義する．このとき計算可能な証拠集合 $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ を $\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le \mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G, \widehat{s})$ となるように選べる．$f, r_{\max}, s$ を固定すれば，$\mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G, \widehat{s})$ は二進表記で $\|G\|$ の多項式時間で計算できる．標的が空語を含み，非空部分を別に扱う場合は，追加する ε の符号化コストは高々 *1* である．

証明. (i) 各 X の最適導出は，ある規則 R_X から始まる．その子の導出が最適でなければ，最短の子導出に置換することで全体の辞書式重みを小さくでき，矛盾する．導出節点数による副次的な最小化によって，この根規則の選択を同時に非循環にできる．したがってランク 0 も含めて，表示した $\omega(X)$ の恒等式が成立する．

ゆえに $\chi(X)[\omega(X)]$ は選択規則 R_X の証拠語と**同一**である．定義 3.7 の他の語は，初めから規則証拠として収録されている．従って二つの集合は終端語の集合として等しく，証拠集合に基づく完全性や特徴標本の証明は変わらない．各型付き規則に高々 1 語が対応し，型付き規則数の評価から個数上界が得られる．

(ii) 命題 5.2 の最短正準タプルと最短導出的文脈を用いる．(i) により，各非終端記号の正準証拠語は既に規則証拠に含まれる．正ランクおよびランク 0 の各規則 $R : X \to \rho(Y_1, \dots, Y_q)$ に対して，その証拠 $\chi(X)[\rho(\omega(Y_1), \dots, \omega(Y_q))]$ の長さは $\mu(X) + b(R)$ に等しい．これらの規則証拠を重複を許して添字付きで数え，各語長に 1 を加えて合計すると $\mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G, \widehat{s})$ となる．同一語の重複を除けば総符号長は増加しない．各 λ, μ の計算可能性，型付き非終端記号と規則の個数，値の二進長に関する多項式評価は命題 5.2 に従う． □

備考 5.4. この**規則証拠だけ**の予算は文法表示に依存し，一律の最悪値を代入する多項式上界より大幅に小さくなる場合がある．これは効率的に計算できる**上界証明**であって，最小サイズの特徴標本の計算や最悪次数の改善を主張するものではない．

定理 5.1 の後の単元集合 $\{\mathsf{c}^{2^n}\}$ が示すように，明示的な特徴語は $\|G\|$ より指数的に長くなりうる．その場合でも命題 5.2 の導出 DAG は多項式サイズのままであり，計算された標本は多項式サイズの圧縮表現をもつ．

5.3 分布同値代表元とアーベル型フィルタ標的

上で求めた計算可能な規則証拠予算では，型付き文法自身から**導出できる**代表タプルを使った．一方，特徴標本の存在に関する上界では，同じ**型付き分布同値類**に属する短いタプルを用いてよく，そのタプルが当該非終端記号から導出される必要はない．

命題 5.5 (緩和された分布証拠)．$L = L(G) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ の縮約済み良形文法 G のファンアウトを高々 f，規則ランクを高々 r とし，$\widetilde{G}_0$ を刈り込み済みの生成語型精密化とする．非開始型付き非終端記号 X に対し，補題 付録 *E.3* により存在する L_X を含む $\equiv_{L,s}$-同値類を $[X]$ とおき，$\kappa_G(X) = \min_{\vec{v}\in[X]} \|\vec{v}\|_1, \qquad \kappa_G = \max_X \kappa_G(X)$ と定義する．このとき，規則ランク上限が G のランク以上である $\mathcal{B}^{\le r}_{f,s}$ および $\mathcal{B}_{f,s}$ の特徴標本 $K^\dagger$ が存在し，

$$
\begin{aligned}
|K^\dagger| &\le |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{fr},\\
\|K^\dagger\|_+ &\le (|V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{fr})\big(1 + \theta_G + \|G\| + (r+1)\kappa_G\big)
\end{aligned}
$$

を満たす．この評価は非空語部分に対するものであり，$\varepsilon \in L$ なら ε を符号化コスト *1* で追加する．

証明. 各 $X = A_{\mathbf{t}}$ に対し $\omega^\dagger(X) \in [X]$ を総長 $\kappa_G(X)$ となるように取る．型なし非終端記号 A を含む最短の成功導出から，兄弟部分木の語を固定した導出的な文文脈 $\chi^\dagger(X)$ を選ぶ．A を含む成功導出は A を含む規則の厚みの証拠にもなるため，この文脈の固定部分の長さは θ_G 以下にできる．$\widetilde{S} \to X$ が存在すれば $\square_1$ を使う．この文脈は $u \in L_X$ を受理し，$\omega^\dagger(X) \equiv_{L,s} u$ なので $\omega^\dagger(X)$ も受理する．

$K^\dagger$ を，非終端記号の証拠語 $\chi^\dagger(X)[\omega^\dagger(X)]$ と，各型付き規則 $X \to \rho(Y_1,\dots,Y_q)$ の証拠語

$$\chi^\dagger(X)\Big[\rho\big(\omega^\dagger(Y_1),\dots,\omega^\dagger(Y_q)\big)\Big]$$

から作る（ランク 0 の規則も含む）．補題 付録 D.2 により，規則の右辺のタプルは L_X の元と分布同値であり，すべての証拠語は L に属する．命題 3.8 を $\iota(X) = \omega^\dagger(X)$，$\chi(X) = \chi^\dagger(X)$ として直接適用できる．文脈証拠と規則証拠は同命題の二つの前提を満たす．さらに命題 付録 D.3 から逆向きの包含が成立する．

重複を除く前の語数は非終端記号と規則につきそれぞれ 1 語である．非終端記号の証拠長は $\theta_G + \kappa_G$ 以下，規則証拠長は $\theta_G + \|G\| + r\kappa_G$ 以下である．これらの符号化長を合計すれば上界が従う．命題 5.3 と異なり，今回の代表元は非終端記号から導出できるとは限らないため，非終端記号用の証拠を一般には省略できない． □

備考 5.6. $f, r, \widehat{s}$ を固定すると，$\|G_n\| \max\{1, \theta_{G_n}\} = n^{O(1)}$ にもかかわらず任意の特徴標本が超多項式長となる文法族が存在するなら，$\kappa_{G_n} = n^{\omega(1)}$ が必要である．これは必要条件であり，そのような族の存在証明ではない．緩和された証拠は存在論的な構成である．命題 5.3 の計算可能な規則証拠は，文法で導出される代表元を用いる別の構成である．

定理 5.7 (アーベル型フィルタ標的の多項式データ)**.** 空でない有限アルファベット Σ，有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$，上界 $f, r \ge 1$ を固定し，$\widehat{s}$，$\mathsf{S}^\sharp$ とおく．Σ, s, f, r のみに依存する定数 C, e が存在して，次が成り立つ．A を任意のアーベル群，$\varphi : \Sigma^* \to \mathsf{A}$ を準同型，$\mathsf{H} \le \mathsf{A}$，$\gamma \in \mathsf{A}$，$\mathsf{Acc} \subseteq \mathsf{S}^\sharp$ とする．$L = \widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ の非空語部分 $L \cap \Sigma^+$ が，ファンアウト高々 f，規則ラン

ク高々 r の縮約済み良形 $MCFG$ G で表示されるなら，$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ であり，$\mathcal{B}^{\le r}_{f,s}$ に対する特徴標本 $K^\dagger$ が存在して $\|K^\dagger\|_+ \le C\big(\|G\| \max\{1, \theta_G\}\big)^e$ を満たす．定数は補助群 $\mathsf{A}, \varphi, \mathsf{H}, \gamma$ に依存しない．$\varepsilon \in L$ のときは ε を特徴標本に加える．$L \subseteq \{\varepsilon\}$ の自明な場合は別途直接扱える．

証明. $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ は命題 2.11 から従う．非空語部分は G が生成し，ε は開始規則で別途扱う．

$\psi : \Sigma^* \to \mathbb{N}^\Sigma$ を Parikh 写像とし，$\Psi(\vec{u}) = \sum_i \psi(u_i)$ と書く．φ は群準同型 $\overline{\varphi} : \mathbb{Z}^\Sigma \to \mathsf{A}$ を用いて分解できる．$\Lambda = \{z \in \mathbb{Z}^\Sigma : \overline{\varphi}(z) \in \mathsf{H}\}$ とおく．各型なし非終端記号 A について，長さが非終端記号厚み $t_G \le \theta_G$ 以下の生産的タプル ω_A を一つ固定する．任意の二つの A の導出タプルは，同一の成功導出的文脈へ代入でき，その結果はともに L に属するため

$$\Psi(u) - \Psi(\omega_A) \in \Lambda \qquad (u \in L_A(G)) \tag{*}$$

となる．

各規則 $R : A \to \rho(B_1, \dots, B_q)$ で，$c_R \in \mathbb{N}^\Sigma$ を規則中の終端記号の出現数ベクトルとし，$\delta_R = \Psi(\omega_A) - c_R - \sum_{j=1}^q \Psi(\omega_{B_j})$ とおく．(*) より $\delta_R \in \Lambda$ で，$\|\delta_R\|_1$ は $T = (r+1)t_G + \|G\|$ 以下である．$\Gamma_T = \{z \in \Lambda : \|z\|_1 \le T\}$, $\Lambda_T = \langle \Gamma_T \rangle$ とする．$\Psi(u) - \Psi(\omega_A) = \sum_j (\Psi(u_j) - \Psi(\omega_{B_j})) - \delta_R$ を用いる導出上の帰納法により，すべての $u \in L_A(G)$ に対して $\Psi(u) - \Psi(\omega_A) \in \Lambda_T$ が成立する．

型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ の $d \le f$ 成分タプル $u = (u_1, \dots, u_d) \in L_X$ を取る．各成分について正規言語 $\widehat{s}^{-1}(t_i) \cap \Sigma^+$ の Parikh 像の固定した半線形表示から，$\psi(u_i)$ を含む線形集合 $c_i + \sum_{p \in P_i} \mathbb{N}p$ を選ぶ．その生成元の個数と係数は $\Sigma, \widehat{s}$ のみに依存する定数で抑えられる．次の非負整数連立系を考える：

$$\sum_{i=1}^{d} \left(c_i + \sum_{p \in P_i} \nu_{i,p} p \right) - \sum_{z \in \Gamma_T} (\mu_z^+ - \mu_z^-) z = \Psi(\omega_A).$$

元の u_i の Parikh ベクトルと Λ_T に属するという上記の事実から，この連立系は可解である．方程式数は $|\Sigma|$，非負変数の個数は $O_{f,s,\Sigma}((T+1)^{|\Sigma|})$ 以下，係数および右辺の絶対値は $O_{f,s,\Sigma}(T+1)$ 以下である．特に $\Psi(\omega_A)$ の各座標は $t_G \le \theta_G \le T$ 以下である．方程式数 $|\Sigma|$ は固定され，多項式の指数は補助アーベル群の大きさには依存しない．Papadimitriou の非負整数小解定理 [39] より，全ての変数が $T+1$ の固定多項式で抑えられる解が存在する．得られた各 Parikh ベクトルを実現する非空語 $v_i \in \widehat{s}^{-1}(t_i)$ を選び，$\vec{v} = (v_1, \dots, v_d)$ とする．$\|\vec{v}\|_1$ は $T+1$ の多項式で抑えられ，成分別型は u と一致し，$\Psi(\vec{v}) - \Psi(u) \in \Lambda_T \subseteq \Lambda$ となる．

任意の文文脈 E に対して $E[\vec{v}]$ と $E[u]$ の全体の $\widehat{s}$-型は等しく，

$$\varphi(E[\vec{v}]) - \varphi(E[u]) = \overline{\varphi}(\Psi(\vec{v}) - \Psi(u)) \in \mathsf{H}$$

が成り立つ．したがって $\vec{v} \equiv_{L,s} \vec{u}$ である．各型付き分布同値類に，長さが $T+1$ の多項式で抑えられた代表元が存在するので，命題 5.5 と $t_G \le \theta_G$ から求める総長上界が得られる．定数は補助アーベル群に依存しない． □

備考 5.8. 定理 5.7 は $\widehat{s}$ の正語像が $\mathbf{LG}$ の**外**にある場合にも成立する．これは有限制御モノイドではなく，標的言語の構造に関する十分条件である．補助アーベル群の表示が計算可能とは限らない場合に，証拠の多項式時間**構成**まで主張しない．

6　多次元代入可能性との比較

Yoshinaka の多次元代入可能性は，正例学習について直接比較すべき基準である [13, 14]．自明型付けの下で，本稿の枠組みはその意味論的言語クラスを再現する．有限型付けは，合成に関する規則証拠を保持したまま，どの観測タプルを同一視してよいかをさらに制限する．MCFG の証明には，成分別の型の伝播が必要であり，定量的な境界型付け定理では，複数のタプル成分を同時に制御しなければならない．Yoshinaka の (k,ℓ) 階層は別の CFG の成果である [12]．$\widehat{s}_{k,\ell}$ は同じ境界情報を成分ごとに持ち上げる．すべての (f,s) 条件はアリティ 1 を含むため，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \cap \mathrm{CFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ が成り立つ．以下の例では，有限型付けによるクラスを自明型付けの場合，接頭辞 – 接尾辞型付け，正則フィルタによる説明からそれぞれ分離する．

6.1　Yoshinaka の基準クラスと接頭辞 – 接尾辞型付けへの特殊化

定義 6.1 (Yoshinaka の多次元代入可能性)**.** 第 2 節で定義した文文脈集合 $\mathcal{E}_d$ を用いる．言語 L が fD-**代入可能**であるとは，任意の $1 \le d \le f$，$E, F \in \mathcal{E}_d$ と $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ に対し $E[\vec{x}],\quad E[\vec{y}],\quad F[\vec{x}] \in L \Longrightarrow F[\vec{y}] \in L$ が成り立つことをいう．この意味論的クラスを $\mathsf{YSub}(f)$ とし，r を規則ランク上界として $\mathsf{YSL}(f,r) := \mathsf{YSub}(f) \cap \mathsf{MCFL}(f,r)$ と書く．表示した四例の含意を**代入の含意**と呼ぶ．Yoshinaka の元の定義はすべてのアリティ $d \le f$ を量化し，非空のタプル成分を用い，d-文脈の内部区切り語を非空と要求する．脚注 3 では，空成分と空の区切り語を許す，より強い代替条件を別に論じている [14, Section 3.1 and footnote 3].

定義 2.6 の有限モノイド準同型 $\widehat{s}_{k,\ell}$ を思い出そう．Yoshinaka の語レベルの定義では，$w_1, y_1, w_1', w_2, y_2, w_2' \in \Sigma^*$，$u \in \Sigma^k$，$v \in \Sigma^\ell$，$uy_1v, uy_2v \neq \varepsilon$ としたうえで，

$$w_1uy_1vw_1',\ w_1uy_2vw_1' \in L \quad\Longrightarrow\quad \bigl(w_2uy_1vw_2' \in L \iff w_2uy_2vw_2' \in L\bigr)$$

を要求する [12]．比較される因子 uy_iv は非空であるが，中央の語 y_i 自体は空でもよい．これらの因子の $\widehat{s}_{k,\ell}$-値が等しいことは，この条件で使われる境界情報が等しいことと正確に一致する．特に $m_0 = \max\{1, k+\ell\}$ より短い語については，語そのものが一致することを含む．

■意味論的条件の特殊化． 自明型付けでは成分別の型の前提が消えるため，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{\mathrm{triv}}} = \mathsf{YSub}(f) \cap f\text{-MCFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ が成り立つ．ファンアウト 1 では，$(1, \widehat{s}_{k,\ell})$-代入可能性は Yoshinaka の語レベルの (k,ℓ) 条件 [12] に正確に一致する．すなわち同じ窓型とは，短い語では語そのものが等しいこと，長い語では長さ k の接頭辞と長さ ℓ の接尾辞が共通であることを意味する．ファンアウトが高い場合も，同じ対応が成分ごとに成り立つ．

■Yoshinaka の効率性尺度との整合． 自明型付けでは，生産的な非終端記号の生成語型は一種類しかない．Yoshinaka の型なし文法に対する証拠はすでに $|K_G| \le |P|,\qquad \|K_G\| \le |P|\tau_G$ を満たす [14, Lemma 7]．次元と規則ランクを固定したときの多項式時間・多項式データも既知である [14, Theorem 1]．したがって，本稿の定量的な主張は自明型付けの結果を再証明することではなく，新しい型付き・多成分の場合を扱うものである．

■分離例で使う境界型付けの補題． 言語が**厳密 *2* 局所**であるとは，固定端点標識 $\vdash, \dashv$ を用いた $\vdash w \dashv$ の隣接 2 文字対の許容・不許容だけで所属が決まることである．

補題 6.2 (厳密 2 局所条件は境界型付きである)**.** $L_{\mathrm{sl}} \subseteq \Sigma^*$ が厳密 *2* 局所なら，任意の $f \geq 1$ について $L_{\mathrm{sl}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}}$ が成り立つ．

証明. 同じ $\widehat{s}_{1,1}$-型をもつ非空タプル $\vec{x}, \vec{y}$ が，受理する文脈 E_0 を共有するとする．各 y_i の内部の隣接対は $E_0[\vec{y}]$ に現れるので許容される．$E[\vec{x}] \in L_{\mathrm{sl}}$ のとき，$E[\vec{y}]$ の各隣接対は，固定終端部分の内部，ある y_i の内部，または成分の境界を横切る対のいずれかである．それらは順に $E[\vec{x}]$，$E_0[\vec{y}]$，あるいは境界型で符号化された先頭・末尾文字の一致によって許容される．端点標識を含む対は変化しない．したがって $E[\vec{y}] \in L_{\mathrm{sl}}$ であり，対称性から主張が従う． □

命題 6.3 (有限素性の適合制約を持つ交差依存)**.** $\Sigma_{\mathrm{feat}} = \{\mathtt{p}_0, \mathtt{p}_1, \mathtt{q}_0, \mathtt{q}_1, \mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\}$，$\mathcal{R}_{\mathrm{feat}} = \{(0,0), (0,1), (1,0)\}$ とし，

$$L_{\mathrm{feat}} = \{\mathtt{a}^m \mathtt{p}_i \mathtt{b}^n \mathtt{c}^m \mathtt{q}_j \mathtt{d}^n : m, n \geq 1,\ (i,j) \in \mathcal{R}_{\mathrm{feat}}\}$$

とおく．有限群 $\mathsf{F} = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ への準同型 $g : \Sigma^*_{\mathrm{feat}} \to \mathsf{F}$ を $g(\mathtt{p}_1) = (1,0)$，$g(\mathtt{q}_1) = (0,1)$，その他の文字では $(0,0)$ と定める．$s_{1,1}$ を先頭・末尾の *1* 文字を記録する型付けとし，固定半群型付け $s = (s_{1,1}, g)|_{\Sigma^+_{\mathrm{feat}}}$ の余域をこの積の正語像とする．このとき全ての $f \geq 2$ について

$$L_{\mathrm{feat}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \setminus \mathsf{YSub}(f), \qquad L_{\mathrm{feat}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}.$$

さらに $(1, s_{1,1})$-代入可能性も成り立たず，この例では窓だけでは足りず有限群成分が必要である．

証明. **交差する二つの計数依存．** ファンアウト 2 の非終端記号 A, B について

$$A \to (\mathtt{a}, \mathtt{c}) \mid (\mathtt{a}\xi^1_1, \mathtt{c}\xi^2_1)(A),$$
$$B \to (\mathtt{b}, \mathtt{d}) \mid (\mathtt{b}\xi^1_1, \mathtt{d}\xi^2_1)(B)$$

とし，各 $(i,j) \in \mathcal{R}_{\mathrm{feat}}$ に対して

$$S \to \xi^1_1 \mathtt{p}_i \xi^1_2 \xi^2_1 \mathtt{q}_j \xi^2_2 (A, B)$$

を加える．各子の 2 成分を一度ずつ使用し，A_1, B_1, A_2, B_2 の順に置くランク 2 の良形 MCFG である．$\{\mathtt{a}^m \mathtt{b}^n \mathtt{c}^m \mathtt{d}^n : m, n \geq 1\}$ は CFL ではない：$a^p b^p c^p d^p$ に対する長さ p のポンピング窓は高々二つの隣接ブロックにしか触れず，a/c と b/d の両等式を保ったポンプができない．L_{feat} を正則言語 $\mathtt{a}^+\mathtt{p}_0\mathtt{b}^+\mathtt{c}^+\mathtt{q}_0\mathtt{d}^+$ と交差させ，$\mathtt{p}_0, \mathtt{q}_0$ を消去するとこの非 CFL になる．したがって L_{feat} も CFL ではない．

有限群に符号化した適合関係．

$$Q = \mathtt{a}^+\{\mathtt{p}_0, \mathtt{p}_1\}\mathtt{b}^+\mathtt{c}^+\{\mathtt{q}_0, \mathtt{q}_1\}\mathtt{d}^+$$

は厳密 2 局所であり，その隣接対と端点標識がブロック順序を決定する．$K_{\mathrm{feat}} = g^{-1}(\mathcal{R}_{\mathrm{feat}})$ は固定 s 型の受理集合の逆像である．$\varphi : \Sigma^*_{\mathrm{feat}} \to \mathbb{Z}^2$ を

$$\varphi(\mathtt{a}) = (1,0),\ \varphi(\mathtt{c}) = (-1,0),\ \varphi(\mathtt{b}) = (0,1),\ \varphi(\mathtt{d}) = (0,-1)$$

および素性標識の像 $(0,0)$ で定めると，

$$L_{\mathrm{feat}} = Q \cap K_{\mathrm{feat}} \cap \varphi^{-1}(0).$$

補題 6.2，定義 2.10 直後の型逆像の観察，命題 2.11 により，この交差はすべての f について (f,s)-タプル代入可能である．

型なし条件と窓型条件の破綻．

$$x = \mathtt{ap}_0\mathtt{b}, \quad y = \mathtt{ap}_1\mathtt{b}, \quad E = \Box_1\mathtt{cq}_0\mathtt{d}, \quad F = \Box_1\mathtt{cq}_1\mathtt{d}$$

とすれば $E[x], E[y], F[x] \in L_{\mathrm{feat}}$ であるが $F[y] \notin L_{\mathrm{feat}}$ となる．x, y は先頭末尾 $(\mathtt{a},\mathtt{b})$ を共有するが，$g(x) = (0,0) \neq (1,0) = g(y)$ である．この有限群成分が不適切な置換を除外する． □

備考 6.4 (有限素性例の意味)．素性標識は格・一致などの適合制約の模式例である．有限型付けは誤った同一視を防ぎ，二つの無限の交差依存は正例から推定すべき対象として残る．型付け自体の推定方法を与えたものではない．

系 6.5 (固定型付けによる有限素性関係族の一様な扱い)**.** 命題 *6.3* の同じ固定型付け $s = (s_{1,1}, g)|_{\Sigma^+_{\mathrm{feat}}}$ は，すべての関係 $R \subseteq \{0,1\}^2$ に共通して使える．すなわち

$$L_R = \{\mathtt{a}^m\mathtt{p}_i\mathtt{b}^n\mathtt{c}^m\mathtt{q}_j\mathtt{d}^n : m,n \geq 1,\ (i,j) \in R\}$$

はすべての $f \geq 2$ について $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する．型付けは各 R に合わせて選び直すものではない．

証明．命題 6.3 の文法の開始規則を R で指定した組だけに制限する（$R = \varnothing$ なら生産的な開始規則を持たない）．同命題の証明における有限素性フィルタを $g^{-1}(R)$ へ置き換えても，同じ型付けの型繊維の和集合である．厳密 2 局所条件と $\mathbb{Z}^2$ の零和条件は変わらないので，同じ交差の証明が成立する． □

命題 6.6 (共通素性型付けに対する明示的なデータ予算)**.** 系 *6.5* の固定型付け s を用いる．任意の非空 $R \subseteq \{0,1\}^2$ と $f \geq 2$ について，上限付き作用素 $\mathcal{B}^{\leq 2}_{f,s}$ には

$$\|K_R\|_+ = 36|R| + 22$$

を満たす特徴標本 $K_R \subseteq L_R$ が存在する．$R = \varnothing$ なら空標本が空言語の特徴標本となる．逆に，同じ族の全ての L_R について特徴標本を持つ任意の集合駆動型作用素 $\mathcal{D}$ を取ると，L_R の任意の特徴標本 K は

$$\|K\|_+ \geq 7|R|$$

を満たす．この下界は族全体を同じ作用素で学習することに対するものであり，既知の一つの R に特化して設計された学習器の下界ではない．

証明．$R \neq \varnothing$ として $(i_0, j_0) \in R$ を一つ固定する．$(i,j) \in R$，$m,n \geq 1$ について

$$w^{m,n}_{ij} = \mathtt{a}^m\mathtt{p}_i\mathtt{b}^n\mathtt{c}^m\mathtt{q}_j\mathtt{d}^n$$

とおき，

$$K_R = \{w^{m,n}_{ij} : (i,j) \in R,\ m,n \in \{1,2\}\} \cup \{w^{3,1}_{i_0 j_0}, w^{1,3}_{i_0 j_0}\}$$

とする．これらは相異なる L_R の語で，$(m,n) = (1,1),(2,1),(1,2),(2,2)$ の符号化費用は順に $7,9,9,11$，追加の 2 語はそれぞれ 11 である．従って $\|K_R\|_+ = 36|R| + 22$ となる．

命題 6.3 の良形ファンアウト 2・ランク 2 文法で，開始規則をちょうど R に属する組に制限する．刈り込んだ $\widehat{s}$ 型細分化では，$s_{1,1}$ が長さ 1 の成分と長さ 2 以上の成分を区別するため，A, B はそれぞれ**二つ**の生成語型を持つ．$(\mathtt{a},\mathtt{c})$ と $(\mathtt{a}^2,\mathtt{c}^2)$ の型を A_1, A_+，$(\mathtt{b},\mathtt{d})$ と $(\mathtt{b}^2,\mathtt{d}^2)$ の型を B_1, B_+ と書く．これで生産的な子の型は尽くされる．$(i,j) \in R$ に対して一つの型付き開始非終端 S_{ij} があり，その型は素性対を区別するが m, n に依存しない．

正準タプルを

$$\omega(A_1) = (\mathtt{a},\mathtt{c}), \quad \omega(A_+) = (\mathtt{a}^2,\mathtt{c}^2),$$
$$\omega(B_1) = (\mathtt{b},\mathtt{d}), \quad \omega(B_+) = (\mathtt{b}^2,\mathtt{d}^2), \quad \omega(S_{ij}) = (w_{ij}^{1,1})$$

と選ぶ．S_{ij} には恒等文脈を与える．A, B の両型について，他方の子を一文字の基底型に固定し，素性対 (i_0, j_0) を持つ導出的文脈

$$\chi(A_\bullet)[(x,y)] = x\mathtt{p}_{i_0}\mathtt{b}\,y\mathtt{q}_{j_0}\mathtt{d},$$
$$\chi(B_\bullet)[(x,y)] = \mathtt{a}\mathtt{p}_{i_0}x\mathtt{c}\mathtt{q}_{j_0}y \quad (\bullet \in \{1,+\})$$

を用いる．A_1, B_1 の代表とランク 0 規則は $w_{i_0j_0}^{1,1}$，長い型 A_+, B_+ の代表は $w_{i_0j_0}^{2,1}$ と $w_{i_0j_0}^{1,2}$ が証拠となる．長さ 1 の型から長い型への再帰規則は後二者で，長い型から同じ長い型への再帰規則は $w_{i_0j_0}^{3,1}$ と $w_{i_0j_0}^{1,3}$ で証拠づけられる．各 $(i,j) \in R$ の四つの開始規則（子の型は $\{A_1, A_+\} \times \{B_1, B_+\}$）には，$w_{ij}^{1,1}, w_{ij}^{2,1}, w_{ij}^{1,2}, w_{ij}^{2,2}$ を与える．これですべての型付き非終端と型付き規則が覆われるため，定義 3.7 の証拠集合は K_R に含まれる．定理 3.10 から K_R は特徴標本である．$R = \varnothing$ では開始規則がないので空標本が特徴的である．

下界を示す．$(i,j) \in R$ について，L_R の特徴標本 K が $\mathtt{p}_i, \mathtt{q}_j$ を含む語を一つも持たないなら，$K \subseteq L_{R\setminus\{(i,j)\}}$ である．後者の特徴標本 F を $\mathcal{D}$ について取ると，有限集合 $K \cup F$ は両特徴標本の拡大であり，L_R と $L_{R\setminus\{(i,j)\}}$ という異なる二言語を同時に再構成しなければならない．矛盾．よって各許可対ごとに少なくとも一語必要で，異なる対は異なる語を要する．各語は長さ 6 以上，符号化費用 7 以上だから $\|K\|_+ \geq 7|R|$ となる． □

備考 6.7 (有限素性値の拡張). 固定した任意の有限集合 $I = \{0,\ldots,p-1\}$，$J = \{0,\ldots,q-1\}$ にも同じ構成が適用できる．異なる一文字標識 $\mathtt{p}_i, \mathtt{q}_j$ を用意し，$g : \Sigma^* \to \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ でそれらを $(i,0)$, $(0,j)$ に，他の四つのカウント文字を零元に送る．同じ先頭末尾文字の型と併せれば，一つの固定型付けで $R \subseteq I \times J$ に対応する 2^{pq} 個の異なる標的を扱える．非空 R に対する標本費用 $36|R| + 22$ も維持される．ただし p, q が変わればアルファベット・群・型付けも変わるため，それらについて一様な定数という意味ではない．

備考 6.8 (この例が示す範囲). これは特定の自然言語の忠実な文法モデルを主張しない．素性適合の有限な制約によって型なしの不適切な置換を排除しながら，二つの無限の交差依存は学習対象として残る．系 6.5 と命題 6.6 は，標的ごとでなく**クラス全体で**与える型付けの意味を正確にする．ただし非可換短縮や局所群短縮の必要性を示す例ではない．

6.2 窓・群決定的型付けの外にある標的

前節の有限素性例は窓と可換群の積で扱えた．以下の二つの標的は，局所群型付けと窓・群決定的型付け，および窓・非可換群型付けと窓・アーベル群決定的型付けの**標的クラス**を分離する．これらは特定の短縮手法の必要性や特徴標本長の下界ではない．$\mathtt{l}$ は検査を課す旗文字，$\mathtt{r}$ は検査を課さない旗文字である．

$$C_\times = \{\mathtt{1}^m\mathtt{2}^n\mathtt{3}^m\mathtt{4}^n : m, n \geq 1\}.$$

$\#_{\mathtt{ab}}(w)$ を語 w の因子 $\mathtt{ab}$ の出現数とする．$\varphi_\times$ は $\mathtt{1},\mathtt{3},\mathtt{2},\mathtt{4}$ をそれぞれ $(1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1) \in \mathbb{Z}^2$ へ，ほかの文字を $(0,0)$ へ送る加法的準同型とする．

補題 6.9 (旗文字による分離)**.** 有限型付け t について $t(u) = t(v)$ となる非空語 u, v と語 z があり，$\mathtt{r}uz, \mathtt{r}vz, \mathtt{l}uz \in L$ で $\mathtt{l}vz \notin L$ なら，すべての $f \geq 1$ について $L \notin \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$ である．

証明. u, v は $E = \mathtt{r}\square_1 z$ を共有するが，$F = \mathtt{l}\square_1 z$ では受理が異なる．アリティ 1 の分布同値が破れるので任意の f で成り立つ． □

■局所群型付けの必要性． $\Sigma_{\mathrm{A}} = \{\mathtt{l},\mathtt{r},\mathtt{a},\mathtt{b},\mathtt{c},\$,\mathtt{1},\mathtt{2},\mathtt{3},\mathtt{4}\}$ とし，

$$L_{\mathrm{A}} = \{\sigma w\$c : \sigma \in \{\mathtt{l},\mathtt{r}\},\ w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b},\mathtt{c}\}^+,\ c \in C_\times,\ (\sigma = \mathtt{r} \text{ または } \#_{\mathtt{ab}}(w)\text{が偶数})\}.$$

$s_{\mathrm{A}} = \lambda_{1,g}|_{\Sigma_{\mathrm{A}}^+}$ とし，$g : \Sigma_{\mathrm{A}}^2 \to \mathbb{Z}_2$ は $\mathtt{ab}$ を 1，他を 0 へ写す．すなわち s_{A} は両端の文字と $\mathtt{ab}$ 出現数の偶奇を記録する．

命題 6.10 (局所群型付けと窓・群型付けを分離する標的)**.** (i) $L_{\mathrm{A}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}$.

(ii) $L_{\mathrm{A}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{\mathrm{A}}}$ $(f \geq 2)$，かつ $s_{\mathrm{A}}(\Sigma_{\mathrm{A}}^+) \in \mathbf{LG}$.

(iii) 任意の有限型付け $t : \Sigma_{\mathrm{A}}^+ \to T$ について，ある k, ℓ と有限群への準同型 $g' : \Sigma_{\mathrm{A}}^* \to A'$ が存在して $t \preceq (s_{k,\ell}, g'|_{\Sigma_{\mathrm{A}}^+})$ を満たすなら，すべての $f \geq 1$ で $L_{\mathrm{A}} \notin \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$ である．特に正語像が $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ に属する任意の型付け t でこの非所属が成り立つ．

したがって L_{A} には定理 *4.20* が適用できる一方，どの型付けを選んでも定理 *4.7*, *4.15*, *4.16* および系 *4.18* は適用できない．特に $s_{\mathrm{A}}(\Sigma_{\mathrm{A}}^+) \in \mathbf{LG} \setminus (\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp})$ である．

証明. (i) 正則言語

$$R_{\mathrm{A}} = \{\sigma w : \sigma \in \{\mathtt{l},\mathtt{r}\}, w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b},\mathtt{c}\}^+,\ \sigma = \mathtt{r} \text{ または } \#_{\mathtt{ab}}(w)\text{が偶数}\}$$

の右線形文法を W とする．次のファンアウト 2・ランク 2 の規則を追加する．

$$\begin{aligned} C &\to (\xi_1^1\$\mathtt{1}, \mathtt{3})(W) \mid (\xi_1^1\mathtt{1}, \xi_1^2\mathtt{3})(C), \\ D &\to (\mathtt{2},\mathtt{4}) \mid (\xi_1^1\mathtt{2}, \xi_1^2\mathtt{4})(D), \\ S &\to (\xi_1^1\xi_2^1\xi_1^2\xi_2^2)(C, D). \end{aligned}$$

これで L_{A} を生成できる．正則集合 $\mathtt{ra}\$\mathtt{1}^+\mathtt{2}^+\mathtt{3}^+\mathtt{4}^+$ との交差後に先頭記号を消去すれば非 CFL の $C_\times$ を得るため，L_{A} も非 CFL である．

(ii) $L_{\mathrm{A}} = Q_{\mathrm{A}} \cap \Pi_{\mathrm{A}} \cap \varphi_\times^{-1}(0)$ と書く．$Q_{\mathrm{A}} = \{\mathtt{l},\mathtt{r}\}\{\mathtt{a},\mathtt{b},\mathtt{c}\}^+\$\mathtt{1}^+\mathtt{2}^+\mathtt{3}^+\mathtt{4}^+$ は，語頭・語尾も含めた strictly 2-local 言語である．補題 6.2 から $(f, s_{1,1})$-タプル代入可能であり，$s_{1,1} \preceq s_{\mathrm{A}}$ なので

(f, s_{A}) でも代入可能である．Π_{A} を「先頭が $\mathtt{r}$，または先頭が $\mathtt{l}$ で $\#_{\mathtt{ab}}$ が偶数」の言語とすると，これは $\widehat{s}_{\mathrm{A}}$ の型繊維の和集合である．$\varphi_{\times}^{-1}(0)$ との交差は命題 2.11 で代入可能性を保つ．よって (ii) が従い，正語像が **LG** に属することは定理 付録 B.4 から従う．

(iii) 窓幅 k, ℓ と群準同型 $g' : \Sigma_{\mathrm{A}}^{*} \to A'$ を任意に取る．$K = \max\{1, k, \ell\}$，q を A' の指数の正の偶数倍として

$$u = \mathtt{a}^K(\mathtt{abc})^q\mathtt{a}^K, \qquad v = \mathtt{a}^K(\mathtt{bac})^q\mathtt{a}^K$$

とする．前後の境界は一致し，$g'(u) = g'(\mathtt{a})^{2K} = g'(v)$ である．しかし $\#_{\mathtt{ab}}(u) = q$ は偶数で，$\#_{\mathtt{ab}}(v) = 1$ は奇数である．$z = \$\mathtt{1234}$ として $\mathtt{r}uz, \mathtt{r}vz, \mathtt{l}uz \in L_{\mathrm{A}}$，$\mathtt{l}vz \notin L_{\mathrm{A}}$ であるから，補題 6.9 が適用できる．$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ の型付けは補題 4.17 により窓・群型付けで決定されるので，主張が従う． □

■非可換群型付けの必要性． $\Sigma_{\mathrm{B}} = \{\mathtt{l}, \mathtt{r}, \mathtt{a}, \mathtt{b}, \$, 1, 2, 3, 4\}$，$\alpha = (12), \beta = (23) \in S_3$ とする．$g_{\mathrm{B}}(\mathtt{a}) = \alpha$，$g_{\mathrm{B}}(\mathtt{b}) = \beta$，それ以外の文字には単位元を対応させる．

$$L_{\mathrm{B}} = \{\sigma w \$ c : \sigma \in \{\mathtt{l}, \mathtt{r}\},\ w \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^{+},\ c \in C_{\times},\ (\sigma = \mathtt{r} \text{ または } g_{\mathrm{B}}(w) = 1)\}.$$

$s_{\mathrm{B}} = (s_{1,1}, g_{\mathrm{B}})$ を正語像に制限する．

命題 6.11 (窓・非可換群型付けと窓・可換群型付けを分離する標的)**.** (i) $L_{\mathrm{B}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}$.

(ii) 任意の $f \geq 2$ で $L_{\mathrm{B}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f, s_{\mathrm{B}}}$ である．s_{B} は有限非可換群 S_3 を用いる窓・群決定型付けである．

(iii) 任意の有限型付け $t : \Sigma_{\mathrm{B}}^{+} \to T$ について，ある k, ℓ と有限アーベル群への準同型 $g' : \Sigma_{\mathrm{B}}^{*} \to A'$ が存在し，$t \preceq (s_{k,\ell}, g'|_{\Sigma_{\mathrm{B}}^{+}})$ なら，すべての $f \geq 1$ で $L_{\mathrm{B}} \notin \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$ である．特に正語像が $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Ab}$ に属する任意の t についても同様である．

したがって L_{B} には非可換群の定数 $c_{S_3,f} = M_{S_3,f} - 1$ を用いて定理 *4.15* を適用できるが，定理 *4.7* と *4.16* は，どの型付けの選択でも適用できない．

証明. (i) S_3 の値を有限状態で追う右線形文法を上の W の代わりに使うと，同じ MCFG で生成できる．同じ正則交差と準同型で非 CFL 性を得る．(ii) 構造を指定する strictly 2-local 言語，旗文字と g_{B} の型繊維の和集合，および $\varphi_{\times}^{-1}(0)$ の交差として表せる．補題 6.2 と命題 2.11 から代入可能性が従う．(iii) 任意の可換群準同型と窓幅 k, ℓ を取り，$K \geq \max\{1, k, \ell\}$ を偶数として

$$u = \mathtt{a}^K(\mathtt{ab})^3\mathtt{a}^K, \qquad v = \mathtt{a}^K(\mathtt{ab})^2(\mathtt{ba})\mathtt{a}^K$$

を取る．両語は Parikh ベクトルと前後境界が一致するので任意の窓・可換群型付けでは同じ型となる．しかし $p = \alpha\beta$ は位数 3，$\beta\alpha = p^{-1}$ なので

$$g_{\mathrm{B}}(u) = p^3 = 1, \qquad g_{\mathrm{B}}(v) = p^2 p^{-1} = p \neq 1.$$

$z = \$\mathtt{1234}$ とした旗文字分離補題で非所属を得る．$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Ab}$ の型付けも窓・可換群型付けで決定される． □

備考 6.12 (二つの分離例が示すこと). 命題 6.10 と 6.11 が分離するのは**型付けクラス**である．局所群短縮や非可換群短縮が，これらの標的の多項式特徴データに不可欠とは主張しない．実際，正則言

語 Q_{A} の構文的準同型の正語制限を σ_{Q} とし，正語像上で $s' = (s_{\mathrm{A}}, \sigma_{\mathrm{Q}})$ と置く．$Q_{\mathrm{A}} \cap \Pi_{\mathrm{A}}$ は $\widehat{s'}$ で認識されるため，ある受理集合 Acc' について

$$L_{\mathrm{A}} = \widehat{s'}^{-1}(\mathsf{Acc}') \cap \varphi_{\times}^{-1}(0)$$

と書ける．$s_{\mathrm{A}} \preceq s'$ なので $L_{\mathrm{A}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s'}$ であり，命題 6.10(i) の文法と定理 5.7 により，s' の代数構造に仮定を課さなくても $\mathcal{B}^{\leq 2}_{f,s'}$ の多項式特徴データが得られる．L_{B} でも同様である．しかも分離はアリティ 1 で起こる（補題 6.9）．交差依存部 $C_{\times}$ は標的を非 CFL にする役割を担うが，型付け依存部は単一成分にある．両例は特徴標本長の下界を与えない．

6.3 内在的に規則ランク 2 を必要とする境界型付き標的

次の例は，ランク 1 と高ランクの定量的場合分けが，文法表示の偶然ではなく言語自体に内在することを示す．この規則ランクの障害は有限型付けによって作られたものではない．以下で用いる文字数平衡の因子は，既に Yoshinaka の自明型付けクラスに属する．本構成では，その障害を，最小ファンアウト 2 という性質と，自明型付けクラスからの分離と組み合わせ，一つの境界型付き標的に実現する．

$$\Sigma_{\mathrm{intr}} := \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{l}, \mathtt{r}, \mathtt{p}, \mathtt{q}, \mathtt{c}, \mathtt{d}, \#, \$, \mathtt{u}, \mathtt{v}, \mathtt{w}\}$$

とし，$P_{\mathrm{intr}} := \{\mathtt{lpc}, \mathtt{lpd}, \mathtt{lqc}, \mathtt{rpc}, \mathtt{rpd}\}$ とおく．以下，この小節での境界型付け $s_{1,1}$ は，定義 2.6 において $\Sigma = \Sigma_{\mathrm{intr}}$ とした正語制限 $s_{1,1} = \widehat{s}_{1,1}|_{\Sigma^+_{\mathrm{intr}}}$ を指す．

$$\mathrm{MIX}_2^+ := \{x \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^+ : |x|_{\mathtt{a}} = |x|_{\mathtt{b}}\}, \qquad T_3^+ := \{\mathtt{u}^n \mathtt{v}^n \mathtt{w}^n : n \geq 1\}$$

と定め，$L_{\mathrm{intr}} := P_{\mathrm{intr}} \# \mathrm{MIX}_2^+ \$ T_3^+$ とする．

証拠言語の役割を明確にするため，

$$\varphi_{\mathrm{mix}} : \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^* \to \mathbb{Z}, \qquad \varphi_{\mathrm{mix}}(\mathtt{a}) = 1, \quad \varphi_{\mathrm{mix}}(\mathtt{b}) = -1$$

とおく．すると $\mathrm{MIX}_2^+ = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^+ \cap \varphi_{\mathrm{mix}}^{-1}(0)$ である．$\{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^+$ は自明に f-タプル代入可能なので，命題 2.11(ii) からすべての $f \geq 1$ について $\mathrm{MIX}_2^+ \in \mathsf{YSub}(f)$ が従う．後述の B に対するランク 2 の CFG は，この因子が文脈自由であることも示す．したがって，ここで用いる内在的ランク 2 の現象自体は，すでに自明型付けの基準クラスに存在する．L_{intr} の役割は，この既知のランク障害を，非文脈自由性，最小ファンアウト 2，および $\mathsf{YSub}(f)$ からの分離と，単一の有限型付き標的の中で組み合わせることである．

補題 6.13 (規則ランク 1 の MCFG から有限指数 EDT0L への包含)**.** 任意の有限ファンアウト上限 f' について，$\mathsf{MCFL}(f', 1)$ に属する言語は，指数が高々 f' の有限指数 *EDT0L* で生成できる．

証明. 規則ランク 1 の文法 H から到達不能・非生産的記号を除く．非終端記号 B の第 j 成分を表す記号 $[B, j]$ を導入し，開始語を $[S, 1]$ とする．規則 $A \to \rho(B)$ ごとに決定的 table を一つ設け，すべての $[A, j]$ を ρ の第 j 成分で同時に置き換える．子変数 ξ_1^k は $[B, k]$ に写し，その他の記号と終端文字は固定する．規則ランク 0 の場合は終端文字のみからなる右辺を用いる．規則ランクが高々 1 かつ線形なので，各段階の活動中の非終端成分は単一の非終端記号に属し，各成分の記号は高々一回し

か現れない．従って活動中の記号数は常に f' 以下である．元の導出の各規則選択は table の選択列に対応する．逆に成功する table 列は一つの活動非終端に作用するので，消去された成分に必要なら生産的導出を補えば元の MCFG の正当な導出を復元でき，終端語は一致する．ゆえに生成言語が等しい有限指数 EDT0L 表示を得る． □

定理 6.14 (非文脈自由で内在的ランク 2 をもつ型付き証拠言語)**.** 言語 L_{intr} は $L_{\mathrm{intr}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}$ を満たす．さらに，任意の $f \geq 2$ について $L_{\mathrm{intr}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}} \setminus \mathsf{YSub}(f)$ となる．また，任意の有限 $f' \geq 1$ について $L_{\mathrm{intr}} \notin \mathsf{MCFL}(f',1)$ である．したがって L_{intr} の最小ファンアウトは正確に *2* であり，任意の有限ファンアウトの *MCFG* 表示全体での最小規則ランクも正確に *2* である．特に，定理 *4.7* は，どの有限ファンアウトでも定理 *5.1* の対象とならない非文脈自由言語に適用できる．

証明. まず最大規則ランク 2 の，縮約済み良形のファンアウト 2 文法を与える．非終端記号 B は，次の規則によって非空の文字数平衡言語を生成する．

$$B \to \mathtt{a}B\mathtt{b}B \mid \mathtt{b}B\mathtt{a}B \mid \mathtt{a}B\mathtt{b} \mid \mathtt{ab}B \mid \mathtt{ab} \\ \mid \mathtt{b}B\mathtt{a} \mid \mathtt{ba}B \mid \mathtt{ba}.$$

$|x|_{\mathtt{a}} - |x|_{\mathtt{b}}$ が初めて 0 に戻る位置による通常の帰納法から $L_B = \mathrm{MIX}_2^+$ が従う．

ファンアウト 2 の非終端記号 A に $A \to (\mathtt{u},\mathtt{w}) \mid (\mathtt{u}\xi_1^1\mathtt{v},\mathtt{w}\xi_1^2)(A)$ という規則を与える．生成するタプルは正確に $\{(\mathtt{u}^n\mathtt{v}^{n-1},\mathtt{w}^n) : n \geq 1\}$ である．各 $\alpha \in P_{\mathrm{intr}}$ について，開始規則 $S \to \alpha\#\xi_1^1\$\xi_2^1\mathtt{v}\xi_2^2(B,A)$ を加える．得られた文法は正確に L_{intr} を生成する．この文法は縮約済みで，λ-自由，線形，非消去，非置換である．またすべての開始規則で，A の二つの成分は終端記号 $\mathtt{v}$ により分離されるため，非融合でもある．よって最大規則ランク 2 の良形ファンアウト 2 文法である．

この言語は文脈自由でない．正則言語 $R := \mathtt{lpc}\#\mathtt{ab}\$\,\mathtt{u}^+\mathtt{v}^+\mathtt{w}^+$ と交差を取ると $L_{\mathrm{intr}} \cap R = \{\mathtt{lpc}\#\mathtt{ab}\$\mathtt{u}^n\mathtt{v}^n\mathtt{w}^n : n \geq 1\}$ となる．固定接頭辞を消去し，$\mathtt{u},\mathtt{v},\mathtt{w}$ を固定する準同型で，この言語は $\{\mathtt{u}^n\mathtt{v}^n\mathtt{w}^n : n \geq 1\}$ に写る．後者は文脈自由でない．文脈自由言語が正則言語との交差と準同型像で閉じていることから，L_{intr} は文脈自由でない．本稿の構文でファンアウト 1 の MCFG はちょうど文脈自由文法であり，上の文法はファンアウト 2 なので，最小ファンアウトは正確に 2 である．

型付きクラスへの所属については，

$$Q_{\mathrm{intr}} := P_{\mathrm{intr}} \,\#\, \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^+ \,\$\, \mathtt{u}^+\mathtt{v}^+\mathtt{w}^+$$

とおく．この言語は厳密 2 局所（strictly 2-local）である．両端の標識も含めた，許容する隣接対の完全な集合の一つは

$$\vdash \mathtt{l},\ \vdash \mathtt{r},\quad \mathtt{lp},\ \mathtt{lq},\ \mathtt{rp},\quad \mathtt{pc},\ \mathtt{pd},\ \mathtt{qc},$$
$$\mathtt{c}\#,\ \mathtt{d}\#,\quad \#\mathtt{a},\ \#\mathtt{b},\quad \mathtt{aa},\ \mathtt{ab},\ \mathtt{ba},\ \mathtt{bb},$$
$$\mathtt{a}\$,\ \mathtt{b}\$,\quad \$\mathtt{u},\quad \mathtt{uu},\ \mathtt{uv},\ \mathtt{vv},\ \mathtt{vw},\ \mathtt{ww},\quad \mathtt{w} \dashv$$

である．準同型 $\Phi_{\mathrm{intr}} : \Sigma_{\mathrm{intr}}^* \to \mathbb{Z}^3$ を

$$\Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{a}) = (1,0,0),\quad \Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{b}) = (-1,0,0),$$
$$\Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{u}) = (0,1,0),\quad \Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{v}) = (0,-1,1),\quad \Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{w}) = (0,0,-1)$$

と定め，他のすべての終端記号の像を $(0,0,0)$ とする．すると $L_{\mathrm{intr}} = Q_{\mathrm{intr}} \cap \Phi_{\mathrm{intr}}^{-1}(0)$ となる．実際，3 座標の制約は順に

$$|x|_{\mathtt{a}} = |x|_{\mathtt{b}}, \qquad |x|_{\mathtt{u}} = |x|_{\mathtt{v}}, \qquad |x|_{\mathtt{v}} = |x|_{\mathtt{w}}$$

を課す．補題 6.2 と命題 2.11(ii) から，この交差言語は任意の $f \geq 1$ について $(f, s_{1,1})$-タプル代入可能である．上のファンアウト 2 文法と合わせて $L_{\mathrm{intr}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}} \quad (f \geq 2)$ が得られる．

この言語は，アリティ 1 においてすでに Yoshinaka の自明型付けクラスに属さない．$x := \mathtt{p}$, $y := \mathtt{q}$ および一穴文脈 $E := \mathtt{l}\Box_1\mathtt{c}\#\mathtt{ab}\$\mathtt{uvw}$, $F := \mathtt{r}\Box_1\mathtt{d}\#\mathtt{ab}\$\mathtt{uvw}$ を取る．すると $E[x],\ E[y],\ F[x] \in L_{\mathrm{intr}}$, $F[y] \notin L_{\mathrm{intr}}$ である．よってアリティ 1 の代入の含意が破れ，任意の $f \geq 1$ に対して $L_{\mathrm{intr}} \notin \mathsf{YSub}(f)$ となる．なお，問題となる一文字因子は境界型付けで区別される：$s_{1,1}(\mathtt{p}) \neq s_{1,1}(\mathtt{q})$.

残るのは内在的な規則ランクの証明である．$\mathrm{MIX}_2 := \{x \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^* : |x|_{\mathtt{a}} = |x|_{\mathtt{b}}\}$ とおく．補題 6.13 により，任意の有限ファンアウトの規則ランク 1 の MCFG 言語は有限指数 EDT0L，したがって EDT0L である．これは Gallot の非分岐文法に関する特徴づけ [21, Definition 38, Theorems 28–29] の必要な方向を直接構成したものである．一方，Bishop らは無限巡回群 $\mathbb{Z}$ の語問題 MIX_2 が EDT0L でないことを示した [22, Theorem C].

ここで π を $\mathtt{a},\mathtt{b}$ を固定し，Σ_{intr} の他のすべての終端記号を消去する準同型とする．すると $\pi(L_{\mathrm{intr}}) = \mathrm{MIX}_2^+$ となる．仮に L_{intr} にファンアウト f'・規則ランク 1 の表示があれば，その規則テンプレートの終端部分へ π を適用することで，ファンアウトと規則ランクを保存した MIX_2^+ の表示を得る．消去によって空の終端部分が生じても，標準 MCFG 形式では許される．さらに新しい開始記号を加え，旧開始記号への単項恒等リンクと ε を生成するランク 0 規則を設ければ，ファンアウト f'・規則ランク 1 の MIX_2 の表示が得られる．これは補題 6.13 と Bishop らの非 EDT0L 定理に矛盾する．したがって任意の有限 $f' \geq 1$ について $L_{\mathrm{intr}} \notin \mathsf{MCFL}(f', 1)$ である．上のランク 2 文法と合わせて，主張した内在的規則ランクが証明された． □

この構成は意図的にモジュール化されている．MIX_2^+ 因子が規則ランク 1 への障害を担い，T_3^+ 因子が文脈自由性を破り，最小ファンアウト 2 を強制する．したがって本定理は，二つの下界が一つの有限型付き標的で同時に成り立つことを示す．両下界は，二つの文法資源の不可分な相互作用ではなく，別々の因子に由来する．

非分岐性の下界そのものは先行結果である．本稿固有の点は，厳密局所的な外側の形式と $(1,1)$-境界型付けによって，この標的を型付きクラスに含めながら，表示した四例の代入の含意によって Yoshinaka の自明型付けクラスから分離することである．外側の形式は既知の非分岐障害を保存するので，同じ標的はあらゆる有限ファンアウトにわたって内在的に規則ランク 2 を必要とする．

7 結論

本稿は，固定有限半群型付けの下での MCFG 正例学習について，既知の質的学習原理を文法表示に相対的な特徴標本の**符号化総長**上界へと発展させた．縮約済み良形文法に対し，窓型と窓・有限群型では非可換群と交錯タプル成分を含めて $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$，正語像が局所群なら $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ を示した．後者では既知の sliding-factor 座標と MCFG の順序付きブロック分解・同時短縮を組み合わせる．任意の標準 MCFG 入力については成分パターン厚さを使って正規化後へ上界を移送し，規則ランク 1 については全ての固定型付けで多項式上界を得た．精密化厚さの二分法（系 4.21）は，完全生成語型精密化の厚さが一様に多項式となる正確な代数的境界が任意ファンアウトで **LG** であることを示す．しかし，これは特徴データ長の必要条件を証明するものではない．命題 6.3 の素性適合付き交差依存例は，境界窓だけでは型なしの不正な置換を防げない非 CFL 標的である．系 6.5 と命

題 6.6 は，同じ事前型付けを共有する標的族とその明示的特徴データ予算を与える．これらの結果のために関連 CFG 論文の下界構成や分離族を利用する必要はない．

未解決問題 7.1 (高ファンアウトの特徴データ長)．$f \geq 2$ を固定する．正語像が $\mathbf{LG}$ に属さない固定有限半群型付け s であっても，$\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ の全ての標的が，元の縮約済み良形・規則ランク有界表示の文法サイズと規則厚さに関して，多項式総長の特徴データを持つ場合はあるか．逆に，2 元半束 U_1 への型付けだけですでに高ファンアウトの超多項式特徴データ下界を強制できるか．系 4.21 は同様の**精密化厚さ**問題を解くが，特徴データについての二つの問いには答えない．

残る中心的な問題は，高アリティの分布的制約を任意の固定有限半群に対する短い型付き代表へ変換できるか，それとも固定型付けの反例が存在するかという点である．

謝辞

著者は有益な議論と励ましに対し，金澤誠氏および吉仲亮氏に感謝する．

利益相反に関する申告

著者は本研究に影響を及ぼしたと見られ得る金銭的利益関係または個人的関係を認識していない．

研究資金

本研究は公的・商業・非営利の助成機関から特定の研究助成を受けていない．

データ利用可能性

本理論研究には対応する実験データセットがない．

付録 A　有限群での同時ブロック置換の詳細

■半群型付けの規約． 群 A および群への準同型は短縮証明の補助的不変量である．意味論上の型付けは窓・群積（または局所群型付け）の正語像半群であり，テンプレート内の空因子の評価には新単位元添加を用いる．補題 付録 E.1 によって正の長さのタプルの比較，ならびに今回の特徴正例標本の性質は変化しない．

本節では定理 4.12 および補題 付録 B.6 に共通する群論的命題を証明する．可換な場合は零和部分列を用い，非可換な場合はブロックの相対順序を均質化する．

定義 付録 A.1 (ブロック置換族)**.** 有限群 A と $f \geq 1$ に対し，幅 f，添字集合 $[m]$ の**ブロック置換族**は，$d \leq f$ 本の**列**からなる．列 c には左から右へ $\beta_{c,1}, \ldots, \beta_{c,q_c}$ というブロックと群定数 $a_{c,0}, \ldots, a_{c,q_c} \in A$ を並べる．各ブロック β は所有者 $o(\beta) \in [m]$，元の値 $x_\beta \in A$ および置換後の値

$x'_\beta \in A$ をもち，各所有者の全列にわたる所有ブロック数は高々 f である．$J \subseteq [m]$ について

$$\mathrm{val}_c(J) = a_{c,0} y_{c,1} a_{c,1} \cdots y_{c,q_c} a_{c,q_c}, \qquad y_{c,j} = \begin{cases} x'_{\beta_{c,j}}, & o(\beta_{c,j}) \in J, \\ x_{\beta_{c,j}}, & o(\beta_{c,j}) \notin J \end{cases}$$

と定める．積の順序は固定し，群の可換性は仮定しない．

補題 付録 A.2 (同時ブロック置換)**.** 幅 f のブロック置換族について，*(a)* A が可換で $m > \mathsf{d}(A^f)$，または *(b)* A が任意の有限群で $m \geq M_{A,f}$ なら，非空集合 $J \subseteq [m]$ が存在し，全列 c に対して $\mathrm{val}_c(J) = \mathrm{val}_c(\emptyset)$ が成立する．定数 $\mathsf{d}(A^f)$ と $M_{A,f}$ は *4.4* 節で定義したものを用いる．

■可換群の場合：零和部分列

補題 付録 *A.2(a)* の証明. A を加法的に書く．$\delta_{i,c}$ を列 c のうち所有者 i に属する全ブロックの差 $x'_\beta - x_\beta$ の和とし，$\delta_i = (\delta_{i,c})_c \in A^d$ とおく．群が可換であるから $\mathrm{val}_c(J) - \mathrm{val}_c(\emptyset) = \sum_{i \in J} \delta_{i,c}$ である．$d \leq f$ から $\mathsf{d}(A^d) \leq \mathsf{d}(A^f)$ である．$m > \mathsf{d}(A^f)$ なら列 $(\delta_i)_{i=1}^m$ は非空の零和部分列をもつので，該当する所有者集合 J が全列の群値を同時に保存する． □

備考 付録 A.3 (零和定数の大きさ). 接頭部分和に対する鳩の巣論法から $\mathsf{d}(A^f) \leq |A|^f - 1$ が従う．したがって補題 4.12 は，連続部分和から得られる上界より弱くなることはなく，通常ははるかに強い．$A \cong C_{n_1} \oplus \cdots \oplus C_{n_s}$，$n = \exp(A) \geq 2$ と書くと

$$f \sum_{i=1}^{s} (n_i - 1) \;\leq\; \mathsf{d}(A^f) \;\leq\; (n-1) + n \log \frac{|A|^f}{n}$$

が成り立つ．下界は基底からなる列で達成され，上界は van Emde Boas と Kruyswijk による [33, Proposition 5.1.8, Theorem 5.5.5]．A が p-群なら下界は等号で成り立つ（Olson の定理 [33, Theorem 5.5.9]）．よって $\mathsf{d}(A^f) = O(\exp(A)\, f \log |A|)$ はファンアウト上限について線形に増え，$|A|^f - 1$ の指数的増加と対照的である．$A = C_2$ では反鎖の上界は $2^f - 1$ から f に下がる．

また $\mathsf{d}(A^d)$ は，ここで述べた反鎖の段階の限界でもある．この段階が用いるのは，差分ベクトル δ_i が非空の零和部分列をもたないという事実だけであり，長さ $\mathsf{d}(A^d)$ の零和自由列は存在する．ただし，そのような極端な配置を実現する文法が存在するとは主張しない．

■一般有限群の場合：順序均質化

補題 *4.10* の証明. (ii) で $t = u$ と置くと，各型の点列は単調である．相異なる型 t, u に対し，$i < j$ のときの $(t,i) < (u,j)$ を X，$(u,i) < (t,j)$ を Y と書く．(ii) より真偽は添字対に依存しない．両型が昇順のとき，$X \wedge Y$ ならランク i の両型の点がランク $j > i$ の両型の点よりすべて左にある．$X \wedge \neg Y$，$\neg X \wedge Y$ では一方の型の全点が他方の全点より左にある．$\neg X \wedge \neg Y$ なら $(t,1) < (t,2) < (u,1) < (u,2) < (t,1)$ という矛盾が生じる．t が昇順，u が降順のとき，$X \wedge Y$ なら $(t,2) < (u,3) < (u,1) < (t,2)$，$\neg X \wedge \neg Y$ なら $(t,3) < (u,2) < (t,1) < (t,3)$ となって矛盾する．$X \wedge \neg Y$ なら異添字の点はすべて t が左にあり，同添字で逆の比較があると $(t,1) < (u,2) < (u,1) < (t,1)$ と矛盾する（(i) を用いた）．したがって全 t-点は全 u-点の左にある．$\neg X \wedge Y$ も対称的に処理できる．両型が降順の場合は添字順を反転して昇順の場合に帰着する．ゆえに二型は，全点が分離しているか，同じ向きでランクごとに交互配置されている．

交互配置関係は推移的である．t と u，u と v が交互配置なら三型は同方向である．添字を必要に応じて反転し昇順とする．t と v が分離し，t が左なら $(v,1)<(u,2)<(t,3)<(v,1)$ と矛盾する．逆に v が左なら $(t,1)<(u,2)<(v,3)<(t,1)$ と矛盾する．したがって交互配置関係に等号を加えると同値関係となる．あるクラスの外の型は，クラス内のすべての型と分離しており，それらのすべてに対し同じ側に位置する．異なる側に位置すれば，クラス内の二つの交互配置型が互いに分離してしまうからである．よってクラス領域は連続する．ランク間の順序関係がチャンクの連続性を与え，(i) が各チャンク内の順序を与える． □

補題 *4.11* の証明. 補題 4.10 を各根成分に適用する．全根成分を通じたクラス領域数は $q\le f$ である．一つのクラス領域 K を考え，チャンクを左から $1,\dots,n$ と番号付けする．ブロック間にある不変の材料も領域の値に含める．チャンク p の末尾までの元の群積を P_p，チャンク $1,\dots,p$ だけを置換した場合の同じ接頭部分の群積を Q_p とし，$P_0=Q_0=1_A$ と置く．$\kappa_p^K=P_pQ_p^{-1}$ と定義する．チャンク $p+1,\dots,p'$ のみを置換した領域全体の積は，積の順序を維持すると $P_p\,Q_p^{-1}Q_{p'}\,P_{p'}^{-1}P_n$ となる．実際，$Q_p^{-1}Q_{p'}$ が置換後の該当区間の積であり，$P_{p'}^{-1}P_n$ が変更されない後続部分の積である．したがって $\kappa_p^K=\kappa_{p'}^K$ なら領域全体の値は元の P_n に等しい．ここでは逆元しか使わず，積の交換は行っていない．

クラス K の方向が昇順なら添字区間 $(a,b]$ はチャンク区間 $(a,b]$ に対応し，降順なら $(n-b,n-a]$ に対応する．$j=0,\dots,n$ について，昇順クラスから κ_j^K，降順クラスから κ_{n-j}^K を集めて A^q の状態を作る．$n+1>|A|^q$ なので，状態が一致する $a<b$ が存在する．添字 $a+1,\dots,b$ を同時置換するとすべてのクラス領域の群積が保存される．領域外の材料は不変なので，すべての根成分の群値が保存される． □

例 付録 A.4 (非可換群での逆順成分と同時置換)．これは数値的な鳩の巣上界ではなく，**境界状態の一致**を実際に示す有限例である．非可換群 $A=S_3$ で $\alpha=(12)$，$\beta=(23)$ と置く．$\alpha^2=\beta^2=1$ だが $\alpha\beta\neq\beta\alpha$ である．所有者 $i=1,2,3$ のブロックを 1 行目の U_i,V_i と 2 行目の W_i とする．固定群値を明示すると出力は

$$\begin{aligned}&\text{第 1 行:}\quad (U_1\,\beta\,V_1)\,\alpha\,(U_2\,\beta\,V_2)\,\alpha\,(U_3\,\beta\,V_3),\\&\text{第 2 行:}\quad W_3\,\beta\,W_2\,\beta\,W_1.\end{aligned}$$

第 1 行では所有者の順序が昇順，第 2 行では降順である．元のブロック値を全ての i について $U_i=\beta$，$V_i=W_i=1$ とすれば，両行の積は 1 となる．次に所有者 $J=\{2,3\}$ だけを置換する：

i	U_i'	V_i'	W_i'	置換
1	β	1	1	なし
2	1	1	$\beta\alpha\beta$	あり
3	$\alpha\beta\alpha\beta$	1	α	あり

新しい第 1 行の積は $1\cdot\alpha\cdot\beta\cdot\alpha\cdot(\alpha\beta\alpha)=1$，逆順の第 2 行の積も $\alpha\cdot\beta\cdot(\beta\alpha\beta)\cdot\beta\cdot1=1$ となる．途中で $\alpha\beta$ と $\beta\alpha$ を交換していない．所有者の区間 $(a,b]=(1,3]$ は，昇順領域では $\kappa_1=\kappa_3=1$，降順領域では $\kappa_{3-b}=\kappa_0=\kappa_2=\kappa_{3-a}=1$ を満たす．同じ所有者区間が向きの異なる境界状態を一致させる．置換した個々の所有者の寄与が不変である必要はなく，**全行の積**がそれぞれ保存されることが本質である．

補題 付録 A.5 (順序の多項式的均質化)**.** $N\ge3$ とし，$m_0=N$，$m_{s+1}=(m_s-1)^2+1$ と定める．このとき $m_k\le N^{2^k}$ である．T を点の型の有限集合とし，各型はいくつかの直線のいずれかに

割り当てられているとする．各添字 $i \in [n]$ と $t \in T$ について，$p_t(i)$ を t の直線上の点とし，各直線上の点は相異なるとする．共通の直線上にある型の順序対 (t,u)（$t=u$ を含む）全体を Π とし，$k=|\Pi|$ と置く．$n \geq m_k$ なら，N 個の添字からなる集合 $I \subseteq [n]$ で，各 $(t,u) \in \Pi$ について $p_t(i) < p_u(j)$ の真偽が I 内のすべての $i<j$ で一定となるものが存在する．

証明. 順序対を一つずつ処理し，(t,t) の形の対を先に扱う．各段階では，大きさ $(m-1)^2+1$ 以上の現在の添字集合から，大きさ m 以上の部分集合に移る．既に得た均質性と各型の単調性は部分集合に引き継がれる．

(t,t) について均質性とは，p_t がその部分集合上で単調であることである．Erdős–Szekeres の定理により長さ m の単調部分列が取れる．

$t \neq u$ のときは，p_t と p_u はともに既に単調である．現在の添字を順に $1,\dots,m'$ と付け直す．ただし $m' \geq (m-1)^2+1$ である．$i<j$ に対し $X(i,j)=[p_t(i)<p_u(j)]$ と置く．各行 $X(i,\cdot)$ は j について単調であり，各列 $X(\cdot,j)$ は i について単調である．必要なら X を $1-X$ に置き換えて，行が 0 から 1 へ変わると仮定してよい．これはどの集合が均質かを変えない．

列が 1 から 0 へ変わる場合，$J(i)=\min\{j>i : X(i,j)=1\}$（そのような j がなければ $J(i)=\infty$）と置く．J は非減少である．$i_1=1$ とし，m' 以下である限り $i_{s+1}=J(i_s)$ と定める．$a<b$ なら $i_b \geq J(i_a)$ なので $X(i_a,i_b)=1$ である．この鎖が m 項以上あれば，最初の m 項でよい．m 項未満なら，高々 $m-1$ 個の項が $[m']$ を高々 $m-1$ 個の区間 $[i_s,i_{s+1})$ と $[i_L,m']$ に切り分け，いずれかの区間は $m'/(m-1)>m-1$ 個以上の添字を含む．$[i_s,i_{s+1})$ 内の $i<j$ は $j<i_{s+1}=J(i_s)\leq J(i)$ を満たすので $X(i,j)=0$ である．$J\equiv\infty$ となる最後の区間でも同じである．

列が 0 から 1 へ変わる場合，$X=1$ となる対の集合は両座標について上に閉じている．$X(\kappa,\kappa+1)=1$ となる最小の添字を κ とし，なければ $\kappa=m'$ とする．$\kappa \leq i<j$ なら $X(i,j)\geq X(\kappa,\kappa+1)=1$ であり，$i<j\leq\kappa$ なら $X(i,j)\leq X(j-1,j)=0$ である．$m\geq 3$ では $(m-1)^2+1\geq 2m-1$ なので，$[1,\kappa]$ と $[\kappa,m']$ のいずれかは $(m'+1)/2\geq m$ 個以上の添字を含む．

k 個の対をすべて処理すると，残る集合は $m_0=N$ 個以上の添字をもつ．最後に $m_{s+1}\leq m_s^2$ から $m_k\leq N^{2^k}$ が従う． □

補題 付録 *A.2(b)* の証明. ブロックを一つも所有しない添字があればその添字だけを選べばよい．以下では各添字が少なくとも一つのブロックを所有するとする．一つの所有者がもつブロック数・所属列・同一列内の順序で決まる**単項パターン**は高々 $f\cdot f^f\cdot f!=U_f$ 種類である．$m\geq M_{A,f}=U_f N_{A,f}^{2^{f^2}}$ なら，同一パターンの所有者が少なくとも $N_{A,f}^{2^{f^2}}$ 個存在する．それ以外の所有者のブロックは置換せずに定数へ吸収する．

共通パターンのブロックを型 $1,\dots,f'$（$f'\leq f$）とし，それぞれが置かれる列上の位置を点とみなす．同一列上の型の順序対（同型対を含む）は高々 f^2 個である．補題 付録 A.5 を $N=N_{A,f}=\max\{3,|A|^f\}$ として適用すると，同じパターンをもち，添字間比較がすべて均質な $N_{A,f}$ 個の所有者が得られる．これらについて補題 4.11 を適用すれば，各列の**順序付き**群積を同時に保存する非空の添字区間が存在する． □

定数 $M_{A,f}$ は f 固定では $|A|$ の多項式であり，従来版に現れた多色 Ramsey 上界より小さい．ただし f への依存は二重指数的に大きい．

付録 B　局所群座標と MCFG ブロック短縮の詳細

■正語像半群についての規約． この節の **LG** 条件は型付けの**正語像半群** $S = \widehat{s}(\Sigma^+)$ に課し，新単位元添加 $S^\sharp$ には課さない．群準同型とモノイド準同型は計算用の補助表示であり，意味論上の学習型は正語への制限である．補題 付録 E.1 により定量的証明と両立する．

節 付録 A，付録 A の窓・群型付けの正像は，有限局所自明半群と有限群の pseudovariety の join $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ に属する [25, Lemma 7.4]．ここでは，元文法の厚さによる多項式上界を，それより真に大きい**局所群**の pseudovariety **LG** に拡張する．**LG** は，冪等元 e ごとの局所モノイド eSe がすべて群となる有限半群 S の全体である．古典的には $\mathbf{LG} = \mathbf{Grp} * \mathbf{D}$ である [37, 38]．局所群性，最小イデアルの冪零拡大，および 2 元半束の不在の同値性は**既知**の結果である [36, Proposition 2.3]．定理 付録 B.4 はこの同値性を再掲し，MCFG の定量的評価に必要な窓と局所因子に沿った群積による型付けの特徴づけを追加する．特に **LG** は，2 元半束 $U_1 = \{1, \zeta\}$（$\zeta^2 = \zeta$）を含まない有限半群のクラスにちょうど一致する．この半束は，[25] の指数下界を与える型付けの正像である．この半束に由来する下界例はファンアウト 1 の文脈でのみ述べる．本稿の高ファンアウト上界に対する逆向きの特徴づけではない（系 4.21）．

この節を通じて，Σ は空でなく，$k \geq 1$，A は有限群とする．$|w| \geq k+1$ の語 w について，長さ $k+1$ の因子を開始位置の順に並べた列を $\sigma_k(w)$ と書く．

定義 4.19 の記法を用いる．

定義 2.6 で $\ell = k$ とすると，長さ $2k$ 未満の語は**短い**語としてそのまま記録され，**長い**語 w は $\langle \mathrm{pref}_k(w), \mathrm{suf}_k(w) \rangle$ として記録される．$s, p \in \Sigma^k$ に対し $J_\nu(s,p) := \prod_{i=1}^{k} \nu\big((sp)[i..i+k]\big)$ と書く．これは，sp の長さ $k+1$ の因子のうち s の中で始まる k 個についての順序つき積である．

補題 付録 B.1 (局所群型付けは準同型である)**.** $\lambda_{k,\nu}$ の核は Σ^* 上の有限指数の合同である．したがって $\lambda_{k,\nu}$ は有限モノイド $M_{k,\nu}$ への全射準同型である．長い u, v に対して

$$\lambda_{k,\nu}(uv) = \big(\langle \mathrm{pref}_k\, u, \mathrm{suf}_k\, v \rangle,\ \gamma_{k,\nu}(u)\, J_\nu(\mathrm{suf}_k\, u, \mathrm{pref}_k\, v)\, \gamma_{k,\nu}(v)\big)$$

が成り立つ．

証明. 窓成分が準同型であることは定義 2.6 による．u, v が長いとき，uv の長さ $k+1$ の因子は順に，u の因子，u の最後の k 位置で始まる k 個の因子，v の因子である．中央の因子は $\mathrm{suf}_k(u)\,\mathrm{pref}_k(v)$ に含まれるので，表示の式を得る．

u が短く v が長いとき，uv の因子のうち u で始まるものは $u\,\mathrm{pref}_k(v)$ に含まれ，残りは v の因子である．したがって $\gamma_{k,\nu}(uv)$ は u，$\mathrm{pref}_k(v)$，$\gamma_{k,\nu}(v)$ で決まる．u が長く v が短い場合も対称である．両方が短ければ uv そのものが決まる．

いずれの場合も $\lambda_{k,\nu}(uv)$ は $\lambda_{k,\nu}(u)$ と $\lambda_{k,\nu}(v)$ の関数である. 像の大きさは高々 $|\Sigma|^{<2k} + |\Sigma|^{2k}|A|$ である． □

補題 付録 B.2 (ブロック分解)**.** 語を，指定されたブロック β_j と固定語 x_j により $w = x_0\beta_1 x_1 \cdots \beta_q x_q$ と分解する．各 j について $\widehat{s}_{k,k}(\beta'_j) = \widehat{s}_{k,k}(\beta_j)$ となる β'_j を用いて

$w' = x_0\beta'_1 x_1 \cdots \beta'_q x_q$ と置く．このとき $\widehat{s}_{k,k}(w') = \widehat{s}_{k,k}(w)$ である．さらに w が長ければ，x_j と β_j の窓型だけに依存する $c_0, \ldots, c_q \in A$ が存在して

$$\gamma_{k,\nu}(w) = c_0\,\gamma_{k,\nu}(\beta_1)\,c_1 \cdots \gamma_{k,\nu}(\beta_q)\,c_q, \qquad \gamma_{k,\nu}(w') = c_0\,\gamma_{k,\nu}(\beta'_1)\,c_1 \cdots \gamma_{k,\nu}(\beta'_q)\,c_q$$

が成り立つ．

証明. 短いブロックはそのまま記録されるので $\beta'_j = \beta_j$ であり，固定語に吸収できる．残るブロックはすべて長く，その置換も長く，最初と最後の k 文字が等しい．よって w' が長いのは w が長いときに限り，最初と最後の k 文字は変わらない．これで窓についての主張が従う．

w の長さ $k+1$ の因子 F を分類する．F が長いブロック β_j の内部にあれば，F は β_j の因子の一つである．そうでなければ，F が接する各長いブロックとの交わりは，長さ高々 k の接頭辞か接尾辞である．F が β_j の両端に接するなら $|\beta_j| \le k-1$ となり，β_j は短い．よって第二種の因子はすべて，固定語と窓 $\mathrm{pref}_k(\beta_j)$，$\mathrm{suf}_k(\beta_j)$ だけで綴られ，同じ因子が同じ順序で w' にも現れる．因子を開始位置の順に並べると，β_j 内部の因子は連続する一続きをなし，$\gamma_{k,\nu}(\beta_j)$ を与える．β_j と β_{j+1} の一続きの間にある残りの因子の順序つき積を c_j とする． □

補題 付録 B.3 (ブロック短縮に使う sliding-factor 座標)**.** S を最小イデアル K を持つ有限半群とし，全ての冪等元が K に属するとする．$n = |S|$ とし，任意の準同型 $h : \Sigma^+ \to S$ を固定する．$\mathsf{K} = \mathcal{M}(H; I, \Lambda; P)$ という *Rees* 表示に対し，ある写像 $\nu : \Sigma^{n+1} \to H$ が存在し，$|w| \ge 2n$ の全ての語について

$$h(w) = \Big(\mathrm{row}(h(\mathrm{pref}_n\, w)),\ \mathrm{grp}(h(\mathrm{pref}_n\, w))\,\gamma_{n,\nu}(w),\ \mathrm{col}(h(\mathrm{suf}_n\, w))\Big). \tag{$\star$}$$

ここで $\mathrm{row}, \mathrm{grp}, \mathrm{col}$ は最小イデアル K の *Rees* 座標への三つの射影であり，$\gamma_{n,\nu}(w)$ は長さ $n+1$ の連続因子に付けたラベルを左から右へ順序付きで掛けた群積である．従って非可換群 H についても，$h(w)$ は最初と最後の n 文字，およびこの順序付き積で決定される．

証明. *(1)* **最小イデアルへの一様到達．** Rees 商 S/K で 0 以外の冪等元は存在しないため，各元のある冪は 0 となる．$m = |S/\mathsf{K}|$ 個の因子の積が非零だとすると，m 個の非空接頭積はすべて非零であり，二つの接頭積 $p_i = p_j$（$i < j$）が一致する．$x = s_{i+1} \cdots s_j$ と置くと $p_i = p_i x^q$ がすべての q について成り立つが，$x^q = 0$ となる q を取れば矛盾する．したがって $n \ge |S/\mathsf{K}|$ 個の因子の積はすべて K に入る．

(2) **外側座標と右作用．** Rees 積を $(i,a,\lambda)(j,b,\mu) = (i, a p_{\lambda j} b, \mu)$ と書く．$i_0 \in I$ を固定し $e_\lambda = (i_0, p^{-1}_{\lambda i_0}, \lambda) \in \mathsf{K}$ とする．任意の $(i,a,\lambda) \in \mathsf{K}$ に対し，右側の e_λ は恒等的に作用する．$s \in S$ について $e_\lambda s = (j, c, \mu) \in \mathsf{K}$ と書き，$\rho(\lambda, s) = p_{\lambda j} c$ と定める．結合法則から

$$(i,a,\lambda)s = (i, a\rho(\lambda,s), \mu(\lambda,s))$$

が厳密に成立する．右乗法は，たとえ $s \notin K$ でも I 座標を変えない．同様に，K に入った積への左乗法は Λ 座標を変えない．実際 (i,a,λ) に左単位的に作用する冪等元 $f_i \in \mathsf{K}$ を取り，$s(i,a,\lambda) = (sf_i)(i,a,\lambda)$ に Rees の乗法規則を適用すればよい．よって長い語の I 座標は最初の n 文字で，Λ 座標は最後の n 文字で決まる．

(3) **移動窓による群座標.** $w = a_1 \cdots a_m$ $(m \geq 2n)$ とし，$h(a_1 \cdots a_n) = (i, a, \lambda_n)$ と書く．$j \geq n$ で λ_j を接頭積 $h(a_1 \cdots a_j)$ の Λ 座標とする．左乗法による Λ 座標の保存から，これは長さ n の末尾語 $h(a_{j-n+1} \cdots a_j)$ の Λ 座標に等しい．$F \in \Sigma^{n+1}$ に対し

$$\nu(F) = \rho\big(\lambda(h(F[1..n])), h(F[n+1])\big)$$

と定める．右作用を左から右の元の順序で適用すると

$$h(w) = \Big(i,\ a \prod_{j=n}^{m-1} \nu(a_{j-n+1} \cdots a_{j+1}),\ \lambda_m\Big)$$

を得る．積は定義どおり $\gamma_{n,\nu}(w)$ であり，$\lambda_m = \lambda(h(\mathrm{suf}_n\, w))$ である．$m = 2n$ の場合も因子が正確に n 個あり成立する． □

定理 付録 B.4 (古典的な局所群条件と sliding-factor 座標)**.** 有限型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ について $S = \widehat{s}(\Sigma^+)$ とおく．次は同値である．

(i) $S \in \mathbf{LG}$，すなわち全ての冪等元 e で eSe が群.
(ii) S は *2* 元半束 U_1 と同型な部分半群をもたない.
(iii) S の全ての冪等元は最小イデアル K に属する.
(iv) $\widehat{s}$ は局所群決定的であり，$k = |S|$ と取れる.

証明. (i)–(iii) の同値は古典的である．[36, Proposition 2.3] は，(i)，(ii) がある m で $S^m = \mathsf{K}$ となることと同値であると示す．また [36, Lemma 2.2] により，$n = |S|$ なら $S^n = SE(S)S$ である．従ってある m で $S^m = \mathsf{K}$ となることと $E(S) \subseteq \mathsf{K}$ は同値である．前向きは冪等元 $e = e^m$ を用い，逆向きは $S^n = SE(S)S \subseteq \mathsf{K}$，および S^n が K を含む非空イデアルであることによる．

(iii)⇒(iv) では，補題 付録 B.3 を $h = \widehat{s}|_{\Sigma^+}$，$n = |S|$ に適用する．式 $(\star)$ により長さ $2n$ 以上の語の値は接頭辞，接尾辞，および順序付き因子群積から決まる．$\widehat{s}_{n,n}$ はそれより短い語をそのまま記録し，新単位元により空語を区別するので $\widehat{s} \preceq \lambda_{n,\nu}$ である．

(iv)⇒(i) では，**LG** が準同型像で閉じているので，$T = \lambda_{k,\nu}(\Sigma^+)$ が **LG** に属することを示せばよい. 短い語を表す元は冪等でない（平方すると長さが増え, 窓型で区別される）. 冪等元 $e = (\langle p, s\rangle, \gamma_e)$ を取ると補題 付録 B.1 から $\gamma_e J_\nu(s,p)\gamma_e = \gamma_e$ となり，eTe の各元の窓型は $\langle p, s\rangle$ である．よって eTe は

$$H_e = \{(\langle p, s\rangle, \alpha) : \alpha \in A\}, \quad \alpha * \beta = \alpha J_\nu(s,p)\beta$$

に含まれる．これは $\alpha \mapsto \alpha J_\nu(s,p)$ により有限群 A と同型であり，その有限部分半群 eTe も群である． □

命題 付録 B.5 (窓・群型付けは局所群型付けであり，包含は真である)**.** (i) 有限群への準同型 g について $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ なら，$\hat{k} = \max\{k, \ell, 1\}$，$\nu(F) := g(F \text{ の最後の文字})$ として $\widehat{s} \preceq \lambda_{\hat{k},\nu}$ である．したがって $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp} \subseteq \mathbf{LG}$ である.

(ii) $\Sigma = \{\mathsf{a}, \mathsf{b}, \mathsf{c}\}$ とし，$\nu(\mathsf{ab}) = 1 \in \mathbb{Z}_2$，それ以外の F について $\nu(F) = 0$ として $h_{\mathsf{ab}} := \lambda_{1,\nu}$ と置く．これは窓とともに ab の出現回数の偶奇を記録する．h_{ab} は窓・群決定的でない．よって $h_{\mathsf{ab}}(\Sigma^+) \in \mathbf{LG} \setminus (\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp})$ である.

証明. (i) $|w| \geq 2\hat{k}$ なら $g(w) = g(\mathrm{pref}_{\hat{k}}\, w)\, \gamma_{\hat{k},\nu}(w)$ である．それより短い語はそのまま記録される．pseudovariety の包含は，定理 付録 B.4 と，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ を窓・群型付けで特徴づける姉妹論文の結果 [25, Lemma 7.4] から従う．

(ii) $g' : \Sigma^* \to A'$ について $h_{\mathtt{ab}} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g')$ と仮定する．$K = \max\{k, \ell, 1\}$ とし，q を A' の冪数の偶数倍とする．$u = \mathtt{a}^K(\mathtt{abc})^q\mathtt{a}^K$，$v = \mathtt{a}^K(\mathtt{bac})^q\mathtt{a}^K$ と置く．どちらも長く，接頭辞 $\mathtt{a}^k$，接尾辞 $\mathtt{a}^\ell$ をもち，$g'(u) = g'(\mathtt{a})^{2K} = g'(v)$ である．しかし u は $\mathtt{ab}$ を q 回含むのに対し，v はちょうど 1 回（$\mathtt{a}^K\mathtt{b}$ の位置）しか含まない．よって $h_{\mathtt{ab}}(u) \neq h_{\mathtt{ab}}(v)$ となり，矛盾する．**LG** への所属は定理 付録 B.4 から，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ への非所属は姉妹論文の特徴づけから従う． □

補題 付録 B.6 (局所群型を指定した短いタプル)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を，ファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max} \geq 1$ の縮約済み良形 $MCFG$ とし，$\lambda = \lambda_{k,\nu}$ とする．縮約された $\widehat{s}_{k,k}$-精密化の開始記号以外の型付き非終端記号の個数を $n_{\mathrm{w}} \leq |V||M_{k,k}|^f$ とし，$b_{\mathrm{w}} := f(2k+1)n_{\mathrm{w}}(r_{\max}+1)\bar{\theta}_G$ と置く．$n_\lambda := |V||M_{k,\nu}|^f$ とし，$M_{A,f}$ を *4.4* 節で定義した定数とする．各 $B \in V$ と実現可能な各 $\mathbf{t} \in M_{k,\nu}^{\mathrm{fan}(B)}$ について，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ かつ

$$\|\vec{u}\|_1 \leq \beta_\lambda := (r_{\max}+1)\, b_{\mathrm{w}} \max\{1, (M_{A,f}-1)\, n_\lambda\}$$

となる $\vec{u} \in L_B(G)$ が存在する．A が可換なら $M_{A,f} - 1$ を $\mathsf{d}(A^f)$ に置き換えてよい．

証明. 根の型が $\mathbf{t}$ となる B からの終端導出のうち，まず総出力長，次に節点数を最小化するもの T を選ぶ．各節点に，非終端記号とその出力の λ-ベクトルを標識する．補題 4.12 と同様に，経路上で標識は繰り返されない．λ は準同型であり（補題 付録 B.1），規則テンプレートは準同型的に評価されるからである．よって各経路の節点数は高々 n_λ である．

出力の総長が b_{w} を超える節点を**重い**と呼ぶ．重い節点は祖先について閉じている．重い節点 v の標識を C とし，その出力の $\widehat{s}_{k,k}$-ベクトルを $\boldsymbol{\omega}$ とする．G は縮約済みなので，T は成功する導出に埋め込める．よって $C_{\boldsymbol{\omega}}$ は縮約された $\widehat{s}_{k,k}$-精密化に残る型付き非終端記号であり，補題 4.6 により，出力の窓ベクトルが同じで総長が高々 b_{w} の C からの導出が存在する．各重い節点についてこの置換を固定する．

重い節点の反鎖 $v_1, \ldots, v_m$ を考える．各 v_i は根の成分に高々 f 個の互いに素なブロックを与える．任意の添字集合 J の部分木を置換すると，総長が真に小さい正しい導出が得られる．補題 付録 B.2 を根の各成分に適用すると，この置換は根の窓型を変えない．また長い根成分の γ 値は，各ブロックが固定定数の間に自分の γ 値を与える順序つき積を通じてのみ変わる．これを群 A 上のブロック置換族として明示する．各添字 i は節点 v_i が根の各成分に与えるブロックを所有し，その総数は高々 f である．窓型の短いブロックは型一致により実際の文字列が不変だから，固定部分へ吸収する．残る長いブロックの γ-値だけが置換によって変化し，補題 付録 B.2 の定数因子は選択集合 J に依存しない．したがって各根成分の γ-値は，固定定数と各所有者の元のブロック値／置換後のブロック値との非可換な**順序付き積**として表せる．所有するブロックがゼロの添字があればそれだけを置換でき，根の型を保って出力を短縮できるので，以下では各添字が少なくとも一つのブロックを持つと仮定してよい．

所有者ごとのブロック数，各ブロックの根成分，同一所有者内の順序で定まるパターンは高々 $U_f = f^{f+1} f!$ 種類である．$m \geq M_{A,f} = U_f N_{A,f}^{2^{f^2}}$ なら，同一パターンの添字が少なくとも $N_{A,f}^{2^{f^2}}$ 個存在する．その他のブロックは固定定数へ吸収する．補題 付録 A.5 を高々 f^2 個の比較型へ適用す

ると，少なくとも $N_{A,f} = \max\{3, |A|^f\}$ 個の添字について所有者間のブロックの順序比較をすべて斉次化できる．その部分族には補題 4.11 が適用でき，非空の添字区間を同時に置換して各根成分の順序付き群積を完全に保存する．窓型も保存されるため根の λ-ベクトルが一致し，各重い節点の置換は総長を真に減らすので最小性に矛盾する．$m \geq M_{A,f}$ なら，置換のある非空集合が根の λ-ベクトル全体を保存し，最小性に矛盾する．A が可換なら，補題 4.12 の零和論法を差分 $\gamma(\beta') - \gamma(\beta)$ に適用して，上界 $\mathsf{d}(A^f)$ を得る．

以上により，任意の重い節点反鎖の濃度は高々 $M_{A,f} - 1$ である．この条件を，$\lambda = \lambda_{k,\nu}$，$b = b_{\mathrm{w}}$，$c = M_{A,f} - 1$ として補題 4.8 に適用すれば，根タプルの総長は表示した β_λ 以下となる．可換群の場合はブロック置換の零和論法により $c = \mathsf{d}(A^f)$ と置ける． □

■定理 4.20 の詳細証明． 定理の主張は本文の第 4.5 節に置いた．ここでは滑動因子による特徴づけと，非可換な順序付き群積の同時短縮を使って総文字数の三次上界を導く．

定理 *4.20* の証明. 定理 付録 B.4 により，$\widehat{s}$ だけに依存するある k, A, g について $\widehat{s} \preceq \lambda_{k,\nu}$ である．$X = B_{\mathbf{s}}$ を縮約された $\widehat{s}$-精密化の開始記号以外の型付き非終端記号とし，$\vec{u} \in L_X$ とする．$\vec{u}$ の λ-ベクトルに補題 付録 B.6 を適用すると，同じ λ-ベクトル（したがって同じ $\widehat{s}$-ベクトル）をもち $\|\vec{u}'\|_1 \leq \beta_\lambda$ となる $\vec{u}' \in L_B(G)$ が得られる．命題 3.5(ii) によりその導出は根 X に持ち上がり，補題 4.6 と同様に縮約後も残る．この二段階の短縮には異なる役割がある．第一段階の窓短縮では長さ b_{w} 以下の代替導出を得るが，その群値が各部分木で保存されるとは仮定しない．第二段階で，補題 付録 A.2 により複数部分木の非空集合を選び，置換後の**根全体**の順序付き群積を同時に保存する．よって長さ高々 $\beta_\lambda = O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ の正準タプルが存在する．ここで $b_{\mathrm{w}} = O(\|G\| \bar{\theta}_G)$，$n_\lambda = O(\|G\|)$ を用いた．補題 4.1 により各証拠語の長さは高々 $2\bar{\theta}_G + r_{\max}\beta_\lambda$ であり，命題 4.2 によりその個数は $O(\|G\|)$ である． □

定理 4.20 は，命題 付録 B.5(i) により窓型付けと窓・群型付けにも適用できる．ただし，この一般的な三次上界より，定理 4.7 と 4.15 によるそれらの部分クラスの二次上界の方が強い．

付録 C　一般 MCFG の成分パターン厚みの移行

命題 4.24 の詳細を記す．元の刈り込み済み文法 H_{red} の各非終端記号 A と実現可能なパターン I について $F_{A,I} := \{\vec{u} \in L_A(H_{\mathrm{red}}) : \mathrm{supp}(\vec{u}) = I\}$ とする．この各集合には長さ $t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ 以下の代表が存在する．

補題 付録 F.1 の段階 (a) では，新しいタプル言語は $\pi_J(L_A(H_{\mathrm{red}}))$ となり，元のパターンごとのファイバーの射影像の和集合である．段階 (b) は成分の順序のみを変更し，パターンを置換して総長を変えない．段階 (c) では射影・置換の後で，指定した非空成分パターンに属する像だけを保持する．寄与する元のファイバーから最短タプルを選べば，同じパターンの保持タプルであって総長は増えない．段階 (d) の連続成分の融合も総長を増やさず，出力パターンは入力パターンから一意に定まる．従って，どの保持記号にも $t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ 以下の長さの実際の終端導出が存在する．この結論は各段階のタプル言語の**等式**を使い，単なる包含だけから主張するものではない．最後の刈り込みは保持記号の言語を変えない．よって $t_G \leq t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$.

命題 3.9 は $\|G\| = O_{f,r}(\|H\|)$ を与え，補題 4.1(iii) は $\bar{\theta}_G \le 2\max\{1, \|G\|\}\max\{1, t_G\}$ を与える．一方，元の通常の規則厚みのみで同様の上界を得たわけではない．空成分除去による増大は命題 付録 F.3 が示す．

例 付録 C.1 (ファンアウト 2 の 4 段階正規化の具体例)．消去，置換，空成分，融合を一つの有限文法で確認する．開始記号 S はファンアウト 1，A, B, C はファンアウト 2 とし，

$$\begin{aligned} B &\to (a,\varepsilon) \mid (a,b), \\ C &\to (c,d), \\ A &\to (\xi_1^2\xi_1^1, \xi_2^1)(B,C) \mid (\varepsilon, z), \\ S &\to (\xi_1^1 \# \xi_1^2)(A) \mid (\varepsilon). \end{aligned}$$

最初の A 規則は C の第 2 成分 d を消去し，B の 2 成分を逆順で使用して連結する．A の (ε, z) の support は $\{2\}$，それ以外の A 導出の support は $\{1, 2\}$ である．生成タプルとそのパターンごとの最短長は

X	各 support での語	最短長
B	(a,ε), (a,b)	$1, 2$
C	(c,d)	2
A	(ε,z), (a,c), (ba,c)	$1, 2$
S	(ε), $(\#z)$, $(a\#c)$, $(ba\#c)$	$0, 2$

である．よって $t_{\mathrm{pat}}(H) = 2$，$L(H) = \{\varepsilon, \#z, a\#c, ba\#c\}$ となる．(a) C を使用される第 1 成分へ射影すると，新しいコピーは (c) だけを生成する．(b) B の逆順コピーは $\{(\varepsilon, a), (b, a)\}$ を生成する．support は置換されるが総長は不変である．(c) 非空 support で分けると B のコピーは (a) と (b, a) になり，A のコピーは (z) と $(a, c), (ba, c)$ に分かれる．開始語の ε は good 文法の正語核から除く．(d) 隣接する (b, a) を (ba) に融合する．重複した名前を統合した最終 good 文法の一例は

$$\begin{aligned} D_0 &\to (a), & D_1 &\to (ba), \\ C_0 &\to (c), & A_2 &\to (z), \\ A_{12} &\to (\xi_1^1, \xi_2^1)(D_0, C_0) \mid (\xi_1^1, \xi_2^1)(D_1, C_0), \\ S_+ &\to (\# \xi_1^1)(A_2) \mid (\xi_1^1 \# \xi_1^2)(A_{12}). \end{aligned}$$

各コピーでの代表元は，元の support fibre の元に $\mu\sigma\pi_J$ を適用した像である．これらの写像は長さを増やさず，元の各ファイバの最短代表元長は高々 2 なので，最終 good 文法の生産的な各コピーでも長さ 2 以下の語が生成される．これは補題 付録 F.1 の一般的証明を置き換えるものではなく，語族全体の保存と各 support fibre の保存の差を検算する例である．

付録 D　質的学習器と再構成の補助検証

D.1　Yoshinaka (2015) による質的学習の先行結果

備考 付録 D.1 (有限 signature による先行理論)．Yoshinaka [15, Theorem 1, Example 3 and Section 8] の有限 signature に関する学習原理は，ランク上界を固定した MCFG 学習の質的な比較基準となる．開始ソートと昇格演算を区別したまま，非開始タプルソートを成分ごとの固定 s 型で精密化できる．本稿では signature embedding そのものを主定理の仮定として使用せず，以下に具体的な Const/Link/Comp 文法の健全性，厳密再構成，多項式構成，Gold 収束を直接検証する．

D.2 健全性

補題 付録 D.2 (合成による同値関係の保存)**.** $L \subseteq \Sigma^*$，ρ をランク r の良形規則のテンプレートとし，$\vec{x}_j, \vec{u}_j$ は子の要求アリティをもち，各成分は非空とする．すべての j について $\vec{u}_j \equiv_{L,s} \vec{x}_j$ ならば，$\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r) \equiv_{L,s} \rho(\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_r)$ が成り立つ．

証明. 子を一つずつ交換し，ほかの子は固定して非空とする．各中間出力を受理する外側文脈から補題 3.1 により交換対象の子の許容文脈が誘導される．仮定 $\vec{u}_j \equiv_{L,s} \vec{x}_j$ により各交換は双方向に所属を保存する．先に交換した子があっても同じ議論を繰り返せる．出力型も固定テンプレートと $\widehat{s}$ の準同型性（空の終端ギャップには新単位元を使用）により一致する．従って出力タプルは分布同値である． □

命題 付録 D.3 (ランク上界付きの各仮説の健全性)**.** L を (f, s)-タプル代入可能とし，$K \subseteq L$ を有限とする．任意の $r_{\max} \geq 1$ について，$\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ で $[\vec{x}] \Rightarrow^* \vec{u}$ ならば $\vec{u} \equiv_{L,s} \vec{x}$ である．したがって

$$L(\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K)) \subseteq L, \qquad L(\mathcal{B}_{f,s}(K)) \subseteq L.$$

証明. $[\vec{x}]$ を根とする導出の高さによる帰納法．Const 規則は観測タプル自身を生成する．Link 規則は $K \subseteq L$ にある同型タプルの共通許容文脈を証拠に持ち，代入可能性により分布同値が成立する．これを子の帰納法の仮定と合成する．Comp 規則では子の導出が観測された子と分布同値であり，補題 付録 D.2 により固定テンプレートへの代入後も同値である．観測された元の出力が親タプル $\vec{x}$ なので不変量が成立する．Start の正語規則は観測された文を指し，恒等文脈から L への所属が従う．空語規則は $\varepsilon \in K \subseteq L$ のときだけ加わる．議論は任意の有限ランク上界で成立し，非空 K の無上界版はランク上界 $\|K\|_+$ の版と一致する．$K = \emptyset$ は自明である． □

D.3 実効的再構成と保守的学習

$f, r_{\max}, s$ を固定すると，Yoshinaka のランク有界学習器 [14, Proposition 4 and Section 4.3] と同様に，本構成は観測標本に関して多項式時間である．観測タプルは標本語の番号と切断位置によって，テンプレートは順序付き変数と終端因子によって符号化する．

定理 付録 D.4 (規則ランク上界の下での多項式時間構成)**.** $f, r_{\max} \geq 1$ と有限半群準同型 $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を固定し，型の計算には $\widehat{s}$ を用いる．有限標本 K から，$\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ の完全な符号化を $(1 + \|K\|_+)^{O(f r_{\max})}$ 時間で計算できる．この文法のファンアウトは高々 f，規則ランクは高々 $r_{\max}$ である．

証明. $n_K = \max\{1, \|K\|_+\}$ とおく．切断位置を用いると，すべてのタプル出現を $n_K^{O(f)}$ 時間で列挙できる．固定有限モノイドで部分語の積を計算すれば型が得られる．文脈と型で分類することで Rule (Link) を列挙できる．補題 3.2 により Rule (Comp) とその符号化を $n_K^{O(f r_{\max})}$ 時間で列挙できる．残る規則はランクが高々 1 であり，重複を取り除いても完全な文法の符号長は多項式のままである． □

有限テキスト接頭部分をその正例内容に対する $\mathcal{B}_{f,s}$ へ写す集合駆動型作用素は，やがて意味的に正しくなる．実際，内容が $\mathcal{F}_L$ を含むようになれば，定理 3.10 により，以後の再構成は常に L を生成する．ただし新しい正例によって観測タプルの種類が増えると，文法表示そのものは変化し続けることがある．このため TxtEx に必要な構文的安定化は，以下の保守的な逐次学習器が担う．

証明. 規則ランク有界の場合も以下の直接的な再構成の議論と Yoshinaka の質的学習理論を区別して用いる．ランク無制限では定理 3.10 の有限特徴標本と命題 付録 D.3 の健全性を使う．MCFG 所属判定は決定可能である [29]．特徴標本出現後の次の仮説更新があれば正確な文法となり，以後変わらない．更新がなければ標本整合性と保守性から現仮説が既に L を生成する． □

■計算時間と収束段階の区別． 定理 付録 D.4 と系 3.12 の「多項式時間」は，各有限段階で蓄積された正例の符号長（新しい正例を含む）に関する**再構成・所属判定の計算時間**である．系 3.12 の TxtEx 同定は，任意の正例テキスト上で最終的に同じ文法コードへ安定することをいうが，その**収束段階**や**仮説変更回数**の多項式上界を含まない．実際，テキストでは特定の正例の初出を任意に遅らせられ，停止記号や正例の重複を任意の回数挿入できる．したがって，有限特徴標本の総長が小さくても，それだけから任意のテキストに対する収束時刻の上界は従わない．

ファンアウト 1 では，空語を別に扱うことで，すべての CFG はランク 2 の表示をもつ．したがって $\mathcal{A}^{\leq 2}_{1,s}$ は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ を対象にできる．ただし，これはランク 2 における特徴データ長が多項式であることを意味しない．

命題・補題・定理 *3.8.* Yoshinaka [15, Lemma 3] の規則証拠論法を本稿の Link・Const・Comp に適用する．各規則について $\vec{z} = \rho(\iota(Y_1), \ldots, \iota(Y_q))$ とおく．二つの証拠語が Link $[\iota(X)] \to [\vec{z}]$ を与え, その後に $q = 0$ なら Const, $q > 0$ ならランク $q \leq r_G$ の Comp が続く. 後者は $q \leq \|\vec{z}\|_1 \leq \|K\|_+$ によりランク無制限版にも現れる．よって導出木の帰納法で元文法の各型付き導出を模倣でき，開始リンクでは $\chi(X) = \square_1$ なので Start を適用できる．命題 3.5(iii) で結論を得る． □

命題・補題・定理 *3.10.* $L^+ = \emptyset$ なら $L \in \{\emptyset, \{\varepsilon\}\}$ であり，$K = L$ となるため両作用素の結論は再構成の定義から従う．$L^+ \neq \emptyset$ なら命題 3.9 で良形表示をとり，定義 3.7 の有限正例集合を用いる．命題 3.8 を $\iota = \omega$ として適用すると，ランク上界付き・上界なしの仮説は L^+ を含む．命題 付録 D.3 で逆包含を得る．空語は $\varepsilon \in K$ の場合に限って開始記号の直接規則で生成する．ランク保存により最後の主張も従う． □

付録 E　型付き有限証拠に関する補助証明

特徴データ長の評価に使う命題と補題は本文に残し，その補助的な検証をここにまとめる．

命題 *3.5.* 規則を適用するとき，規則テンプレートに対する準同型的評価から

$$\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}\big(\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)\big) = \mathrm{out}_\rho\big(\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(B_1))}(\vec{u}_1), \ldots, \widehat{s}^{(\mathrm{fan}(B_r))}(\vec{u}_r)\big)$$

が成り立つ．ランク 0 の場合は明らかである．導出木の高さに関する帰納法で (i) が従い，同じ等式が (ii) の終端導出の一意な持ち上げを与える．型の添字を忘れれば言語包含の一方向が得られる．逆に，G の任意の成功終端導出には (ii) の一意の持ち上げがあり，開始リンク $\widetilde{S} \to S_{(\widehat{s}(w))}$ も一意

に決まる．さらに，すべての成功した型付き導出は刈り込みで残された規則だけを用いるので，刈り込みは生成言語を変えない． □

補題 付録 E.1 (有限モノイド表示と半群型付けの移行)**.** $f \geq 1$ と有限モノイド準同型 $h_0 : \Sigma^* \to M_0$ を固定し，$S_0 = h_0(\Sigma^+)$，$s_0 = h_0|_{\Sigma^+} : \Sigma^+ \twoheadrightarrow S_0$ とおく．

(i) 任意の $1 \leq d \leq f$ と $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ について

$$h_0^{(d)}(\vec{x}) = h_0^{(d)}(\vec{y}) \iff s_0^{(d)}(\vec{x}) = s_0^{(d)}(\vec{y}) \iff \widehat{s_0}^{(d)}(\vec{x}) = \widehat{s_0}^{(d)}(\vec{y}).$$

したがって $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h_0} = \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_0}$ であり，任意の正例標本に対するランク制限の有無によらない再構成文法の規則も，正語の型添字の対応の下で一致する．

(ii) 任意の良形 *MCFG* G について，h_0 と $\widehat{s_0}$ による刈り込み済み生成語型精密化は同型である．刈り込み前の精密化は同型とは限らない．

(iii) 対応する文法の生成言語は $L(G)$ であり，同じ正準タプル・文脈・特徴証拠語を選べる．

補題 付録 *E.1.* (i) 非空成分上では三つの写像は共通の正語像半群 S_0 への写像として一致する．置換リンクはこれらの成分の等号と共通文脈のみを検査する．定数・合成・空語の直接開始規則では，空の成分を比較する追加条件はない．

(ii) S_0 は M_0 と $S_0^\sharp$ の部分半群であり，乗法は一致する．良形文法の λ-自由性より，非終端記号が生成するすべてのタプル成分は非空である．良形規則テンプレートの各出力成分は，明示的な終端文字または非空の子成分を一つ以上含む連結である．その型を h_0 と $\widehat{s_0}$ で評価すると，空の終端因子はそれぞれの単位元を与えるだけなので，両者は S_0 の同じ元となる．成功した導出について帰納法を行うと，生産的な型付き規則と正語の開始昇格が対応する．到達可能性と生産性による刈り込みもこの対応を保つ．しかし $M_0 = \{1\}$ の場合，新単位元の添加では未使用の余分な型が生じ得るため，全精密化の同型は主張できない．

(iii) 命題 3.5 の生成語不変量を適用すれば，同じ導出で同じ正準タプルと文脈を実現できるので，対応する証拠語を同一に選べる． □

補題 付録 E.2 (型付き非終端記号の正準文脈)**.** 標的文法が良形であるとする．アリティ d の各型付き非終端記号 X には，$\chi(X) \in \mathcal{E}_d$ で，任意の $\vec{u} \in L_X$ について $\chi(X)[\vec{u}] \in L(G)$ を満たす文文脈が存在する．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ に含まれるなら，$\chi(X) = \Box_1$ としてよい．

補題 付録 *E.2.* X の出現を含む成功した型付き導出を選ぶ．根では一穴文脈 $\Box_1$ が許容される．根の出現から X の選んだ出現までの唯一の経路をたどる．この経路上の各規則について，成功導出で使われた生産的な兄弟部分木を固定し，補題 3.1 を適用する．規則の良形性と兄弟成分の非空性により，誘導された子の文脈でも内部区切り語は非空である．経路に沿って繰り返すと $\chi(X) \in \mathcal{E}_d$ を得る．周囲の型付き規則適用は型付き記号 X のみに依存するので，その部分木を別の X-導出で置き換えても $\widetilde{G}_0$ で正しい導出であり続ける．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ の規則なら，経路の長さは 0 であり $\chi(X) = \Box_1$ となる． □

補題 付録 E.3 (型付き非終端記号の分布的斉次性)**.** 良形 *MCFG* G について $L = L(G) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ とする．任意の型付き非終端記号 X のタプル言語 L_X は，$\equiv_{L,s}$ の単一の同値類 $[X]$ に含まれる．

補題 付録 *E.3.* $\vec{u}, \vec{v} \in L_X$ とすると，命題 3.5(i) により成分別の型が一致する．補題 付録 E.2 は両方を受理する共通の許容文文脈を与えるため，(f, s)-代入可能性によって分布も一致する． □

付録 F　良形標準化の詳細

命題 *3.9* の証明．まず到達不能・非生産的な非終端記号を除き，Seki らの補題 2.2 の証明にある非消去化段階 (f3) を用いる [29, proof of Lemma 2.2, item (f3)]．Kanazawa [31, Section 2.1] はファンアウト・規則ランクを保存する非消去・非置換の同値文法の存在を述べているが，ここでのサイズ評価は付録 付録 F に示す成分添字集合による具体的な構成から導く．非終端記号に成分置換を添字として付けることで文法を非置換にする．次に，付録 F で明示するように，終端導出によって実現可能な非空成分パターンで非終端記号を装飾し，空成分を射影で除去する．これにより開始記号の ε が取り除かれ，残るすべての出力テンプレートが λ-自由になる．最後に Yoshinaka の非融合化を適用する [14, Section 2.3, Lemma 1]．これらの操作はファンアウトも規則ランクも増加させない．

$f, r_{\max}$ が固定されていれば，成分パターンの選択による記号の装飾は高々 2^f 通り，各規則での子のパターン選択は高々 $2^{f r_{\max}}$ 通りであり，置換による装飾は高々 $f!$ 個のコピーにすぎない．Yoshinaka の変換も，これらの固定パラメータに関して線形サイズである．したがって総符号長は $O_{f, r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ のままである．導出の対応と空成分に関する構成の詳細は付録 F に記録する． □

命題 3.9 で用いた四つの変換について，非終端記号のタプル言語を段階ごとに明示する．同命題の固定パラメータに関するサイズ上界と命題 付録 F.2 の厚み移送は，この同一性に基づいて導く．非消去化と非融合化の意味論的正しさは既知である [14, 29, 31]．Kanazawa [31, Section 2.1] の存在結果だけではサイズ・厚みの量的上界は出ないため，ここで別途導出する．

タプル $\vec{w} = (w_1, \ldots, w_d)$ と $\emptyset \neq I \subseteq [d]$ に対し，$\pi_I(\vec{w})$ は I 番目の成分を昇順に残す射影，$\sigma\vec{w}$ は成分置換，$\mu(\vec{w})$ は隣接成分の連結を表す．従って

$$\|\pi_I(\vec{w})\|_1 \leq \|\vec{w}\|_1, \quad \|\sigma\vec{w}\|_1 = \|\mu(\vec{w})\|_1 = \|\vec{w}\|_1.$$

補題 付録 F.1 (標準化各段階のタプル言語)**.** $f, r_{\max}$ を固定し，G_0 を規則ランク高々 $r_{\max}$ の縮約済み f-*MCFG* とする．次の各変換は線形性を保持し，ファンアウトと規則ランクを増加させず，テンプレートを拡大しない．非終端記号および規則のコピー数の増加倍率は $f, r_{\max}$ のみに依存する．

(a) 非消去化（*Seki* ら *[29, Lemma 2.2, proof (f3)]*）．$\emptyset \neq I \subseteq [\mathrm{fan}(A)]$ に対して A^I を導入する．$R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_q)$ の I 番目の出力成分に使われる B_j の成分集合を J_j とし，出力の選択・変数の付替えを行う．$J_j \neq \emptyset$ の子だけを $B_j^{J_j}$ として保持し，残りの子を除去すると非消去となり，$L_{A^I} = \pi_I(L_A(G_0))$ が成り立つ．

(b) 非置換化．ファンアウト d の非終端記号を $\sigma \in \mathfrak{S}_d$ で装飾する．置換済み親テンプレートにおける子変数の使用順から子の置換が一意に定まり，装飾付き記号の言語は σL_A である．

(c) 空成分除去．各 A について実現可能な非空成分位置集合 $\mathsf{Pat}(A)$ を有限飽和計算で求める．実現可能な子パターンの空成分変数を ε に替え，親の空成分を消し，全成分が空の子は除去する．非空パターン I に対応する A^I の言語は，L_A のうちパターン I を持つタプルの π_I 像に正確に一致する．得られる文法は λ-自由で，$S^{\{1\}}$ は元言語の正語部分を生成する．初めから全生成タプルの各成分が非空ならば，この段階は恒等である．

(d) 非融合化（*Yoshinaka [14, Section 2.3, Lemma 1, proof]*）．非終端記号をそのファンアウトの成分連結 μ で装飾し，親が隣接して使う子成分の極大連続列から子の連結を決める．融合装飾付き記号は像 $L_{A^\mu} = \mu(L_A)$ を生成する．

(b)–(d) は先行段階で確立した条件を保存する．

証明. (a) 任意の子タプルに対し $\pi_I(\rho(\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_q)) = \rho^I((\pi_{J_j}\vec{v}_j)_{J_j \neq \emptyset})$ が成り立つ．導出木に関する帰納法で一方向の包含を得る．逆包含については帰納法の仮定で保持した子タプルを持ち上げ，省略した子には終端導出を補う．G_0 は縮約済みなので省略した子はすべて生成可能である．事前に刈り込んでいなければ自動的なのは $\pi_I(L_A) \subseteq L_{A^I}$ だけである．記号のコピー数は高々 2^f，規則も I が各 J_j を定めるのでコピー数は高々 2^f であり，子の省略はランクを増やさない．

(b) 線形性・非消去性によって子の置換が定まり，両方向の導出帰納法で言語 σL_A を得る．記号コピー数は高々 $f!$ で，子の重複はなく，総長・λ-自由性・fan-out・ランクは保存される．

(c) 残る変数は順序を保って一度ずつ現れるので，非消去・非置換・fan-out・ランクは保存される．導出帰納法でパターン別の射影恒等式を得る．省略した全空子はそのパターンを実現する終端導出で復元できる．各非終端記号のパターン数は高々 2^f，規則の子パターン選択数は高々 $2^{f r_{\max}}$ であり，テンプレートは射影によって短くなるだけである．

(d) 非置換性によって子成分の極大連続列は適合的に定まり，非消去性により全成分を被覆する．$\rho^\mu(\mu_1(\vec{v}_1), \ldots, \mu_q(\vec{v}_q)) = \mu(\rho(\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_q))$ だから，導出帰納法で像言語の等式を得る．融合写像は単射とは限らないので逆像の同一性は主張しない．連結は総長・λ-自由性・非置換性・fan-out・ランクを保つ．固定 fan-out・固定ランクでは変換後のサイズは線形である [14, Section 2.3, after Example 2]. □

命題 *3.9* **のサイズ上界．** 刈り込んだ入力に (a)–(d) を適用し，最後に再び刈り込む．各段階の符号長の増加倍率は $f, r_{\max}$ だけに依存し，刈り込みは符号長を増やさないので

$$\|G_{\mathrm{good}}\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|), \qquad L(G_{\mathrm{good}}) = L(G_{\mathrm{in}}) \setminus \{\varepsilon\}$$

が成り立つ．

λ-自由表示に対する厚みの転移

命題 付録 F.2 (良形変換の下での厚み)**.** $f, r_{\max}$ を固定する．G_{in} を，削除規則を含んでもよい，縮約済み λ-自由なファンアウト f 以下の *MCFG* とし，最大規則ランクは $r_{\max}$ 以下，$L(G_{\mathrm{in}}) \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ とする．命題 *3.9* による良形標準化では，同じファンアウト・規則ランク上界の同値な縮約済み良形文法 G が得られ，

$$\|G\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|), \qquad t_G \leq t_{G_{\mathrm{in}}},$$
$$\theta_G = O_{f,r_{\max}}\big(\|G_{\mathrm{in}}\| \max\{1, t_{G_{\mathrm{in}}}\}\big)$$

が成り立つ．

証明. 入力の λ-自由性により，導出されるタプルの全成分は非空である．したがって補題 付録 F.1(c) の空成分除去は恒等操作となる．同補題 (a),(b),(d) により，最終文法の各非終端記号 X には入力非

終端記号 A，非空成分集合 I，成分置換 σ，隣接成分連結 μ が対応し，$L_X(G) = \mu\big(\sigma\pi_I(L_A(G_{\mathrm{in}}))\big)$ が成り立つ．付録冒頭の長さ不等式から，

$$\min_{\vec{u}\in L_X(G)} \|\vec{u}\|_1 \le \min_{\vec{w}\in L_A(G_{\mathrm{in}})} \|\vec{w}\|_1.$$

最後の刈り込みは残る非終端記号の言語を変えないので，$t_G \le t_{G_{\mathrm{in}}}$ である．補題 付録 F.1 の固定パラメータでのコピー数評価とテンプレート非拡大性より，$\|G\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ が従う．さらに補題 4.1(iii) を適用すると

$$\theta_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\} = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\| \max\{1, t_{G_{\mathrm{in}}}\})$$

を得る． □

したがって，削除規則それ自体は，縮約済み λ-自由表示からの厚みの多項式転移を妨げない．問題となるのは実際に空の成分が存在する場合である．

命題 付録 F.3 (空成分除去は厚みを指数的に増大させ得る)**.** 任意の $n \ge 1$ に対して，サイズ $O(n)$，ファンアウト *2*，規則ランク *2* の縮約済み *MCFG* E_n で，$t_{E_n} \le 2$ と $\theta_{E_n} = O(n)$ を満たしながら，命題 *3.9* の空成分除去段階で，厚みが少なくとも 2^n の残存非終端記号と残存規則が現れるものが存在する．

証明. E_n はファンアウト 1 の開始記号 S と，ファンアウト 2 の $A_0, \dots, A_n$ をもち，

$$\begin{aligned} &A_0 \to (\mathtt{a}, \varepsilon),\\ &A_i \to (\varepsilon, \mathtt{c}) \mid (\xi_1^1\xi_2^1, \xi_1^2\xi_2^2)(A_{i-1}, A_{i-1}) \quad (1 \le i \le n),\\ &S \to (\xi_1^1 \mathtt{d}\, \xi_1^2)(A_n) \end{aligned}$$

という規則をもつとする．これは縮約済みで，非消去，非置換，非融合である．短い側枝への導出から $t_{E_n} \le 2$ であり，二分木の背骨上の一枝に任意の規則を置き，兄弟を最短で完成させると $\theta_{E_n} = O(n)$ が従う．

A_i が生成するタプルの第 1 成分が非空で第 2 成分が空なら，規則 $(\varepsilon, \mathtt{c})$ は使用できない．帰納法により，そのような最短タプルは $(\mathtt{a}^{2^i}, \varepsilon)$ である．したがって A_n のパターン $\{1\}$ は空成分除去後も残存し，射影された開始規則 $S \to \xi_1^1 \mathtt{d}\, (A_n^{\{1\}})$ の成功導出には，長さが少なくとも 2^n の子が必要である．よって残存非終端記号と規則の厚みは少なくとも 2^n となる． □

これは命題 4.5 と同種の障害である．有限状態への精密化により，一つの精密化状態の内部で必要な最短証拠が指数的に長くなり得る．

原稿作成過程における生成 AI・AI 支援技術の利用申告

著者は原稿の構成の整理，文章表現・翻訳の補助，文献・記法の照合，および LaTeX ソースの編集に，ChatGPT（OpenAI）と Claude（Anthropic）を使用した．著者は出力の内容を確認し，必要に応じて修正・採否を判断した．最終的な原稿の正確性，引用，および公表内容については著者が責任を負う．

参考文献

[1] E. M. Gold. Language identification in the limit. *Information and Control*, 10(5):447–474, 1967.

[2] D. Angluin. Inductive inference of formal languages from positive data. *Information and Control*, 45(2):117–135, 1980.

[3] A. Clark and R. Eyraud. Polynomial identification in the limit of substitutable context-free languages. *Journal of Machine Learning Research*, 8:1725–1745, 2007.

[4] C. de la Higuera. Characteristic sets for polynomial grammatical inference. *Machine Learning*, 27:125–138, 1997.

[5] F. Coste, D. Fredouille, C. Kermorvant, and C. de la Higuera. Introducing domain and typing bias in automata inference. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications – ICGI 2004*, LNCS 3264, pp. 115–126, Springer, 2004.

[6] Y. Takada. Grammatical inference for even linear languages based on control sets. *Information Processing Letters*, 28(4):193–199, 1988. doi:10.1016/0020-0190(88)90208-6.

[7] Y. Takada. Learning formal languages based on control sets. In K. P. Jantke and S. Lange (eds.), *Algorithmic Learning for Knowledge-Based Systems*, LNCS 961, pp. 316–339, Springer, 1995.

[8] A. Clark. Learning trees from strings: A strong learning algorithm for some context-free grammars. *Journal of Machine Learning Research*, 14:3537–3559, 2013.

[9] F. Coste, G. Garet, and J. Nicolas. Local substitutability for sequence generalization. In *Proceedings of the 11th International Conference on Grammatical Inference*, JMLR Workshop and Conference Proceedings 21, pp. 97–111, 2012.

[10] R. Eyraud, J. Heinz, and R. Yoshinaka. Efficiency in the identification in the limit learning paradigm. In J. Heinz and J. M. Sempere (eds.), *Topics in Grammatical Inference*, pp. 25–46. Springer, 2016. doi:10.1007/978-3-662-48395-4_2.

[11] F. Coste and J. Nicolas. Learning local substitutable context-free languages from positive examples in polynomial time and data by reduction. In *Proceedings of the 14th International Conference on Grammatical Inference*, Proceedings of Machine Learning Research 93, pp. 155–168, 2019.

[12] R. Yoshinaka. Identification in the limit of k, l-substitutable context-free languages. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications*, LNCS 5278, pp. 266–279. Springer, 2008.

[13] R. Yoshinaka. Learning mildly context-sensitive languages with multidimensional substitutability from positive data. In *Algorithmic Learning Theory*, LNCS 5809, pp. 278–292. Springer, 2009. doi:10.1007/978-3-642-04414-4_24.

[14] R. Yoshinaka. Efficient learning of multiple context-free languages with multidimensional substitutability from positive data. *Theoretical Computer Science*, 412(19):1821–1831, 2011. doi:10.1016/j.tcs.2010.12.058.

[15] R. Yoshinaka. General perspective on distributionally learnable classes. In *Proceedings of the 14th Meeting on the Mathematics of Language (MoL 2015)*, pp. 87–98. Association for Computational Linguistics, 2015. doi:10.3115/v1/W15-2308.

[16] R. Yoshinaka. Polynomial-time identification of multiple context-free languages from positive data and membership queries. In *Grammatical Inference: Theoretical Results and Applications*, LNCS 6339, pp. 230–244. Springer, 2010. doi:10.1007/978-3-642-15488-1_19.

[17] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of context-free and multiple context-free grammars. In J. Heinz and J. M. Sempere (eds.), *Topics in Grammatical Inference*, pp. 143–172. Springer, 2016. doi:10.1007/978-3-662-48395-4_6.

[18] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of parallel multiple context-free grammars. *Machine Learning*, 96(1–2):5–31, 2014. doi:10.1007/s10994-013-5403-2.

[19] T. Oates, T. Armstrong, L. Becerra-Bonache, and M. Atamas. Inferring grammars for mildly

context-sensitive languages in polynomial-time. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications – ICGI 2006*, LNCS 4201, pp. 137–147. Springer, 2006.

[20] M. Kanazawa and R. Yoshinaka. Extending distributional learning from positive data and membership queries. In *Proceedings of the 16th International Conference on Grammatical Inference*, Proceedings of Machine Learning Research 217, pp. 8–22, 2023.

[21] P. D. Gallot. *Safety of transformations of data trees: Tree transducer theory applied to a verification problem on shell scripts*. PhD thesis, Université de Lille, 2021. `https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/EDMADIS/2021/2021LILUB030.pdf`.

[22] A. Bishop, M. Elder, A. Evetts, P. Gallot, and A. Levine. On groups with EDT0L word problem. *International Journal of Algebra and Computation*, 36(4):425–486, 2026. doi:10.1142/S0218196726500165.

[23] A. Duncan, M. Elder, L. Frenkel, and M. Lyu. A substitution lemma for multiple context-free languages. *International Journal of Algebra and Computation*, 2026 (online publication). doi:10.1142/S0218196726500463.

[24] O. Rambow and G. Satta. Independent parallelism in finite copying parallel rewriting systems. *Theoretical Computer Science*, 223(1–2):87–120, 1999. doi:10.1016/S0304-3975(97)00190-4.

[25] T. Kuriyama. Distributional learning of context-free languages under fixed finite-semigroup typing. *Theoretical Computer Science* 提出改訂稿, TCS-D-26-00494R1（2026 年 10 月）. 公開版は arXiv:1409.6247v4. `https://arxiv.org/abs/1409.6247`. 本稿の Proposition 6.4 は提出改訂稿の番号である.

[26] J.-E. Pin. *Varieties of Formal Languages*. North Oxford Academic, London, and Plenum, New York, 1986.

[27] J. C. Costa. Some pseudovariety joins involving locally trivial semigroups. *Semigroup Forum*, 64(1):12–28, 2002. doi:10.1007/s002330010060.

[28] J. C. Costa. Some pseudovariety joins involving groups and locally trivial semigroups. In *Semigroups, Algorithms, Automata and Languages*, pp. 341–348. World Scientific, 2002.

[29] H. Seki, T. Matsumura, M. Fujii, and T. Kasami. On multiple context-free grammars. *Theoretical Computer Science*, 88(2):191–229, 1991. doi:10.1016/0304-3975(91)90374-B.

[30] L. Kallmeyer. *Parsing Beyond Context-Free Grammars*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. doi:10.1007/978-3-642-14846-0.

[31] M. Kanazawa. Ogden's lemma, multiple context-free grammars, and the control language hierarchy. *Information and Computation*, 269:104449, 2019. doi:10.1016/j.ic.2019.104449.

[32] C. Gómez-Rodríguez, M. Kuhlmann, G. Satta, and D. Weir. Optimal reduction of rule length in linear context-free rewriting systems. In *Proceedings of Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, pp. 539–547. Association for Computational Linguistics, 2009.

[33] A. Geroldinger and F. Halter-Koch. *Non-Unique Factorizations: Algebraic, Combinatorial and Analytic Theory*, volume 278 of *Pure and Applied Mathematics*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2006.

[34] G. Ramalingam and T. Reps. An incremental algorithm for a generalization of the shortest-path problem. *Journal of Algorithms*, 21(2):267–305, 1996. doi:10.1006/jagm.1996.0046.

[35] M.-J. Nederhof. Weighted deductive parsing and Knuth's algorithm. *Computational Linguistics*, 29(1):135–143, 2003.

[36] J. Almeida, S. Margolis, B. Steinberg, and M. Volkov. Representation theory of finite semigroups, semigroup radicals and formal language theory. *Transactions of the American Mathematical Society*, 361(3):1429–1461, 2009. doi:10.1090/S0002-9947-08-04712-0.

[37] H. Straubing. Finite semigroup varieties of the form $\mathbf{V} * \mathbf{D}$. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 36:53–94, 1985.

[38] B. Tilson. Categories as algebra: an essential ingredient in the theory of monoids. *Journal of Pure*

and Applied Algebra, 48:83–198, 1987.

[39] C. H. Papadimitriou. On the complexity of integer programming. *Journal of the ACM*, 28(4):765–768, 1981. doi:10.1145/322276.322287.