

すべての括弧が必要になるとき

栗山貴之

概要

変数の順序を $x_1, \dots, x_n$ に固定し、 $+$ 、 $\times$ 、 $/$ を用いて完全括弧付き式を作る。最外側以外の任意の一組の括弧を取り除くと、その結果得られる中置式が表す有理関数が変化するとき、その式を剛直であるという。三行からなる局所規則によって剛直な式を完全に分類でき、相異なる剛直な式は相異なる有理関数を表す。剛直な式の個数を r_n とすると、

$$r_2 = 3, \quad r_n = 2F_{n+1} \quad (n \geq 3),$$

となる。ここで $F_1 = F_2 = 1$ はフィボナッチ数である。

1 問題

括弧は、見た目には存在していても、数学的には何の役割も果たしていないことがある。たとえば、

$$x_1 + (x_2/x_3) = x_1 + x_2/x_3$$

である。一方、

$$x_1/(x_2 + x_3) \neq x_1/x_2 + x_3$$

である。では、内側にあるどの括弧も無意味ではない完全括弧付き式は、いくつあるだろうか。

この順序で並ぶ相異なる不定元 $x_1, \dots, x_n$ を固定する。完全括弧付き式とは、式全体がかっこでおおわれており、葉が左から右へ $x_1, \dots, x_n$ と並び、内部頂点に

$$+, \quad \times, \quad /$$

のいずれかが付された平面完全二分木である。式は $\mathbb{Q}(x_1, \dots, x_n)$ の元として比較する。ただし、式全体を囲む括弧のみ、上のように省略して書くようにする。残る $n-2$ 組の括弧は、それぞれ二つの内部頂点を結ぶ一辺に対応する。

一組の括弧を取り除いた後の中置式は、次の規約に従って構文解析する。 $\times$ と $/$ は同じ優先順位をもち左結合、 $+$ はそれらより低い優先順位をもち左結合とする。答えはこの規約に依存し、たとえば積と商を右結合とすれば、 $(A/B) \times C$ の括弧は一般に必要な。

他のすべての括弧を残したまま一組だけを取り除いたとき、式が表す有理関数が変化するなら、その括弧を必要であるという。 $n-2$ 個の候補括弧がすべて必要であるとき、その式を剛直であるという。

$n=3$ の場合、剛直な式は次の六つである。

$$\begin{array}{lll} (x_1 + x_2) \times x_3, & (x_1 + x_2)/x_3, & x_1 \times (x_2 + x_3), \\ x_1/(x_2 + x_3), & x_1/(x_2 \times x_3), & x_1/(x_2/x_3). \end{array}$$

ここでは最外側の括弧を表示していない。 $x_1, \dots, x_n$ 上の剛直な式の個数を r_n とすれば、 $r_3 = 6$ である。

$n = 2$ のとき、完全括弧付き式は

$$(x_1 + x_2), \quad (x_1 \times x_2), \quad (x_1 / x_2)$$

の三つであり、これら自体が剛直である。ただし今回は式全体を覆うかっこを見せている。「すべての候補括弧が必要である」という剛直性の条件は三つの式すべてについて満たされる。よって $r_2 = 3$ である。

本稿の対象は、括弧が最小限に付された中置文字列ではなく、完全括弧付き二分木である。木を固定することで、指定された括弧の必要性が辺に局所的な性質になる。本稿では三つの演算だけを扱う。減算を加えると別の数え上げ問題が生じる。

2 局所規則

根の演算が $+$ である内部子を**加法的**であるという。次の表は、内部子を囲む括弧が必要であるかどうかを決定する。

親	左の内部子	右の内部子
$+$	決して必要でない	決して必要でない
$\times$	加法的な場合に限り必要	加法的な場合に限り必要
$/$	加法的な場合に限り必要	常に必要

表 1 内部子を囲む括弧が必要となる条件。

3 構造とフィボナッチ数

命題 1 (構造分類). 少なくとも二つの葉をもつ完全括弧付き式が剛直であるための必要十分条件は、次の三つのうちちょうど一つが成り立つことである。

1. 根が $+$ であり、二つの子がともに葉である。
2. 根が $\times$ であり、各子が葉または二葉の和である。
3. 根が $/$ であり、左の子が葉または二葉の和で、右の子が葉または剛直な式である。

証明. 式が剛直であるとする。根が $+$ なら、局所規則により内部子は許されず、二つの子はともに葉である。根が $\times$ なら、すべての内部子は加法的でなければならない。文脈独立性により、そのような子自身も剛直なので、第一の場合から二葉の和である。根が $/$ の場合、左の子には同じ議論が適用されるが、内部右子の根演算には制限がなく、その右部分木は文脈独立性により剛直である。

逆に、列挙した三つの形のいずれかをもつ式では、根の直下の括弧は局所規則により必要であり、剛直な子の内部にある括弧も文脈独立性により式全体で必要である。したがって式全体が剛直である。 $\square$

定理 2. $F_1 = F_2 = 1$ とする。このとき、

$$r_2 = 3, \quad r_n = 2F_{n+1} \quad (n \geq 3)$$

である。したがって、

$$r_2, r_3, r_4, r_5, r_6, r_7, r_8, \dots = 3, 6, 10, 16, 26, 42, 68, \dots$$

となる。

証明. すでに $r_2 = 3$ と $r_3 = 6$ を得ている。葉が四つの場合、根が乗法である式は、左右に二葉の和をも一つだけである。根が除法である式は、左のブロックが一葉または二葉である場合に応じて

$$r_3 + r_2 = 6 + 3 = 9$$

個あるので、 $r_4 = 10$ である。

$n \geq 5$ とする。構造分類により根は $+$ にも $\times$ にもなれないので、 $/$ である。左の子は葉 x_1 で、右に $x_2, \dots, x_n$ 上の任意の剛直な式を置くか、和 $x_1 + x_2$ で、右に $x_3, \dots, x_n$ 上の任意の剛直な式を置く。したがって

$$r_n = r_{n-1} + r_{n-2} \quad (n \geq 5).$$

$r_3 = 6 = 2F_4$ および $r_4 = 10 = 2F_5$ から主張が従う。 $\square$

この漸化式は、フィボナッチ数に現れるモノマー–ドミノ型の選択を表している。また、初期値と漸化式から、通常母関数は

$$R(z) = \sum_{n \geq 2} r_n z^n = \frac{3z^2 + 3z^3 + z^4}{1 - z - z^2}$$

である。

命題 3. 相異なる剛直な式は、相異なる有理関数を表す。

証明. x_i および $x_i + x_{i+1}$ を**基本ブロック**と呼ぶ。構造分類により、任意の葉または剛直な式が表す有理関数は

$$\prod_{j=1}^k b_j^{\varepsilon_j}, \quad \varepsilon_j \in \{1, -1\}$$

と書ける。ここで b_j は、左から右へ並ぶ互いに素な変数区間上の基本ブロックである。乗法は二つの正の基本ブロックを連結し、除法は左の基本ブロックを先頭に置いて、右の子の因子に付く符号をすべて反転させる。

各基本ブロックは一意分解整域 $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$ のモニックな既約一次多項式であり、相異なる基本ブロックは互いに同伴でない。したがって、有理関数から符号付き基本因子列が一意に定まる。一因子の列は葉または二葉の和を、二つの正因子はその積を与える。それ以外では、構造分類により第一因子が左の子で、根は除法である。残りの符号をすべて反転すれば右の子を再帰的に復元できる。よって有理関数から式が一意に定まる。 $\square$

位置づけ

冗長な括弧に関する先行研究は、主として優先順位と結合規則のもとで構文を保存する文法やアンパーシングを扱う [?, ?, ?]。一方、関連する算術式の数え上げでは、有理関数の同値類が研究されている [?, ?]。本稿では完全括弧付き木を固定し、その各内側括弧が意味論的に必要であることを要求する。OEIS の記法では $r_n = A118658(n+2)$ for $n \geq 3$ であり、定理 ?? はこの数列に括弧による解釈を与える [?]。OEIS A155069 は、 $+$ と $-$ を用いた最小括弧付き中置文字列を数える別のモデルである。

参考文献

- [1] R. M. Bates, Distinguishing redundant parentheses by syntax, *Internat. J. Comput. Math.* **82** (2005), 951–967.
- [2] B. Cohen, The number of non-isomorphic arithmetic expressions that can be constructed using $+$, $-$, $\times$, and $/$, arXiv:2602.18522 (2026).
- [3] W. B. Lotfallah, Characterizing unambiguous precedence systems in expressions without superfluous parentheses, *Internat. J. Comput. Math.* **86** (2009), 1–20.
- [4] N. Ramsey, Unparsing expressions with prefix and postfix operators, *Software: Practice and Experience* **28** (1998), 1327–1356.
- [5] I. Stošić, I. Damnjanović, and Ž. Randelović, Counting the number of inequivalent arithmetic expressions on n variables, *Filomat* **39** (2025), 949–962.
- [6] N. J. A. Sloane and The OEIS Foundation Inc., The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, A118658 and A155069.