
Punktweise und Gleichmäßige Konvergenz

Es sei $f(n) : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge von Funktionen, dann heißt $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ punktweise Konvergent falls die Folge $(f_n(x))_n$ für alle $x \in D$ konvergiert. Die Funktionen-Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ heißt gleichmäßig Konvergent gegen f falls $\forall x \forall \epsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_0 \forall x \in D |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ oder äquivalent $\forall \epsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_0 \sup(|f_n(x) - f(x)|) < \epsilon$

Satz: Ist $(f_n)_n$ eine gleichmäßig Konvergente Folge stetiger Funktionen, dann ist ihr Grenzwert auch stetig.

Bsp: Sei $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ $f_n(x) = x^n$ hat Punktmäßig Grenzwerte.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für alle } x \in [0, 1) \\ 1 & \text{für } x = 1 \end{cases} \quad (1)$$

Der Grenzwert ist nicht stetig also Konvergenz nicht gleichmäßig.

Warum wichtig für Infos?

Oft ist idealer Weg gesucht, z.B Flugbahn, Fräsbahn. Diese wird durch Funktion $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ beschrieben. Nur passen allgemeine Funktionen nicht in den Computer rein.

Man behilft sich durch diskretisierung γ_n der Funktion $\gamma_n[0, \frac{1}{h}, \frac{2}{h}, \frac{3}{h}, \dots, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$

Dieses γ_n soll für jede Folge $h_n \rightarrow 0$ gleichmäßig gegen γ konvergieren.

Aufgabe 1

Zeigen sie die Funktionen-Folge $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f_n(x) := \begin{cases} 0 & \text{für } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ \frac{1}{n} & \text{für } x \in \mathbb{Q} \end{cases} \quad (2)$$

konvergiert gleichmäßig.

Aufgabe 2

Es sei $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f_n(x) = \frac{1}{n}x$ eine Funktionen-Folge.

Zeigen sie:

- Ist $D = [a, b]$ mit $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ beliebig so konvergiert $(f_n)_n$ gleichmäßig auf D
- Ist $D = \mathbb{R}$ so konvergiert $(f_n)_n$ zwar punktweise aber nicht gleichmäßig.

Lösung zu Aufgabe 1

Es sei $\epsilon > 0$ beliebig (aber fest).

Wähle $N_0 \in \mathbb{N}$, so dass $N_0 > \frac{1}{\epsilon}$ dann gilt für alle $n \geq N_0$ und alle $x \in D$

$$|f_n(x) - 0| \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N_0} < \epsilon.$$

Damit ist gleichmäßige Konvergenz von f_n gegen die Null-Funktion gezeigt.

Lösung 2a)

Es sei $\epsilon > 0$ (beliebig aber fest).

Wähle $N_0 \in \mathbb{N}$, so dass

$$N_0 > \frac{1}{\epsilon} \cdot \max|a|, |b|$$

Dann gilt für alle $n \geq N_0$ und alle $x \in D$, dass

$$|f_n(x) - 0| = \left| \frac{1}{n}x \right| \leq \frac{1}{n}|x| \leq \frac{1}{n}\max|a|, |b| \leq \frac{1}{N_0} \cdot \max|a|, |b| < \epsilon$$