

Ayrık-Zamanlı Fourier Dönüşümü

Dönüşüm çifti

$$\begin{aligned}x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega, \\X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}.\end{aligned}$$

Örnek:

$$x[n] = a^n u[n], \quad |a| < 1.$$

İşaretinin Fourier dönüşümünü bulalım.

$$\begin{aligned}X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n] e^{-j\omega n} \\&= \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}.\end{aligned}$$

Örnek:

$$x[n] = a^{|n|}, \quad |a| < 1.$$

şeklinde verilen işaretin Fourier dönüşümünü bulalım.

$$\begin{aligned}X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^{|n|} e^{-j\omega n} \\&= \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} + \sum_{n=-\infty}^{-1} a^{-n} e^{-j\omega n}.\end{aligned}$$

$$m = -n$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n + \sum_{m=1}^{\infty} (ae^{j\omega})^m.$$

$$\begin{aligned}X(e^{j\omega}) &= \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} + \frac{ae^{j\omega}}{1 - ae^{j\omega}} \\&= \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}.\end{aligned}$$

Dönüşümün Varlık koşulu:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < \infty,$$

Örnek:


$$x[n] = \delta[n].$$

$$X(e^{j\omega}) = 1.$$

Örnek:

$$x[n] = \cos \omega_0 n = \frac{1}{2} e^{j\omega_0 n} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 n},$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{5}.$$



$$X(e^{j\omega}) = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \pi \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{5} - 2\pi l\right) + \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \pi \delta\left(\omega + \frac{2\pi}{5} - 2\pi l\right).$$

$$X(e^{j\omega}) = \pi \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{5}\right) + \pi \delta\left(\omega + \frac{2\pi}{5}\right), \quad -\pi \leq \omega < \pi,$$

Örnek:



$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kN],$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n}.$$

$$0 \leq n \leq N - 1,$$

$$a_k = \frac{1}{N}.$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right).$$



Ayrık-Zamanlı Fourier Dönüşümünün Özellikleri

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \mathcal{F}\{x[n]\}, \\ x[n] &= \mathcal{F}^{-1}\{X(e^{j\omega})\}, \\ x[n] &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}). \end{aligned}$$

Periyodiklik:

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega}).$$

Lineerlik:

$$x_1[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_1(e^{j\omega})$$

$$x_2[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_2(e^{j\omega}),$$

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega}).$$

Zamanda ve frekansta Öteleme:


$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}),$$

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j(\omega - \omega_0)}).$$

Örnek:

AGS-YGS (Alçak geçiren- Yüksek geçiren süzgeç) farkı



Süzgeçler arasında frekans ve zaman domeninde

$$H_{hp}(e^{j\omega}) = H_{lp}(e^{j(\omega-\pi)}).$$

$$\begin{aligned} h_{hp}[n] &= e^{j\pi n} h_{lp}[n] \\ &= (-1)^n h_{lp}[n]. \end{aligned}$$

ilişkisi vardır.

Eşlenik Alma:

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}),$$

$$x^*[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X^*(e^{-j\omega}).$$

Reel $x[n]$ için

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \quad [x[n] \text{ real}].$$

Fark Alma:







$$x[n] - x[n-1] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega}).$$

Zamanda Katlama:

$$x[-n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{-j\omega}).$$

Zamanda Ölçekleme:

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{j\omega}{a}\right).$$



Parseval Bağıntısı:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega.$$

Konvolüsyon:

$$y[n] = x[n] * h[n],$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}),$$

Örnek:

$$h[n] = \delta[n - n_0].$$



$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n - n_0] e^{-j\omega n} = e^{-j\omega n_0}.$$

Herhangi bir giriş işareti için sistem çıkışı

$$Y(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega}).$$

Örnek:

Aşağıda frekans cevabı verilen AGS nin impuls cevabını bulalım.



$$\begin{aligned} h[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}, \end{aligned}$$

Örnek:

$$h[n] = \alpha^n u[n],$$

$$x[n] = \beta^n u[n],$$

şeklinde impuls cevabı ve giriş işareti verilen sistemin çıkışını bulalım.

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \beta e^{-j\omega}},$$

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \alpha e^{-j\omega})(1 - \beta e^{-j\omega})}.$$

Rezidü yöntemi ile,

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{A}{1 - \alpha e^{-j\omega}} + \frac{B}{1 - \beta e^{-j\omega}}.$$

$$A = \frac{\alpha}{\alpha - \beta}, \quad B = -\frac{\beta}{\alpha - \beta}.$$

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{\alpha}{\alpha - \beta} \alpha^n u[n] - \frac{\beta}{\alpha - \beta} \beta^n u[n] \\ &= \frac{1}{\alpha - \beta} [\alpha^{n+1} u[n] - \beta^{n+1} u[n]]. \end{aligned}$$

Çarpım Özelliği:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(e^{j\theta}) X_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta.$$

Fourier Dönüşümünün Özellikleri

Property	Aperiodic Signal	Fourier Transform
	$x[n]$	$X(e^{j\omega})$ periodic with
	$y[n]$	$Y(e^{j\omega})$ period 2π
Linearity	$ax[n] + by[n]$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$
Time Shifting	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
Frequency Shifting	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
Conjugation	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
Time Reversal	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
Time Expansion	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & \text{if } n = \text{multiple of } k \\ 0, & \text{if } n \neq \text{multiple of } k \end{cases}$	$X(e^{jk\omega})$
Convolution	$x[n] * y[n]$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
Multiplication	$x[n]y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$
Differencing in Time	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
Accumulation	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega})$
		$+ \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$
Differentiation in Frequency	$nx[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
Conjugate Symmetry for Real Signals	$x[n]$ real	$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \\ \Re\{X(e^{j\omega})\} = \Re\{X(e^{-j\omega})\} \\ \Im\{X(e^{j\omega})\} = -\Im\{X(e^{-j\omega})\} \\ X(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) \\ \angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega}) \end{cases}$
Symmetry for Real, Even Signals	$x[n]$ real and even	$X(e^{j\omega})$ real and even
Symmetry for Real, Odd Signals	$x[n]$ real and odd	$X(e^{j\omega})$ purely imaginary and odd
Even-odd Decomposition of Real Signals	$x_e[n] = \mathcal{E}\{x[n]\} \quad [x[n] \text{ real}]$ $x_o[n] = \mathcal{O}\{x[n]\} \quad [x[n] \text{ real}]$	$\Re\{X(e^{j\omega})\}$ $j\Im\{X(e^{j\omega})\}$
Parseval's Relation for Aperiodic Signals		
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$		

Fourier Dönüşüm Çiftleri

Signal	Fourier Transform	Fourier Series Coefficients (if periodic)
$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	a_k
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$	(a) $\omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$ $a_k = \begin{cases} 1, & k = m, m \pm N, m \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ (b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ irrational \Rightarrow The signal is aperiodic
$\cos \omega_0 n$	$\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \{\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)\}$	(a) $\omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$ $a_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = \pm m, \pm m \pm N, \pm m \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ (b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ irrational \Rightarrow The signal is aperiodic
$\sin \omega_0 n$	$\frac{\pi}{j} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \{\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) - \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)\}$	(a) $\omega_0 = \frac{2\pi r}{N}$ $a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j}, & k = r, r \pm N, r \pm 2N, \dots \\ -\frac{1}{2j}, & k = -r, -r \pm N, -r \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ (b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ irrational \Rightarrow The signal is aperiodic
$x[n] = 1$	$2\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi l)$	$a_k = \begin{cases} 1, & k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$
Periodic square wave $x[n] = \begin{cases} 1, & n \leq N_1 \\ 0, & N_1 < n \leq N/2 \end{cases}$ and $x[n + N] = x[n]$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	$a_k = \frac{\sin[(2\pi k/N)(N_1 + \frac{1}{2})]}{N \sin[2\pi k/2N]}, \quad k \neq 0, \pm N, \pm 2N, \dots$ $a_k = \frac{2N_1 + 1}{N}, \quad k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots$
$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN]$	$\frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	$a_k = \frac{1}{N}$ for all k
$a^n u[n], \quad a < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	—
$x[n] = \begin{cases} 1, & n \leq N_1 \\ 0, & n > N_1 \end{cases}$	$\frac{\sin[\omega(N_1 + \frac{1}{2})]}{\sin(\omega/2)}$	—
$\frac{\sin Wn}{\pi n} = \frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{Wn}{\pi}\right)$ $0 < W < \pi$	$X(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \omega \leq W \\ 0, & W < \omega \leq \pi \end{cases}$ $X(\omega)$ periodic with period 2π	—
$\delta[n]$	1	—
$u[n]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega - 2\pi k)$	—
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$	—
$(n+1)a^n u[n], \quad a < 1$	$\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$	—
$\frac{(n+r-1)!}{n!(r-1)!} a^n u[n], \quad a < 1$	$\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^r}$	—

	Continuous time		Discrete time	
	Time domain	Frequency domain	Time domain	Frequency domain
Fourier Series	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ continuous time periodic in time	$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$ discrete frequency aperiodic in frequency	$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$ discrete time periodic in time	$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n}$ discrete frequency periodic in frequency
Fourier Transform	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ continuous time aperiodic in time	$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$ continuous frequency aperiodic in frequency	$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$ discrete time aperiodic in time	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$ continuous frequency periodic in frequency

Fark denklemlerinin Fourier Domeninde Modellenmesi

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k].$$

Fark denkleminde 2 tarafın da AZFD (Ayrık-Zamanlı Fourier dönüşümü) alınarak, sistemin frekans cevabı

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})}.$$

$$\sum_{k=0}^N a_k e^{-jk\omega} Y(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^M b_k e^{-jk\omega} X(e^{j\omega}),$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-jk\omega}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-jk\omega}}.$$

Örnek:

Fark denklemi

$$y[n] - ay[n-1] = x[n],$$

şeklinde verilen sistemin impuls cevabını bulalım.

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}.$$

$$h[n] = a^n u[n].$$

Örnek:

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n].$$

Fark denklemi yukarıda verilen sistemin impuls cevabı

$$H(e^{j\omega}) = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}.$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{2}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})}.$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}.$$

$$h[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n].$$

Örnek:

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n].$$

girişi için önceki örnekte verilen sistemin çıkışını bulalım.

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = \left[\frac{2}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})} \right] \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} \right] \\ &= \frac{2}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})^2}. \end{aligned}$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{B_{11}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} + \frac{B_{12}}{(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})^2} + \frac{B_{21}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}},$$

$$Y(e^{j\omega}) = -\frac{4}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} - \frac{2}{(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})^2} + \frac{8}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}.$$

$$y[n] = \left\{ -4\left(\frac{1}{4}\right)^n - 2(n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n + 8\left(\frac{1}{2}\right)^n \right\} u[n].$$