

Counts per 20 MeV/c<sup>2</sup>

ALICE, Pb–Pb  $\sqrt{s_{\text{NN}}} = 5.02$  TeV

$J/\psi \rightarrow \mu^+\mu^-$

$|y| < 0.8$

$p_{\text{T}} \in (1.04, 1.12)$  GeV/c

— sum

$\chi^2/\text{NDF} = 0.515$

---- J/ψ signal

$N_{J/\psi} = 11 \pm 4$

$M_{J/\psi} = 3.104 \pm 0.005$  GeV/c<sup>2</sup>

$\sigma = 0.012$  GeV/c<sup>2</sup>

$\alpha_{\text{L}} = 1.39$

$n_{\text{L}} = 6.99$

$\alpha_{\text{R}} = 1.53$

$n_{\text{R}} = 7.85$

... background

$\lambda = -1.56 \pm 0.19$  GeV<sup>-1</sup>c<sup>2</sup>

with  $m_{\mu\mu} \in (3.0, 3.2)$  GeV/c<sup>2</sup>:

$N_{\text{bkg}} = 9 \pm 1$

0

2

4

6

8

10

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

$m_{\mu\mu}$  (GeV/c<sup>2</sup>)

