A.


Not Flooded
vs
Flooded
Nodes
Log fold change
Mean read proportion
-5.00
-3.33
-1.67
0.00
1.67
3.33
5.00
0.000226
0.153000
0.311000
0.474000
0.643000
0.819000
1.000000
dissotocum
jasmonium
Pythium
Pythiaceae
Pythiales
jonesum
Oomycetes
Oomycota
Stramenopila
Eukaryota
Peronosporales
Peronosporaceae
Phytophthora
sp.kunmaurra
Agaricomycetes
Agaricales
Clavaria
Ascomycota
Fungi
Basidiomycota
Cystofilobasidiales
Tremellomycetes
Mrakiaceae
Tausonia
puttians
Microbotryomycetes
Tremellales
Leotiomycetes
Helotiales
Dermateaceae
Coleophoma
Hyaloscyphaceae
Dothideomycetes
Pleosporales
Sporidiobolales
Sporidiobolaceae
Didymellaceae
Didymella
fabae
Rhodotorula
kratochvilovae
Sordariomycetes
Hypocreales
Hypocreaceae
Amphisphaeriales
Trichoderma
Pestalotiopsidaceae
Neopestalotiopsis
paucisporum
iberica
debomae
Coniochaeta
Coniochaetaceae
Coniochaetales
thomii
Penicillium
Aspergillaceae
Eurotiales
Eurotiomycetes
Thelebolales
Pseudeurotiaceae

B.


Not Flooded
vs
Flooded
Nodes
Log fold change
Mean read proportion
-5.00
-3.33
-1.67
0.00
1.67
3.33
5.00
0.000225
0.153000
0.311000
0.474000
0.643000
0.819000
1.000000
kratochvilovae
jasmonium
Rhodotorula
puttians
Tausonia
Sporidiobolaceae
dissotocum
Pythium
Mrakiaceae
Sporidiobolales
Pythiaceae
jonesum
Cystofilobasidiales
Microbotryomycetes
Pythiales
Tremellales
Tremellomycetes
Basidiomycota
Oomycetes
Oomycota
Clavaria
Clavariaceae
Agaricales
Agaricomycetes
Stramenopila
Peronosporaceae
Phytophthora
sp.kunmaurra
Eukaryota
Eurotiomycetes
Peronosporales
Aspergillaceae
spinulosum
Eurotiales
Penicillium
Fungi
Dothideomycetes
Pleosporales
Didymellaceae
Didymella
fabae
Ascomycota
Hyaloscyphaceae
Leotiomycetes
Helotiales
Amphisphaeriales
Sordariomycetes
Pestalotiopsidaceae
Neopestalotiopsis
Coniochaetales
Hypocreales
Thelebolales
Dermateaceae
Coleophoma
iberica
Coniochaetaceae
Pseudeurotiaceae
Hypocreaceae
Coniochaeta
Trichoderma
debomae
paucisporum