
AULA #11

A via aérea não é da sedação. É da Odontologia.

O efeito dominó: o risco que nós mesmos provocamos

Profa. Dra. Carla Gamba




O EFEITO DOMINÓ

Nenhuma dessas peças é sedação.

- **1** · Sinais vitais não aferidos e estresse invisível
- **2** · Anestésico local além do limite
- **3** · SNC e variação hemodinâmica
- **4** · Via aérea: engasgo e corpo estranho
- **5** · Deterioração clínica imediata

Atherton et al., Br Dent J, 1999 · Fukayama & Yagiela, Int Dent J, 2006




PEÇA 1 · SINAIS VITAIS E ESTRESSE

O estresse também é adrenalina.

- A adrenalina plasmática sobe **durante o procedimento**, pela carga emocional
- Com anestesia eficaz, a resposta simpática é **mínima**
- Dois tubetes: efeito hemodinâmico **menor que uma caminhada leve**

Taggart et al., BMJ, 1976 · Cioffi et al., JADA, 1985 · Niwa et al., Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 2000



PEÇA 2 · ANESTÉSICO LOCAL

A dose tem limite.

Paciente com doença cardiovascular:
0,04 mg de adrenalina

ADRENALINA	TUBETES DE 1,8 ML
1:80.000	**≈ 1,8**
1:100.000	**≈ 2,2**
1:200.000	**≈ 4,4**

Sem vasoconstritor: mais dor e mais anestésico.

Hashemi et al., Glob J Health Sci, 2016 · Seminario-Amez et al., J Evid Based Dent Pract, 2021 (revisão sistemática) · Laragnoit et al., Clinics, 2009

O CENÁRIO

Implante · ASA II, hipertenso controlado · 2 tubetes · primeira fresa · dor.

1

Mais anestésico, além do limite?

2


Seguir com dor e adrenalina endógena?

3

Interromper, com o leito cirúrgico exposto?

Qual é a sua alternativa?

Cioffi et al., JADA, 1985 · Dionne et al., Anesth Analg, 1984



PEÇA 3 · SNC E HEMODINÂMICA

Qual peça caiu?

Palidez · inconsciência · bradicardia · hipotensão

- **Reflexo vasovagal e síncope:** a emergência mais frequente na cadeira
- **Sobredosagem de anestésico local:** da tontura à inconsciência, das arritmias à parada
- Só **40,5%** aferem a pressão · até **87%** não calculam a dose

Yamashita et al., Front Physiol, 2025 · Rhee et al., J Dent Anesth Pain Med, 2019 · Otero et al., J Clin Exp Dent, 2025 · Christensen & Shipp, J Dent Anesth Pain Med, 2026

PEÇA 4 · VIA AÉREA

A obstrução acontece em toda a Odontologia.

Prótese

Cimentação de coroas unitárias: maior chance de aspiração

Tiwana et al., JADA, 2004

Endodontia

44 aspirações em 11 anos; aspirados exigem mais hospitalização

Susini et al., Int Endod J, 2007

Implante

Aspiração da chave do implante, Brasil

Araujo et al., J Stomatol Oral Maxillofac Surg, 2021

Mais frequente entre profissionais de **1 a 7 anos de formados**.

Hisanaga et al., Bull Tokyo Dent Coll, 2014 · Hou et al., Head Face Med, 2016


1 em 5

ORTODONTIA

ortodontistas já teve um paciente que aspirou ou ingeriu parte do aparelho.

Bandas, segmentos de fio e chaves de expansor.

Varho et al., Acta Odontol Scand, 2015 · Karamani et al., J Orthod Sci, 2022



PEÇA 4 · VIA AÉREA

Ingestão ou aspiração?

- Mais aspirados: **próteses 29%**, **coroas 22%**, **chaves de implante 17%**
- Componente perdido: **primeiro descartar a via aérea**
- O silêncio não indica resolução: pode ser **ausência de fluxo aéreo**

Velapati et al., J Bronchology Interv Pulmonol, 2026 · Xie et al., Medicine, 2026 · Grabie et al., HCA Healthc J Med, 2025

O QUE SABEMOS, DE VERDADE

Saber não é o mesmo que conseguir fazer.

36%

acertam a conduta na aspiração de corpo estranho

Shaath et al., Eur J Dent, 2023

82%

dos acadêmicos brasileiros não se sentem preparados para emergências


de Aquino et al., Eur J Dent Educ, 2026

87 × 43

87% treinados em SBV; 43% aptos a executar as manobras

Stafuzza et al., Braz Oral Res, 2014

Sem treino, o tempo até a ventilação de resgate sobe de ~57 para ~90 s em 4 meses · McCaw et al., Adv Simul, 2023



PEÇA 5 · DETERIORAÇÃO CLÍNICA

A última peça.

- **42 eventos graves** com risco de vida em ~1,28 milhão de atendimentos em 1 ano
- Eventos adversos em **1,4%** dos pacientes; **2/3 evitáveis**; 8% procuraram só o médico
- Causa mais comum: **falta de protocolo** · só 44,5% têm protocolo de emergência

Müller et al., Emerg Med J, 2008 · Tokede et al., J Patient Saf, 2024 · Lo et al., JADA, 2025 · Khattak et al., PeerJ, 2026

RED FLAG

RDC 1002/2025 · ANVISA

Plano de Segurança do Paciente no consultório

"O cirurgião-dentista deverá estar apto a prevenir, reconhecer, manejar e resgatar."

Resolução CFO 295/2026, art. 11, §1º

NA SUA PRÓXIMA CONSULTA

Quatro atitudes.

01
Aferir a pressão arterial

02
Investigar ronco e apneia
STOP-Bang

03
Examinar a orofaringe
SARI

04
Aspiração eficaz
150 a 300 L/min

Aspiração: fluxo contínuo de sangue, saliva e secreção para proteger a via aérea.

Baixo volume ≈ 40 L/min (bomba portátil) · médio ≈ 150–160 L/min · alto ≥ 250–300 L/min

Holliday et al., J Dent, 2021 · Graetz et al., Clin Oral Investig, 2022 · Koch & Graetz, PLoS One, 2021

VIAS AÉREAS PARA TODA A ODONTOLOGIA

Três aulas, quatro verbos.

#11

Reconhecer o risco

O efeito dominó

12/11

#12

Prevenir

Avaliar em 2 minutos: STOP-Bang, Mallampati, SARI

19/11

#13

Reconhecer, manejar, resgatar

PSP · SBV · SAVO

26/11

PARA QUEM JÁ TEM A SEDAÇÃO NA ROTINA

Trilha 295

Avaliação de vias aéreas, monitorização, SBV e SAVO no mesmo percurso, rumo à Habilitação Básica em Sedação.

Black Friday até 16/11 | **Presencial · 5 a 9/12 · Rio** | **Online · 104 h ao vivo**

Envie **TRILHA** no WhatsApp · link na descrição

Nenhum curso habilita, inclusive o nosso. Quem habilita é o Conselho.

Na Odontologia, a cavidade oral é o nosso campo de trabalho, mas a via aérea é a nossa responsabilidade:

dominar sua anatomia e fisiologia é o que transforma o risco iminente em segurança clínica.

Todas as referências estão na descrição desta aula.